

終末期・治療差し控えと意思決定 Home

 終末期・治療差し控えと意思決定 Home

Goals of Care の立て方、治療の差し控え・中止、家族との対話、緩和ケアの並行導入。関連30件。院内の運用(ICテンプレート改訂・多職種カンファ・倫理係)は [★ICU意思決定支援・倫理 Home](#) のプロジェクト側で扱い、ここでは**文献の到達点**を置く。

当院の標準(迷ったらこれ)

聖路加ICUでの実践

迷ったらこう動く

- 「Goals of Care」をDNARや人工呼吸の可否と同一視しない。**患者の価値観に基づき臨床的文脈のなかで定められる「医療の包括的な目標」**であって、個別の介入の可否リストではない(「Goals of Care」とは何か — 文献の合意に基づく操作的定義)
- DNAR指示が有効なのは心停止のときのみ。**心停止でない場面で侵襲的介入を行わないことではなく、そのためには改めて合意形成が要る**(日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念 — DNAR指示が有効なのは心停止時のみ、「予想された急変」とフレイル2潮流(JJAAM2025))
- 緩和ケアは予後ではなく「必要性」に基づいて並行導入する。生存が見込まれる患者にも、延命治療と並行して症状・情報のやりとり・家族の負担を扱う(ICU緩和ケアの10のキーポイント — 緩和ケアは予後ではなく必要性に基づく(What's New枠・ICM2016))
- 予後スコアを治療制限の根拠にしない。**予後モデルに基づく治療縮小・中止の決定は、医療専門職の倫理的責任が禁じる**(無益な治療を避けることは尊厳と環境倫理の交点にある(Correspondence・ICM2023))
- 意思決定能力(capacity)は診断名でも点数でも「医師の勧めに従うか」でもない。**選択を伝えられ・理解し・自分のこととして認識し・比較して考えられるか**の4過程を決定ごとに評価する(意思決定能力に関する10の誤解 — capacityは決定ごとの臨床判断、competencyは裁判所の法的判断(VHA国家倫理委員会・JAMDA2004))
- 「困った家族」というラベルを貼る前に、対立の層を見立てる: 課題(何をすべきか)→ プロセス(誰がどう決めたか)→ 関係(信頼と敬意が壊れたか)。**関係領域に入ると解決は格段に難しくなる**(ICUの対立を課題・プロセス・関係の3層で読み解く — 「困った家族」の多くはプロセス不全の帰結(ナラティブレビュー・CritCare2026))
- 深刻な知らせは1回では伝わらない前提で設計する。**混乱・沈黙・怒り・無反応は「わかっていない家族」ではなく、扁桃体とコルチゾールが作業記憶と新規記憶を止めている状態**(深刻な知らせを伝えるときの神経科学 — 扁桃体とコルチゾールが理解を奪う機序と5つの推奨(総説・ICM2026))。回復・書面・時間を置いた再確認を組む
- 多職種カンファでは医師の発話時間を意識的に減らす。フランスの実測では**実質14分のうち医師が94%を話し、看護師・看護助手は1分(5%)、心理士と学生は0分**(フランスICUの延命治療差し控え・中止カンファレンスの実態(Letter・ICM2022))

- 終末期の抗菌薬は「症状緩和になっているか」で判断する。死亡直前の40～80%に投与されているが、**症状緩和は21.4～56.7%と一貫せず、呼吸器感染では0～53%、尿路感染では60～92%と桁が違う**（終末期の抗菌薬は「必要悪」か — 死亡直前の40～80%に投与され症状緩和は21.4～56.7% (What's New・ICM2026)）
- 決めきれないときは時間制限つき治療トライアル(TLT)を使う。5要素と家族面談の進め方を型として持つ（終末期における時間制限つき治療トライアル(TLT) — 5要素と家族面談の進め方 (コメンタリー・JAMA2011)）
- 家族体験を測るなら総合点ではなく領域別に残す。**15項目を1つの点数に丸めた瞬間に「どこを直せばよいか」が見えなくなる**（ICUにおける終末期ケアの家族体験を測定する重要性と課題 (ICM編集)）
- 蘇生をめぐる倫理的な行き詰まりを、個人の道徳的欠陥として扱わない。無益なCPR・slow code・moral distress は、法的曖昧さ・組織文化・チーム階層・資源制約が生み出す構造の産物として読む。当院で先に手を付けられるのは、DNAR記載様式でスコープ（心停止時のみか、心停止前の挿管・昇圧薬まで含むか）を明文化することと、蘇生後の構造化デブリーフィングを定型化すること（蘇生の倫理は個人の失敗ではなくシステムの産物 — 22研究から導かれた倫理的経路モデル (EPM・ナラティブレビュー・ResuscPlus2026)）
- 人工呼吸の適応を判断するとき、生理学的な利益だけでなく「その人が世界とつながっている在り方」への影響も1項目として言語化する。高齢・終末期・慢性呼吸不全では特に。抜管後の数日に名前・身体・場所を言葉にして返す再方向づけも、著者らが挙げた具体策の1つ（人工呼吸を受けるといふ経験の存在論 — 機械論から全体論へ、生きられた身体と世界とのつながりを問う (From the Inside・ICM2026)）
- 「この人は決められない」「この人のQOLはどうせ低い」という無自覚の前提を点検する（ICUにおけるエイブリズム — 障害を理由に治療を絞っていないか (FROM THE INSIDE・ICM2023)）

この領域の到達点

補足

Known / Unknown / What's new

- **確立したこと**: 欧州では治療制限が標準になった ([欧州ICUにおける終末期医療の変化 \(Ethicus-2, JAMA2019\)](#)): 16年で 68.3%→89.7%、制限なしの死亡は 31.7%→10.3%)。緩和ケアは予後ではなく必要性で。面会緩和はICUの既定にすべき (**SCCM 17ステートメント中、強い推奨はこれ1つだけ**)。
- **まだ決着していないこと**: ①ICU終末期の疼痛管理 (**質の高いエビデンスは存在せず、推奨の一致は「データの一致」ではなく「倫理原則と専門家の合意」に由来する**)、②緩和的抜管の手順 (**日本にプロトコルがない**)、③代理意思決定者の負担軽減、④文化差をまたぐ標準化。
- **最近変わったこと**: **対話そのものが研究対象になった**。対立の3層モデル、深刻な知らせの神経科学、カンファの発話時間の実測、[ICU toolbox — 家族面談の交渉スキル \(ICM2026\)](#) と、**「何を決めるか」から「どう話すか」へ重心が移っている**。もう一つは [医師をコーチングすると過剰治療患者のDNI-DNACPR記載が増える \(CODE段階的ウェッジRCT・ICM2024\)](#) で、**医師側への介入が記載行動を変えられることをRCTで示した**。
- **視点の移動**: 2026年には、蘇生の倫理を法・組織文化・チーム階層・個人の道徳的感受性という3層の相互作用として統合した概念モデル (Ethical Pathways Model) が提示された ([蘇生の倫理は個人の失敗ではなくシステムの産物 — 22研究から導かれた倫理的経路モデル \(EPM・ナラティブレビュー・ResuscPlus2026\)](#))。文献由来で前向き検証はされておらず、導入の根拠ではなく「自施設のどこが詰まっているか」を見る地図として使う。同じ年に、人工呼吸を受ける体験そのものを存在論の問題として立てた論説も出ており ([人工呼吸を受けるという経験の存在論 — 機械論から全体論へ、生きられた身体と世界とのつながりを問う \(From the Inside・ICM2026\)](#))、議論は「何を差し控えるか」から「その介入がその人に何をするか」へも広がりつつある。

Vault内で結論が割れている論点

論点	一方の立場	もう一方の立場	今どう扱うか
予後予測を治療制限に使うてよいか	早期WLSTを除外した心停止後の神経予後予測(不良マーカー2つ以上で偽陽性ゼロ・CritCare2026) (多モーダル予測は妥当)	無益な治療を避けることは尊厳と環境倫理の交点にある (Correspondence・ICM2023) (スコアは治療制限の根拠にならない)	「予測」と「決定」を分ける。 予測は情報として家族と共有し、決定は価値観と合意形成で行う。 重症度スコアを制限の理由として記載しない
面会緩和は何かのためか	成人ICUの家族中心ケア SCCMガイドライン2024 — 17ステートメント、強い推奨は面会緩和の1つだけ (SCCM2024・CCM2025)	柔軟な面会はせん妄を減らさないが家族の不安・抑うつを改善する (ICU Visits クラスター交差 RCT・JAMA2019)	矛盾しない。患者のせん妄を減らす施策としてではなく、家族の不安・抑うつを減らす施策として位置づける
終末期に抗菌薬を続けるか	「症状緩和になる」という臨床的直観	終末期の抗菌薬は「必要悪」か — 死亡直前の40～80%に投与され症状緩和は21.4～56.7% (What's New・ICM2026)	感染部位で分けて考える。 尿路感染(60～92%)は緩和になりうるが、 呼吸器感染(0～53%)は根拠が薄い 。継続の目的を毎回言語化する

まずこの7本

- 1 [「Goals of Care」とは何か — 文献の合意に基づく操作的定義 — 言葉の使い方を揃える1本](#)
- 2 [日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念 — DNAR指示が有効なのは心停止時のみ、「予想された急変」とフレイル2潮流\(JJAAM2025\) — 日本の現場に直結](#)
- 3 [ICUの対立を課題・プロセス・関係の3層で読み解く — 「困った家族」の多くはプロセス不全の帰結\(ナラティブレビュー・CritCare2026\)](#)
- 4 [深刻な知らせを伝えるときの神経科学 — 扁桃体とコルチゾールが理解を奪う機序と5つの推奨\(総説・ICM2026\) — 面談設計が変わる](#)
- 5 [意思決定能力に関する10の誤解 — capacityは決定ごとの臨床判断、competencyは裁判所の法的判断\(VHA国家倫理委員会・JAMDA2004\)](#)

- 6 [ICU緩和ケアの10のキーポイント — 緩和ケアは予後ではなく必要性に基づく \(What's New枠・ICM2016\)](#)
 - 7 [フランスICUの延命治療差し控え・中止カンファレンスの実態 \(Letter・ICM2022\)](#) — **自施設のカンファ
を見直す鏡**
-

関連するトピックHome

-  [心停止後ケアと神経予後予測 Home](#) — 予後情報の扱い
-  [フレイルと高齢重症患者 Home](#) — 治療強度の決め方
-  [Hotel ICU・人間的ケア Home](#) — 家族の体験
-  [AKIと腎代替療法の開始時期 Home](#) — 高齢者の透析導入をどう話すか
-  [HDU・SDU\(中間治療室\)と病床機能 Home](#) — ICU入室の適応判断

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。