A 稿选稿说明

推荐定位：以年度断续观测的月—日扫相区分两个邻近半日组；四幅主图依次展示地理与负荷、全记录相位、实测半日谱、跨时段支持和仪器对照。可供作者终选，尚非已获作者批准的投稿文件。

主结果与样本。同一 R7 冻结输入、权重及模板，逐段零点得到月球组 **1.0004±0.1320**、邻近半日组 **0.9251±0.3649**；摘要写 **1.00±0.13、0.93±0.36**。误差取缩放最小二乘与 UTC 删日误差较大者。全部 3,299 均值、54 段、545.924 h，跨度 353.39 日，覆盖八个有观测的月份；未填补缺测。K_2 含日月作用，邻近组不称纯太阳组。

零点裁决。八期模型 **0.9866±0.1231 已复现**，但 46 个期内相邻段边界没有已建立的零点传递或重锁连续性证据。因此 A 稿采用 S54；P8 留作同数据敏感性。选择依据是实验记录，不是系数接近 1。v68 的 **0.97±0.14** 属约 544 h、三角滤波、等权、残差循环平移误差的另一归算，本轮标为 **AUTHOR-REPORTED**，不平均。

同数据表现。P8→S54 的加权 RSS 为 3781.58→3713.64，增加 46 个截距；残差 RMS 为 24.114→23.934 (10^{-18})，段内相邻标准残差相关为 −0.127→−0.148。删期月球范围分别为 0.877–1.052、0.885–1.093。四种各千次条件模拟中，S54 月球 95% 区间覆盖 95.1–97.4%；这些不能替代真实噪声与校准证据。

图与对照来源。`data/RESULTS.json`、`primary_rows.csv`、`phase_fold.csv`、`leave_period_all_designs.csv` 由 `scripts/recompute_candidate.py` 生成。Fig.3c 数值保持 v71 原表，另经完整等权 S54 扫描复核：峰 22.361、23.147 μHz，双向单线交叉功率 8.03%、8.15%，保留真实 UTC。246.634 h 光纤配对仅在夏季，S54 月球改变量 0.00606±0.00627；不冒充全年控制。所有图由 `scripts/draw_candidate.py` 重画。

待作者确认。锁定/重锁和零点转移日志；预测测站坐标与钟跃迁点；固体潮位移换势近似的适用性；v68 温度与 474 h 监控的逐点支撑；作者、基金、利益声明、Hou 稿当前状态及编辑数据/代码链接。0.89±0.55 独立负荷系数仅为 v68 报告，不能称测出海洋负荷。

编辑背景。正文简引 Stahl 为同期互补研究，正文一句披露与 Hou 的夏季样本重叠，投稿信给出研究对象差异；Nature 政策不把预印本作为既往正式发表或创新性评估依据。近期欧洲、中国两篇核光钟正式论文同日上线、在 Nature 658 的 897–902 与 903–908 页相邻刊出；这是编辑背景，不构成接收保证。详见 `editorial/NATURE_POLICY_AND_CONTEXT.md`。未投稿、未改原始资料，未读取或合并 B 稿。