A_v74 修改说明：以 A_v72 为底稿

本轮保留 A_v72 的主分析、全部数据和四幅主图，调整科学贡献的组织方式。未采用已撤回的 A_v73 文字或图序，未重拟合、删点或拼接零点。

主线改为：两台相距 692 km 的光钟，在 353 天内积累 545.9 h 有效观测；利用随日期漂移的月球—太阳相位，在 54 段各自零点未知的条件下分辨相邻半日潮响应。摘要先讲实验困难与解决方式，再给实测谱和联合幅度结果。欧洲工作按同期独立、互补观测介绍。按随后指示补查文献，增加光钟网络兼顾共同守时与地球监测的一段讨论；四条新引用均经核验。

内容	本版口径与依据
主结果	M_2+N_2：1.00±0.13；S_2+K_2：0.93±0.36。沿用 A_v72 的 S54、同一物理模板及权重，误差取缩放 LS 与删日标准误较大值。
光谱能力	两个天文主频间距 0.78387 μHz，文中写约 0.78 μHz。实测局部峰为 22.361、23.147 μHz；不把主频间距称为通用仪器分辨率极限。
海岸—内陆几何	负荷约占预测 M_2 合成振幅的 30%；全记录加权 RMS 比为 33.1%。两者定义不同，均不代表独立负荷探测。
日周期	简述更长连续钟运行、长期稳定链路及独立于潮汐拟合的数据质量规则的重要性，保留全部有效点。
单点影响	归档 P8 诊断：去掉 7 月 7 日 01:25 BJT 一点，全日组移动 0.043，小于原标准误 0.359；月球组移动 0.039。该点仍在当前样本中。这不是 S54 新拟合，也不能解释全日约束偏弱。

核对与交付。文中数字来自冻结结果表与已归档单点诊断；来源和 SHA256 已存入证据记录。主图、派生数据与 A_v72 逐文件核对；PDF 逐页检查；英文 Markdown、Word、LaTeX 及图源一并保存。文字使用 academic-humanizer 检查，结果与误差未因润色改变。交付包另附光钟网络意义调研报告，列明引文依据及应用边界。

仍由作者确认：作者及声明、编辑可访问的数据与代码地址，以及已有温度对照和另一归算的支撑范围。本文没有把这些事项补写成已完成，也没有代为投稿。