

# 2022년 1학기 물리학 I: Quiz 4

김현철<sup>\*1,†</sup> and Lee Hui Jae<sup>1,‡</sup>

<sup>1</sup>*Hadron Theory Group, Department of Physics,  
Inha University, Incheon 402-751, Republic of Korea*

(Dated: Spring semester, 2022)

## Abstract

**주의:** 단 한 번의 부정행위도 절대 용납하지 않습니다. 적발 시, 학점은 F를 받게 됨은 물론이고, 징계위원회에 회부합니다. One strike out임을 명심하세요.

문제는 다음 쪽부터 나옵니다.

**Date:** 2022년 3월 14일 (월) 15:30–16:15

**학번:**

**이름:**

---

\* Office: 5S-436D (면담시간 매주 화요일-16:00~20:00)

<sup>†</sup>Electronic address: hchkim@inha.ac.kr

<sup>‡</sup>Electronic address: hjlee6674@inha.edu

**문제 1 [10pt]** 그림 1과 같이 어떤 사람이 건물 꼭대기에서 수평에서부터  $30^\circ$ 의 각도로,  $20.0 \text{ m/s}$ 의 속도로 공을 던졌다. 건물 바닥에서 공을 던진 곳까지 높이는  $45.0 \text{ m}$ 이다.




FIG. 1: 문제 2

(가) 공이 지면에 닿을 때까지 걸린 시간을 구하여라.

(나) 공이 지면에 닿을 때 속력을 구하여라. (이 문제에서는 계산기를 쓰셔도 무방합니다.)

### 해답

(가) 공은 중력에 의한 포물선 운동을 하므로, 수직 방향 운동과 수평 방향 운동을 따로 생각할 수 있다. 수직 방향으로 중력에 의한 등가속도 운동을 하게 된다. 이 공의 초기 수직 방향 속력은 다음과 같다.

$$v_{x,0} = v_i \sin \theta_i = (20.0 \text{ m/s}) \sin 30^\circ = (20.0 \text{ m/s}) \left( \frac{1}{2} \right) \quad (1)$$

중력은 아래 방향으로 작용하므로, 시간  $t$  일 때 이 공의 위치는 다음과 같다.

$$x = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

$v_0 = v_{x,0}$  이고, 초기 위치는  $45 \text{ m}$ , 나중 위치는  $0 \text{ m}$  이므로,

$$\begin{aligned} 0 \text{ m} &= 45 \text{ m} + (20.0 \text{ m/s}) \left( \frac{1}{2} \right) \times t - \left( \frac{1}{2} \right) (9.80 \text{ m/s}^2) \times t^2 \\ &= 45 \text{ m} + (10.0 \text{ m/s}) \times t - (4.90 \text{ m/s}^2) \times t^2. \end{aligned} \quad (3)$$

이는  $t$  에 대한 2차 방정식이다. 해는  $t = -2.18\text{ s}$  그리고  $t = 4.22\text{ s}$  이다. 따라서, 걸린 시간은  $4.22\text{ s}$  이다.

(나) 수평 방향으로로는 가속도가 존재하지 않기 때문에 수평 방향 속력은 변하지 않는다. 수평 방향 속력은 다음과 같다.

$$v_y = v_i \cos \theta_i = (20.0\text{ m/s}) \cos 30^\circ = (20.0\text{ m/s}) \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \quad (4)$$

수직 방향 속력은 중력 가속도를 받아 지면에 닿을 때 까지 일정하게 변한다. 지면에 닿을 때 수직 방향 속력은 다음과 같다.

$$v_x = v_{x,0} - gt = v_i \sin \theta_i - gt = (20.0\text{ m/s}) \left( \frac{1}{2} \right) - (9.80\text{ m/s}^2)(4.22\text{ s}) \quad (5)$$

이 공의 전체 속력은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(v_i \sin \theta_i - gt)^2 + (v_i \cos \theta_i)^2} \\ &= \sqrt{\left( (20.0\text{ m/s}) \left( \frac{1}{2} \right) - (9.80\text{ m/s}^2)(4.22\text{ s}) \right)^2 + \left( (20.0\text{ m/s}) \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)^2} \\ &= \sqrt{((10.0\text{ m/s}) - (41.4\text{ m/s}))^2 + ((10.0\sqrt{3}\text{ m/s}))^2} \\ &= \sqrt{986 + 300}\text{ m/s} \\ &= 35.86\text{ m/s} \end{aligned} \quad (6)$$

공이 지면에 닿을 때 속력은  $35.86\text{ m/s}$  이다.

**문제 2 [20pt]** 초기 위치  $x_0$ , 초기 속력  $v_0$ 이 주어졌을 때, 아래의 식

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0) \quad (7)$$

을 다음과 같이 유도해보자. 순간 가속도는

$$a = \frac{dv}{dt} \quad (8)$$

와 같이 주어진다. (8)의 양변에 속력  $v$ 를 곱한 식에서부터 (7)을 유도하여라. (적분을 이용하여야 한다는 점을 명심하여라.)

**해답** (8)의 양변에 속력  $v$ 를 곱하면,

$$a v(t) = v(t) \frac{dv}{dt}. \quad (9)$$

양변을  $t'$ 에 대해  $t' = t_0$  부터  $t' = t$  까지 적분하자.

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t a v(t') dt' &= \int_{t_0}^t v(t') \frac{dv}{dt'} dt' \\ &= \int_{v_0}^v v(t') dv(t') = \frac{1}{2} (v^2 - v_0^2) \end{aligned} \quad (10)$$

속력은 위치를 시간에 대해 미분한 값이다. 따라서,

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}. \quad (11)$$

(10)의 좌항에 대입하고 부분적분 하자.

$$\int_{t_0}^t a \frac{dx}{dt'} dt' = a x(t')|_0^t - \int_{t_0}^t \frac{da}{dt'} x(t') dt' \quad (12)$$

등가속도 운동에서는 가속도가 일정하므로 다음과 같다.

$$a x(t')|_0^t - \int_{t_0}^t \frac{da}{dt'} x(t') dt' = a (x - x_0) - \int_{t_0}^t 0 x(t') dt' = \frac{1}{2} (v^2 - v_0^2) \quad (13)$$

최종적으로,

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0). \quad (14)$$

**문제 3 [10pt]** 스키 점프 선수가 트랙의 수평면에 도달해서 수평방향으로 도약을 했다. 이때 속력은 25.0 m/s였다. 그리고 수평면과 경사면 사이의 각은  $35.0^\circ$ 였다. 이 선수는 어느 지점에 착지했을까?




FIG. 2: 문제 3

**해답** 스키 점프 선수가 도약한 지점으로 부터 착지한 지점까지 수평 방향으로 떨어진 거리를  $x$ , 수직 방향으로 떨어진 거리를  $y$  라 하자.  $x$  와  $y$  의 관계는 삼각비로 표현할 수 있다.

$$\frac{y}{x} = \tan \phi \quad (15)$$

스키 점프 선수가 도약하는 동안 수평 방향으로 이동한 거리  $x$  는 다음과 같다.

$$x = v_x t = (25.0 \text{ m/s})t \quad (16)$$

수직 방향으로는 중력 가속도가 존재하여 등가속도 운동한다. 따라서, 수직 방향으로 이동한 거리  $y$  는 다음과 같다.

$$y = v_{y,0}t + \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)t^2 \quad (17)$$

관계식 (15) 에 대입하면 다음과 같다.

$$\tan \phi = \frac{y}{x} = \frac{\frac{1}{2}gt^2}{v_x t} = \frac{gt}{2v_x}, \quad t = \frac{2v_x \tan \phi}{g} \quad (18)$$

도약한 지점과 착지한 지점 사이 거리를  $d$  라 하면,

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{x^2 + y^2} = x\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = v_x t \sqrt{1 + \tan^2 \phi} \\ &= \frac{2v_x^2 \tan \phi}{g} \sqrt{1 + \tan^2 \phi} \end{aligned} \quad (19)$$

이다. 경사면의 각도는  $35.0^\circ$  이고 수평 방향 속력은  $25.0 \text{ m/s}$  이므로  $d$  는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} d &= \frac{2(25.0 \text{ m/s})^2 \tan 35.0^\circ}{(9.80 \text{ m/s}^2)} \sqrt{1 + \tan^2 35.0^\circ} \\ &= \frac{2(25.0 \text{ m/s})^2 (0.700)}{(9.80 \text{ m/s}^2)} \sqrt{1 + (0.700)^2} \\ &= (89.3 \text{ m})(1.22) = 109 \text{ m} \end{aligned} \quad (20)$$

스키 점프 선수는 도약 지점으로 부터  $109 \text{ m}$  떨어진 지점에 착지했다.

**문제 4 [10pt]** 높이가  $y_0 = 15.0 \text{ m}$  인 건물이 있다. 이 건물 꼭대기에서  $v_0 = 10.0 \text{ m/s}$  의 속력으로 위로 공을 쏘아올렸다. 그림 3에 보여주는  $y_{\max}$  를 구하여라.




FIG. 3: 문제 4

**해답** 이 공은 중력에 의한 등가속도 운동을 하고 있으므로 공의 높이는 다음과 같다.

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (21)$$

$t$  에 대한 완전제곱 꼴로 바꾸면,

$$y = -\frac{1}{2} g \left( t - \frac{v_0}{g} \right)^2 + \frac{v_0^2}{2g} + y_0 \quad (22)$$

$y$  의 최댓값이 다음과 같음을 볼 수 있다.

$$y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} + y_0 \quad (23)$$

초기 높이가 15.0 m, 초기 속력은 10.0 m/s 이므로,  $y_{\max}$  는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} y_{\max} &= \frac{v_0^2}{2g} + y_0 = \frac{(10.0 \text{ m/s})^2}{2(9.80 \text{ m/s}^2)} + 15.0 \text{ m} \\ &= 5.10 \text{ m} + 15.0 \text{ m} \\ &= 20.1 \text{ m} \end{aligned} \quad (24)$$

이 공은 지면으로부터 최대 20.1 m 까지 올라간다.