

# 2022년 1학기 물리학 I: Quiz 10

김현철<sup>a,†</sup> and Lee Hui-Jae<sup>1,‡</sup>

<sup>1</sup>Hadron Theory Group, Department of Physics,  
Inha University, Incheon 22212, Republic of Korea

(Dated: Spring semester, 2022)

**문제 1. (30pt)** 그림 3에서처럼  $\theta = 30.0^\circ$ 만큼 기울어져 있는 면 위에 질량이 12.0 kg인 나무토막이 놓여있다. 이 토막 아래에는 270. N의 힘을 받으면 2.00 cm만큼 압축되는 용수철이 놓여있다. 이 토막을 가만히 놓으면, 비탈면으로 내려와서 용수철을 5.50 cm 압축시킨다.




FIG. 1. 문제 1


(가) 정지 상태에서 용수철을 압축시켜 멈추게 될 때까지 이 나무토막은 얼마나 내려왔는가?

(나) 나무토막이 용수철에 닿는 순간의 속력은 얼마인가?

**풀이 :**

(가) 나무 토막 비탈면을 내려올 때와 용수철을 압축시켜 정지해 있을 때의 자유 물체 다이어그램을 그려보자. 나무

하강 :



정지 :




FIG. 2. 자유 물체 다이어그램

토막은 처음에 정지해 있었으므로 초기에 가지고 있던 역학적 에너지를  $E_i$ , 나무토막이 비탈면을 내려온 거리를  $d$ 라 하자. 즉  $d$ 는 나무토막이 정지해 있던 지점에서 용수철에 의해 정지한 지점까지의 직선 거리이다. 그러면,

$$E_i = mgh = mgd \sin \theta, \quad m = 12.0 \text{ kg.} \quad (1)$$

<sup>a</sup> Office: 5S-436D (면담시간 매주 화요일-16:00~20:00)

<sup>†</sup> hchkim@inha.ac.kr

<sup>‡</sup> hjlee6674@inha.edu

나무토막이 용수철을 압축시켜 정지하였으므로 나무토막이 가지고 있던 모든 역학적 에너지가 용수철의 탄성 위치에너지로 전환되었다. 용수철이 압축된 길이를  $x_f$ 라고 하면,

$$E_i = mgd \sin \theta = \frac{1}{2} k x_f^2, \quad x_f = 5.50 \text{ cm} = 5.50 \times 10^{-2} \text{ m}. \quad (2)$$

용수철은 270 N의 힘을 받을 때 2.00 cm만큼 압축되므로 용수철 상수  $k$ 는,

$$k = \frac{F}{x} = \frac{270 \text{ N}}{2.00 \text{ cm}} = \frac{270 \text{ N}}{2.00 \times 10^{-2} \text{ m}}. \quad (3)$$

식 (2)에 의해 나무토막이 내려온 거리  $d$ 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} d &= \frac{k x_f^2}{2 m g \sin \theta} = \frac{(270 \text{ N})(5.50 \times 10^{-2} \text{ m})^2}{2(2.00 \times 10^{-2} \text{ m})(12.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \sin 30.0^\circ} \\ &= 3.47 \times 10^{-1} \text{ m} \\ &= 34.7 \text{ cm}. \end{aligned} \quad (4)$$

(나) 용수철에 닿는 순간의 역학적 에너지를  $E_s$ , 이 때와 나무토막이 정지한 지점 사이의 직선 거리를  $d_s$ 라고 하면,

$$E_s = \frac{1}{2} m v^2 + m g d_s \sin \theta, \quad d_s = 5.50 \text{ cm} = 5.50 \times 10^{-2} \text{ m}. \quad (5)$$

역학적 에너지는 보존되어야 하므로 이 에너지는 처음 역학적 에너지  $E_i$ 와 같다. 따라서,

$$E_s = E_i, \quad \frac{1}{2} m v^2 + m g d_s \sin \theta = m g d \sin \theta. \quad (6)$$

따라서 이 때의 속력은,

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{2 g d \sin \theta - 2 g d_s \sin \theta} = \sqrt{2 g (d - d_s) \sin \theta} \\ &= \sqrt{2(9.80 \text{ m/s}^2) ((3.47 \times 10^{-1} \text{ m}) - (5.50 \times 10^{-2} \text{ m})) \sin 30.0^\circ} \\ &= 1.69 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (7)$$

**문제 2. (50 pt)(난이도 상)** 어떤 아이가 그림 3처럼 반지름이  $R$ 인 반구 모양의 얼음 위에 앉아 있다가 무시할 수 있는 아주 작은 처음속력으로 미끄러지기 시작한다.




FIG. 3. 문제 2

얼음과 아이 사이에 쓸림이 없다고 가정한다면, 아이가 얼음에서 떠나는 높이는 어디인가?

**풀이 :** 아이의 얼음을 떠나는 순간의 자유 물체 다이어그램은 다음과 같다. 아이는 얼음 위에서 원궤도를 그리며 떨어지므로 원심력  $F_c$ 가 존재한다. 중심 방향으로 작용하는 중력의 크기가 원심력보다 작아질 때 아이는 얼음을 떠난다. 즉,

$$F_g \cos \theta \leq F_c, \quad F_g = m g \quad (8)$$




FIG. 4. 얼음을 떠날 때의 다이어그램

일 때 아이는 얼음을 떠난다. 역학적 에너지 보존 법칙을 이용하기 위해 아이의 처음 역학적 에너지를  $E_i$ 라 하자. 아이는 처음에 정지해 있었으므로,

$$E_i = mgR. \quad (9)$$

얼음에서 떠나는 순간의 역학적 에너지를  $E_f$ , 그 때의 높이와 속력을  $R_f$ ,  $v_f$ 라 하면 아이가 얼음을 떠나는 순간 지면에서의 높이  $R_f$ 를 얼음의 반지름  $R$ 과  $\theta$ 의 삼각비로 표현할 수 있다.

$$E_f = mgR_f + \frac{1}{2}mv_f^2, \quad R_f = R \cos \theta. \quad (10)$$

역학적 에너지는 보존되므로,

$$mgR = mgR_f + \frac{1}{2}mv_f^2. \quad (11)$$

이 때 작용하는 원심력  $F_c$ 는,

$$F_c = \frac{mv_f^2}{R} = \frac{2mg(R - R_f)}{R} = 2mg(1 - \cos \theta), \quad (12)$$

이므로 식 (8)에 의해,

$$mg \cos \theta \leq 2mg(1 - \cos \theta), \quad \cos \theta \leq \frac{2}{3}. \quad (13)$$

따라서,

$$R_f = R \cos \theta \leq \frac{2}{3}R, \quad (14)$$

아이의 높이가  $\frac{2}{3}R$ 인 순간 부터 얼음을 벗어난다.

**문제 3. (20 pt)** 그림 5의 암모니아 분자( $\text{NH}_3$ )는 세 개의 수소원자(H)가 정삼각형의 꼭지점에 있고 정삼각형의 중심은 수소원자로부터  $d = 9.40 \times 10^{-11} \text{ m}$ 만큼 떨어져 있다. 질소원자(N)는 수소원자들이 바닥을 이루는 피라미드의 꼭지점에 있다. 질소 대 수소의 원자질량 비율은 13.9이고, 질소에서 수소까지의 거리는  $L = 10.14 \times 10^{-11} \text{ m}$ 이다.

암모니아분자의 질량중심의

(가)  $x$  좌표

(나)  $y$  좌표는 각각 무엇인가?

**풀이 :**

(가) 정삼각형의 중심을 원점,  $x$ 축 위에 위치한 수소 원자 부터 반시계 방향으로 1, 2, 3번 수소라 하자. 질량 중심의  $x$  좌표를  $x_{cm}$ 이라 하면  $x_{cm}$ 은,

$$x_{cm} = \frac{m_N x_N + m_H x_{H1} + m_H x_{H2} + m_H x_{H3}}{m_N + m_H + m_H + m_H}. \quad (15)$$




FIG. 5. 문제 3




FIG. 6. 위에서 내려다 본 원자들의 위치

질소 원자의  $x$  좌표는 0 이고 각 수소들은 정삼각형의 꼭짓점에 위치하므로,

$$\begin{aligned} x_{H1} &= d \\ x_{H2} &= d \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}d \\ x_{H3} &= d \cos 240^\circ = -\frac{1}{2}d. \end{aligned} \quad (16)$$

$x_{cm}$ 의 분모는 다음과 같이 얻어진다.

$$\begin{aligned} m_N x_N + m_H x_{H1} + m_H x_{H2} + m_H x_{H3} &= m_H \left( d - \frac{1}{2}d - \frac{1}{2}d \right) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (17)$$

따라서  $x_{cm}$ 은 0 이다.

(나) 질량 중심의  $y$  좌표를  $y_{cm}$ 이라 하면  $y_{cm}$ 은,

$$y_{cm} = \frac{m_N y_N + m_H y_{H1} + m_H y_{H2} + m_H y_{H3}}{m_N + m_H + m_H + m_H}. \quad (18)$$

모든 수소 원자들은  $y = 0$ 평면에 위치해 있으므로  $y$  좌표가 0 이다. 즉,

$$y_{H1} = y_{H2} = y_{H3} = 0. \quad (19)$$

그림 5로 부터 질소 원자의  $y$  좌표는,

$$y_N = \sqrt{L^2 - d^2}, \quad (20)$$

이고 질소 대 수소의 원자질량 비율이 13.9 이므로,

$$\frac{m_N}{m_H} = 13.9, \quad m_N = 13.9m_H. \quad (21)$$

따라서  $y_{cm}$ 의 분모는 다음과 같다.

$$m_N y_N + m_H y_{H1} + m_H y_{H2} + m_H y_{H3} = 13.9 m_H \sqrt{L^2 - d^2}. \quad (22)$$

$y_{cm}$ 은,

$$\begin{aligned} y_{cm} &= \frac{13.9 m_H \sqrt{L^2 - d^2}}{13.9 m_H + 3 m_H} = \frac{13.9 \sqrt{(10.14 \times 10^{-11} \text{ m})^2 - (9.40 \times 10^{-11} \text{ m})^2}}{13.9 + 3} \\ &= 3.13 \times 10^{-11} \text{ m}. \end{aligned} \quad (23)$$

질량중심의  $y$  좌표는  $3.13 \times 10^{-11} \text{ m}$ 이다.