


7.1 [20分]


(1)  $\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2} \varepsilon(k)$

$\varepsilon(k) = \begin{cases} 1, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases}$  ,  $\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2}$  是一个等比数列.




(2)  $2\delta(k) - \varepsilon(k)$

$\delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$  ,  $\varepsilon(k) = \begin{cases} 1, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases}$




(3)  $\varepsilon(k) + \sin\left[\frac{k\pi}{8}\varepsilon(k)\right]$

$\varepsilon(k) = \begin{cases} 1, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases}$  ,  $\sin\left[\frac{k\pi}{8}\varepsilon(k)\right]$  的周期是16



(4)  $k \cdot 2^{-k} \varepsilon(k)$


$$\varepsilon(k) = \begin{cases} 1, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases}, \quad 2^{-k} \text{ 是一个等比数列}$$



#### 7.7 [15分]

解:

根据抽样定理，该频谱是以原连续时间信号频谱排列构成的周期函数，周期为采样频率的大小即 10kHz，所以原信号频谱在 0–25 kHz 范围内总共重复三次，如下图：



### 7.12 [15分]

解：假设零输入响应为 $y_i(k)$ ，当激励为 $e(k)$ 时，系统的零状态响应为 $y_s(k)$

$$\therefore y_1(k) = y_i(k) + y_s(k) = \left[ \left( \frac{1}{2} \right)^k + 1 \right] \varepsilon(k)$$

$$\text{当激励为 } -e(k) \text{ 时, } y_2(k) = y_i(k) - y_s(k) = \left[ \left( -\frac{1}{2} \right)^k - 1 \right] \varepsilon(k)$$

$$\text{联立上面两式, 可解得 } y_i(k) = \left[ \left( \frac{1}{2} \right)^{k+1} + \frac{1}{2} \times \left( -\frac{1}{2} \right)^k \right] \varepsilon(k), \quad y_s(k) = \left[ \left( \frac{1}{2} \right)^{k+1} - \frac{1}{2} \times \left( -\frac{1}{2} \right)^k + 1 \right] \varepsilon(k)$$

$\therefore$  当初始状态增加一倍，激励为 $4e(k)$ 时，




$$\begin{aligned} y_3(k) &= 2y_i(k) + 4y_s(k) = \left[ \left( \frac{1}{2} \right)^k + \left( -\frac{1}{2} \right)^k \right] \varepsilon(k) + \left[ 2 \times \left( \frac{1}{2} \right)^k - 2 \times \left( -\frac{1}{2} \right)^k + 4 \right] \varepsilon(k) \\ &= \left[ 3 \times \left( \frac{1}{2} \right)^k - \left( -\frac{1}{2} \right)^k + 4 \right] \varepsilon(k) \end{aligned}$$

### 7.24 (1) (3) 两小题，至少一个用图解法 [15分]

解：(1)  $\varepsilon(k) * \varepsilon(k)$



$$\text{法一: } \varepsilon(k) * \varepsilon(k) = \sum_{j=0}^k \varepsilon(j) \varepsilon(k-j) = (k+1) \varepsilon(k)$$

$$\text{法二 图解法: } \varepsilon(k) * \varepsilon(k) = \sum_{j=0}^k \varepsilon(j) \varepsilon(k-j)$$





当  $k=0$  时，

$$\varepsilon(0) * \varepsilon(0) = \varepsilon(0) \varepsilon(0) = 1$$



当  $k=1$  时，

$$\varepsilon(1) * \varepsilon(1) = \sum_{j=0}^1 \varepsilon(j) \varepsilon(1-j) = 2$$



当  $k=2$  时，

$$\varepsilon(2) * \varepsilon(2) = \sum_{j=0}^2 \varepsilon(j) \varepsilon(2-j) = 3$$

依次类推，可得  $\varepsilon(k) * \varepsilon(k) = (k+1) \varepsilon(k)$

$$(2) 2^k \varepsilon(k) * 3^k \varepsilon(k)$$

法一:  $2^k \varepsilon(k) * 3^k \varepsilon(k)$

$$= \sum_{j=0}^k 2^{k-j} \varepsilon(k-j) \cdot 3^j \varepsilon(j)$$

$$= (3^0 \cdot 2^k + 3 \cdot 2^{k-1} + 3^2 \cdot 2^{k-2} + \dots + 3^k \cdot 2^0) \varepsilon(k)$$









$$\text{令 } x = 3^0 \cdot 2^k + 3 \cdot 2^{k-1} + 3^2 \cdot 2^{k-2} + \dots + 3^k \cdot 2^0, \text{ 则 } 3x = 3^1 \cdot 2^k + 3^2 \cdot 2^{k-1} + \dots + 3^{k+1} \cdot 2^0$$

$$2x = 3^{k+1} - 2^k + (3^1 \cdot 2^{k-1} + 3^2 \cdot 2^{k-2} + \dots + 3^k \cdot 2^0) = 3^{k+1} - 2^k + (x - 2^k)$$

$$\text{解得 } x = 3^{k+1} - 2^{k+1}$$

$$\therefore 2^k \varepsilon(k) * 3^k \varepsilon(k) = (3^{k+1} - 2^{k+1}) \varepsilon(k)$$

法二 图解法:  $2^k \varepsilon(k) * 3^k \varepsilon(k) = \sum_{j=0}^k 2^j \varepsilon(j) 3^{k-j} \varepsilon(k-j)$



$$\text{当 } k=0 \text{ 时, } 2^0 \varepsilon(0) * 3^0 \varepsilon(0) = 2^0 \varepsilon(0) 3^0 \varepsilon(0) = 1$$

$$\text{当 } k=1 \text{ 时, } 2^1 \varepsilon(1) * 3^1 \varepsilon(1) = \sum_{j=0}^1 2^j \varepsilon(j) 3^{1-j} \varepsilon(1-j) = 3 + 2 = 5$$

$$\text{当 } k=2 \text{ 时, } 2^2 \varepsilon(2) * 3^2 \varepsilon(2) = \sum_{j=0}^2 2^j \varepsilon(j) 3^{2-j} \varepsilon(2-j) = 9 + 6 + 4 = 19$$

观察规律, 看出这是首项  $2^k$ , 公比为  $\frac{3}{2}$  的等比数列, 前  $k+1$  项和为  $\frac{2^k [1 - (\frac{3}{2})^{k+1}]}{1 - \frac{3}{2}} \varepsilon(k) = (3^{k+1} - 2^{k+1}) \varepsilon(k)$

## 7.28 [20分]

$$y(k+2) + y(k+1) + y(k) = \varepsilon(k+1), \quad y_{zi}(0) = 1, \quad y_{zi}(1) = 2$$

解：（1）由题目所给差分方程可得  $(S^2 + S + 1)y(k) = S\varepsilon(k)$

$$\text{转移算子 } H(S) = \frac{S}{S^2 + S + 1} = \frac{1}{2} \frac{2S + 1 - 1}{(S + \frac{1+\sqrt{3}j}{2})(S + \frac{1-\sqrt{3}j}{2})} = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{S + \frac{1+\sqrt{3}j}{2}} + \frac{1}{S + \frac{1-\sqrt{3}j}{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}j} \left( \frac{1}{S + \frac{1+\sqrt{3}j}{2}} - \frac{1}{S + \frac{1-\sqrt{3}j}{2}} \right) \right]$$

根据欧拉公式，可得  $\frac{1+\sqrt{3}j}{2} = e^{\frac{\pi}{3}j}, \frac{1-\sqrt{3}j}{2} = e^{-\frac{\pi}{3}j}$

$$\therefore H(S) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{S + e^{\frac{\pi}{3}j}} + \frac{1}{S + e^{-\frac{\pi}{3}j}} - \frac{1}{\sqrt{3}j} \left( \frac{1}{S + e^{\frac{\pi}{3}j}} - \frac{1}{S + e^{-\frac{\pi}{3}j}} \right) \right]$$

$$h(k) = \frac{1}{2} \left[ \left( -e^{\frac{\pi}{3}j} \right)^{k-1} + \left( -e^{-\frac{\pi}{3}j} \right)^{k-1} \right] \varepsilon(k-1) - \frac{1}{2\sqrt{3}j} \left[ \left( -e^{\frac{\pi}{3}j} \right)^{k-1} - \left( -e^{-\frac{\pi}{3}j} \right)^{k-1} \right] \varepsilon(k-1)$$

$$y_{zs}(k) = h(k) * \varepsilon(k)$$

$$= \frac{1}{2} \left[ \left( -e^{\frac{\pi}{3}j} \right)^{k-1} + \left( -e^{-\frac{\pi}{3}j} \right)^{k-1} \right] \varepsilon(k-1) * \varepsilon(k) - \frac{1}{2\sqrt{3}j} \left[ \left( -e^{\frac{\pi}{3}j} \right)^{k-1} - \left( -e^{-\frac{\pi}{3}j} \right)^{k-1} \right] \varepsilon(k-1) * \varepsilon(k)$$

$$= \frac{1}{2} \left[ \frac{1 - \left( -e^{\frac{\pi}{3}j} \right)^k}{1 + e^{\frac{\pi}{3}j}} + \frac{1 - \left( -e^{-\frac{\pi}{3}j} \right)^k}{1 + e^{-\frac{\pi}{3}j}} \right] \varepsilon(k) - \frac{1}{2\sqrt{3}j} \left[ \frac{1 - \left( -e^{\frac{\pi}{3}j} \right)^k}{1 + e^{\frac{\pi}{3}j}} - \frac{1 - \left( -e^{-\frac{\pi}{3}j} \right)^k}{1 + e^{-\frac{\pi}{3}j}} \right] \varepsilon(k)$$

化简可得：

$$y_{zs}(k) = \frac{\varepsilon(k)}{3} - \frac{(-1)^k \varepsilon(k)}{3} \left[ \cos \frac{k\pi}{3} + \cos \frac{(k-1)\pi}{3} \right] - \frac{(-1)^k \varepsilon(k)}{3\sqrt{3}} \left[ \sin \frac{k\pi}{3} + \sin \frac{(k-1)\pi}{3} \right]$$

由  $H(S)$  的极点可知， $y_{zi}(k) = [C_1 \left( -e^{\frac{\pi}{3}j} \right)^k + C_2 \left( -e^{-\frac{\pi}{3}j} \right)^k] \varepsilon(k)$

$$y_{zi}(0) = C_1 + C_2 = 1, \quad y_{zi}(1) = -e^{\frac{\pi}{3}j} C_1 - e^{-\frac{\pi}{3}j} C_2 = 2$$

$$\text{解得 } C_1 = \frac{j}{\sqrt{3}} \left( 2 + e^{-\frac{\pi}{3}j} \right), C_2 = -\frac{j}{\sqrt{3}} \left( 2 + e^{\frac{\pi}{3}j} \right)$$

$$\therefore y_{zi}(k) = \left[ \frac{j}{\sqrt{3}} \left( 2 + e^{-\frac{\pi}{3}j} \right) \left( -e^{\frac{\pi}{3}j} \right)^k - \frac{j}{\sqrt{3}} \left( 2 + e^{\frac{\pi}{3}j} \right) \left( -e^{-\frac{\pi}{3}j} \right)^k \right] \varepsilon(k) = -\frac{2}{\sqrt{3}} (-1)^k \left[ 2 \sin \frac{k\pi}{3} + \sin \frac{(k-1)\pi}{3} \right] \varepsilon(k)$$

$$y(k) = y_{zs}(k) + y_{zi}(k)$$

$$= \frac{\varepsilon(k)}{3} - \frac{(-1)^k \varepsilon(k)}{3} \left[ \cos \frac{k\pi}{3} + \cos \frac{(k-1)\pi}{3} \right] - \frac{(-1)^k \varepsilon(k)}{3\sqrt{3}} \left[ \sin \frac{k\pi}{3} + \sin \frac{(k-1)\pi}{3} \right] - \frac{2}{\sqrt{3}} (-1)^k \left[ 2 \sin \frac{k\pi}{3} + \sin \frac{(k-1)\pi}{3} \right] \varepsilon(k)$$

$$= \frac{\varepsilon(k)}{3} - \frac{(-1)^k \varepsilon(k)}{3} \left[ \cos \frac{k\pi}{3} + \cos \frac{(k-1)\pi}{3} \right] - \frac{13}{3\sqrt{3}} (-1)^k \sin \frac{k\pi}{3} \varepsilon(k) - \frac{7}{3\sqrt{3}} (-1)^k \sin \frac{(k-1)\pi}{3} \varepsilon(k)$$

$$(2) \quad y(0) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left( 1 + \frac{1}{2} \right) + \frac{7}{3\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 = y_{zi}(0), \quad y_{zs}(0) = 0$$

$$y(1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} + 1 \right) + \frac{13}{3\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3, \quad y_{zs}(1) = 1$$

当  $k=0, 1$  时全响应值和给定的初始条件值不同的是因为：

该系统的全响应分为零输入响应和零状态响应两部分，而零状态响应是指仅由外加的激励源引起的响应；而该系统的激励为单位阶跃信号， $k < 0$  时，该激励为 0； $k > 0$  时，激励为 1。因此当  $k=0$  时，零状态响应仍为 0，而  $k=1$  时零状态响应为 1，所以当  $k=0, 1$  时全响应值和给定的初始条件值不同。

### 7.30 [15分]

设第  $k$  次弹起的高度为  $y(k)$ , 则  $y(0) = 10$ , 由题意可得差分方程:

$$y(k) = \frac{3}{4}y(k-1) \Rightarrow y(k) - \frac{3}{4}y(k-1) = 0$$

则特征方程为  $\lambda - \frac{3}{4} = 0$ ,  $\therefore y(k) = C \left(\frac{3}{4}\right)^k \varepsilon(k)$

由  $y(0) = 10$ , 可得  $C = 10$ ,  $\therefore y(k) = 10 \times \left(\frac{3}{4}\right)^k \varepsilon(k)$

第 5 次弹起的高度:  $y(5) = 10 \times \left(\frac{3}{4}\right)^5 \varepsilon(5) = 2.373(m)$

第 8 次弹起的高度:  $y(8) = 10 \times \left(\frac{3}{4}\right)^8 \varepsilon(8) = 1.001(m)$