

Das Austauschprinzip in der Naturwissenschaft

Formale Analyse, mathematische Nachweise und Anwendungsfelder
inspiriert durch das biologische Vorbild des menschlichen Körpers

Stephan Epp

4. Mai 2026

Abstract

Das Austauschprinzip beschreibt den gerichteten, selektiven Transfer von Stoffen, Energie oder Information zwischen zwei Systemen durch eine Grenzschicht hindurch. Der menschliche Körper realisiert dieses Prinzip in idealer Weise: In den Lungen wird venöses Blut mit Sauerstoff angereichert, während Kohlendioxid abgegeben wird; im Kapillarbett werden Nährstoffe, Sauerstoff und Metabolite zwischen Blut und Gewebe ausgetauscht; in den Nieren scheiden die Tubuli Schadstoffe aus und reabsorbieren lebenswichtige Substanzen. In dieser Arbeit wird das Austauschprinzip mathematisch formalisiert und es werden die wichtigsten Anwendungsfelder in der Naturwissenschaft – Biologie, Thermodynamik, Chemie, Atmosphärenwissenschaft und Elektrochemie – formal nachgewiesen. Jedes Anwendungsfeld wird durch Definitionen, Sätze, Lemmata und Beweise im Stile einer mathematischen Abhandlung dargestellt und durch visualisierte Simulationen ergänzt.

Contents

1	Einführung	3
1.1	Das Austauschprinzip als universelles Naturprinzip	3
1.2	Zielsetzung dieser Arbeit	3
2	Mathematische Grundlagen	4
2.1	Allgemeine Formalisierung des Austauschprinzips	4
2.2	Das Fick'sche Diffusionsgesetz als Grundgesetz des Austauschprinzips . . .	5
3	Anwendungsfeld I: Biologischer Gasaustausch	5
3.1	Pulmonaler Gasaustausch – das Vorbild schlechthin	5
4	Anwendungsfeld II: Thermischer Austausch	8
4.1	Fourier'sches Wärmeleitungsgesetz	8
4.2	Wärmeübertrager – technische Realisierung des Gegenstromaustauschs . .	8
5	Anwendungsfeld III: Osmotischer Membrantransport	10
5.1	Van't-Hoff-Gesetz und osmotischer Druck	10
6	Anwendungsfeld IV: Chemischer Ionenaustausch	10
6.1	Ionenaustauscher und das Donnan-Gleichgewicht	10

7	Anwendungsfeld V: Atmosphärisch-Ozeanischer CO₂-Austausch	12
7.1	Henry-Gesetz und Grenzschichtmodell	12
8	Anwendungsfeld VI: Elektrochemischer Ladungsaustausch	15
8.1	Nernst-Planck-Gleichung und elektrochemische Zellen	15
9	Zusammenfassung	16
10	Ausblick	16
10.1	Nichtlineare Austauschprozesse und Fernab-vom-Gleichgewicht-Dynamik .	16
10.2	Maschinelles Lernen für adaptive Austauschsysteme	17
10.3	Technologische Anwendungen im Bereich Membrantechnologie	17
10.4	Klimawissenschaftliche Bedeutung des Ozean-Atmosphäre-Austauschs . . .	17
10.5	Quantentransport und nanometerkaliger Austausch	18
10.6	Systembiologie: das Austauschprinzip als Netzwerkeigenschaft	18
10.7	Theologisch-philosophische Reflexion: Das Austauschprinzip als Schöpfungsprinzip	18
10.8	Fazit des Ausblicks	19

1 Einführung

1.1 Das Austauschprinzip als universelles Naturprinzip

Das Austauschprinzip gehört zu den fundamentalsten Wirkprinzipien der belebten und unbelebten Natur. Es beschreibt den Prozess, durch den zwei Systeme – getrennt durch eine semipermeable oder selektiv durchlässige Grenzschicht – Stoffe, Energie oder Ladung in geregelter, gerichteter Weise transferieren, sodass auf beiden Seiten ein definierbares Gleichgewicht angestrebt wird.

Das Leitbild: der menschliche Körper. Der menschliche Organismus wurde als ideales Vorbild dieses Prinzips geschaffen. Er realisiert den Austausch auf mehreren hierarchischen Ebenen:

- **Pulmonaler Gasaustausch:** In den Alveolen der Lunge diffundiert O_2 aus der Atemluft in das venöse Blut, während CO_2 in entgegengesetzter Richtung abgegeben wird – getrieben durch Partialdruckdifferenzen.
- **Kapillaraustausch:** Im Kapillarbett werden Nährstoffe, Sauerstoff und Metabolite gemäß dem Starling-Gleichgewicht zwischen Blut und interstitieller Flüssigkeit ausgetauscht.
- **Renaler Austausch:** Die Niere filtert täglich ca. 180 L Primärharn, reabsorbiert das Brauchbare (Glukose, Aminosäuren, Wasser) und scheidet Schadstoffe und Abfallprodukte konzentriert aus.
- **Intestinaler Austausch:** Im Dünndarm werden Nährstoffe aktiv und passiv durch die Enterozyten in das Blut aufgenommen; das Unbrauchbare wird weitergeleitet.

Das Prinzip lässt sich in allen Teilen der Naturwissenschaft wiederfinden: von der molekularen Diffusion bis zum planetarischen Stoffkreislauf.

1.2 Zielsetzung dieser Arbeit

Diese Arbeit hat das Ziel, das Austauschprinzip in einer allgemeinen mathematischen Sprache zu formalisieren und die wichtigsten Anwendungsfelder formal zu analysieren. Im Einzelnen werden folgende Bereiche behandelt:

1. Biologischer Gasaustausch (Fick'sche Diffusion, pulmonale Physiologie)
2. Thermischer Austausch (Fourier'sches Gesetz, Wärmeübertrager)
3. Chemischer Ionenaustausch (Donnan-Gleichgewicht, Thomas-Modell)
4. Osmotischer Membrantransport (van't-Hoff-Gesetz, Starling-Gleichung)
5. Atmosphärisch-ozeanischer Gasaustausch (Henry-Gesetz, Piston-Velocity-Modell)
6. Elektrochemischer Ladungsaustausch (Nernst-Planck-Gleichung)

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Allgemeine Formalisierung des Austauschprinzips

Definition 1 (Austauschsystem). Ein *Austauschsystem* ist ein Tripel

$$\mathcal{A} = (\Omega_1, \Omega_2, \Gamma)$$

bestehend aus zwei abgeschlossenen Teilgebieten $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^3$ und einer Grenzfläche $\Gamma = \partial\Omega_1 \cap \partial\Omega_2$. Auf Γ ist eine Flussdichte $\mathbf{J} : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n$ definiert, die den gerichteten Transport einer Größe φ (Konzentration, Temperatur, Ladung) beschreibt.

Definition 2 (Austauschflussdichte). Sei $\varphi_1 : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ und $\varphi_2 : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$ die jeweilige Zustandsgröße in den beiden Teilgebieten. Die *Austauschflussdichte* an der Grenzfläche Γ ist

$$J_\Gamma = P \cdot (\varphi_1|_\Gamma - \varphi_2|_\Gamma),$$

wobei $P \geq 0$ die *Permeabilität* (oder ein analoger Transportkoeffizient) der Grenzfläche ist.

Bemerkung 1. Der Fluss J_Γ ist positiv definiert in Richtung von höherem zu niedrigerem Potential: von Ω_1 nach Ω_2 , wenn $\varphi_1|_\Gamma > \varphi_2|_\Gamma$. Dies entspricht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik in verallgemeinerter Form.

Definition 3 (Gleichgewichtszustand). Ein Austauschsystem befindet sich im *Gleichgewicht*, wenn

$$J_\Gamma = 0 \iff \varphi_1|_\Gamma = \varphi_2|_\Gamma.$$

Satz 1 (Existenz und Eindeutigkeit des Gleichgewichts). Sei $\mathcal{A} = (\Omega_1, \Omega_2, \Gamma)$ ein Austauschsystem mit stetiger Permeabilität $P > 0$ und einem geschlossenen Gesamtsystem $\Omega_1 \cup \Omega_2$ (kein externer Quellterm). Dann existiert ein eindeutiger Gleichgewichtszustand $\varphi^* \in \mathbb{R}$, der durch Erhaltung der Gesamtmenge bestimmt ist:

$$\varphi^* = \frac{|\Omega_1| \bar{\varphi}_1(0) + |\Omega_2| \bar{\varphi}_2(0)}{|\Omega_1| + |\Omega_2|},$$

wobei $\bar{\varphi}_i(0)$ der Mittelwert von φ_i zum Zeitpunkt $t = 0$ ist.

Proof. Da das Gesamtsystem geschlossen ist, gilt die Erhaltungsgleichung

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} \varphi dV = 0.$$

Der Fluss über Γ transferiert Menge von Ω_1 nach Ω_2 (oder umgekehrt), ohne die Gesamtmenge zu ändern:

$$|\Omega_1| \dot{\bar{\varphi}}_1 = -J_\Gamma |\Gamma| \quad \text{und} \quad |\Omega_2| \dot{\bar{\varphi}}_2 = +J_\Gamma |\Gamma|.$$

Mit $J_\Gamma = P(\bar{\varphi}_1 - \bar{\varphi}_2)$ (linearisiert an der Grenzfläche) ergibt sich das lineare System:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \bar{\varphi}_1 \\ \bar{\varphi}_2 \end{pmatrix} = P |\Gamma| \begin{pmatrix} -1/|\Omega_1| & 1/|\Omega_1| \\ 1/|\Omega_2| & -1/|\Omega_2| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\varphi}_1 \\ \bar{\varphi}_2 \end{pmatrix}.$$

Die Systemmatrix hat die Eigenwerte $\lambda_1 = 0$ und $\lambda_2 = -P|\Gamma|(1/|\Omega_1| + 1/|\Omega_2|) < 0$. Zum Eigenwert $\lambda_1 = 0$ gehört der Eigenvektor $(1, 1)^T$, der den Erhaltungssatz repräsentiert. Der negative Eigenwert λ_2 sichert die exponentielle Konvergenz jeder Trajektorie gegen den einzigen stationären Punkt $\bar{\varphi}_1 = \bar{\varphi}_2 = \varphi^*$, welcher sich aus der Erhaltungsbedingung $|\Omega_1|\varphi^* + |\Omega_2|\varphi^* = |\Omega_1|\bar{\varphi}_1(0) + |\Omega_2|\bar{\varphi}_2(0)$ ergibt. $\square$

Korollar 1 (Exponentieller Zeitverlauf). Unter den Voraussetzungen des vorangehenden Satzes relaxiert die Differenz $\Delta(t) = \bar{\varphi}_1(t) - \bar{\varphi}_2(t)$ exponentiell:

$$\Delta(t) = \Delta(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right), \quad \tau = \frac{1}{P|\Gamma|(1/|\Omega_1| + 1/|\Omega_2|)}.$$

2.2 Das Fick'sche Diffusionsgesetz als Grundgesetz des Austauschprinzips

Definition 4 (Fick'sches 1. Gesetz). Sei $c : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ die Konzentration eines gelösten Stoffes und $D > 0$ der Diffusionskoeffizient. Die *diffusive Flussdichte* ist

$$\mathbf{J} = -D \nabla c.$$

Definition 5 (Fick'sches 2. Gesetz). Die zeitliche Entwicklung der Konzentration unter reiner Diffusion (ohne Quellen) gehorcht der *Diffusionsgleichung*:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \Delta c = D \nabla^2 c.$$

Satz 2 (Fundamentallösung der Diffusionsgleichung). Für eine punktförmige Anfangsbedingung $c(\mathbf{x}, 0) = m \delta(\mathbf{x})$ in $\mathbb{R}^3$ ist die Lösung des zweiten Fick'schen Gesetzes:

$$c(\mathbf{x}, t) = \frac{m}{(4\pi Dt)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4Dt}\right), \quad t > 0.$$

Proof. Durch Fourier-Transformation bezüglich $\mathbf{x}$ ergibt die Diffusionsgleichung:

$$\frac{\partial \hat{c}}{\partial t} = -D |\mathbf{k}|^2 \hat{c},$$

mit der Lösung $\hat{c}(\mathbf{k}, t) = m \exp(-D|\mathbf{k}|^2 t)$. Die inverse Fourier-Transformation eines Gaußschen Exponentialis ist wieder ein Gaußsches Exponential:

$$c(\mathbf{x}, t) = \mathcal{F}^{-1} \left[m e^{-D|\mathbf{k}|^2 t} \right] = \frac{m}{(4\pi Dt)^{3/2}} e^{-|\mathbf{x}|^2/(4Dt)}.$$

Die Normierung $\int_{\mathbb{R}^3} c(\mathbf{x}, t) d\mathbf{x} = m$ folgt aus dem Gaußschen Integral. □

3 Anwendungsfeld I: Biologischer Gasaustausch

3.1 Pulmonaler Gasaustausch – das Vorbild schlechthin

Die menschliche Lunge realisiert das Austauschprinzip auf nahezu perfekte Weise. Durch die enorme Alveolaroberfläche von ca. 70–80 m² bei einer Membrandicke von nur 0,2–0,5 µm werden täglich ca. 500 L Sauerstoff in das Blut abgegeben.

Definition 6 (Alveoläre Permeabilität). Die *alveoläre Diffusionskapazität* D_L (engl. *diffusing capacity*) eines Gases X in der Lunge ist definiert als

$$D_L^X = \frac{\dot{V}_X}{\Delta p_X} = \frac{D_X \cdot A}{\ell},$$

wobei $\dot{V}_X$ der Gasvolumenstrom (mL/min), $\Delta p_X = p_{alv}^X - p_{bl}^X$ die Partialdruckdifferenz zwischen Alveole und Blut, D_X der Diffusionskoeffizient, A die Diffusionsfläche und ℓ die Membrandicke ist.

plots/plot1_fick.png

Figure 1: **Fick'sches Diffusionsgesetz.** *Links:* Stationäres Konzentrationsprofil einer Membran; der Pfeil symbolisiert die Flussdichte $J = -D \partial c / \partial x$ von hoher zu niedriger Konzentration. *Rechts:* Transiente Ausbreitung einer Punktquelle gemäß der Fundamentallösung $c(x, t) \propto (4\pi Dt)^{-1/2} \exp(-x^2/4Dt)$ zu fünf verschiedenen Zeitpunkten $t_1 < t_2 < \dots < t_5$.

Satz 3 (Gleichgewicht am Ende der Alveolarkapillare). Sei die Partialdruckdifferenz $\Delta p(z)$ des Sauerstoffs entlang der Kapillarlänge $z \in [0, L]$ durch das Permeabilitätsmodell

$$\frac{d \Delta p}{dz} = -\frac{D_L^{O_2}}{Q_b \beta} \Delta p(z)$$

gegeben, wobei Q_b der Blutfluss und β die Sauerstoffbindungskapazität des Blutes ist. Dann relaxiert Δp exponentiell:

$$\Delta p(z) = \Delta p(0) \exp\left(-\frac{D_L^{O_2}}{Q_b \beta} z\right).$$

Bei gesunder Lunge gilt $D_L^{O_2}/(Q_b\beta) \gg 1/L$, sodass $\Delta p(L) \approx 0$: Das Gleichgewicht wird noch vor Ende der Kapillare erreicht.

Proof. Die Differentialgleichung ergibt sich aus der Bilanz des Sauerstoffstroms: Der axiale Zuwachs der Sauerstoffmenge im Blut $d(Q_b\beta \cdot p_{O_2}^b)/dz$ entspricht dem transmembranösen Fluss $D_L^{O_2} \cdot \Delta p(z)$ je Längeneinheit. Unter der Annahme konstanten alveolären $p_{O_2}^{alv}$ gilt $d(\Delta p)/dz = -D_L^{O_2}/(Q_b\beta) \Delta p$. Die allgemeine Lösung dieser linearen ODE ist das behauptete Exponential. Die Bedingung $D_L^{O_2}/(Q_b\beta) \gg 1/L$ ist physiologisch erfüllt: für $D_L^{O_2} \approx 21 \text{ mL}/(\text{min} \cdot \text{mmHg})$, $Q_b \approx 5 \text{ L}/\text{min}$ und $\beta \approx 0.3 \text{ mL}/(\text{dL} \cdot \text{mmHg})$ ergibt sich ein Relaxationsweg von $\sim 0.15 L$, also ca. 15 % der Kapillarlänge. $\square$



Figure 2: **Pulmonaler Gasaustausch.** Verlauf der Sauerstoff- (p_{O_2}) und Kohlendioxid-Partialdrücke (p_{CO_2}) im Blut entlang der alveolären Kapillare. Venöses Blut tritt mit $p_{O_2} = 40$ und $p_{CO_2} = 45 \text{ mmHg}$ ein. Bereits nach ca. 30 % der Kapillarlänge ist das alveoläre Gleichgewicht nahezu vollständig erreicht – ein Reservekapazitätspuffer, der bei körperlicher Belastung und erhöhtem Blutfluss aktiviert wird.

4 Anwendungsfeld II: Thermischer Austausch

4.1 Fourier'sches Wärmeleitungsgesetz

Definition 7 (Wärmefluss nach Fourier). Die *Wärmeflussdichte* $\mathbf{q}$ (W/m^2) durch einen Festkörper mit Wärmeleitfähigkeit $\lambda > 0$ ($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) ist:

$$\mathbf{q} = -\lambda \nabla T.$$

Die Wärmegleichung lautet mit der Wärmekapazität ρc_p :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \Delta T.$$

Die strukturelle Analogie zum Fick'schen Gesetz ($J = -D \nabla c$) ist unmittelbar erkennbar: Beide sind spezielle Realisierungen des allgemeinen Onsager-Transportgesetzes $\mathbf{J}_i = -\sum_j L_{ij} \nabla \mu_j$.

4.2 Wärmeübertrager – technische Realisierung des Gegenstromaustauschs

Definition 8 (Wärmeübertragungsgleichung). Für einen Wärmeübertrager mit Heißfluid (Index h) und Kaltfluid (Index c), die durch eine Wand mit Wärmedurchgangskoeffizient k ($\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$) und Fläche A getrennt sind, gilt die stationäre Gleichung:

$$\dot{Q} = k A \Delta T_{lm},$$

wobei ΔT_{lm} die *logarithmische mittlere Temperaturdifferenz* ist:

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)},$$

mit $\Delta T_1, \Delta T_2$ den Temperaturdifferenzen an den beiden Enden.

Satz 4 (Überlegenheit des Gegenstrombetriebs). Für zwei Fluide mit gleichen Massenströmen und spezifischen Wärmekapazitäten ($\dot{m}_h c_{p,h} = \dot{m}_c c_{p,c} = W$) ist die übertragene Wärmeleistung im *Gegenstrom* größer oder gleich jener im *Gleichstrom*, mit Gleichheit nur für verschwindende thermische Länge. Im Gegenstrom gilt:

$$\Delta T_{lm}^{\text{gegen}} \geq \Delta T_{lm}^{\text{gleich}},$$

bei sonst identischen Bedingungen.

Proof. Sei $T_{h,in}$ und $T_{c,in}$ die jeweiligen Eintrittstemperaturen.

Gleichstrom: Beide Fluide strömen parallel, das Fluid tritt an derselben Seite ein. Die Temperaturdifferenzen an den Enden sind:

$$\Delta T_1^G = T_{h,in} - T_{c,in}, \quad \Delta T_2^G = T_{h,out}^G - T_{c,out}^G.$$

Da die Kapazitäten gleich sind, gilt $T_{h,out}^G = T_{c,out}^G = (T_{h,in} + T_{c,in})/2$, also $\Delta T_2^G = 0$ – was im idealen Fall zu $\dot{Q} = W(T_{h,in} - T_{c,in})/2$ führt.

Gegenstrom: Eintritte an entgegengesetzten Seiten. Die Temperaturdifferenz ist entlang des gesamten Apparates konstant: $\Delta T_1^{GG} = \Delta T_2^{GG} = T_{h,in} - T_{c,out} = T_{h,out} - T_{c,in}$. Im Grenzfall perfekten Austauschs nähert sich der kalte Auslass der heißen Eintrittstemperatur an: $T_{c,out} \rightarrow T_{h,in}$, sodass $\dot{Q}^{GG} = W(T_{h,in} - T_{c,in})$ erreichbar ist – doppelt so viel wie im Gleichstrom. Da $\ln(x) \leq x - 1$ für $x > 0$, gilt $\Delta T_{lm}^{GG} \geq \Delta T_{lm}^G$. $\square$

plots/plot3_waerme.png

Figure 3: **Wärmeübertrager – Gleich- vs. Gegenstrom.** *Links:* Im Gleichstrom nähern sich die Temperaturen asymptotisch an, sodass die treibende Kraft gegen Ende schwindet. *Rechts:* Im Gegenstrom bleibt ΔT nahezu konstant entlang der gesamten Apparatelänge, was eine deutlich höhere Wärmeübertragungsleistung ermöglicht. Diese Architektur nutzt der menschliche Körper im Rete-mirabile-System (Wärmetausch in Extremitäten und Flossen bei Tieren).

Definition 9 (NTU-Methode). Die Anzahl der Übertragungseinheiten (NTU) ist dimensionslos:

$$\text{NTU} = \frac{k A}{W_{\min}},$$

wobei $W_{\min} = \min(\dot{m}_h c_{p,h}, \dot{m}_c c_{p,c})$. Der Wirkungsgrad des Wärmeübertragers ist:

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\max}}, \quad \dot{Q}_{\max} = W_{\min}(T_{h,in} - T_{c,in}).$$

Lemma 1 (NTU- ε -Relation für Gegenstrom ($C^* = 1$)). Für $C^* = W_{\min}/W_{\max} = 1$ gilt

im Gegenstrom:

$$\varepsilon = \frac{\text{NTU}}{1 + \text{NTU}}.$$

Proof. Aus den Energiebilanzen und der Transfergleichung folgt für $C^* = 1$: $T_h - T_c = \text{const}$ entlang der gesamten Länge. Die Differentialgleichung $dT_h/d\xi = -\text{NTU}(T_h - T_c)$ mit $d(T_h - T_c)/d\xi = 0$ ergibt $\Delta T = \Delta T_{\text{in}}$. Aus der Gesamtbilanz $\dot{Q} = W \text{NTU} \Delta T = W(T_{h,\text{in}} - T_{h,\text{out}})$ und $\Delta T = T_{h,\text{out}} - T_{c,\text{in}}$ erhält man nach algebraischer Umformung die angegebene Relation. $\square$

5 Anwendungsfeld III: Osmotischer Membrantransport

5.1 Van't-Hoff-Gesetz und osmotischer Druck

Definition 10 (Osmotischer Druck). Für eine verdünnte Lösung mit der molaren Konzentration c (mol/L), dem van't-Hoff-Faktor i (Anzahl der Teilchen pro Formeleinheit nach Dissoziation), der universellen Gaskonstante R und der Temperatur T gilt:

$$\Pi = i c R T.$$

Beispiel 1. Physiologische Kochsalzlösung (NaCl, $c = 154$ mmol/L, $i = 2$, $T = 310,15$ K):

$$\Pi_{\text{NaCl}} = 2 \times 0.154 \times 8.314 \times 310.15 \approx 795 \text{ kPa} \approx 7,9 \text{ atm}.$$

Dies entspricht dem osmotischen Druck des Blutplasmas – ein zentraler Wert für die intravenöse Infusionstherapie.

Satz 5 (Starling-Gleichung des Kapillaraustauschs). Der Nettofluss von Wasser J_w (mL/min) durch die Kapillarwand ist:

$$J_w = L_p A \left[\underbrace{(P_c - P_i)}_{\text{hydrostat.}} - \sigma \underbrace{(\Pi_c - \Pi_i)}_{\text{onkot.}} \right],$$

wobei L_p die hydraulische Permeabilität, A die Kapillarfläche, P_c, P_i die hydrostatischen Drücke und Π_c, Π_i die onkotischen Drücke von Plasma und Interstitium sind; $\sigma \in [0, 1]$ ist der Reflexionskoeffizient.

Proof. Die Starling-Gleichung ergibt sich aus dem Onsager-Formalismus für irreversible Thermodynamik: Für einen einzigen permeat-selektiven Kanal gilt $J_w = L_p (\Delta P - \sigma \Delta \Pi)$, wobei ΔP der Druckunterschied und $\Delta \Pi$ die osmotische Druckdifferenz ist. Der Reflexionskoeffizient σ (Staverman-Koeffizient) berücksichtigt die unvollständige Reflexion des osmotischen Drucks: $\sigma = 1$ bedeutet vollständig semipermeable Membran, $\sigma = 0$ bedeutet keine osmotische Wirkung. Die Summation über alle Kapillarfläche A liefert die angegebene Formel. $\square$

6 Anwendungsfeld IV: Chemischer Ionenaustausch

6.1 Ionenaustauscher und das Donnan-Gleichgewicht

Definition 11 (Ionenaustauscher). Ein *Ionenaustauscher* ist ein Feststoff mit festen Ladungsgruppen, der Gegenionen aus der Lösung reversibel aufnimmt und durch andere Ionen gleicher Ladung ersetzt. Die *Austauschkapazität* q_{max} (meq/g) ist die maximale Menge austauschbarer Ionen pro Masseneinheit.

plots/plot4_osmose.png

Figure 4: **Osmose und van't-Hoff-Gesetz.** *Links:* Osmotischer Druck $\Pi = icRT$ als Funktion der Konzentration für vier physiologisch relevante Substanzen. Die gestrichelte Linie markiert den physiologischen Wert für NaCl ($c = 154 \text{ mmol/L}$, $\Pi \approx 795 \text{ kPa}$). *Rechts:* Transmembraner Wasserfluss $J_w = L_p \Delta\Pi$ gemäß der linearisierten Starling-Gleichung; positive Werte bedeuten Einwärtsstrom, negative Auswärtsstrom.

Definition 12 (Selektivitätskoeffizient). Für den Austausch von Ion A^{z_A} gegen Ion B^{z_B} an einem Austauscher gilt die *Selektivitätsrelation*:

$$K_{A/B} = \frac{[\bar{A}]^{1/z_A} [B]^{1/z_B}}{[A]^{1/z_A} [\bar{B}]^{1/z_B}},$$

wobei $[X]$ die Lösungs- und $[\bar{X}]$ die Harzphase-Konzentration bezeichnen. $K_{A/B} > 1$ bedeutet Bevorzugung von A.

Satz 6 (Thomas-Modell für Durchbruchkurven). Für einen Ionenaustauscher mit Langmuir-Isotherme ($q = q_{\max} K_T c / (1 + K_T c)$) im Festbett liefert das Thomas-Modell die Durch-

bruchskurve:

$$\frac{c_{aus}(t)}{c_0} = \frac{1}{1 + \exp(k_{Th} q_{\max} m/Q - k_{Th} c_0 t)},$$

wobei k_{Th} die Thomas-Ratenkonstante ($L/(mg \cdot min)$), m die Harzmasse, Q der Volumenstrom und t die Zeit ist.

Proof. Aus der Massenbilanz des Festbetts $Q dc/dz + \rho_b dq/dt = 0$ mit der Langmuir-Sorptionskinetik $dq/dt = k_{Th}(q_{\max} - q)c - k_{Th} q/K_T$ ergibt sich nach Integration durch die Methode der charakteristischen Linien und Linearisierung der Wellenfront die angegebene Sigmoid-Funktion (vgl. Thomas, 1944 [11]). Im Grenzfall $k_{Th} \rightarrow \infty$ (sofortiges Gleichgewicht) geht die Kurve in eine Stufenfunktion über. $\square$

7 Anwendungsfeld V: Atmosphärisch-Ozeanischer CO₂-Austausch

7.1 Henry-Gesetz und Grenzschichtmodell

Definition 13 (Henry-Gesetz). Die Gleichgewichtskonzentration eines Gases in einer Flüssigkeit ist proportional zu seinem Partialdruck:

$$c_{aq} = K_H(T) p_{gas},$$

wobei $K_H(T)$ ($mol/(L \cdot atm)$) die temperaturabhängige Henry-Konstante ist. Die Temperaturabhängigkeit folgt dem van't-Hoff-Gesetz:

$$K_H(T) = K_H(T_0) \exp\left[\frac{\Delta H_{sol}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right].$$

Satz 7 (Luft-See-Gasfluss nach dem Piston-Velocity-Modell). Der netto CO₂-Fluss über die Luft-See-Grenzfläche ist:

$$F_{CO_2} = k_w \cdot K_H \cdot (p_{CO_2}^{atm} - p_{CO_2}^{oze}),$$

wobei k_w (m/s) die *Piston-Velocity* (auch Gasübertragungsgeschwindigkeit) ist, die nach Wanninkhof (1992) windgeschwindigkeitsabhängig angenähert wird durch:

$$k_w = 0.31 u_{10}^2 \left(\frac{Sc}{660}\right)^{-1/2},$$

mit der Windgeschwindigkeit u_{10} (m/s) in 10 m Höhe und der Schmidt-Zahl $Sc = \nu/D_{CO_2}$.

Proof. Das Piston-Velocity-Modell basiert auf dem Film-Modell: Die molekulare Diffusion durch eine dünne Grenzschicht der Dicke z_s liefert $F = D_{CO_2}/z_s \cdot \Delta c = k_w \cdot \Delta c$. Die Abhängigkeit der Filmdicke von der Windgeschwindigkeit wird empirisch durch die u_{10}^2 -Abhängigkeit erfasst (turbulente Durchmischung zerstört den Film). Die Schmidt-Zahl-Korrektur $(Sc/660)^{-1/2}$ normiert auf das Standard-Gas SF₆ bei 20°C ($Sc = 660$). $\square$

plots/plot6_ionen.png

Figure 5: **Ionenaustausch – Durchbruchskurven und Selektivität.** *Links:* Simulierte Durchbruchskurven nach dem Thomas-Modell für drei verschiedene kinetische Ratenkonstanten k_{Th} . Schnellere Austauschkinetik erzeugt eine steilere Kurve – im Grenzfalle eine Stufenfunktion. Die gestrichelte Linie markiert den theoretischen Gleichgewichtszeitpunkt t_{eq} . *Rechts:* Relative Ionenselektivitäten für Kationen- und Anionentauscher gegenüber Na^+ als Referenz; höherwertige Ionen werden bevorzugt gebunden.

Lemma 2 (Pufferkapazität des Ozeans). Die effektive CO_2 -Aufnahmekapazität des Ozeans wird durch den *Revelle-Faktor* R_F begrenzt:

$$R_F = \frac{\delta p_{\text{CO}_2}/p_{\text{CO}_2}}{\delta C_{\text{DIC}}/C_{\text{DIC}}} \approx 10-15 \quad (\text{heutiger Ozean}).$$

Ein höherer R_F bedeutet geringere Pufferkapazität – je mehr CO_2 aufgenommen wird, desto schwieriger wird weitere Aufnahme.

Proof. Im Karbonatsystem des Ozeans gilt die Gleichgewichtschemie: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+$. Differentiation von $p_{\text{CO}_2} = [\text{CO}_2]/K_H$ und $C_{\text{DIC}} =$

plots/plot5_co2.png

Figure 6: **Atmosphärisch-ozeanischer CO₂-Austausch.** *Links:* Löslichkeit von CO₂ im Meerwasser nach dem Henry-Gesetz für vorindustrielle (280 ppm) und aktuelle (420 ppm) atmosphärische Konzentrationen. Kälteres Wasser löst deutlich mehr CO₂ – daher sind Polarmeere die stärksten natürlichen CO₂-Senken. *Rechts:* Historische Entwicklung des atmosphärischen CO₂-Gehalts (1750–2024) und der resultierende Rückgang des Ozean-pH-Werts (Versauerung um ca. 0,12 pH-Einheiten seit der Industrialisierung).

$[CO_2] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$ nach den Gleichgewichtskonstanten ergibt die angegebene Näherungsformel für R_F (Revelle & Suess, 1957 [10]). $\square$

8 Anwendungsfeld VI: Elektrochemischer Ladungsaustausch

8.1 Nernst-Planck-Gleichung und elektrochemische Zellen

Definition 14 (Nernst-Planck-Gleichung). Der Gesamtfluss eines Ions i mit Ladungszahl z_i , Diffusionskoeffizient D_i und Konzentration c_i in einem elektrischen Feld $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ ist:

$$\mathbf{J}_i = -D_i \nabla c_i - \frac{z_i F D_i}{RT} c_i \nabla \phi,$$

wobei F die Faraday-Konstante ist. Der erste Term ist der Diffusionsfluss, der zweite der Migrationsfluss.

Satz 8 (Nernst-Gleichung für Gleichgewichtspotential). Im elektrochemischen Gleichgewicht ($\mathbf{J}_i = 0$) ergibt sich das Membranpotential (Nernst-Potential):

$$E_i = \frac{RT}{z_i F} \ln \frac{c_i^{aueu}}{c_i^{innen}}.$$

Proof. Aus $\mathbf{J}_i = 0$ folgt:

$$D_i \nabla c_i = -\frac{z_i F D_i}{RT} c_i \nabla \phi \quad \Rightarrow \quad \frac{\nabla c_i}{c_i} = -\frac{z_i F}{RT} \nabla \phi.$$

Integration über die Membran von innen nach außen liefert:

$$\ln \frac{c_i^{aueu}}{c_i^{innen}} = -\frac{z_i F}{RT} (\phi^{aueu} - \phi^{innen}) = \frac{z_i F}{RT} E_i.$$

Umformung ergibt die Nernst-Gleichung. □

Beispiel 2 (Ruhepotential der Nervenzelle). Für die Kalium-Ionen ($z = +1$) einer Nervenzelle mit $[K^+]_{aueu} = 5 \text{ mmol/L}$ und $[K^+]_{innen} = 140 \text{ mmol/L}$ bei $T = 310,15 \text{ K}$:

$$E_{K^+} = \frac{8.314 \times 310.15}{1 \times 96485} \ln \frac{5}{140} \approx 0.0267 \times (-3.33) \approx -89 \text{ mV}.$$

Das reale Ruhepotential von ca. -70 mV ergibt sich durch die Goldman-Hodgkin-Katz-Gleichung, die mehrere Ionen (K^+ , Na^+ , Cl^-) gewichtet berücksichtigt.

Satz 9 (Universelle Struktur des Austauschprinzips). Alle sechs untersuchten Anwendungsfelder lassen sich auf die einheitliche Form

$$J = P \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)$$

zurückführen, wobei die Zuordnung gemäß Tabelle 1 gilt.

Proof. Die Analogie ergibt sich durch direkte Substitution in den jeweiligen Transportgesetzen, wie in den vorausgehenden Abschnitten gezeigt. Alle Gesetze sind Spezialfälle der linearen Onsager-Relationen $J_i = \sum_j L_{ij}(\varphi_i - \varphi_j)$ der irreversiblen Thermodynamik, wobei L_{ij} die phänomenologischen Kopplungskoeffizienten (hier: P) sind. Die Symmetrie $L_{ij} = L_{ji}$ (Onsager-Reziprozität) gilt für alle linearen Nah-Gleichgewichtsprozesse. □

Table 1: Analogietabelle des Austauschprinzips in verschiedenen Disziplinen.

Disziplin	Fluss J	Potential φ	Permeabilität P	Gesetz
Diffusion	J [mol/(m ² s)]	Konzentration c	D/ℓ	Fick
Wärmeleitung	q [W/m ²]	Temperatur T	λ/ℓ	Fourier
Osmose	J_w [m/s]	Osmot. Druck Π	L_p	van't Hoff
Ionenaustausch	J_i [mol/(m ² s)]	Konz. c_i , Pot. ϕ	D_i/ℓ	Nernst-Planck
Gasaustausch	F [mol/(m ² s)]	Partialdruck p	$k_w K_H$	Henry
Wärmeübertr.	$\dot{Q}$ [W]	Temperatur T	kA	NTU-Methode

9 Zusammenfassung

Das Austauschprinzip erweist sich als eines der universellsten Organisationsprinzipien der Naturwissenschaft. Es durchzieht alle Skalen – vom Ionenkanal in der Zellmembran bis zum globalen CO₂-Kreislauf – und alle Disziplinen: Biologie, Physik, Chemie, Atmosphärenwissenschaft, Thermodynamik und Elektrochemie.

Zentrale Ergebnisse dieser Arbeit:

- Das Austauschprinzip wurde formal als linearer Transportprozess $J = P(\varphi_1 - \varphi_2)$ definiert (Abschnitt 2).
- Satz 1 beweist die Existenz und Eindeutigkeit des Gleichgewichts sowie die exponentielle Relaxation mit Zeitkonstante τ .
- Alle sechs Anwendungsfelder wurden durch spezifische Sätze, Lemmata und Beweise formal nachgewiesen.
- Die Tabelle der Analogien (Tab. 1) zeigt die universelle Struktur als Onsager-Transportrelation.
- Der menschliche Körper realisiert das Austauschprinzip optimiert auf mehreren Ebenen gleichzeitig – pulmonal, kapillär, renal und intestinal.

10 Ausblick

10.1 Nichtlineare Austauschprozesse und Fernab-vom-Gleichgewicht-Dynamik

Die in dieser Arbeit betrachteten Transportgesetze basieren sämtlich auf linearen Onsager-Relationen, die im Nah-Gleichgewichtsbereich gültig sind. Ein bedeutender Zukunftsbereich ist die Erweiterung auf stark nichtlineare Regime, wie sie in biologischen Systemen routinemäßig auftreten. So zeigen Ionenkanäle in der Nervenzellmembran bei der Entstehung von Aktionspotentialen hochgradig nichtlineare Gatingdynamiken, die durch die Hodgkin-Huxley-Gleichungen beschrieben werden. Die Kopplung von Diffusion, Reaktion und Elektromigration führt zu Turing-Instabilitäten und Musterbildungsprozessen, die in der Entwicklungsbiologie, der Oberflächenkatalyse und der chemischen Signaltransduktion eine fundamentale Rolle spielen. Eine formale Erweiterung des hier entwickelten Rahmens auf nichtlineare Kopplungskoeffizienten $L_{ij}(\varphi)$ ist ein natürlicher nächster Schritt,

der insbesondere für die Modellierung biologischer Membranen mit spannungsabhängigen Permeabilitäten relevant ist.

10.2 Maschinelles Lernen für adaptive Austauschsysteme

Moderne Ansätze des maschinellen Lernens, insbesondere physik-informierte neuronale Netze (PINNs, *Physics-Informed Neural Networks*), ermöglichen es, die Diffusionsgleichung und verwandte partielle Differentialgleichungen aus experimentellen Messdaten zu identifizieren und inverse Probleme zu lösen: zum Beispiel die Rekonstruktion räumlich variierender Diffusionskoeffizienten $D(\mathbf{x})$ oder temperaturabhängiger Permeabilitäten $P(T)$ aus zeitlichen Konzentrationsverläufen. Dies hat unmittelbare Anwendungen in der personalisierten Medizin (Bestimmung patientenindividueller pulmonaler Diffusionskapazitäten aus Atemmessungen), in der Umweltüberwachung (Rückrechnung von Emissionsquellen aus Konzentrationsfeldern) und im Membrandesign für Meerwasserentsalzung und Hämofiltration.

10.3 Technologische Anwendungen im Bereich Membrantechnologie

Die Membrantechnologie ist ein Schlüsseltechnologiefeld für die Zukunft der Wasserversorgung, der Energiegewinnung und der Biomedizin. Zentrale Entwicklungslinien:

- **Umkehrosmose und Nanofiltration:** Die Modellierung der Polarisationschicht (Konzentrationspolarisation) an der Membranoberfläche erfordert eine Kopplung von Fick'scher Diffusion mit konvektiven Strömungsfeldern (Lösung der Konvektions-Diffusions-Gleichung). Zukünftige Hochleistungsmembranen auf Basis zweidimensionaler Materialien (Graphen, MXene) versprechen drastisch reduzierte Transmembranwiderstände bei gleichzeitig hoher Selektivität.
- **Künstliche Lunge (ECMO/ECLS):** Die Extrakorporale Membranoxygenierung realisiert das pulmonale Austauschprinzip technisch und lebensrettend außerhalb des Körpers. Zukünftige Generationen biomimetischer Membranen sollen die natürliche Alveolarmembran in Dicke, Fläche und Permeabilität imitieren; mathematische Optimierungsmodelle basierend auf den in dieser Arbeit hergeleiteten Gleichungen sind dafür unerlässlich.
- **Brennstoffzellen und Elektrolyseure:** Der Protonen-Austausch durch die Nafion-Membran in PEM-Brennstoffzellen ist eine direkte Anwendung der Nernst-Planck-Gleichung. Die Optimierung der Membrandicke, Feuchte und Betriebstemperatur ist ein aktives Forschungsfeld.

10.4 Klimawissenschaftliche Bedeutung des Ozean-Atmosphäre-Austauschs

Der in Abschnitt 7 mathematisch beschriebene atmosphärisch-ozeanische CO_2 -Austausch ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis des Klimawandels. Zukünftige Forschungsrichtungen umfassen:

- **Iron-Fertilization-Hypothese:** Das Einbringen von Eisensulfat in eisenlimitierte Ozeangebiete (Südozean) könnte die Phytoplanktion-Photosynthese und damit die

biologische Kohlenstoffpumpe beschleunigen. Die mathematische Modellierung erfordert die Kopplung von Henry-Gesetz, Reaktions-Diffusions- Gleichungen und Nährstofftransportmodellen in drei Dimensionen.

- **Hochauflösende Eddy-Covariance-Messungen:** Die direkte Messung des Flusses F_{CO_2} über der Meeresoberfläche mittels turbulenter Wirbelkorrelation ermöglicht die Validierung der Piston-Velocity-Parametrisierungen.
- **pH-Monitoring und Ozeanversauerung:** Der durch Abbildung 6 illustrierte Rückgang des Ozean-pH hat tiefgreifende Konsequenzen für Kalkorganismen (Korallen, Mollusken), die ihr Exoskelett durch Ausfällung von $CaCO_3$ bilden. Das Löslichkeitsprodukt $K_{sp}(CaCO_3)$ wird bei weiter sinkenden pH-Werten überschritten, was zur Auflösung von Kalkstrukturen führt. Die mathematische Beschreibung dieses gekoppelten chemisch-biologischen Prozesses ist ein Forschungsgebiet von höchster Dringlichkeit.

10.5 Quantentransport und nanometerkaliger Austausch

Auf der nanometerischen Skala – einzelne Proteinkanäle, Nanoröhren oder zweidimensionale Materialien – verlieren klassische Diffusionsgesetze ihre Gültigkeit. Quantenmechanische Effekte wie Tunneln, Dekohärenz und diskrete Energieniveaus der Translationsbewegung modifizieren den Transportprozess grundlegend. Die Theorie des Quantentransports (Landauer-Büttiker-Formalismus) beschreibt den Ladungsfluss durch nanometerische Kanäle als Transmissionsproblem an einer Potentialbarriere. Analoge Formulierungen für Massentransport (Quantendiffusion) sind ein offenes Forschungsgebiet. Insbesondere Wasserkanäle in Zellmembranen (Aquaporine, Durchmesser ~ 0.3 nm) zeigen Transportphänomene, die ohne molekulardynamische Simulationen auf atomarer Ebene nicht vollständig verstanden werden können.

10.6 Systembiologie: das Austauschprinzip als Netzwerkeigenschaft

Der menschliche Körper realisiert das Austauschprinzip nicht isoliert, sondern als vernetzte Hierarchie von Austauschprozessen: Die Lunge versorgt das Blut, das Blut versorgt die Kapillaren, die Kapillaren versorgen die Zellen, die Zellen ernähren die Mitochondrien. Diese mehrstufige Struktur ist mathematisch als gerichteter Graph mit Austauschflüssen als Kantengewichten modellierbar – und stellt eine direkte Verbindung zur Graphentheorie her. Der Subgraph Algorithmus [16] könnte zukünftig verwendet werden, um strukturelle Ähnlichkeiten in biologischen Austausch-Netzwerken zu identifizieren: zum Beispiel, ob das Versorgungsmuster eines Tumorgewebes als Subgraph des physiologischen Versorgungsgraphen aufgefasst werden kann. Diese interdisziplinäre Brücke zwischen der formalen Graphentheorie und der systembiologischen Modellierung von Austauschprozessen eröffnet ein faszinierendes neues Forschungsfeld.

10.7 Theologisch-philosophische Reflexion: Das Austauschprinzip als Schöpfungsprinzip

Aus theologischer Perspektive – insbesondere im Rahmen einer Schöpfungstheologie im Sinne der Genesis-Exegese – kann das Austauschprinzip als eines der fundamentalen Ord-

nungsprinzipien der Schöpfung verstanden werden. Der menschliche Körper wurde nach dem biblischen Zeugnis als Abbild (hebr. *tselem*) des Schöpfers gestaltet und verkörpert in seiner physiologischen Architektur eine gestalterische Weisheit, die in ihrer Effizienz und Robustheit von menschlicher Ingenieurskunst bis heute nicht vollständig erreicht wurde. Das Austauschprinzip – Geben und Empfangen, Abgeben des Unbrauchbaren und Aufnehmen des Nützlichen – spiegelt auf der biologischen Ebene eine universelle ethische Grundstruktur wider, die auch in der Theologie des Gebets (Gebet als Austausch mit dem Transzendenten) und der Gemeinschaft (Gabe und Gegengabe) ihre Entsprechung findet. Diese Parallele, die über die reine Naturwissenschaft hinausgeht, verweist auf die Einheit von Schöpfungsordnung und naturwissenschaftlichem Gesetz – ein Forschungsfeld, das an der Schnittstelle von Theologie, Philosophie der Naturwissenschaft und Systemtheorie liegt und weiterer interdisziplinärer Erforschung bedarf.

10.8 Fazit des Ausblicks

Das Austauschprinzip ist weit davon entfernt, vollständig verstanden zu sein. Von den nichtlinearen Erweiterungen der Onsager-Theorie über quantenmechanische Transportphänomene in Nanoporen, maschinell-lernende Identifikation von Transportparametern, klimawissenschaftliche Modellierung des Ozean-Atmosphäre-Systems bis hin zu systembiologischen Netzwerkmodellen und theologisch-philosophischen Reflexionen bietet dieses Prinzip eine schier unerschöpfliche Quelle wissenschaftlicher und kultureller Erkenntnis. Die formale mathematische Grundlage, wie sie in dieser Arbeit gelegt wurde, ist dabei nicht bloß ein Hilfsmittel – sie ist Ausdruck der tiefen Rationalität, die der Schöpfung innewohnt.

References

- [1] A. Fick. Über Diffusion. *Annalen der Physik*, 170(1):59–86, 1855.
- [2] J.-B. J. Fourier. *Théorie analytique de la chaleur*. Firmin Didot, Paris, 1822.
- [3] J. H. van’t Hoff. Die Rolle des osmotischen Drucks in der Analogie zwischen Lösungen und Gasen. *Zeitschrift für physikalische Chemie*, 1:481–508, 1887.
- [4] E. H. Starling. On the absorption of fluids from the connective tissue spaces. *Journal of Physiology*, 19(4):312–326, 1896.
- [5] W. Nernst. Zur Kinetik der in Lösung befindlichen Körper. *Zeitschrift für physikalische Chemie*, 2:613–637, 1888.
- [6] M. Planck. Über die Potentialdifferenz zwischen zwei verdünnten Lösungen binärer Elektrolyte. *Annalen der Physik*, 276(8):561–576, 1890.
- [7] L. Onsager. Reciprocal relations in irreversible processes. I. *Physical Review*, 37(4):405–426, 1931.
- [8] W. Henry. Experiments on the quantity of gases absorbed by water at different temperatures and under different pressures. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 93:29–274, 1803.

- [9] R. Wanninkhof. Relationship between wind speed and gas exchange over the ocean. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 97(C5):7373–7382, 1992.
- [10] R. Revelle and H. E. Suess. Carbon dioxide exchange between atmosphere and ocean and the question of an increase of atmospheric CO₂ during the past decades. *Tellus*, 9(1):18–27, 1957.
- [11] H. C. Thomas. Heterogeneous ion exchange in a flowing system. *Journal of the American Chemical Society*, 66(10):1664–1666, 1944.
- [12] A. L. Hodgkin and A. F. Huxley. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *Journal of Physiology*, 117(4):500–544, 1952.
- [13] E. R. Weibel. *The Pathway for Oxygen: Structure and Function in the Mammalian Respiratory System*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1984.
- [14] W. M. Kays and A. L. London. *Compact Heat Exchangers*. McGraw-Hill, New York, 3rd edition, 1984.
- [15] M. Mulder. *Basic Principles of Membrane Technology*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2nd edition, 1996.
- [16] S. Epp. Der Subgraph Algorithmus. , 2026. <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>.