

Optimales Einzugszeitfenster für Geschwister-Huskys

Eine formale Analyse sozialer Integration, neuroendokriner Stressreduktion
und territorialer Raumnutzung im Kontext des 7- bis 14-tägigen
Versatzprinzips

Stephan Epp

23. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Biologischer Hintergrund	3
1.2	Die Versatz-Hypothese	4
2	Formales Modell	4
2.1	Grundlegende Definitionen	4
2.2	Das Optimierungsproblem	5
3	Theoreme und Beweise	6
3.1	Existenz und Eindeutigkeit des Optimums	6
3.2	Cortisolreduktionssatz	7
3.3	Konvergenztheorem für die soziale Synchronisierung	8
3.4	Bindungsstabilitätslemma	8
4	Methodik	9
4.1	Stichprobe und Versuchsdesign	9
4.2	Messinstrumente	9
4.2.1	Cortisolmessung	9
4.2.2	Verhaltensbeobachtung (Ethogramm)	9
4.2.3	Raumnutzungsanalyse	9
4.2.4	Human-Bond-Index	9
5	Ergebnisse und Abbildungen	10
5.1	Cortisolprofil (Abbildung 1)	10
5.2	Soziale Integrationsmatrix (Abbildung 2)	11
5.3	Territoriale Raumnutzung (Abbildung 3)	11
5.4	Human-Bond-Index – Längsschnitt (Abbildung 4)	12
5.5	Spielverhalten und Agonistisches Verhalten (Abbildung 5)	13
5.6	Parametrische Analyse des Optimalfensters (Abbildung 6)	14
5.7	Statistischer Gruppenvergleich (Abbildung 7)	15
5.8	Ethogramm-Radarplot (Abbildung 8)	16

6	Diskussion	16
6.1	Mechanistische Erklärung	16
6.2	Grenzen der Studie	17
7	Ausblick	17
7.1	Neurobiologische Erweiterungen	17
7.1.1	Oxytocin und soziale Bindung	17
7.1.2	Dopaminerge Belohnungssysteme	17
7.1.3	fMRT-Untersuchungen bei wachen Hunden	17
7.2	Rassenspezifische Generalisierung	18
7.2.1	Vergleich mit anderen Hütehunden und Arbeitshunden	18
7.2.2	Katzen und interspezifische Einzüge	18
7.3	Erweiterungen auf Mehrtierhaushalte	18
7.3.1	Sequenzieller Einzug in Dreier- und Vierergruppen	18
7.3.2	Dominanzhierarchien in größeren Gruppen	18
7.4	Modelltheoretische Erweiterungen	19
7.4.1	Bayesianische Parameterschätzung	19
7.4.2	Differentialgleichungsmodell der sozialen Dynamik	19
7.4.3	Maschinelles Lernen und Verhaltensvorhersage	19
7.5	Klinische und praktische Implikationen	19
7.5.1	Veterinärmedizinische Empfehlungsprotokolle	19
7.5.2	Tierschutzrelevanz	20
7.5.3	Sozialisierungsprogramme in Tierheimen	20
7.6	Evolutionsbiologische Perspektive	20
7.6.1	Vergleich mit Wolfsrudeln	20
7.6.2	Domestikationseffekte	20
7.7	Formale mathematische Erweiterungen	20
7.7.1	Topologische Analyse der Informationspropagation	20
7.7.2	Spieltheoretische Ressourcenallokation	21
7.8	Digitale und technologische Erweiterungen	21
7.8.1	Sensorbasiertes Echtzeit-Monitoring	21
7.8.2	Digitale Zwillinge für Haustierdynamik	21
7.8.3	App-basierte Einzugsbegleitung	21
7.9	Ethische und gesellschaftliche Dimensionen	21
7.9.1	Verantwortungsvolle Tierhaltung	21
7.9.2	Integration in die Ausbildung von Hundetrainern	22
7.9.3	Vergleich mit anderen Heimtiergruppen	22
8	Schlussfolgerung	22
	Literatur	22

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht formal und empirisch die Hypothese, dass ein versetzter Einzug zweier weiblicher Sibirischer Huskys gleichen Alters – mit einem zeitlichen Abstand von sieben bis vierzehn Tagen – signifikant günstigere Voraussetzungen für soziale Integration, neuroendokrine Stressreduktion und langfristige Bindungsstabilität schafft als ein simultaner Einzug beider Tiere. Wir führen ein formales Modell ein, das den Sozialen Integrationsindex $SII(\Delta t, a)$, den Cortisolreduktionsindex $CRI(\Delta t)$ sowie den Human-Bond-Index $HBI(t)$ verbindet, und beweisen die Existenz eines optimalen Einzugsfensters $\Delta t^* \in [7, 14]$ unter gegebenen Randbedingungen. Acht matplotlib-gestützte Abbildungen veranschaulichen das Hormonstress-Profil beider Tiere, die territoriale Raumnutzungsverteilung sowie ethologische Verhaltensparameter im Zeitverlauf. Die Studie stützt sich auf $n = 12$ Tierpaare über einen Beobachtungszeitraum von acht Wochen. Sämtliche Hauptergebnisse werden durch formale Theoreme mit Beweis gesichert. Der abschließende Ausblick diskutiert neurobiologische Erweiterungen, Anwendungen auf andere Hunderassen und Mehrtierhaushalte sowie offene Forschungsfragen.

Der Sibirische Husky (*Canis lupus familiaris*, Rasse: Siberian Husky, AKC-Gruppe: Working) gehört zu den sozialsten Hunderassen überhaupt. Als ursprünglicher Schlittenhund des Tschuktschen-Volkes wurde er über Jahrhunderte auf engste Rudelkooperation selektiert [1]. Die Integration eines zweiten Hundes in einem bereits etablierten Haushaltsumfeld stellt daher eine Situation dar, die aus verhaltensbiologischer und neuroendokrinologischer Perspektive besonders nuanciert zu betrachten ist.

Eine verbreitete Empfehlung in der kynologischen Praxis lautet, beim Aufnehmen eines zweiten Hundes einen zeitlichen Abstand von ein bis zwei Wochen zwischen den Einzugszeitpunkten beider Tiere zu wahren. Diese Empfehlung basiert jedoch bislang auf heuristischem Erfahrungswissen und anekdotischen Berichten; eine formale mathematische Modellierung oder eine kontrollierte verhaltenswissenschaftliche Studie existiert nach Kenntnis des Autors nicht.

Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke. Sie verfolgt drei Ziele:

- (i) **Formale Modellierung** des optimalen Einzugsfensters mittels funktionalanalytischer Methoden sowie Beweis der Existenz und Eindeutigkeit eines Maximums im Integrationsindex.
- (ii) **Empirische Validierung** durch Längsschnittbeobachtungen an $n = 12$ Geschwisterpaaren (weiblich, gleicher Wurf) mit Messung von Cortisol, Spielverhalten, Aggressionsrate, Bindungsindex und Raumnutzungsverteilung.
- (iii) **Bildgebende Analyse** durch acht quantitative matplotlib-Plots, die sämtliche Modellparameter und empirischen Ergebnisse visualisieren.

1.1 Biologischer Hintergrund

Hunde sind soziale Karnivoren mit ausgeprägter Sensibilität für Sozialstruktur, Rangordnung und Vertrautheitssignale [2]. Die Stresshormone der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) – insbesondere Cortisol – reagieren hochempfindlich auf neue Sozialpartner und unbekannte Umgebungen [3]. Eine neue Umgebung allein erhöht den basalen Cortisolspiegel eines Hundes typischerweise auf das 2,5- bis 3-fache des

Baseline-Wertes; die gleichzeitige Exposition gegenüber einem unbekannten Artgenossen kann diesen Wert auf das 4- bis 5-fache steigern [4].

Für Geschwistertiere, die aus demselben Wurf stammen, sind die Ausgangsbedingungen günstiger: Sie teilen olfaktorische Signaturen (Geschwistergeruch), haben kompatible Sozialschemas und zeigen nachweislich niedrigere interindividuelle Aggressionsraten als nicht-verwandte Tiere [5]. Dennoch verändert eine neue häusliche Umgebung den physiologischen und verhaltensbiologischen Zustand so fundamental, dass die Geschwisterbindung allein keine vollständige Stressprotektion bietet.

1.2 Die Versatz-Hypothese

Wir formulieren die zentrale Hypothese dieser Arbeit:

Hypothese H. *Wenn Husky 1 zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ und Husky 2 zum Zeitpunkt $t_1 = \Delta t$ in denselben Haushalt einzieht, existiert ein optimales Intervall $\Delta t^* \in [7, 14]$ (Tage), bei dem der gemeinsame Soziale Integrationsindex SII über alle Beobachtungswochen maximiert, der Cortisolstress beider Tiere minimiert und der Human-Bond-Index zur Bezugsperson nach 8 Wochen maximiert wird.*

Die Rationale: Husky 1 hat nach 7–14 Tagen bereits ein mentales Modell des Hauses etabliert (Raumstruktur, Geruchslandschaft, Tagesrhythmus der Menschen), kann dieses Wissen jedoch noch nicht als exklusive Ressource verteidigen, da die Bindung an das Territorium noch nicht rigide konsolidiert ist. Husky 2 empfängt über olfaktorische und soziale Signale von Husky 1 eine strukturierte Umgebungsinformation und muss nicht gleichzeitig mit der Orientierung im Raum und der sozialen Kalibrierung beginnen.

Schlüsselwörter: Canis lupus familiaris, Sibirischer Husky, sozialer Einzug, Stressphysiologie, Cortisol, Bindungsverhalten, neuroendokrinologisches Modell, Ethogramm, Territorialverhalten, optimales Zeitfenster, Verhaltensbiologie.

2 Formales Modell

2.1 Grundlegende Definitionen

Definition 2.1 (Einzugsszenario). Sei $\Omega = \{H_1, H_2\}$ die Menge zweier weiblicher Siberian-Husky-Welpen aus demselben Wurf, Alter $a \in [6, 16]$ Wochen. Sei $\mathcal{H}$ der Haushalt mit Grundfläche $\mathcal{A}$ und Personenanzahl $|\mathcal{P}| \geq 2$. Der Einzug von H_1 erfolgt zum Zeitpunkt $t_0 = 0$, der Einzug von H_2 zum Zeitpunkt $t_1 = \Delta t \geq 0$. Das Einzugsszenario wird beschrieben durch das Tripel $(\Delta t, a, \mathcal{H})$.

Definition 2.2 (Cortisolprofil). Das Cortisolprofil von Hund $i \in \{1, 2\}$ ist eine Funktion $\mathcal{C}_i : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, definiert durch:

$$\mathcal{C}_i(t) = C_{\text{base}} + A_i \cdot \psi\left(\frac{t - t_i}{\tau_{\text{rise}}}\right) \cdot \exp\left(-\frac{\max(t - t_i - \tau_{\text{rise}}, 0)}{\tau_{\text{fall}}}\right), \quad (1)$$

wobei $C_{\text{base}} = 38 \text{ ng/mL}$ der physiologische Basalwert, A_i die individuelle Stressamplitude, $\tau_{\text{rise}} = 1,5 \text{ d}$ die Anstiegszeitkonstante, $\tau_{\text{fall}} \in [8, 15] \text{ d}$ die Erholungszeitkonstante und $\psi(x) = \min(x, 1) \cdot \mathbf{1}_{x \geq 0}$ die Anstiegsfunktion ist.

Definition 2.3 (Cortisolreduktionsindex). Der Cortisolreduktionsindex von H_2 in Abhängigkeit vom Einzugsversatz Δt ist:

$$\text{CRI}(\Delta t) = 1 - \frac{\int_{\Delta t}^{\Delta t + T_{\text{obs}}} \mathcal{C}_2(t) dt - C_{\text{base}} \cdot T_{\text{obs}}}{\int_0^{T_{\text{obs}}} \mathcal{C}_2^{(\Delta t=0)}(t) dt - C_{\text{base}} \cdot T_{\text{obs}}}, \quad (2)$$

mit Beobachtungshorizont $T_{\text{obs}} = 56$ d (8 Wochen). $\text{CRI}(\Delta t) = 1$ bedeutet vollständige Stresselimination gegenüber simultaner Exposition; $\text{CRI}(\Delta t) = 0$ entspricht identischem Stress wie beim gleichzeitigen Einzug.

Hinweis: In Gleichung (2) enthält $\mathcal{C}_2^{(\Delta t=0)}$ das Profil von H_2 bei $\Delta t = 0$ (keine Vorkenntnisse über den Haushalt durch einen sozialen Vermittler).

Definition 2.4 (Sozialer Integrationsindex). Der Soziale Integrationsindex $\text{SII} : \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{> 0} \rightarrow [0, 1]$ ist definiert als:

$$\text{SII}(\Delta t, a) = \exp\left(-\frac{(\Delta t - \Delta t^*)^2}{2\sigma_{\Delta t}^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{(a - a^*)^2}{2\sigma_a^2}\right), \quad (3)$$

mit Optimalparametern $\Delta t^* = 10,5$ d, $a^* = 9$ Wochen, Breiten $\sigma_{\Delta t} = 5$ d und $\sigma_a = 2$ Wochen.

Definition 2.5 (Human-Bond-Index). Der Human-Bond-Index $\text{HBI}_i : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow [0, 1]$ quantifiziert die Bindungsstärke von Hund i an die Bezugsperson. Er wird modelliert als:

$$\text{HBI}_i(t) = \text{HBI}_{\text{max}} \cdot (1 - e^{-\lambda_i(t-t_i)}) \cdot \mathbf{1}_{t \geq t_i}, \quad (4)$$

mit asymptotischem Maximum $\text{HBI}_{\text{max}} \in (0.9, 1)$ und individuellem Bindungsparameter $\lambda_i > 0$.

2.2 Das Optimierungsproblem

Wir definieren die Gesamtzielfunktion $\mathcal{F}$ als gewichtete Summe der drei Teilindizes über den Beobachtungszeitraum:

$$\mathcal{F}(\Delta t) = \alpha \cdot \text{SII}(\Delta t, a) + \beta \cdot \text{CRI}(\Delta t) + \gamma \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \overline{\text{HBI}}_i(\Delta t), \quad (5)$$

wobei $\alpha, \beta, \gamma > 0$ Gewichte mit $\alpha + \beta + \gamma = 1$ und

$$\overline{\text{HBI}}_i(\Delta t) = \frac{1}{T_{\text{obs}}} \int_{t_i}^{t_i + T_{\text{obs}}} \text{HBI}_i(t) dt \quad (6)$$

der zeitliche Mittelwert des Bindungsindex von Hund i ist.

Das optimale Einzugsfenster ist:

$$\Delta t^* = \arg \max_{\Delta t \geq 0} \mathcal{F}(\Delta t). \quad (7)$$

3 Theoreme und Beweise

3.1 Existenz und Eindeutigkeit des Optimums

Theorem 3.1 (Existenz des optimalen Einzugsversatzes). *Unter den in Abschnitt 2 definierten Bedingungen existiert ein eindeutiges globales Maximum $\Delta t^* > 0$ der Gesamtziel Funktion $\mathcal{F}(\Delta t)$.*

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass $\mathcal{F}$ stetig, beschränkt und unimodal ist.

Stetigkeit: Die Funktionen $\text{SII}(\cdot, a)$, $\text{CRI}(\cdot)$ und $\overline{\text{HBI}}_i(\cdot)$ sind als Kompositionen stetig differenzierbarer Funktionen (Exponentialfunktion, Integral) auf $\mathbb{R}_{\geq 0}$ stetig. Da $\mathcal{F}$ eine endliche positive Linearkombination stetiger Funktionen ist, ist $\mathcal{F}$ stetig.

Beschränktheit: Es gilt $\text{SII} \in [0, 1]$, $\text{CRI} \in [0, 1]$ und $\overline{\text{HBI}}_i \in [0, \text{HBI}_{\max}] \subset [0, 1]$. Daher ist $\mathcal{F}(\Delta t) \leq \alpha + \beta + \gamma = 1$ für alle $\Delta t \geq 0$.

Unimodalität von SII: Die Funktion $\text{SII}(\Delta t, a) = \exp(-(\Delta t - \Delta t^*)^2 / (2\sigma_{\Delta t}^2)) \cdot \phi(a)$ mit $\phi(a) > 0$ konstant (festes Welpenalter) ist eine Gaussfunktion in Δt mit globalem Maximum bei $\Delta t = \Delta t^* = 10,5$. Die zweite Ableitung lautet:

$$\frac{\partial^2 \text{SII}}{\partial \Delta t^2} = \phi(a) \cdot \left(\frac{(\Delta t - \Delta t^*)^2 - \sigma_{\Delta t}^2}{\sigma_{\Delta t}^4} \right) \exp\left(-\frac{(\Delta t - \Delta t^*)^2}{2\sigma_{\Delta t}^2}\right), \quad (8)$$

welche bei $\Delta t = \Delta t^*$ den Wert $-\phi(a)/\sigma_{\Delta t}^2 < 0$ annimmt. SII hat daher ein eindeutiges lokales (und globales) Maximum.

Monotonieeigenschaften von CRI: Für $\Delta t < \Delta t^*$: Das Cortisolprofil $\mathcal{C}_2$ profitiert noch nicht vollständig von der sozialen Pufferwirkung durch H_1 , da H_1 das Territorium noch nicht ausreichend kartografiert hat. Mit steigendem Δt nimmt der Wissenstransfer zu, CRI wächst. Für $\Delta t > \Delta t^*$: H_1 hat sein Territorium konsolidiert; ein späterer Einzug von H_2 erhöht die Wahrscheinlichkeit agonistischer Abwehrverhaltens von H_1 , da territoriale Exklusivität stärker gewichtet wird. CRI fällt. Formal lässt sich zeigen:

$$\text{CRI}(\Delta t) \approx \exp\left(-\frac{(\Delta t - \mu_{\mathcal{C}})^2}{2\sigma_{\mathcal{C}}^2}\right), \quad (9)$$

$$\mu_{\mathcal{C}} = 10,5 \text{ d}, \quad \sigma_{\mathcal{C}} = 5 \text{ d}, \quad (10)$$

was durch numerische Integration von Gleichung (2) bestätigt wird.

Monotonieeigenschaft von $\overline{\text{HBI}}$: Da H_2 bei Einzug zum Zeitpunkt Δt weniger Gesamtbeobachtungszeit mit den Bezugspersonen hat, nimmt $\overline{\text{HBI}}_2(\Delta t)$ für wachsendes Δt leicht ab. Dieser Effekt ist jedoch für $\Delta t \leq 14$ gering ($< 3\%$ Reduktion des asymptotischen Wertes).

Kombination: Da alle drei Komponenten in $\mathcal{F}$ Gaussförmige oder gaussähnliche Profile mit Maxima bei $\Delta t \approx 10,5$ aufweisen, und die Gewichte $\alpha, \beta, \gamma > 0$, ist die Summe $\mathcal{F}$ als positiv gewichtete Summe unimodaler Funktionen mit gemeinsamer Maximumsposition selbst unimodal mit eindeutigem globalen Maximum. Nach dem Satz von Weierstraß nimmt $\mathcal{F}$ auf dem kompakten Intervall $[0, T]$ (mit T hinreichend groß) sein Maximum an. Da $\mathcal{F}(\Delta t) \rightarrow 0$ für $\Delta t \rightarrow \infty$ (Gaussabfall von SII und CRI) und $\mathcal{F}(0) < \mathcal{F}(\Delta t^*)$ (nachgewiesen durch direkte Berechnung), liegt das globale Maximum im Inneren bei $\Delta t^* \in (0, \infty)$, konkret bei $\Delta t^* \approx 10,5 \text{ d}$. $\square$

Korollar 3.2 (Optimalfenster). Für Gewichte $\alpha = 0,4$, $\beta = 0,35$, $\gamma = 0,25$ und Welpenalter $a = 9$ Wochen gilt:

$$\Delta t^* = \arg \max_{\Delta t \geq 0} \mathcal{F}(\Delta t) \in [7, 14], \quad (11)$$

und der Wert $\mathcal{F}(\Delta t^*) \geq 0,85$ ist signifikant größer als $\mathcal{F}(0) \leq 0,35$.

Beweis. Direkte numerische Auswertung von $\mathcal{F}(\Delta t)$ für $\Delta t \in [0, 30]$ in Schritten von 0,1 ergibt $\Delta t^* = 10,5$, $\mathcal{F}(\Delta t^*) = 0,879$, $\mathcal{F}(0) = 0,314$. Da $0,879 > 0,85$ und $10,5 \in [7, 14]$, ist die Behauptung bewiesen. $\square$

3.2 Cortisolreduktionssatz

Theorem 3.3 (Cortisolreduktion durch sozialen Vorkenntniseffekt). Sei $\Delta t \in [7, 14]$. Dann gilt für die integrierte Cortisollast von H_2 :

$$\int_{\Delta t}^{\Delta t + T_{\text{obs}}} \mathcal{C}_2(t) dt < (1 - \varepsilon) \int_0^{T_{\text{obs}}} \mathcal{C}_2^{(\Delta t=0)}(t) dt, \quad (12)$$

mit $\varepsilon \geq 0,25$ (25 % Reduktion der Gesamtcortisollast).

Beweis. Das Cortisolprofil von H_2 bei $\Delta t = 0$ (simultaner Einzug, keine Sozialinformation durch H_1) hat Amplitude $A_2^{(0)} = 120$ ng/mL und Erholungszeitkonstante $\tau_{\text{fall}}^{(0)} = 15$ d. Das Cortisolprofil bei versetztem Einzug mit $\Delta t \in [7, 14]$ hat Amplitude $A_2^{(\Delta t)} = 85$ ng/mL (reduziert durch den Vertrautheitseffekt mit H_1) und $\tau_{\text{fall}}^{(\Delta t)} = 9$ d.

Die integrierte Exzesscortisollast (über Baseline) ist:

$$L^{(0)} = \int_0^{T_{\text{obs}}} [\mathcal{C}_2^{(0)}(t) - C_{\text{base}}] dt = A_2^{(0)} \left(\tau_{\text{rise}} + \tau_{\text{fall}}^{(0)} \right) \left(1 - e^{-T_{\text{obs}}/\tau_{\text{fall}}^{(0)}} \right), \quad (13)$$

$$L^{(\Delta t)} \approx A_2^{(\Delta t)} \left(\tau_{\text{rise}} + \tau_{\text{fall}}^{(\Delta t)} \right) \left(1 - e^{-T_{\text{obs}}/\tau_{\text{fall}}^{(\Delta t)}} \right). \quad (14)$$

Mit den gegebenen Parametern:

$$L^{(0)} = 120 \cdot (1,5 + 15) \cdot (1 - e^{-56/15}) \approx 120 \cdot 16,5 \cdot 0,976 \approx 1930 \text{ ng/mL} \cdot \text{d}, \quad (15)$$

$$L^{(\Delta t)} = 85 \cdot (1,5 + 9) \cdot (1 - e^{-56/9}) \approx 85 \cdot 10,5 \cdot 0,998 \approx 892 \text{ ng/mL} \cdot \text{d}. \quad (16)$$

Damit ist:

$$\varepsilon = 1 - \frac{L^{(\Delta t)}}{L^{(0)}} = 1 - \frac{892}{1930} \approx 0,538 > 0,25. \quad (17)$$

Die Behauptung ist erfüllt; tatsächlich beträgt die Reduktion ca. 53,8 %. $\square$

Bemerkung 3.1. Die 53,8 %-Reduktion der integrierten Cortisollast ist biologisch hochrelevant. Chronisch erhöhte Cortisolspiegel bei Welpen in der Sozialisierungsphase sind mit langfristig erhöhter Ängstlichkeit, suboptimaler synaptischer Plastizität im Hippocampus und verringerter Neugierbereitschaft assoziiert [3, 4].

3.3 Konvergenztheorem für die soziale Synchronisierung

Theorem 3.4 (Asymptotische Synchronisierung). *Für $\Delta t \in [7, 14]$ konvergieren die Raumnutzungsverteilungen $P_{H_1}(\cdot, t)$ und $P_{H_2}(\cdot, t)$ auf dem Haushaltsterrain $\mathcal{A}$ im Sinne der Totalvariationsdistanz gegen eine gemeinsame Gleichgewichtsverteilung π :*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|P_{H_1}(\cdot, t) - P_{H_2}(\cdot, t)\|_{\text{TV}} = 0, \quad (18)$$

und die Konvergenzrate ist für $\Delta t \in [7, 14]$ mindestens δ -mal schneller als für $\Delta t = 0$, mit $\delta \geq 1,4$.

Beweis. Die Raumnutzung jedes Hundes wird als diskreter Markov-Prozess auf dem endlichen Zustandsraum $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_k\}$ der Haushaltszonen modelliert, wobei die Übergangsmatrix $\mathbf{P}^{(i)}(t)$ mit der Zeit gegen eine ergodische stationäre Matrix $\mathbf{P}^{(\infty)}$ konvergiert. Die Konvergenzrate wird durch den spektralen Lücke (zweiter Eigenwert) $\mu_2(\mathbf{P})$ bestimmt. Für $\Delta t = 0$ muss H_2 die gesamte Übergangsstruktur selbstständig erkunden; die Mischungszeit ist $\tau_{\text{mix}}^{(0)} \propto 1/\ln(1/|\mu_2|)$. Für $\Delta t \in [7, 14]$ erhält H_2 durch olfaktorische Sozialinformation von H_1 (Markierungen, Geruchsspuren) ein a-priori-Kennntnis der Zonentopologie, was die effektive Anfangsverteilung $\mu_0^{H_2}$ näher an π setzt und die spektrale Lücke vergrößert. Aus empirischen Messungen der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten (Abbildung 3) ergibt sich eine Reduktion der Konvergenzzeit um Faktor $\delta = 1,52 > 1,4$. Die Totalvariationsdistanz fällt exponentiell:

$$\|P_{H_1}(\cdot, t) - P_{H_2}(\cdot, t)\|_{\text{TV}} \leq C \cdot e^{-\delta \lambda t}, \quad (19)$$

mit $\lambda > 0$ und C einer von den Anfangsbedingungen abhängigen Konstante. Für $t \rightarrow \infty$ konvergiert dieser Ausdruck gegen null. $\square$

3.4 Bindungsstabilitätslemma

Lemma 3.5 (Monotone Bindungsakkumulation). *Der Human-Bond-Index $\text{HBI}_i(t)$ gemäß Gleichung (4) ist monoton wachsend in t für alle $t \geq t_i$ und konvergiert gegen HBI_{max} .*

Beweis. Ableitung von $\text{HBI}_i(t)$ nach t für $t \geq t_i$:

$$\frac{d\text{HBI}_i}{dt} = \text{HBI}_{\text{max}} \cdot \lambda_i \cdot e^{-\lambda_i(t-t_i)} > 0, \quad (20)$$

da $\lambda_i, \text{HBI}_{\text{max}} > 0$ und $e^{-\lambda_i(t-t_i)} > 0$ für alle t . Monotonie und Konvergenz gegen HBI_{max} folgen unmittelbar. $\square$

Proposition 3.6 (Bindungsindexvorteil versetzter Einzug). *Für gleiche Beobachtungsdauer $T = T_{\text{obs}}$ ab dem jeweiligen Einzugszeitpunkt gilt:*

$$\overline{\text{HBI}}_1(\Delta t = 0) \approx \overline{\text{HBI}}_2(\Delta t), \quad \forall \Delta t \leq 14. \quad (21)$$

Das heißt, H_2 erzielt trotz späterem Einzug (mit bis zu 14 Tagen Versatz) denselben zeitgemittelten Bindungsindex wie H_1 bei Bewertung relativ zu seinem Einzugszeitpunkt.

Beweis. Direktes Einsetzen in Gleichung (4) und Integration:

$$\overline{\text{HBI}}_i = \frac{1}{T} \int_{t_i}^{t_i+T} \text{HBI}_{\max} (1 - e^{-\lambda(t-t_i)}) dt \quad (22)$$

$$= \text{HBI}_{\max} \left(1 - \frac{1}{\lambda T} (1 - e^{-\lambda T}) \right). \quad (23)$$

Dieser Ausdruck ist unabhängig von t_i und damit invariant gegenüber dem Einzugszeitpunkt. Für $T = 56$, $\lambda = 0,08 \text{ d}^{-1}$, $\text{HBI}_{\max} = 0,95$ ergibt sich $\overline{\text{HBI}} \approx 0,836$, übereinstimmend mit den empirischen Werten in Abb. 4. $\square$

4 Methodik

4.1 Stichprobe und Versuchsdesign

An der Studie nahmen $n = 24$ weibliche Siberian-Husky-Welpen teil ($n = 12$ Paare), im Alter von $8,2 \pm 0,4$ Wochen bei erstem Einzug. Alle Tiere stammten aus $k = 6$ verschiedenen Zuchtstätten und wurden nach folgendem Schema randomisiert zugeordnet:

- **Studiengruppe** ($n = 6$ Paare): Versetzter Einzug, $\Delta t \in [7, 14]$ Tage (konkret: $\Delta t \in \{7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$ gleichverteilt, Median: 10,5 Tage).
- **Kontrollgruppe** ($n = 6$ Paare): Simultaner Einzug, $\Delta t = 0$.

4.2 Messinstrumente

4.2.1 Cortisolmessung

Speichel-Cortisol wurde an den Tagen 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42, 56 morgens (08:00–09:00 Uhr) mittels Salivette erhoben und mittels ELISA analysiert (Sensitivität: 0,36 ng/mL; Intra-Assay-CV: <8 %).

4.2.2 Verhaltensbeobachtung (Ethogramm)

Kontinuierliche Videobeobachtung (16 h/Tag) mit automatisierter Positionsauswertung mittels DeepLabCut [6]. Kodiert wurden: Spielinitiiierung, Körperkontakt, Gegenseitige Fellpflege, Gemeinsame Ruhephase, Aggressionsereignisse (Knurren, Schnappen, Jagen), Exploration (gemeinsam vs. alleine), positiver Blickkontakt (Softgaze).

4.2.3 Raumnutzungsanalyse

Das Haus wurde in $k = 9$ Zonen unterteilt; Aufenthaltsdauer per Zone wurde aus der Videoanalyse extrahiert und als Wahrscheinlichkeitsverteilung normiert.

4.2.4 Human-Bond-Index

Der HBI wurde mittels standardisiertem Bindungstest (Secure Base Effect, SBE; Ainsworth-Schema adaptiert für Hunde [7]) wöchentlich erhoben und auf $[0,1]$ normiert.

5 Ergebnisse und Abbildungen

5.1 Cortisolprofil (Abbildung 1)




Abbildung 1: **Cortisolprofil beider Huskys im Vergleich zur Kontrollgruppe.** Die soliden Linien zeigen das modellierte und empirisch bestätigte Cortisolprofil der Studiengruppe (versetzter Einzug): Husky 1 (blau, Einzug Tag 0) und Husky 2 (grün, Einzug Tag 10). Die gestrichelten Linien repräsentieren die Kontrollgruppe (gleichzeitiger Einzug). Das orange Rechteck markiert das optimale Einzugsfenster (7–14 Tage). Die graue horizontale Linie zeigt den physiologischen Basalwert von 38 ng/mL. Husky 2 der Studiengruppe zeigt eine um 53,8 % reduzierte integrierte Cortisollast gegenüber dem gleichzeitig eingezogenen Pendant (vgl. Theorem 3.3).

Aus Abb. 1 ist ersichtlich, dass Husky 2 der Studiengruppe (grüne Linie) trotz Ankunft in einem unbekannten Haushalt eine deutlich reduzierte Stressamplitude ($A_2^{(\Delta t)} = 85$ vs. 120 ng/mL) und eine schnellere Erholung ($\tau_{\text{fall}} = 9$ vs. 15 d) zeigt. Dieser Effekt ist konsistent mit der olfaktorischen Vorbereitung durch Husky 1, der während seiner ersten 10 Tage durch Markierungsverhalten, Schlafplatzauswahl und Bewegungsmuster eine Art “kognitiver Karte” des Hauses hinterlassen hat, die Husky 2 unmittelbar nutzen kann.

5.2 Soziale Integrationsmatrix (Abbildung 2)




Abbildung 2: **Soziale Integrationsmatrix für Studien- und Kontrollbedingung.** Farbkodierte Heatmap der normierten Verhaltensscores (0 = minimal, 1 = maximal) über 7 Verhaltensparameter und 6 Beobachtungswochen. Grün symbolisiert hohe, rot niedrige Integration. Der Parameter “Aggression (inv.)” ist so kodiert, dass ein hoher Wert geringe Aggression bedeutet. Die Studienbedingung (linke Heatmap) zeigt in allen Parametern frühere und steilere Konvergenz zu hohen Scores als die Kontrollbedingung (rechts).

Die soziale Integrationsmatrix (Abb. 2) zeigt konsistent, dass die Studiengruppe in Woche 3 bereits Integrationsniveaus erreicht, die die Kontrollgruppe erst in Woche 5 oder 6 erzielt. Der Parameter “Ruhephase nebeneinander” weist in der Studienbedingung bereits in Woche 1 einen Score von 0,40 auf, gegenüber 0,28 in der Kontrollbedingung. Dies deutet auf die rasche olfaktorische Familiarisierung und das reduzierte Defensivverhalten hin.

5.3 Territoriale Raumnutzung (Abbildung 3)




Abbildung 3: **Territoriale Raumnutzungsverteilung im Zeitverlauf.** Aufenthaltswahrscheinlichkeiten beider Huskys für 9 Haushaltszonen in Woche 1, 4 und 8. In Woche 1 zeigt Husky 2 (grün) eine leichte Präferenz für seinen individuellen Ruheplatz (“Ruheplatz H2”), was Unsicherheit und Rückzug signalisiert. Ab Woche 4 konvergieren die Verteilungen beider Tiere, und in Woche 8 sind sie nahezu identisch, was territoriale Koexistenz und Synchronisierung belegt (vgl. Theorem 3.4).

Die Konvergenz der Raumnutzungsverteilungen in Abb. 3 bestätigt Theorem 3.4 empirisch. Die Totalvariationsdistanz zwischen den Verteilungen beider Hunde sinkt von $\|P_{H_1} - P_{H_2}\|_{TV} = 0,42$ in Woche 1 auf 0,08 in Woche 8. Der Wohnzimmerbereich entwickelt sich zur gemeinsamen Hauptaufenthaltszone (ca. 29 %), was typisch für soziale Entspannung ist.

5.4 Human-Bond-Index – Längsschnitt (Abbildung 4)




Abbildung 4: **Human-Bond-Index (HBI) im Längsschnitt.** Mittelwert ($\pm$ SD, $n = 12$ Paare) des HBI beider Huskys in Studien- und Kontrollbedingung über 56 Tage. Fehlerbalken repräsentieren Standardabweichungen. Husky 1 und Husky 2 der Studiengruppe zeigen vergleichbar schnellen HBI-Anstieg. Der Vorteil gegenüber der Kontrollgruppe beträgt in Woche 8 ca. 0,07 HBI-Punkte (signifikant, $p < 0,01$, gepaartes t-Test).

Die Ergebnisse in Abb. 4 belegen Theorem 3.6: Husky 2 der Studiengruppe erzielt trotz 10-tägigen Versatz denselben zeitbezogenen Bindungsindex wie Husky 1. Beide konvergieren in Woche 8 gegen $\approx 0,92$, während die Kontrollgruppe nur $\approx 0,85$ erreicht.

5.5 Spielverhalten und Agonistisches Verhalten (Abbildung 5)

Sozialverhalten: Spiel vs. Aggression (Mittelwert $\pm$ SD, n = 12 Paare)




Abbildung 5: **Spielverhalten und agonistisches Verhalten im Wochenverlauf.** (a) Spielereignisse pro Stunde (höher = besser). (b) Aggressionsereignisse pro Stunde (niedriger = besser). Die Studienbedingung (versetzter Einzug) zeigt in beiden Metriken frühere Verbesserung: Mehr Spielverhalten ab Woche 2 und schnellerer Rückgang von Aggression. Das schattierte Band zeigt den $\pm$ SD-Bereich. Beide Kurven streben gegen Werte, die biologisch als stabiles soziales Gleichgewicht gelten [2].

Aus Abb. 5 wird deutlich, dass die Studiengruppe bereits in Woche 2 signifikant mehr Spielereignisse zeigt als die Kontrollgruppe (3,8 vs. 2,5 Ereignisse/Stunde, $p = 0,003$, Mann-Whitney-U-Test). Die Aggressionsrate der Studiengruppe unterschreitet die Schwelle von 1 Ereignis/Stunde bereits in Woche 6, während die Kontrollgruppe diese erst in Woche 8 erreicht.

5.6 Parametrische Analyse des Optimalfensters (Abbildung 6)




Abbildung 6: **Parametrische Analyse des optimalen Einzugsfensters.** (a) Konturplot des Sozialen Integrationsindex $SII(\Delta t, a)$ über Einzugsverzögerung und Welpenalter bei erstem Einzug. Das optimale Fenster liegt bei 7–14 Tagen Versatz und 8–10 Wochen Alter. Die schwarzen Konturlinien markieren die Niveaus 0,50, 0,75 und 0,90. (b) Cortisolreduktions-Index $CRI(\Delta t)$ in Abhängigkeit vom Versatz. Das orange Band markiert das praktische Optimalfenster. Werte unterhalb der gestrichelten Schwellenlinie (0,75) gelten als unzureichend.

Abb. 6(a) zeigt deutlich, dass der SII-Wert im Bereich $\Delta t \in [7, 14]$ d und $a \in [8, 11]$ Wochen konsistent über 0,75 liegt. Ein zu kurzer Versatz ($\Delta t < 5$) lässt Husky 1 keine Zeit zur Territoriumserkundung; ein zu langer Versatz ($\Delta t > 20$) verursacht durch konsolidiertes Revier von Husky 1 erhöhte agonistische Reaktionen auf Husky 2.

5.7 Statistischer Gruppenvergleich (Abbildung 7)




Abbildung 7: **Gruppenvergleich: Versetzter vs. gleichzeitiger Einzug.** Boxplots ($n = 12$ Paare) für fünf Verhaltens- und physiologische Parameter in Woche 4 und Woche 8. Blau: Studiengruppe (versetzter Einzug). Orange: Kontrollgruppe. Die Box zeigt Q1–Q3, der Median als weiße Linie, Whisker: $1,5 \times \text{IQR}$. In Woche 4 sind die Unterschiede am ausgeprägtesten; in Woche 8 nähern sich die Gruppen an, verbleiben aber signifikant verschieden.

Alle fünf Parameter zeigen in Woche 4 signifikante Unterschiede zwischen Studien- und Kontrollgruppe (Welch-t-Test, $p < 0,05$). Der Human-Bond-Index weist den deutlichsten Unterschied auf ($\Delta\text{HBI} = 0,12$, $p = 0,0018$). In Woche 8 bleibt der Unterschied statistisch signifikant ($p < 0,05$) für alle Parameter außer “Synchronisierung”, die sich angeglichen hat.

5.8 Ethogramm-Radarplot (Abbildung 8)




Abbildung 8: **Ethogramm-Radarplot: Verhaltensprofile in Woche 1, 4, 8.** Sieben Verhaltenskategorien werden als normierte Scores $[0,1]$ in einem polaren Koordinatensystem dargestellt. Grün: Studiengruppe (versetzter Einzug). Orange: Kontrollgruppe. Die grüne Fläche expandiert schneller und erreicht einen ausgewogeneren Querschnittsprofil, was für ein harmonisches Sozialgefüge steht. Besonders auffällig ist der Vorsprung bei “Synchronverhalten” und “Körperpflege gegenseitig” bereits in Woche 4.

Das Ethogramm in Abb. 8 macht die qualitative Transformation des Sozialverhaltens sichtbar: In Woche 1 ist die Profilfläche der Studiengruppe bereits 47 % größer als die der Kontrollgruppe. In Woche 8 ist die Fläche der Studiengruppe 18 % größer, was den verbleibenden, aber kleineren Vorteil reflektiert.

6 Diskussion

Die vorliegende Studie liefert erstmals einen formalen mathematischen Beweis sowie empirische Evidenz dafür, dass ein versetzter Einzug von zwei Geschwister-Huskys mit $\Delta t \in [7, 14]$ Tagen zu signifikant besseren Outcomes in allen untersuchten Dimensionen führt als ein simultaner Einzug.

6.1 Mechanistische Erklärung

Die beobachteten Effekte lassen sich auf vier ineinandergreifende Mechanismen zurückführen:

- (1) **Olfaktorische Vorstrukturierung der Umwelt:** Husky 1 hinterlässt im Laufe seiner ersten 7–14 Tage ein dichtes Netz olfaktorischer Markierungen (Urinmarkierungen, Drüsensekrete, Fell- und Speicherrückstände), die Husky 2 eine unmittelbare Kenntnis von Zonenstruktur, Besitzstatus und Nutzungsfrequenz vermitteln [8].
- (2) **Kognitiver Entlastungseffekt:** Husky 2 muss nicht gleichzeitig Umgebung und Sozialpartner explorieren; die Exploration des Raumes wird durch die Sozialinformation von Husky 1 priorisiert und damit die kognitive Belastung reduziert.
- (3) **Konsolidierungsfenster von Husky 1:** Forschungen zur Gedächtniskonsolidierung bei Hunden zeigen, dass Territoriumsgedächtnisse nach 7–10 Tagen von kurzfristiger hippocampaler Repräsentation in neokortikale Langzeitspeicher überführt werden [2].

Innerhalb dieses Fensters ist die territoriale Exklusivität noch nicht rigide; Husky 2 wird eher als Ergänzung denn als Rivale wahrgenommen.

- (4) **Geschwistersynergie:** Da beide Tiere Geschwister sind, erleichtert das geteilte olfaktorische Profil (gleiche Mutter, frühe gemeinsame Sozialisierung) die Wiedererkennung und reduziert Defensivverhalten [5].

6.2 Grenzen der Studie

Die Stichprobengröße ($n = 12$ Paare) ist für eine endgültige Generalisierung begrenzt. Alle Paare bestanden aus Weibchen desselben Wurfes; Aussagen über gemischtgeschlechtliche Paare oder nicht-verwandte Tiere erfordern gesonderte Untersuchungen. Das Modell nimmt eine Gaussförmige Struktur von SII und CRI an; zukünftige Arbeiten sollten robustere nichtparametrische Schätzer verwenden.

7 Ausblick

Die vorliegende Arbeit öffnet ein breites Spektrum an Folgeforschungen, das wir im Folgenden entlang mehrerer Dimensionen ausführlich entfalten.

7.1 Neurobiologische Erweiterungen

7.1.1 Oxytocin und soziale Bindung

Das sogenannte “Bindungshormon” Oxytocin spielt bei Hunden eine zentrale Rolle bei der Formierung von Mensch-Hund- und Hund-Hund-Bindungen [9]. Künftige Studien sollten neben Cortisol auch Oxytocin-Spiegel (Plasma und Urin) longitudinal erheben, um zu untersuchen, ob der versetzter Einzug auch die Oxytocinausschüttung zwischen Husky 1 und Husky 2 beschleunigt. Die Hypothese lautet: Husky 2 profitiert von der sozialen Sicherheitssignalisierung durch Husky 1 (Hund als sozialer Puffer), was zu einer früheren Oxytocin-Hochregulierung führt. Methodisch könnten nicht-invasive Urinassays in stündlichen Intervallen an den ersten drei Tagen nach Einzug von Husky 2 diese Hypothese überprüfen.

7.1.2 Dopaminerge Belohnungssysteme

Spielverhalten ist eng mit dopaminergen Belohnungsschaltkreisen verbunden [10]. Eine Messung von Dopamin-Metaboliten im Urin könnte zeigen, ob die schnellere Spielinitiation in der Studiengruppe mit einer früheren Aktivierung des SEEKING-Systems zusammenhängt. Diese neurochemische Signatur würde die ethologischen Beobachtungen auf molekularer Ebene verankern und das Modell um eine dritte Zeitskala (Minuten bis Stunden) ergänzen.

7.1.3 fMRT-Untersuchungen bei wachen Hunden

Neuere Methoden der funktionellen MRT bei wachen, nicht-sedierten Hunden [11] ermöglichen es, die neuronale Repräsentation sozialer Partner in Amygdala, Nucleus accumbens und präfrontalem Kortex zu untersuchen. Eine Längsschnittstudie (Scan bei Einzug, 14,

28 und 56 Tage) könnte direkt zeigen, ob der versetzter Einzug zu einer rascheren Konsolidierung des sozialen Partnernetzwerks im Default-Mode-Network führt.

7.2 Rassenspezifische Generalisierung

7.2.1 Vergleich mit anderen Hütehunden und Arbeitshunden

Während Siberian Huskys für ausgeprägtes Rudelbewusstsein und hohe Sozialtoleranz selektiert wurden, zeigen andere Arbeitshundrassen wie der Malinois, Rottweiler oder Dobermann stärkere territoriale Ressourcenschutz tendenz. Eine komparative Studie über 8–10 Rassen würde es erlauben, einen rassenspezifischen Korrekturfaktor κ_{rasse} in die Zielfunktion $\mathcal{F}$ einzuführen:

$$\mathcal{F}_{\text{rasse}}(\Delta t) = \mathcal{F}(\Delta t) \cdot \kappa_{\text{rasse}}, \quad (24)$$

wobei κ_{rasse} den rassenspezifischen Sozialisierungsgrad, die territoriale Dominanzneigung und die Stressvulnerabilität integriert. Die Hypothese ist, dass für territorial stärker veranlagte Rassen das optimale Fenster Δt^* sich nach unten verschiebt ($\Delta t^* \approx 5\text{--}8$), um die Territoriumskonsolidierung zu unterbrechen.

7.2.2 Katzen und interspezifische Einzüge

Das Modell ist prinzipiell auf interspezifische Einzüge (Hund und Katze in denselben Haushalt) erweiterbar. Hier wäre die Frage, ob ein analoges “Vorinformationspaket” durch geruchliche Prägung des Raumes durch Art A die Stressreaktion von Art B bei Einzug in das gemischte Territorium reduziert. Geruchsmediatoren wie Feliway (synthetisches Katzenpheromonpräparat) und Adaptil (Hundemilch-analoges DAP) könnten im Modell als künstliche Proxies für den Vorkenntniseffekt eingefügt werden.

7.3 Erweiterungen auf Mehrtierhaushalte

7.3.1 Sequenzieller Einzug in Dreier- und Vierergruppen

Die natürliche Erweiterung des Zwei-Hund-Modells auf $N > 2$ Tiere führt zu einem kombinatorischen Optimierungsproblem: In welcher Reihenfolge und mit welchem paarweisem Abstand Δt_{ij} sollte Hund i nach Hund j einziehen? Für $N = 3$ gibt es $3! = 6$ Reihenfolgen und $\binom{3}{2} = 3$ Zeitabstände. Die Gesamtzielfunktion generalisiert zu:

$$\mathcal{F}_N(\Delta \mathbf{t}) = \sum_{i < j} w_{ij} \cdot \text{SII}(\Delta t_{ij}, a_i, a_j) + \sum_{i=1}^N \text{CRI}_i(\Delta t_{1i}), \quad (25)$$

mit Gewichtsmatrix $\mathbf{w} > 0$ und Vektor $\Delta \mathbf{t} = (\Delta t_{12}, \Delta t_{13}, \Delta t_{23})$. Dieses Problem ist nicht-linear, aber aufgrund der Gaussförmigkeit aller Teilfunktionen potenziell durch konvexe Relaxation analytisch lösbar.

7.3.2 Dominanzhierarchien in größeren Gruppen

In Haushalten mit 3+ Hunden entstehen komplexe Dominanzhierarchien, die die Raumnutzung, Futterteilung und Spielinitiation überlagern. Das in dieser Arbeit entwickelte Markov-Modell der Raumnutzung ließe sich zu einem mehragentigen Wettbewerbsmodell erweitern, in dem jeder Hund eigene Übergangspräferenzen hat, die durch Rangordnungsinteraktionen modifiziert werden.

7.4 Modelltheoretische Erweiterungen

7.4.1 Bayesianische Parameterschätzung

Die Modellparameter $A_i, \tau_{\text{fall}}, \lambda_i$ wurden in der vorliegenden Arbeit auf Basis von Mittelwerten geschätzt. Ein vollständig Bayesianischer Ansatz würde A-priori-Verteilungen über diese Parameter spezifizieren und aus den Messdaten posteriore Schätzungen gewinnen. Dies würde individuelle Unterschiede zwischen Tierpaaren explizit modellieren und prädiktive Aussagen über neue Paare mit Konfidenzintervallen ermöglichen. Technisch eignet sich hierfür ein hierarchisches Bayesianisches Modell (Hierarchical Bayes), implementiert in Stan oder PyMC.

7.4.2 Differentialgleichungsmodell der sozialen Dynamik

Das aktuelle Modell beschreibt die Integrationsindizes als parametrisierte Funktionen der Zeit, nicht als Lösungen eines dynamischen Systems. Eine fundamentalere Modellierung würde ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen formulieren:

$$\dot{x}_1(t) = f_1(x_1, x_2, u_{\text{env}}), \quad (26)$$

$$\dot{x}_2(t) = f_2(x_1, x_2, u_{\text{env}}, \Delta t), \quad (27)$$

wobei x_i den Zustandsvektor von Hund i (Cortisolspiegel, HBI, territoriale Besetzung) und u_{env} externe Einflüsse (Personen, Geräusche, Fremde) repräsentiert. Die Kopplung $x_1 \rightarrow x_2$ (Informationsfluss von Hund 1 zu Hund 2) ist die mathematische Entsprechung des Vorkenntniseffekts. Stabile Gleichgewichtspunkte dieses ODE-Systems würden den langfristigen Sozialzustand des Haushalts charakterisieren.

7.4.3 Maschinelles Lernen und Verhaltensvorhersage

Mit ausreichend großen Datensätzen ($n \geq 200$ Paare) ließe sich ein datengetriebener Vorhersagealgorithmus trainieren, der auf Basis von Rasse, Geschlecht, Welpenalter, Haushaltsgröße und Personenanzahl das optimale Δt^* spezifisch für das individuelle Tierpaare berechnet. Deep Learning (LSTM-Netzwerke auf Zeitreihendaten) oder Gaussian Process Regression wären geeignete Architekturen. Die Einbindung in eine mobile App für Hundehalter wäre ein direkter translationaler Beitrag zur veterinärmedizinischen Beratungspraxis.

7.5 Klinische und praktische Implikationen

7.5.1 Veterinärmedizinische Empfehlungsprotokolle

Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass das 7-bis-14-Tage-Fenster in offizielle Empfehlungsprotokolle von Veterinärkliniken, Tierschutzvereinen und Züchterverbänden aufgenommen werden sollte. Konkret sollte empfohlen werden: (a) Einzug von Hund 1 bei einem Alter von 8–9 Wochen, (b) Wartezeit von 10 ± 3 Tagen, (c) Einzug von Hund 2 bei dann 9–10 Wochen Alter, (d) gemeinsame Ruhephasen in der ersten Woche bewusst fördern, (e) Cortisol-Monitoring durch Speicheltest am Tag 3 und 7 nach Einzug von Hund 2.

7.5.2 Tierschutzrelevanz

Stressinduzierte Verhaltensstörungen (Trennungsangst, Hyperaktivität, repetitive Verhaltensweisen) gehören zu den häufigsten Gründen für die Abgabe von Hunden an Tierheime [12]. Da der versetzter Einzug die Cortisollast von Hund 2 um über 50 % reduziert, ist eine signifikante Reduktion stressbedingter Verhaltensstörungen zu erwarten. Eine prospektive Langzeitstudie über 2 Jahre würde diese Hypothese prüfen und den Beitrag zur Tierschutzdiskussion quantifizieren.

7.5.3 Sozialisierungsprogramme in Tierheimen

Viele Tierheime betreiben sogenannte Pflegefamilien-Programme, in denen Welpen temporär in privaten Haushalten sozialisiert werden. Das Versatzprinzip könnte auch hier angewandt werden: Ein "Pilot-Hund" (älterer, bereits sozialisierter Hund der Familie) bereitet dem Welpen die olfaktorische Umgebung vor und fungiert als soziales Modell, bevor der Welpe permanent aufgenommen wird.

7.6 Evolutionsbiologische Perspektive

7.6.1 Vergleich mit Wolfsrudeln

Siberian Huskys sind genetisch eng mit Wölfen verwandt [1]. Bei der Etablierung neuer Wolfsterritorien zeigen junge Wölfe ähnliche Muster: Ein Tier erkundet zunächst das neue Revier, markiert Hauptpfade und Ressourcenpunkte, bevor ein zweites Tier hinzukommt und von diesen Vorkenntnissen profitiert. Das hier modellierte Versatzprinzip könnte also eine evolutionär konservierte Strategien sozialer Rudeltiere widerspiegeln und sollte komparativ bei Wölfen, Kojoten und Füchsen untersucht werden.

7.6.2 Domestikationseffekte

Die Domestikation des Hundes über ca. 15.000 Jahre [1] hat die Bindungspräferenz von der Rudel- auf die Mensch-Bindung verlagert. Es wäre interessant zu untersuchen, ob das Versatzprinzip bei hochdomestizierten Rassen (z. B. Labrador, Golden Retriever) andere Parameter aufweist als bei ursprünglicheren Rassen (Siberian Husky, Basenji, Shiba Inu), da letztere stärker auf Intragruppen-Sozialität als auf Mensch-Bindung optimiert sind.

7.7 Formale mathematische Erweiterungen

7.7.1 Topologische Analyse der Informationspropagation

Die Übertragung von Rauminformation von Hund 1 zu Hund 2 durch olfaktorische Markierungen lässt sich als Informationspropagation auf einem Graphen modellieren, dessen Knoten die Haushaltszonen und Kanten die Durchgangswege sind. Mittels Werkzeugen der algebraischen Topologie (persistent homology, Betti-Zahlen) könnte die topologische Komplexität des olfaktorischen Informationsnetzes quantifiziert werden. Die Hypothese: Haushalte mit höherer topologischer Komplexität (Betti-Zahl $\beta_1 > 0$, d. h. Zyklen im Grundriss) erfordern ein längeres optimales Fenster Δt^* .

7.7.2 Spieltheoretische Ressourcenallokation

Aus spieltheoretischer Sicht kann das Zusammenleben zweier Hunde im selben Haushalt als wiederholtes Spiel modelliert werden, bei dem Ressourcen (Schlafplatz, Futter, Aufmerksamkeit der Besitzer) aufgeteilt werden. Nash-Gleichgewichte dieses Spiels und ihre Abhängigkeit vom Einzugszeitpunkt sind formal analysierbar. Es ist zu erwarten, dass der versetzter Einzug zu einem pareto-effizienteren Nash-Gleichgewicht führt als der simultane Einzug, da die Erwartungsbildung asymmetrisch (Hund 1 kennt die Ressourcen) und damit weniger konflikthaft ist.

7.8 Digitale und technologische Erweiterungen

7.8.1 Sensorbasiertes Echtzeit-Monitoring

Moderne GPS- und Accelerometer-Halsbänder ermöglichen eine präzise, kontinuierliche Aufzeichnung von Position, Aktivität und Interaktionsereignissen. Eine zukünftige Studie könnte diese Sensordaten in das Modell integrieren und $SII(\Delta t)$ in Echtzeit berechnen, sodass Hundehalter täglich eine aktualisierte Bewertung der sozialen Integration erhalten. Kombiniert mit Cortisol-Biosensoren (tragbare ELISA-Patches) könnte ein vollständig automatisiertes “Social Integration Dashboard” für Hundehalter entwickelt werden.

7.8.2 Digitale Zwillinge für Haustierdynamik

Das formale Modell dieser Arbeit (SII , CRI , HBI und das Markov-Raumnutzungsmodell) stellt die Grundlage für einen *digitalen Zwilling* des Tierhaushalts dar: ein Computersimulationsmodell, das – mit Rassenparametern, Haushaltsgrundriss und Personenzahl kalibriert – das Sozialverhalten und die Stressphysiologie beider Hunde für verschiedene Einzugszenarien voraussagt. Solche digitalen Zwillinge werden bereits in der Veterinärmedizin und Landwirtschaft (Precision Livestock Farming) eingesetzt und könnten künftig auch für Heimtiere kommerziell verfügbar sein.

7.8.3 App-basierte Einzugsbegleitung

Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie ist die Entwicklung einer mobilen Applikation denkbar, die Hundehalter beim Einzugsprozess unterstützt: (1) Eingabe von Rasse, Alter, Haushaltsgröße, Anzahl der Personen; (2) Berechnung des individuell optimalen Einzugsfensters; (3) Tägliche Verhaltenscheckliste für die ersten 8 Wochen; (4) Integration von Cortisol-Schnelltests (Foto-basierte ELISA-Auswertung via Smartphone-Kamera); (5) Wöchentlicher Bindungstest (standardisierter Videotest, 3 Minuten). Diese App würde den Transfer der Forschungsergebnisse in die breite Bevölkerung ermöglichen und gleichzeitig Daten für eine large-scale Folgestudie generieren.

7.9 Ethische und gesellschaftliche Dimensionen

7.9.1 Verantwortungsvolle Tierhaltung

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen, dass optimale Tierhaltung Wissen, Planung und zeitliche Flexibilität erfordert. Die wissenschaftliche Begründung des Versatzprinzips kann dazu beitragen, dass Hundehalter die Bedeutung der Einzugsplanung ernst nehmen, was letztlich die Tierwohlart verbessert und die Rate der Tierheimabgaben reduziert.

7.9.2 Integration in die Ausbildung von Hundetrainern

Das Versatzprinzip sollte in die Grundausbildung zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater aufgenommen werden. Eine Kooperation mit dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) oder dem International Association of Animal Behavior Consultants (IAABC) würde die Verbreitung dieser Erkenntnisse in die Praxis fördern.

7.9.3 Vergleich mit anderen Heimtiergruppen

Obwohl diese Studie auf Siberian Huskys fokussiert ist, sind die Prinzipien auf andere Rudelheimtiere (z. B. Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen in Gruppen) übertragbar. Eine vergleichende Studie über verschiedene Heimtierarten würde den Geltungsbereich des Versatzprinzips klären und artspezifische Optimalfenster identifizieren.

8 Schlussfolgerung

Die vorliegende Arbeit beweist formal und belegt empirisch, dass ein versetzter Einzug zweier weiblicher Geschwister-Huskys mit einem Zeitabstand von sieben bis vierzehn Tagen optimale Bedingungen für soziale Integration, neuroendokrine Stressreduktion und langfristige Bindungsstabilität schafft.

Formale Ergebnisse umfassen:

- **Theorem 3.1** (Existenz und Eindeutigkeit): Das optimale Einzugsfenster $\Delta t^* \in [7, 14]$ ist eindeutig und maximiert die Gesamtzielfunktion $\mathcal{F}$.
- **Theorem 3.2** (Cortisolreduktion): Das versetzter Einzug reduziert die integrierte Cortisolbelastung um $\geq 53,8\%$.
- **Theorem 3.3** (Synchronisierung): Die Raumnutzungsverteilungen konvergieren mindestens 1,4-fach schneller als bei simultanem Einzug.
- **Lemma 3.4** und **Proposition 3.5**: Die Bindungsakkumulation ist monoton und invariant gegenüber dem Einzugszeitpunkt (bei gleicher relativer Beobachtungszeit).

Acht quantitative Abbildungen veranschaulichen diese Ergebnisse aus mehreren Perspektiven. Der umfangreiche Ausblick in Abschnitt 7 zeigt, dass diese Arbeit erst den Beginn einer umfassenden Forschungsrichtung markiert, die von neurobiologischen Erweiterungen über maschinelles Lernen bis zu digitalen Zwillingen und gesellschaftlichen Implikationen reicht.

Die Botschaft für Hundehalter ist klar und praktisch: *Geben Sie Ihrem ersten Husky 7 bis 14 Tage, das Haus kennen zu lernen – und Ihr zweiter Husky wird dankbar sein.*

Literatur

- [1] Bridgett M. von Holdt u. a. “Genome-wide SNP and haplotype analyses reveal a rich history underlying dog domestication”. In: *Nature* 464.7290 (2010), S. 898–902. DOI: [10.1038/nature08837](https://doi.org/10.1038/nature08837).
- [2] Ádám Miklósi. *Dog: Behaviour, Evolution, and Cognition*. Oxford: Oxford University Press, 2007. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780199295852.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199295852.001.0001).

- [3] Bonne Beerda u. a. “Behavioural, saliva cortisol and heart rate responses to different types of stimuli in dogs”. In: *Applied Animal Behaviour Science* 58.3–4 (1998), S. 365–381. DOI: [10.1016/S0168-1591\(97\)00145-7](https://doi.org/10.1016/S0168-1591(97)00145-7).
- [4] Michael B. Hennessy u. a. “Plasma cortisol levels of dogs at a county animal shelter”. In: *Physiology & Behavior* 62.3 (1997), S. 485–490. DOI: [10.1016/S0031-9384\(97\)00155-0](https://doi.org/10.1016/S0031-9384(97)00155-0).
- [5] Sunil Kumar Pal. “Pup rearing: the role of littermates”. In: *Behavioural Processes* 69.1 (2005), S. 111–124. DOI: [10.1016/j.beproc.2005.01.009](https://doi.org/10.1016/j.beproc.2005.01.009).
- [6] Alexander Mathis u. a. “DeepLabCut: markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning”. In: *Nature Neuroscience* 21.9 (2018), S. 1281–1289. DOI: [10.1038/s41593-018-0209-y](https://doi.org/10.1038/s41593-018-0209-y).
- [7] József Topál u. a. “Attachment behavior in dogs (*Canis familiaris*): a new application of Ainsworth’s (1969) Strange Situation Test”. In: *Journal of Comparative Psychology* 112.3 (1998), S. 219–229. DOI: [10.1037/0735-7036.112.3.219](https://doi.org/10.1037/0735-7036.112.3.219).
- [8] Tristram D. Wyatt. *Pheromones and Animal Behaviour: Communication by Smell and Taste*. Cambridge University Press, 2003. DOI: [10.1017/CB09780511615061](https://doi.org/10.1017/CB09780511615061).
- [9] Miho Nagasawa u. a. “Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds”. In: *Science* 348.6232 (2015), S. 333–336. DOI: [10.1126/science.1261022](https://doi.org/10.1126/science.1261022).
- [10] Jaak Panksepp. *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. New York: Oxford University Press, 1998.
- [11] Gregory S. Berns, Andrew M. Brooks und Mark Spivak. “Functional MRI in awake unrestrained dogs”. In: *PLOS ONE* 7.5 (2012), e38027. DOI: [10.1371/journal.pone.0038027](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038027).
- [12] Ilana R. Reisner. “The pathophysiologic basis of behavior problems”. In: *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice* 21.2 (1991), S. 207–224. DOI: [10.1016/S0195-5616\(91\)50025-0](https://doi.org/10.1016/S0195-5616(91)50025-0).