

축산-(육계)

출하 일수 단축

“2~3일 단축, 평균 2일 단축 효과

질병 치료, 예방

“면역력 강화에 도움->잔 질병 없어짐”
 “천연항생효과로 육계자체의 품질 향상”
 “폐사율 감소(5%→1%)

각종 시너지 효과

“육성율 증가, 사료 요구율 감소, 생산지수 상승,
 Drip loss 감소 등의 다양한 시너지 효과 발생

단국대학교 육계실험 자료(자료첨부)

구분	시험구	대조구	비고
입추수수	20,000	34,000	
입추일자	2009-03-04	2009-03-03	
출하수수	19,800	32,240	
출하일자	2009-04-07	2009-04-08	
출하중량	30,010kg	48,150kg	
평균중량	1.516kg	1.493kg	
사육일령	34일	36일	출하시기 평균 2~3일 단축
육성율	99%	94.80%	
사료급여량	49,610kg	87,950kg	
사료요구율	1.65	1.82	사료급여량/출하중량
생산지수	268	216	$(\text{평균중량} \times \text{육성율}) / (\text{요구율} \times \text{일령}) \times 100$

축산-(육계사료실험결과)

CJ 사료 실험 결과

출처:CJ 인도네시아

보종군치 시험농장, 9월 4일 입식, 30일령 출하

바이오황사료:
항생제 처리구 비FCR 3P 우위, 폐사율 1.9%
개선(AGP 대체효과 있음)

BW (g) – Body Weight 개체 평균 체중
단위: g(그램) 예: BW 2,000g = 닭 한 마리 평균 체중 2kg
•보통 출하 시 목표 체중을 기준으로 생산성 평가

FCR = 소비 사료량 ÷ 체중 증가량
폐사수 ÷ 총 입식수 × 100%
PI = (생존율 × 평균체중) ÷ (사육일령 × FCR) × 100

육계·산란계 생산성) 평가할 때 사용하는 핵심 지표입니다.

30days	BW(g) 개체 평균 체중	FCR 1.5 (사료 요구율)	Mortality (폐사율)	PI (생산성 지수)
항생제	1,627	1.44	5.71	343
미생물사균체0.1%	1,592	1.48	4.76	335
미생물사균체0.2%	1,575	1.51	7.86	315
유황사료(BMP 0.05%)	1,638	1.41	3.81	360
허브추출물0.05%	1,613	1.43	4.29	348
생균제0.05%	1,625	1.43	8.33	335

축산-(육계사육실험현장11령)

슈퍼 닭은 경기지역에서 부화된 병아리에 자사 바이오항 영양제를 공급한 **실험군** 그룹과 공급하지 않은 **대조군**으로 나누어 실험사육 진행했음




실험군은 사육기간 중 일체의 항생제 및 약품을 투여하지 않고, 면역력이 강하고 건강한 **무 항생제 닭으로** 사육함

축산-(육계실험군& 대조군비교)



축산-(육계실험군& 대조군비교)



축산-(육계실험군& 대조군비교)

유황첨가 육계사료 먹인 개체군이 그렇지 않은 개체군에 비해 중 체량 증가
유황첨가 육계사료 먹은 개체군이 사료 요구율 감소

육계 사료 내 유황 첨가가 생산성에 미치는 영향



단국대학교 육계실험 자료

주 관 기 관

단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단

결 과

1. 생산성

육계 사료 내 유황 첨가가 생산성에 미치는 영향은 Table 1에 나타내었다. 14 일령 개체 평균 체중에 있어 S2 및 S3 처리구가 CON 처리구보다 유의적으로 높게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 증가하였다 ($P<0.0001$). 종료 시 (29 일령) 개체 평균 체중에 있어 S3 처리구가 CON 처리구보다 유의적으로 높게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 증가하였다 ($P<0.0001$). 1-14 일차 중체량에 있어 S2 및 S3 처리구가 CON 처리구보다 유의적으로 높게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 증가하였다 ($P<0.0001$). 사료요구율에 있어 S3 처리구가 CON 처리구보다 유의적으로 낮게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 감소하였다 ($P=0.0250$). 14-29 일차 중체량에 있어 S3 처리구가 CON 처리구보다 유의적으로 높게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 증가하였다 ($P=0.0235$). 전체 시험기간 중체량에 있어 S3 처리구가 CON 처리구보다 유의적으로 높게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 증가하였다 ($P<0.0001$). 사료요구율에 있어 S2 및 S3 처리구가 CON 처리구보다 유의적으로 낮게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 감소하였다 ($P=0.0138$).

2. 육질특성

육계 사료 내 유황 첨가가 육질특성에 미치는 영향은 Table 2에 나타내었다. 감소율 적색도에 있어 S3 처리구가 CON 처리구보다 유의적으로 높게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 증가하였다 ($P=0.0010$). 저장감탕 3 일차에 있어 처리구간 유의적인 차이는 나타나지 않았지만 ($P>0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 감소하였다 ($P=0.0438$). 5 일차에 있어 처리구간 유의적인 차이는 나타나지 않았지만 ($P>0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 감소하였다 ($P=0.0476$). 7 일차에 있어 S3 처리구가 CON 및 S1 처리구보다 유의적으로 낮게 나타났고 ($P<0.05$), 유황 첨가 수준이 증가할수록 Linear 하게 감소하였다 ($P=0.0018$). pH, 보수력 및 장기무게에서는 유의적인 차이가 나타나지 않았다 ($P>0.05$).