
ÁLGEBRA CONMUTATIVA

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Ana Bravo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Anillos I	1
1.1	Nociones básicas	1
1.2	Subanillos	4
1.2.1	Subanillos generados	4
1.2.2	Subcuerpos	5
1.3	Ideales	5
1.3.1	Operaciones con ideales	8
1.4	Morfismos de anillos	12
1.5	Anillos cociente	14
1.5.1	Correspondencia de ideales	15
1.6	Teoremas de isomorfía	16
2	Anillos II	19
2.1	Módulos sobre anillos	19
2.2	Localización de anillos	21
2.2.1	Relación entre R y $S^{-1}R$	23
2.2.2	Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$	24
2.2.3	Localizar y pasar al cociente conmutan	26
H	Hojas de ejercicios	31
H.0	Repaso de estructuras algebraicas	31
H.1	Hoja 1: Anillos, ideales	35
H.1.1	Operaciones con ideales	35
H.1.2	Anillos locales	37
H.2	Homomorfismos, cocientes y Teoremas de Isomorfía	39
H.3	Módulos, localización	46

1. Anillos I

1.1 Nociones básicas

Definición 1.1.1 (Anillo). Sean $*, \circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Nota: En este curso vamos a trabajar exclusivamente con anillos conmutativos con unidad (ACU), salvo que se indique lo contrario. Los denotaremos normalmente por $(R, +, \cdot)$.

- Llamaremos 0 al neutro de $(R, +)$ y $-a$ al *opuesto* (inverso aditivo) de $a \in R$.
- Llamaremos 1 a la *unidad* de $(R, \cdot)$ (el neutro multiplicativo).
- Si $a \in R$ tiene inverso multiplicativo, lo denotaremos por a^{-1} y diremos que a es invertible, inversible o *una unidad*.

Ejemplos 1.1.1 (de anillos).

- [1] **Conmutativos con unidad:** $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.
- [2] **Conmutativos sin unidad:** $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}, \dots$.
- [3] **No conmutativos con unidad:** el anillo de matrices cuadradas de orden n con entradas en $\mathbb{R}$, $M_n(\mathbb{R})$, para $n \geq 2$.
- [4] **No conmutativos sin unidad:** el conjunto de matrices 2×2 con entradas en $\mathbb{R}$ pero cuya primera fila es nula.

Ejercicio 1.1.2. Encuentra dos anillos $R \subseteq S$ con unidad tales que la unidad de R no sea la unidad de S .

Solución: Sea R un anillo con unidad, consideramos $S = R \times R$ con las operaciones definidas por $\forall (a, b), (c, d) \in R \times R : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \wedge (a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d)$.

Entonces, S es un anillo con unidad $(1, 1)$. Además, $R \cong R \times \{0\} \subset R \times R$ es un anillo cuya unidad es $(1, 0) \neq (1, 1)$.

Definición 1.1.2 (Divisor de 0). Sea R un anillo y $a \in R \setminus \{0\}$,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

Definición 1.1.3 (Nilpotencia). Sea R un anillo y $a \in R$,

$$a \text{ es nilpotente} \iff \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0.$$

El conjunto de los elementos nilpotentes de R se denota por $\text{Nil}(R)$.

Definición 1.1.4 (DI). Sea R un ACU, es un dominio de integridad

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff (\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0).$$

Ejemplos 1.1.3 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Proposición 1.1.1 (Anillo de polinomios). Sea A un anillo (conmutativo con unidad)

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

- *Suma:* $(a_n x^n + \dots + a_0) + (b_m x^m + \dots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \dots + (a_0 + b_0)$.
- *Producto:* $(a_n x^n + \dots + a_0) \cdot (b_m x^m + \dots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$.

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A .

Observación 1.1.5. Sea R un anillo y $a \in R$ invertible, entonces $a \in R[x]$ es invertible. Si además R es un dominio de integridad, entonces las únicas unidades de $R[x]$ son las de R .

Definición 1.1.6 (Grado). Sea $p(x) = \sum_i a_i x^i \in A[x]$ un polinomio,

$$p(x) \text{ tiene grado } n \text{ (deg}(p(x)) = n) \iff n = \begin{cases} \max\{i : a_i \neq 0\} & \text{si } p(x) \neq 0 \\ -\infty & \text{si } p(x) = 0. \end{cases}$$

Proposición 1.1.2. Sea A un dominio de integridad, entonces $\forall p(x), q(x) \in A[x]$:

$$(1) \deg(p(x) + q(x)) \leq \max\{\deg(p(x)), \deg(q(x))\}.$$

$$(2) \deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)).$$

Proposición 1.1.3. Sea A un dominio de integridad $\implies A[x]$ es un dominio de integridad.

Demostración: Sean $p(x), q(x) \in A[x]$ tales que $p(x)q(x) = 0$. Por contradicción, supongamos que $p(x), q(x) \neq 0$. Entonces, $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$. Pero, por la Proposición 1.1.2 (2), tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geq 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geq 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \quad \blacksquare$$

Observación 1.1.7. El recíproco de la Proposición 1.1.3 también es cierto, puesto que para todos los $a, b \in R$ se tiene que $a, b \in R[x]$.

Ejemplos 1.1.4 (de no dominios de integridad). $\mathbb{Z}_n$ con n compuesto, $R[x]$ si R no es un DI (por ejemplo, $\mathbb{Z}_4[x]$), etc.

Ejercicio 1.1.5. Caracteriza los $\mathbb{Z}_n$ con elementos nilpotentes no triviales (distintos de 0).

Solución: $\mathbb{Z}_n$ tiene elementos nilpotentes no triviales si y solo si n no es libre de cuadrados, es decir, si existe un primo p tal que $p^2 \mid n$.

Proposición 1.1.4. Sea R un anillo, entonces $\{\text{divisores de } 0\} \cap \{\text{unidades}\} = \emptyset$.

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists a \in R$: a es invertible y divisor de 0. Entonces, $\exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0$ y $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$. Por lo tanto, tenemos que

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \quad \blacksquare$$

Definición 1.1.8 (Anillo reducido). Sea R un ACU, R es reducido

$$\iff R \text{ no tiene elementos nilpotentes no triviales.}$$

Definición 1.1.9 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1.1.6 (de cuerpos). $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Observación 1.1.10. Sean $\{R_i\}_{i \in I}$ una colección de anillos conmutativos con unidad. Entonces, el producto cartesiano $\prod_{i \in I} R_i$ es un anillo con las operaciones definidas componente a componente. Además, podemos definir la suma directa

$$\bigoplus_{i \in I} R_i = \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i : r_i = 0 \text{ para casi todo } i \right\},$$

que también es un anillo (subanillo del producto).

Si $|I| < \infty$, ambos coinciden y son anillos conmutativos con unidad. Ahora bien, si $|I| = \infty$, $\bigoplus_{i \in I} R_i$ no tiene unidad mientras que $\prod_{i \in I} R_i$ sí la tiene $(1, 1, 1, \dots)$.

1.2 Subanillos

Definición 1.2.1 (Subanillo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $S \subseteq R$ es un subanillo de R

$$\iff (S, +, \cdot) \text{ es un anillo con las mismas operaciones de } R.$$

Si R tiene unidad 1_R , $S \subset R$ es un subanillo con unidad $\iff S$ es un subanillo $\wedge 1_R \in S$.

En esta asignatura, salvo que se indique lo contrario, diremos subanillo para referirnos a subanillos con unidad ya que siempre trataremos con ACUs.

Ejemplos 1.2.1 (de subanillos).

[1] $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ es una cadena de subanillos con unidad.

[2] Si R es un anillo, $R \subset R[x_1] \subset R[x_1, x_2] \subset \dots$ es una cadena de subanillos.

1.2.1 Subanillos generados

Definición 1.2.2 (Subanillo generado). Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, $S[A]$ es el subanillo de R generado por A y S

$$\iff S[A] \text{ es el subanillo más pequeño que contiene a } S \cup A.$$

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

Lema 1.2.1. Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, entonces

$$S[A] = \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} s_\lambda \prod_{a_i \in B} a_i^{\lambda_i} : \Lambda \subset \mathbb{N}^n \wedge B \subset A : |B| = n \wedge s_\lambda \in S \right\}.$$

Ejemplos 1.2.2 (de subanillos generados).

[1] $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por $\sqrt[3]{2}$ y $\mathbb{Z}$.

[2] $\mathbb{Z}[\pi] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i \pi^i : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{Z} \right\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por π y $\mathbb{Z}$.

1.2.2 Subcuerpos

Definición 1.2.3 (Subcuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $L \subset K$ es un subcuerpo de K

$$\iff (L, +, \cdot) \text{ es un cuerpo con las mismas operaciones de } K.$$

Definición 1.2.4 (Subcuerpo generado). Sean $L \subset K$ cuerpos y $A \subset K$, $L(A)$ es el subcuerpo de K generado por A y L

$$\iff L(A) \text{ es el subcuerpo de } K \text{ más pequeño que contiene a } L \cup A.$$

Observación 1.2.5. Sean $L \subset K$ cuerpos y $a_1, \dots, a_n \in K$, entonces

$$L \subset L[a_1, \dots, a_n] \subset L(a_1, \dots, a_n) \subset K.$$

1.3 Ideales

Definición 1.3.1 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un ACU, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

(i) Estable para $+$: $(I, +)$ es un grupo abeliano.

(ii) Absorbente para $\cdot$: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Lema 1.3.1. Sea R un anillo, $I \subset R$ es un ideal $\iff$

(i) $I \neq \emptyset$.

(ii) $\forall a, b \in I : a + b \in I$.

(iii) $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejemplos 1.3.1 (de ideales).

- 1 Si R es un anillo, $\{0\}$ y R son ideales de R , llamados ideales triviales.
- 2 $n\mathbb{Z}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Lema 1.3.2. Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , entonces

$$1 \in I \vee \exists a \in I \text{ invertible} \implies I = R.$$

Demostración: Veamos ambos casos por separado.

- I. Si $1 \in I$, por la propiedad de absorción, $\forall r \in R : r = r \cdot 1 \in I$, luego $I = R$.
- II. Si $a \in I$ es invertible, entonces $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$. Entonces, por la propiedad de absorción, tenemos que $1 \in I$ y, por el caso I, esto implica que $I = R$. ■

Lema 1.3.3. Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R .

Demostración: Veamos cada implicación por separado.

$\Rightarrow$ Sea R un cuerpo y $I \subset R$ un ideal no nulo. Como $I \neq \{0\}$, existe $a \in I$ con $a \neq 0$. Dado que R es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = 1$. Luego por el Lema 1.3.2, $I = R$.

$\Leftarrow$ Sea R un anillo cuyos únicos ideales son $\{0\}$ y R . Sea $a \in R$ con $a \neq 0$. Consideremos el ideal generado por a , $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$ (Lema 1.3.4). Como $a \neq 0$, $\langle a \rangle \neq \{0\}$, luego $\langle a \rangle = R$.

En particular, $1 \in \langle a \rangle$, luego existe $a^{-1} \in R$ tal que $a^{-1}a = 1$. Como a era arbitrario, concluimos que todo elemento no nulo de R tiene inverso. ■

Observación 1.3.2. Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una colección de ideales de un anillo R

$$\implies \bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

Definición 1.3.3 (Ideal generado). Sea R un anillo y $A \subset R$,

$\langle A \rangle$ es el ideal de R generado por $A \iff$ es el más pequeño que contiene a A .

Lema 1.3.4. Sea R un anillo y $A \subset R$

$$\implies \langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

Definición 1.3.4 (Ideal principal). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal de R ,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a \rangle.$$

Ejercicio 1.3.2. Prueba que los siguientes ideales **no** son principales:

- (a) En $\mathbb{R}[x, y]$, el ideal $\langle x, y \rangle$. (b) En $\mathbb{Z}[x]$, el ideal $\langle 2, x \rangle$.

Solución:

- (a) Consideramos el conjunto $I := \{p(x, y) \in K[x, y] : p(0, 0) = 0\}$. Este es un ideal de $K[x, y]$ distinto del total. Supongamos por contradicción que I es principal, es decir, $\exists p(x, y) \in K[x, y] : I = \langle p(x, y) \rangle$. Como $I \neq K[x, y]$, $p(x, y)$ no es una unidad (por el Lema 1.3.2).

Por otro lado, $K[x, y]$ es un dominio de factorización única, luego $p(x, y)$ se puede escribir como producto de irreducibles.

Definición 1.3.5 (DIP). Sea R un DI, R es un dominio de ideales principales

$$\iff \forall I \subset R \text{ ideal de } R : I \text{ es un ideal principal.}$$

Ejemplo 1.3.3 (de DI que no es DIP). En $\mathbb{Z}[x]$ el ideal $\langle 2, x \rangle$ no es principal.

Teorema 1.3.5. Sea K un cuerpo, entonces $K[x]$ es un dominio de ideales principales.

Demostración: Consideramos $S := \{n \in \mathbb{N} : \exists q(x) \in I : \deg(q(x)) = n\} \subset \mathbb{N}$. Sabemos que $S \neq \emptyset$ porque $I \neq \{0\}$, luego $\exists q(x) \in I \setminus \{0\}$. Sea $d \in \mathbb{N}$ el elemento mínimo de S y $p(x) \in I$ un polinomio tal que $\deg(p(x)) = d$. Veamos que $I = p(x) \cdot K[x]$.

$\supset$ Es claro que $p(x) \cdot K[x] \subset I$ porque $p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de absorción).

$\subset$ Sea $q(x) \in I$, por el algoritmo de la división, existen $s(x), r(x) \in K[x]$ tales que

$$q(x) = s(x)p(x) + r(x) \quad \wedge \quad \deg(r(x)) < \deg(p(x)) = d.$$

* Si $r(x) = 0$, entonces $q(x) \in p(x) \cdot K[x]$.

* Si $r(x) \neq 0$, tenemos que $r(x) = q(x) - s(x)p(x) \in I$ porque $q(x), p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de estabilidad). Entonces, $\deg(r(x)) \in S$ y $\deg(r(x)) < d$, lo cual es una contradicción con la minimalidad de d . ■

1.3.1 Operaciones con ideales

Observación 1.3.6. Sean I, J ideales de un anillo R . En general, la unión $I \cup J$ no es un ideal. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, los ideales $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ y $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$: su unión no es un ideal.

Definición 1.3.7 (Suma de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$I + J$ es el ideal suma de I y $J \iff I + J$ es el ideal más pequeño que contiene a $I \cup J$.

Lema 1.3.6. Sean I, J ideales de un anillo $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

Demostración: Denotaremos $S := \{a + b : a \in I, b \in J\}$. Veamos ambas inclusiones.

$\square$ Basta ver que S es un ideal que contiene a $I \cup J$.

- (i) Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(i), $0 \in I, J$, luego $0 = 0 + 0 \in S$.
- (ii) Sean $x, y \in S$. Entonces existen $a_1, a_2 \in I$ y $b_1, b_2 \in J$ tales que $x = a_1 + b_1$ y $y = a_2 + b_2$. Luego $x + y = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)$. Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(ii), $a_1 + a_2 \in I$ y $b_1 + b_2 \in J$, por tanto $x + y \in S$.
- (iii) Sea $x \in S$ y $r \in R$. Entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $x = a + b$. Luego $rx = r(a + b) = ra + rb$. Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(iii), $ra \in I$ y $rb \in J$, por tanto $rx \in S$.

Como S satisface las tres propiedades del Lema 1.3.1, es un ideal de R . Además, contiene a $I \cup J$ porque, para $a \in I$, $a = a + 0 \in S$ (pues $0 \in J$) y para $b \in J$, $b = 0 + b \in S$ (pues $0 \in I$). Por tanto, $I + J \subset S$.

$\supseteq$ Sea $a + b \in S$ con $a \in I$ y $b \in J$. Como $I, J \subset I + J$ y $I + J$ es un ideal, tenemos que $a, b \in I + J$ y $a + b \in I + J$. Por tanto, $S \subset I + J$. ■

Definición 1.3.8 (Producto de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$I \cdot J$ es el ideal producto de I con $J \iff I \cdot J = \langle a \cdot b : a \in I \wedge b \in J \rangle$.

Lema 1.3.7. Sea R un anillo y $A, B \subset R \implies \langle A \rangle \cdot \langle B \rangle = \langle a \cdot b : a \in A \wedge b \in B \rangle$.

Ejemplo 1.3.4 (No todo elemento de $I \cdot J$ es un producto ab con $a \in I, b \in J$).

En $\mathbb{R}[x, y]$, si $I = \langle x, y \rangle$, entonces $x^2 + y^2 \in I \cdot I = I^2$ pero no es un producto de elementos

de I . Esto se puede ver porque $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ y $\mathbb{R}[x, y] \subset \mathbb{C}[x, y]$ que son dominios de factorización única y $x + iy, x - iy \notin I$.

Observación 1.3.9. Sean I, J ideales de un anillo R , entonces $I \cdot J \subset I \cap J$. La inclusión puede ser estricta. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, si $I = 2\mathbb{Z}$ y $J = 4\mathbb{Z}$, entonces $I \cdot J = 8\mathbb{Z} \subsetneq 4\mathbb{Z} = I \cap J$.

Lema 1.3.8 (Ideal nilradical). Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R)$ es un ideal de R .

Este ideal se llama ideal nilradical de R .

Demostración: Sabemos que $\text{Nil}(R) \neq \emptyset$ ya que $0 \in \text{Nil}(R)$. ■

Definición 1.3.10 (Radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$\sqrt{I} = \text{Rad}(I) \text{ es el radical de } I \iff \sqrt{I} = \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} : r^n \in I\}.$$

Ejercicio 1.3.5. Demuestra que si I es un ideal de un anillo R , entonces $\sqrt{I}$ es un ideal de R y que $\text{Nil}(R) = \sqrt{\langle 0 \rangle}$.

Ejemplos 1.3.6 (de ideales radicales).

- [1] El radical de $\langle 9 \rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 9 \rangle} = \langle 3 \rangle$.
- [2] El radical de $\langle 12 \rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 12 \rangle} = \langle 6 \rangle$.
- [3] Sea K un cuerpo, consideramos el ideal $I = \langle x^2, xy \rangle$ en $K[x, y]$. Entonces, $\sqrt{I} = \langle x \rangle$.

$\supset$ Es claro que $\langle x \rangle \subset \sqrt{I}$ porque $x^2 \in I$.

$\subset$ Sea $p(x, y) \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $p(x, y)^n \in I = \langle x^2, xy \rangle$.

$$\implies \exists a(x, y), b(x, y) \in K[x, y] : p(x, y)^n = a(x, y)x^2 + b(x, y)xy.$$

Entonces $x \mid p(x, y)^n \implies x \mid p(x, y)$ porque x es irreducible y $K[x, y]$ es un dominio de factorización única. Por tanto, $p(x, y) \in \langle x \rangle$.

Definición 1.3.11 (Ideal primo). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , I es un ideal primo

$$\iff I \neq R \wedge (\exists a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I).$$

Ejemplos 1.3.7 (de ideales primos).

- [1] En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales primos son $\langle p \rangle$ con p primo y $\langle 0 \rangle$.

Observación 1.3.12. $\langle 0 \rangle$ es primo en $R \iff R$ es un dominio de integridad.

[2] En $\mathbb{R}[x, y]$, consideramos el conjunto $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$.

(a) S es un ideal de $\mathbb{R}[x, y]$.

i. $S \neq \emptyset$ porque $0 \in S$.

ii. Suma: ejercicio.

iii. Absorción: ejercicio.

(b) S es un ideal primo de $\mathbb{R}[x, y]$. Para empezar, $S \neq \mathbb{R}[x, y]$ porque $1 \notin S$.

Ahora, sean $p(x, y), q(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ tales que $p(x, y)q(x, y) \in S$. Entonces, $p(1, 2)q(1, 2) = 0$ por definición de S . Como $\mathbb{R}$ es un dominio de integridad, $p(1, 2) = 0$ o $q(1, 2) = 0$, es decir, $p(x, y) \in S$ o $q(x, y) \in S$.

[3] En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$, entonces

$I = \{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}$ es un ideal primo de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Definición 1.3.13 (Ideal maximal). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , I es maximal

$$\iff I \neq R \wedge (J \text{ ideal de } R : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R).$$

Ejemplos 1.3.8 (de ideales maximales).

[1] En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales maximales son $\langle p \rangle$ con p primo.

[2] En $K[x]$ con K un cuerpo, los ideales maximales son los de la forma $\langle p(x) \rangle$ con $p(x)$ irreducible.

[3] En $K[x, y]$ con K un cuerpo, $\langle x \rangle$ no es maximal porque $\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y \rangle \subsetneq K[x, y]$.

[4] En $\mathbb{R}[x, y]$, consideramos el ideal primo $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$ de los Ejemplos 1.3.7. Veamos que S también es maximal. Observamos que

$$x^n y^m = ((x - 1) + 1)^n \cdot ((y - 2) + 2)^m \in \langle x - 1, y - 2 \rangle + \mathbb{R}.$$

Sea $J \subset \mathbb{R}[x, y]$ un ideal tal que $S \subsetneq J \subsetneq \mathbb{R}[x, y]$. Sea $p(x, y) \in J \setminus S$, entonces $p(1, 2) \neq 0$. Entonces, sabemos que existen $a(x, y), b(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ tales que

$$p(x, y) = p(1, 2) + a(x, y)(x - 1) + b(x, y)(y - 2).$$

Como $p(1, 2) \neq 0$, $p(1, 2)$ es invertible en $\mathbb{R}[x, y]$ y, por tanto, $1 \in J$. Luego, $J = \mathbb{R}[x, y]$ lo que es una contradicción. Por tanto, S es maximal.

Además, hemos probado que $S = \langle x - 1, y - 2 \rangle$.

[5] En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$, entonces

$$\{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\} = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$$

es un ideal maximal de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Definición 1.3.14 (Ideal radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$I \text{ es un ideal radical} \iff I = \sqrt{I}.$$

Ejercicio 1.3.9. Sea K un cuerpo, caracteriza los ideales radicales de $K[x]$.

Teorema 1.3.9. Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un ACU R

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subseteq J.$$

Demostración: Consideramos el conjunto $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge I \neq R\}$.

- $\Sigma \neq \emptyset$ porque $I \in \Sigma$.
- $(\Sigma, \subset)$ está parcialmente ordenado.
- Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección de ideales en Σ totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en Σ , que es $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$.

Como $J \neq \langle 1 \rangle$ (si $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$, contradicción), por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal M . ■

Ejercicio 1.3.10. ¿Qué pasaría en el Teorema 1.3.9 si R no tuviese unidad?

Solución: El teorema dejaría de ser cierto. Por ejemplo, el anillo

$$R = \left\{ x \frac{f(x)}{g(x)} : f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x], g(0) \neq 0 \right\},$$

que no tiene unidad, no tiene ideales maximales.

Para la prueba de este hecho, consultar <https://math.stackexchange.com/questions/4652213/commutative-ring-without-unit-and-maximal-ideals>.

Corolario 1.3.10. *Todo ACU tiene un ideal maximal.*

Corolario 1.3.11. *Sea R un ACU, entonces R es un cuerpo $\iff \langle 0 \rangle$ es un ideal maximal.*

Más adelante veremos que todo ideal maximal es un ideal primo, por lo tanto, podemos concluir que todo ACU tiene algún ideal primo.

Ejercicio 1.3.11. Ya sabemos que $\sqrt{\langle x^2, y \rangle} = \langle x \rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$. Demuestra que $\langle x \rangle$ es el ideal primo más pequeño que contiene a $\langle x^2, y \rangle$.

Proposición 1.3.12. *Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R) = \bigcap_{P \subset R \text{ primo}} P$.*

Demostración: Veamos cada inclusión por separado.

$\subseteq$ Es inmediata: $f \in \text{Nil}(R) \implies \exists n \in \mathbb{N} : f^n = 0 \implies \forall P \subset R \text{ primo} : f \in P$.

$\supseteq$ Probamos el contrarrecíproco. Sea $f \in R \notin \text{Nil}(R)$. Consideramos el conjunto

$$\Sigma = \{I \subset R \text{ ideal} : \forall n \in \mathbb{N} : f^n \notin I\}.$$

Entonces, $\langle 0 \rangle \in \Sigma \implies \Sigma \neq \emptyset$ y Σ está parcialmente ordenado por inclusión. Aplicando el lema de Zorn, sabemos que Σ tiene un elemento maximal M .

Sea P un elemento maximal de Σ , veamos que P es un ideal primo. Sean $a, b \in R \setminus P$, veamos que $ab \notin P$. Tenemos que

$$\left. \begin{array}{l} p \subsetneq P + \langle a \rangle \subset R \text{ ideal} \\ p \subsetneq P + \langle b \rangle \subset R \text{ ideal} \end{array} \right\} \implies \exists n, m \in \mathbb{N} : f^n \in P + \langle a \rangle \wedge f^m \in P + \langle b \rangle.$$

$$\implies \exists \alpha, \beta \in P, \lambda, \mu \in R : f^n = \alpha + \lambda a \wedge f^m = \beta + \mu b.$$

$$\implies f^n f^m = f^{n+m} = (\alpha + \lambda a)(\beta + \mu b) = \underbrace{\alpha\beta + \alpha\mu b + \lambda a\beta}_{\in P} + \underbrace{\lambda\mu ab}_{\in \langle ab \rangle}.$$

Por tanto, tenemos que $f^{n+m} \in P + \langle ab \rangle \notin \Sigma$, luego $ab \notin P$. ■

1.4 Morfismos de anillos

Definición 1.4.1 (Morfismo de anillos). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, una aplicación $\phi : A \longrightarrow B$ es un morfismo de anillos $\iff$

(i) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$

- (ii) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$
- (iii) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$

Ejemplos 1.4.1 (de morfismos de anillos).

- [1] Cualquier morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de $\mathbb{Z}$, luego $\varphi = \text{id}$ es el único morfismo de anillos de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$.
- [2] Sea R un anillo, un morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de R . Por tanto, existe un único morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$.
- [3] Sea $S \subset R$ un subanillo, la inclusión $\iota: S \hookrightarrow R$ es un morfismo de anillos.
- [4] Sea $R \subset T$ un subanillo y $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in R$, el morfismo de evaluación

$$\begin{aligned} \text{ev}_{\alpha_1, \dots, \alpha_n}: R[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow R \\ p(x_1, \dots, x_n) &\longmapsto p(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

es un morfismo de anillos que viene determinado por las imágenes de $x_1, \dots, x_n$.

- [5] Sea R un anillo con característica p primo ($p \equiv 0$), entonces tenemos el homomorfismo de Frobenius

$$\begin{aligned} F: R &\longrightarrow R \\ r &\longmapsto r^p \end{aligned}$$

Observación 1.4.2. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces

- 1. $f(0_R) = 0_S$.
- 2. $f(-a) = -f(a)$ para todo $a \in R$.
- 3. Si $a \in R$ es invertible, entonces $f(a)$ es invertible y $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$.

$$\ker f = \{a \in R : f(a) = 0_S\} \text{ es un ideal de } R.$$

- 4. f es inyectivo $\iff \ker f = \{0_R\}$.

Ejercicio 1.4.2. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos biyectivo, demuestra que $f^{-1}: S \rightarrow R$ es un morfismo de anillos.

Solución: Sean $a, b \in S$, como f es sobreyectiva, $\exists x, y \in R : f(x) = a \wedge f(y) = b$. Comprobemos las tres propiedades de la Definición 1.4.1.

$$(i) \quad f^{-1}(a + b) = f^{-1}(f(x) + f(y)) = f^{-1}(f(x + y)) = x + y = f^{-1}(a) + f^{-1}(b).$$

$$(ii) \quad f^{-1}(a \cdot b) = f^{-1}(f(x) \cdot f(y)) = f^{-1}(f(x \cdot y)) = x \cdot y = f^{-1}(a) \cdot f^{-1}(b).$$

(iii) Como f es un morfismo de anillos, $f(1_R) = 1_S$. Luego, $f^{-1}(1_S) = f^{-1}(f(1_R)) = 1_R$.

Por tanto, f^{-1} es un morfismo de anillos. ■

Definición 1.4.3 (Isomorfismo). Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos,

$$f \text{ es un isomorfismo} \iff f \text{ es biyectivo.}$$

1.5 Anillos cociente

Proposición 1.5.1 (Anillo cociente). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente $R/I := R/\sim$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \quad \bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b} \quad \wedge \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces R/I es ACU.

Demostración: Veamos que las operaciones están bien definidas. Sean $a, a', b, b' \in R$ tales que $\bar{a} = \bar{a}'$ y $\bar{b} = \bar{b}'$. Entonces, $a - a' \in I$ y $b - b' \in I$.

- $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ y como $a - a', b - b' \in I$ y I es cerrado por la suma, $(a + b) - (a' + b') \in I$, luego $\overline{a + b} = \overline{a' + b'}$ y la suma está bien definida.
- $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b')$. Como $a - a', b - b' \in I$ y I absorbe productos, $(a - a')b, a'(b - b') \in I$. Como I es cerrado por sumas, $(a - a')b + a'(b - b') \in I$, luego $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ y el producto está bien definido.

Las propiedades de anillo se heredan directamente de R porque las operaciones están definidas de forma natural. Si R es ACU y $I \neq R$, entonces $\bar{1} \neq \bar{0}$, $\bar{1}$ es la unidad de R/I y la conmutatividad del producto se hereda directamente de R . ■

Observación 1.5.1 (Morfismo canónico). Sea R un anillo y $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$\pi: R \longrightarrow R/I, \quad a \longmapsto [a]$$

es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker \pi = I$.

Ejercicio 1.5.1. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, demuestra que

- (a) Si $J \subset S$ es un ideal, entonces $f^{-1}(J) \subset R$ es un ideal.
- (b) Si f es sobreyectivo e $I \subset R$ es un ideal, entonces $f(I) \subset S$ es un ideal.

En general, si $I \subset R$ es un ideal, denotamos por $f(I)^e$ o mediante $f(I) \cdot S$ al ideal de S generado por $f(I)$.

Ejemplos 1.5.2 (de anillos cociente).

- [1] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle xy - 1 \rangle}$, x tiene un elemento inverso que es y , porque $[x][y] = [xy] = [1]$.
- [2] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^3 \rangle}$, el elemento $[x]$ es nilpotente porque $[x]^3 = [x^3] = [0]$.
- [3] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^2 - y \rangle}$, se tiene que $[x]^2 = [y]$.
- [4] En $\frac{\mathbb{R}}{\langle x^2 + 1 \rangle}$, $[x]$ es una raíz cuadrada de -1 . De hecho, $\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2 + 1 \rangle} \cong \mathbb{C}$.

1.5.1 Correspondencia de ideales

Ejercicio 1.5.3. Consideramos el morfismo canónico $\pi: R \rightarrow R/I$, demuestra que entonces

- (a) Si $H \subseteq R/I$ es un ideal, entonces $\pi^{-1}(H) \subset R$ es un ideal que contiene a I .
- (b) Si $J \subset R$ es un ideal, entonces $\pi(J) \subseteq R/I$ es un ideal y además $\pi(J) = \pi(J + I)$.

Observación 1.5.2. Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I , entonces $\pi(J) \cong J/I$. Si $J \not\subset I$, entonces $\pi(J) \cong J+I/I$.

- (c) Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I , entonces $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$.
- (d) Si $I \subset J_1 \subsetneq J_2 \subset R$ son ideales, entonces $\pi(J_1) \subsetneq \pi(J_2)$.

Teorema 1.5.2 (Correspondencia de ideales). Hay una Correspondencia biyectiva entre los ideales de R/I y los ideales de R que contienen a I .

Además, esta correspondencia preserva contenidos y contenidos estrictos.

Ejemplo 1.5.4 (de correspondencia de ideales). Consideramos el ideal $\langle 6 \rangle$ de $\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}\pi: \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\ \langle 6 \rangle &\longmapsto \langle \bar{0} \rangle \\ \langle 2 \rangle &\longmapsto \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4]\} \\ \langle 3 \rangle &\longmapsto \langle [3] \rangle = \{[0], [3]\} \\ \langle 1 \rangle = \mathbb{Z} &\longmapsto \langle [1] \rangle = \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\ \langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle = \langle 2 \rangle &\longmapsto \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4]\}\end{aligned}$$

Proposición 1.5.3. Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un ACU R , entonces

- (1) I es primo $\iff R/I$ es un dominio de integridad.
- (2) I es maximal $\iff R/I$ es un cuerpo.
- (3) I es radical $\iff R/I$ es un anillo reducido.

Corolario 1.5.4. Sea $I \subset R$ un ideal maximal de un ACU $R \implies I$ es un ideal primo.

Ejemplos 1.5.5 (de aplicación de estos resultados).

- [1] En $\mathbb{Z}$, el ideal $\langle 2 \rangle$ es primo porque $\mathbb{Z}[x]/\langle 2 \rangle \cong \mathbb{F}_2[x]$ es un dominio de integridad, pero no es maximal.
- [2] En $K[x_1, \dots, x_n]$ con K un cuerpo, el ideal $\langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$ con $a_i \in K$ es maximal porque $K[x_1, \dots, x_n]/\langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle \cong K$ es un cuerpo.

1.6 Teoremas de isomorfía

Sean R, S anillos y $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos. Sea $I \subset R$ un ideal.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ R/I & & \end{array}$$

Queremos definir $\bar{f}$ de manera que $\forall a \in R: \bar{f}(\bar{a}) = f(a)$. Para que esto esté bien definido, necesitamos que si $\bar{a} = \bar{b}$, entonces $\bar{f}(\bar{a}) = \bar{f}(\bar{b})$, es decir, $f(a) = f(b)$. Pero $\bar{a} = \bar{b} \iff a - b \in I$, luego necesitamos que $f(a - b) = 0_S$, es decir, $a - b \in \ker f$. Por tanto, para que $\bar{f}$ esté bien definido, necesitamos que $I \subset \ker f$.

Teorema 1.6.1. Sean R, S ACU, $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos e $I \subset R$ un ideal tal que $I \subset \ker f$

$$\implies \exists! \bar{f}: R/I \rightarrow S \text{ morfismo de anillos tal que } f = \bar{f} \circ \pi.$$

Observación 1.6.1. Sean R, S ACU, $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos y $I \subset \ker f$, entonces el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ R/I & & \end{array}$$

y se dice que f **factoriza** a través de π . Además, $\ker \bar{f} = \ker f/I$.

Teorema 1.6.2 (Primero de isomorfía). Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces

- (1) $\bar{f}: R/\ker f \rightarrow \text{Im } f$ es *inyectivo*.
- (2) f es *sobreyectivo* $\implies \bar{f}$ es un *isomorfismo* y $R/\ker f \cong S$.

Ejercicio 1.6.1. Busca los morfismos de anillos $\varphi: \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_6$.

Ejercicio 1.6.2. Busca los morfismos de anillos $f: \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{C}$.

Sea $R \subset T$ una inclusión de anillos y $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset T$. Vamos a considerar los morfismos de anillos $f: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow T$ tales que $\forall r \in R: f(r) = r$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n: f(x_i) = a_i$.

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \dots, x_n] & \xrightarrow{f} & T \\ g \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ R[a_1, \dots, a_n] & & \end{array}$$

Por el primer teorema de isomorfía, f es un morfismo de anillos $\iff \ker f \subset \ker g$.

Teorema 1.6.3 (Segundo de isomorfía). Sea R un anillo, $I \subset J \subset R$ ideales, entonces

$$J/I \subset R/I \text{ es un ideal y } \frac{R/I}{J/I} \cong R/J.$$

Demostración: Consideramos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\pi} & R/I & \xrightarrow{g} & \frac{R/I}{J/I} \\ & \searrow h & & & \uparrow \end{array}$$

Entonces, h es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker h = J$. Por el primer teorema de isomorfía, $\frac{R/I}{J/I} \cong R/J$. ■

Otra aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea R un anillo, $I \subset R$ un ideal. Entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos $P \supset I$ de R y los ideales primos de R/I .

Sea $Q \supset I$ un ideal de R , entonces

$$Q/I \text{ es un ideal primo de } R/I \iff \frac{R/I}{Q/I} \cong R/Q \text{ es un DI} \iff Q \text{ es un ideal primo de } R.$$

Corolario 1.6.4. Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un anillo R , entonces $\sqrt{I} = \bigcap_{P \supset I, P \text{ primo}} P$.

Demostración: Sea $f \in R$, entonces

$$\begin{aligned} f \in \sqrt{I} &\iff \exists n \in \mathbb{N} : f^n \in I \iff \exists n \in \mathbb{N} : [f]^n = [0] \in R/I \\ &\iff [f] \in \text{Nil}(R/I) \iff \forall P/I \text{ primo en } R/I : [f] \in P/I \\ &\iff \forall P \supset I \text{ primo en } R : f \in P. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 1.6.3. Encuentra todos los ideales primos que contienen a $\langle y - x^2 \rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$.

Una última aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos y sea $Q \subset S$ un ideal primo, entonces $f^{-1}(Q) \subset R$ es un ideal primo.

Demostración:

$$\begin{array}{ccccc} & & g & & \\ & \text{---} \text{dashed arrow} \text{---} & & \text{---} \text{dashed arrow} \text{---} & \\ R & \xrightarrow{f} & S & \xrightarrow{\pi} & S/Q \\ \ker f & \longmapsto & 0 & \longmapsto & 0 \end{array}$$

Luego $\ker g = f^{-1}(Q)$. ■

2. Anillos II

2.1 Módulos sobre anillos

Definición 2.1.1 (Módulo). Sea R un anillo conmutativo con unidad, $M \neq \emptyset$ es un módulo sobre $R \iff$

- (i) $(M, +)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Existe una operación externa $\cdot : R \times M \rightarrow M$ tal que
 - (a) $\forall r \in R, m, n \in M : r \cdot (m + n) = r \cdot m + r \cdot n.$
 - (b) $\forall r, s \in R, m \in M : (r + s) \cdot m = r \cdot m + s \cdot m.$
 - (c) $\forall r, s \in R, m \in M : (rs) \cdot m = r \cdot (s \cdot m).$
 - (d) $\forall m \in M : 1_R \cdot m = m.$

Definición 2.1.2 (R -álgebra). Sea R un anillo conmutativo con unidad, A es una R -álgebra $\iff$

- (i) $(A, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad.
- (ii) Existe una operación externa $\cdot : R \times A \rightarrow A$ tal que
 - (a) $\forall r \in R, a, b \in A : r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b.$
 - (b) $\forall r, s \in R, a \in A : (r + s) \cdot a = r \cdot a + s \cdot a.$
 - (c) $\forall r, s \in R, a \in A : (rs) \cdot a = r \cdot (s \cdot a).$
 - (d) $\forall a \in A : 1_R \cdot a = a.$
 - (e) $\forall r \in R, a, b \in A : r \cdot (a \cdot b) = (r \cdot a) \cdot b = a \cdot (r \cdot b).$

Ejemplos 2.1.1 (de módulos). Sea R un anillo conmutativo con unidad, entonces:

- [1] R es un R -módulo.
- [2] R^n con las operaciones coordenada a coordenada es un R -módulo.
- [3] $\forall I \subset R$ ideal de $R : I$ es un R -módulo.
- [4] $\forall I \subset R$ ideal de $R : R/I$ es un R -módulo.

[5] Sea $f: R \rightarrow T$ un morfismo de anillos, entonces $\forall J \subset T$ ideal de T : J es un R -módulo con la operación $r \cdot j = f(r) \cdot j$.

[6] En las condiciones del ejemplo anterior, T es un R -módulo con la misma operación.

Si estamos pensando en T como un anillo, diremos que T es una R -álgebra.

Definición 2.1.3. Sea M un R -módulo, M está finitamente generado sobre R

$$\iff \exists m_1, \dots, m_n \in M : M = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i m_i : r_i \in R \right\}.$$

Definición 2.1.4. Sea T una R -álgebra, T está finitamente generada sobre R

$$\iff \exists t_1, \dots, t_n \in T : T = R[t_1, \dots, t_n] = \{f(t_1, \dots, t_n) : f \in R[x_1, \dots, x_n]\}.$$

Ejemplos 2.1.2 (de módulos finitamente generados).

[1] Todo ideal de $\mathbb{Z}$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado.

[2] $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado por $\{1, \sqrt{2}\}$.

[3] $\mathbb{Z}[x]$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo que no está finitamente generado. Sin embargo al considerarlo como una $\mathbb{Z}$ -álgebra, sí que está finitamente generada por $\{x\}$.

Definición 2.1.5 (Morfismo). Sean M y N dos R -módulos, una aplicación $f: M \rightarrow N$ es un morfismo de R -módulos $\iff$

(i) f es un morfismo de grupos.

(ii) $\forall r \in R, m \in M : f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$.

De manera natural, tenemos las siguientes definiciones y resultados:

1. Noción de submódulo de un R -módulo M .
2. Noción de núcleo e imagen de un morfismo de R -módulos.
3. El núcleo de un morfismo de R -módulos es un submódulo.
4. Un morfismo de R -módulos es inyectivo $\iff$ su núcleo es trivial.
5. Noción de isomorfismo de R -módulos.
6. Sea $N \subset M$ un submódulo, entonces M/N es un R -módulo.

7. Teoremas (primero y segundo) de isomorfía para módulos.

Teorema 2.1.1 (Tercero de isomorfía). Sean $I, J \subset R$ ideales de un ACU R ,

$$\implies I+J/J \text{ es isomorfo como } R\text{-módulo a } I/I \cap J.$$

Demostración: Consideramos la aplicación $\pi: R \longrightarrow R/J$, $r \longmapsto r + J$. Entonces $\pi(I) = I+J/J$. Además, $\pi|_I$ es un morfismo de R -módulos sobreyectivo. Por tanto, por el primer teorema de isomorfía para módulos, $I/\ker(\pi|_I) \cong I+J/J$. Pero $\ker(\pi|_I) = I \cap J$, luego el resultado se sigue. ■

Ejemplo 2.1.3 (de aplicación del teorema). En $\mathbb{Z}$, consideramos los ideales $I = \langle 4 \rangle$ y $J = \langle 6 \rangle$. Entonces, por el teorema anterior,

$$\langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle / \langle 6 \rangle \cong \langle 4 \rangle / \langle 4 \rangle \cap \langle 6 \rangle \implies \langle 2 \rangle / \langle 6 \rangle \cong \langle 4 \rangle / \langle 12 \rangle.$$

Es decir, este teorema nos habla de isomorfismos entre objetos que no “viven” en el mismo anillo.

2.2 Localización de anillos

Definición 2.2.1 (Parte multiplicativa). Sea R un ACU, $S \subset R$ es una parte multiplicativa o un subconjunto multiplicativamente cerrado $\iff$

- (i) $1 \in S$.
- (ii) $\forall s, t \in S : st \in S$.

Ejemplos 2.2.1 (de partes multiplicativas). Sea R un ACU, entonces:

- [1] Sea $r \in R \setminus \{0\}$, entonces $\{r^n : n \in \mathbb{N}\}$ es una parte multiplicativa.
- [2] Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo, entonces $R \setminus \mathfrak{p}$ es una parte multiplicativa.
- [3] El complemento de una unión de ideales primos de R es una parte multiplicativa.
- [4] $S = R \setminus \{\text{divisores de cero}\}$ es una parte multiplicativa.

Vamos a construir la localización de un anillo R respecto a una parte multiplicativa S . Consideramos el conjunto $R \times S = \{(r, s) : r \in R \wedge s \in S\}$. Queremos dotar a este conjunto de una estructura de anillo. Para ello, definimos la relación $\sim$ en $R \times S$ mediante:

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff rs' - r's = 0.$$

Ejemplo 2.2.2. En $\mathbb{Z}_6$, consideramos la parte multiplicativa $S = \{\bar{2}^n : n \in \mathbb{N}\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\}$.

Entonces, la relación $\sim$ en $\mathbb{Z}_6 \times S$ no es de equivalencia, ya que no es transitiva.

Ejercicio 2.2.3. Demuestra que si R es un dominio de integridad, entonces $\sim$ es una relación de equivalencia en $R \times S$.

Nuevo intento: En $R \times S$, definimos la relación $\sim$ mediante:

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff \exists t \in S : t(rs' - r's) = 0.$$

Ejercicio 2.2.4. Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia en $R \times S$.

Tomamos entonces el cociente $R \times S / \sim$ y denotamos por $\frac{r}{s}$ a la clase de equivalencia de (r, s) . Definimos las operaciones suma y producto en $R \times S / \sim$ mediante:

- Suma: $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in R \times S / \sim : \frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'}$.
- Producto: $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in R \times S / \sim : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \frac{rr'}{ss'}$.

El elemento neutro de la suma es $\frac{0}{s}$ con $s \in S$ cualquiera, y el elemento neutro del producto es $\frac{s}{s} = \frac{1}{1}$ con $s \in S$ cualquiera. Entonces, $(R \times S / \sim, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad y lo denotamos por $S^{-1}R$.

Observación 2.2.2. Si $0 \in S$, entonces $R \times S / \sim = \{0\}$.

Si $\exists s \in S$ tal que s es nilpotente, entonces $R \times S / \sim = \{0\}$.

Ejemplos 2.2.5 (de localizaciones). Sea R un ACU, entonces:

- [1] Si $S = \{r^n : n \in \mathbb{N}\}$ donde $r \in R$ no es nilpotente, entonces $S^{-1}R$ se denota por $R_{\{r\}}$ y se llama la localización de R en r .
- [2] Si $S = R \setminus \mathfrak{p}$ donde $\mathfrak{p} \subset R$ es un ideal primo, entonces $S^{-1}R$ se denota por $R_{\mathfrak{p}}$ y se llama la localización de R en el primo $\mathfrak{p}$.

2.2.1 Relación entre R y $S^{-1}R$

Proposición 2.2.1. Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces la aplicación

$$\iota_S: R \longrightarrow S^{-1}R, \quad r \longmapsto \frac{r}{1}$$

es un morfismo de anillos con $\ker(\iota_S) = \{r \in R : \exists s \in S : sr = 0\}$.

Ejemplo 2.2.6. Consideramos el anillo $\mathbb{Z}_6$ y la parte multiplicativa $S = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\}$. Entonces $\ker(\iota_S) = \{\bar{0}, \bar{3}\}$. ¿Quién es $S\mathbb{Z}_6^{-1}$?

Teorema 2.2.2 (Propiedad universal de la localización). Sea R un ACU, $S \subset R$ una parte multiplicativa y $g: R \rightarrow T$ un morfismo de anillos tal que $\forall s \in S : g(s) \in T^*$.

$$\implies \exists! h: S^{-1}R \longrightarrow T \text{ morfismo de anillos tal que } h \circ \iota_S = g.$$

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{g} & T \\ \iota_S \downarrow & \nearrow h & \\ S^{-1}R & & \end{array}$$

Demostración: Suponiendo que $\exists h$ con las propiedades indicadas, veamos que debe ser único. Sea $\frac{r}{s} \in S^{-1}R$, entonces, como el diagrama conmuta y h es morfismo de anillos,

$$h\left(\frac{r}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1} \in T.$$

Por tanto, h está determinado por g y es único.

Ahora, definimos $h: S^{-1}R \rightarrow T$ mediante $h\left(\frac{r}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1}$. Veamos que está bien definida. Sean $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$ en $S^{-1}R$, entonces $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, dado que g es morfismo de anillos, tenemos que

$$g(t) \cdot g(rs' - r's) = g(t) \cdot (g(r)g(s') - g(r')g(s)) = 0.$$

Como $g(t) \in T^*$, podemos multiplicar por su inverso y obtenemos que $g(r)g(s') = g(r')g(s)$, luego $g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1}$. Por tanto, h está bien definida. Además, es fácil ver que h es un morfismo de anillos y que $h \circ \iota_S = g$. ■

Ejemplo 2.2.7 (de la propiedad universal). Consideramos el anillo $\mathbb{Z}$ y la parte multiplicativa $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Entonces, por la propiedad universal de la localización, $\mathbb{Z}_S^{-1} \cong \mathbb{Q}$.

Si consideramos $\mathfrak{p} = \langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}$, entonces $\mathbb{Z}_{\mathfrak{p}}$ es el anillo de los racionales cuyo denominador

no es múltiplo de 3. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_{\{0\}} \cong \mathbb{Q} \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathbb{Z}_p & & \end{array} \quad \text{donde} \quad \mathbb{Z}_p = \left\{ \frac{n}{m} \in \mathbb{Q} : (n, m) = 1 \wedge 3 \nmid m \right\}.$$

Observación 2.2.3. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\iota_S: R \rightarrow S^{-1}R$ el morfismo de la Proposición 2.2.1. Entonces, se tienen las siguientes propiedades:

- (i) $\forall s \in S : \iota_S(s) \in (S^{-1}R)^*$.
- (ii) $\ker(\iota_S) = \{r \in R : \exists s \in S : sr = 0\}$.
- (iii) Todo elemento de $S^{-1}R$ es de la forma $\iota_S(r) \cdot (\iota_S(s))^{-1}$ para algún $r \in R$ y $s \in S$.

Ejercicio 2.2.8. Demuestra que si $g: R \rightarrow T$ es un morfismo de anillos que cumple las propiedades (i), (ii) y (iii) anteriores, entonces $T \cong S^{-1}R$.

2.2.2 Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$

Notación: Si $I \subset R$ es un ideal, usamos I^e para denotar el ideal extendido de I en $S^{-1}R$, es decir, $I^e = \iota_S(I)^e$. Además, si $J \subset S^{-1}R$ es un ideal, usamos J^c para denotar el ideal contraído de J en R , es decir, $J^c = \iota_S^{-1}(J)$.

Proposición 2.2.3. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces:

- (1) Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal, entonces $(J^c)^e = J$.

En particular, todo ideal de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal de R .

- (2) Sea $I \subset R$ un ideal, entonces $(I^e)^c = \{r \in R : \exists s \in S : sr \in I\} = \bigcup_{s \in S} (I : s)$.
- (3) Sea $I \subset R$ un ideal, entonces $I^e = \langle 1 \rangle \iff I \cap S \neq \emptyset$.

Demostración:

- (1) Por un morfismo de anillos, siempre se tiene que $(J^c)^e \subset J$. Veamos la otra inclusión. Sea $\frac{b}{s} \in J$ con $b \in R$ y $s \in S$. Entonces, $\frac{b}{1} \in J$, luego $b \in J^c$. En consecuencia, $\frac{1}{s} \cdot \frac{b}{1} = \frac{b}{s} \in (J^c)^e$ y el resultado se sigue.

- (2) Veamos ambas inclusiones para $(I^e)^c = \bigcup_{s \in S} (I : s)$.

$\supseteq$ Sea $r \in \bigcup_{s \in S} (I : s)$, entonces $\exists s \in S : sr \in I$. Por tanto, $\frac{sr}{1} \in I^e$, luego $\frac{1}{s} \cdot \frac{sr}{1} \in I^e$. Entonces, $\frac{r}{1} \in I^e$ y concluimos que $r \in (I^e)^c$.

$\subseteq$ Sea $r \in (I^e)^c$, entonces $\frac{r}{1} \in I^e$. Por definición de ideal extendido, $\exists a_1, \dots, a_n \in I$ y $\exists s_1, \dots, s_n, t \in S$ tales que $\frac{r}{1} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$, luego $\exists s'' \in S : s''r \in \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n} \subset I \subset R$.

(3) Ejercicio. ■

Ejemplo 2.2.9. Consideramos el anillo $\mathbb{Z}$ y la parte multiplicativa $S = \mathbb{Z} \setminus \langle 3 \rangle$. Entonces, $S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle}$ es el anillo de los racionales cuyo denominador no es múltiplo de 3. Consideramos el ideal $I = \langle 6 \rangle \subset \mathbb{Z}$. Entonces, $I^e = \langle 6 \rangle^e = \langle 2 \cdot 3 \rangle^e = \langle 3 \rangle^e$. Por tanto, $(I^e)^c = \langle 3 \rangle^c = \langle 3 \rangle \supsetneq \langle 6 \rangle = I$.

Proposición 2.2.4. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo tal que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, entonces

(1) $(\mathfrak{p}^e)^c = \mathfrak{p}$.

(2) $\mathfrak{p}^e \subset S^{-1}R$ es un ideal primo.

Demostración:

(1) Tenemos que $\forall s \in S : (\mathfrak{p} : s) = \{r \in R : sr \in \mathfrak{p}\} = \mathfrak{p}$ por ser $\mathfrak{p}$ primo y $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Por tanto, $(\mathfrak{p}^e)^c = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{p} : s) = \mathfrak{p}$.

(2) Sean $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$ tales que $\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$. Entonces, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathfrak{p}, \{s_i\}_{i=1}^n : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$. Por tanto, $\exists s'' \in S : s''rr' \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $s'' \notin \mathfrak{p}$, tenemos que $r \cdot r' \in \mathfrak{p}$, luego $r \in \mathfrak{p} \vee r' \in \mathfrak{p}$. Por tanto, $\frac{r}{s} \in \mathfrak{p}^e \vee \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$ y el resultado se sigue. ■

Ejemplo 2.2.10.

Corolario 2.2.5. Todo ideal primo de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal primo de R .

Demostración: Sea $\mathfrak{q} \subset S^{-1}R$ un ideal primo. Entonces, $\mathfrak{q}^c \subset R$ es un ideal primo. Por

(1), $(\mathfrak{q}^c)^e = \mathfrak{q}$. ■

Observación 2.2.4. En general, hay correspondencia biyectiva entre los ideales de $S^{-1}R$ y los ideales de R (aunque pidamos que no intersequen a S).

Sin embargo, sí hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos de $S^{-1}R$ y los ideales primos de R que no intersecan a S .

Ejemplo 2.2.11. Sea $R = K[x, y, z]$ con K un cuerpo, consideramos el ideal $\mathfrak{p} = \langle x, y \rangle \subset R$. Sabemos que $\mathfrak{p}$ es un ideal primo porque $R/\mathfrak{p} \cong K[z]$ es un dominio de integridad. Consideramos la parte multiplicativa $S = R \setminus \mathfrak{p}$. Entonces, para $p(z) \in K[z]$ polinomio irreducible,

Observación 2.2.5. Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo, entonces $R_{\mathfrak{p}}$ es un anillo local y su maximal es $\mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$.

2.2.3 Localizar y pasar al cociente conmutan

Proposición 2.2.6. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $I \subset R$ un ideal, entonces existe un isomorfismo de anillos

$$S^{-1}(R/I) \cong S^{-1}R/I^e.$$

Demostración: Consideramos $\bar{S} := \pi(S) \subset R/I$ donde $\pi: R \rightarrow R/I$ es el morfismo canónico. Entonces, $\bar{S}$ es una parte multiplicativa de R/I .

Además, consideramos $I^e := \iota_S(I) \subset S^{-1}R$ donde $\iota_S: R \rightarrow S^{-1}R$ es el morfismo canónico. Entonces, I^e es un ideal de $S^{-1}R$.

Tenemos entonces el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 R & \xrightarrow{\iota_S} & S^{-1}R & \xrightarrow{\pi'} & S^{-1}R/I^e \\
 \pi \downarrow & & & \nearrow \exists g & \\
 \bar{S} \subset R/I & & & & \\
 \downarrow \iota_{\bar{S}} & & & \nearrow \exists h & \\
 \bar{S}^{-1}(R/I) & & & &
 \end{array}$$

$\pi' \circ \iota_S$ (curved arrow from R to $S^{-1}R/I^e$)

Paso 1: Veamos que $\exists g$ morfismo de anillos tal que $g \circ \pi = \pi' \circ \iota_S$. Basta comprobar que $I \subset \ker(\pi' \circ \iota_S)$. Tenemos que $\ker(\pi' \circ \iota_S) \supset (I^e)^c \supset I$.

$$g(\bar{r}) = \pi' \circ \iota_S(r) = \pi' \left(\frac{r}{1} \right) = \overline{\left(\frac{r}{1} \right)} \in \frac{S^{-1}R}{I^e}.$$

Además, como $\ker(\pi' \circ \iota_S) = (I^e)^c$, $g(\bar{r}) = (\pi' \circ \iota_S)(r + (I^e)^c)$.

Paso 2: Veamos que $\exists h$ morfismo de anillos tal que $h \circ \iota_{\bar{S}} = g$. Entonces, $\forall \bar{r} \in R/I, \bar{s} \in \bar{S} : h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) = g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1}$.

Ejercicio 2.2.12. Demuestra que si $I \cap S \neq \emptyset$, entonces $S^{-1}R/I^e = \{0\}$ y $\bar{S}^{-1}(R/I) = \{0\}$.

Supongamos que $I \cap S = \emptyset$. Veamos que h es un isomorfismo de anillos.

Paso 3: Veamos que h es sobreyectivo. Sea $\overline{\left(\frac{r}{s}\right)} \in S^{-1}R/I^e$, entonces

$$\begin{aligned} \overline{\left(\frac{r}{s}\right)} &= \pi' \left(\left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot (s^{-1} + I^e) \right) = \pi' \left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot \pi' (s + I^e)^{-1} \\ &= \pi' \left(\iota_S(r + (I^e)^c) \right) \cdot \pi' \left(\iota_S(s + (I^e)^c) \right)^{-1} = g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1} = h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right). \end{aligned}$$

Paso 4: Veamos que h es inyectivo. Sea $\frac{\bar{r}}{\bar{s}} \in S^{-1}(R/I)$ tal que $\frac{\bar{r}}{\bar{s}} \in \ker(h)$, veamos que $\frac{\bar{r}}{\bar{s}} = \bar{0}$. Tenemos que $h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) = 0$. Es decir,

$$\begin{aligned} 0 &= h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) = g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1} = \pi' \left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot \pi' (s^{-1} + I^e) \\ &= \pi' \left(\left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot (s^{-1} + I^e) \right) = \pi' (\iota_S(r + (I^e)^c) \cdot (\iota_S(s)^{-1} + I^e)) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\iota_S(r + (I^e)^c) \cdot (\iota_S(s)^{-1} + I^e) \in I^e$. Es decir,

$$\iota_S(r + (I^e)^c) \cdot (\iota_S(s)^{-1} + I^e) = \iota_S(r + (I^e)^c) \cdot \iota_S(s)^{-1} + \iota_S(r + (I^e)^c) \cdot I^e \in I^e.$$

Luego $\iota_S(r + (I^e)^c) \cdot \iota_S(s)^{-1} \in I^e$. Por tanto,

$$\frac{r + (I^e)^c}{s} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i} \text{ con } a_i \in I, s_i \in S \implies \exists s'' \in S : s''r \in I \subset R.$$

Al evaluar en π , tenemos que $\pi(s'') \cdot \pi(r) = \bar{0} \in R/I$. Luego $\bar{s}'' \cdot \bar{r} = \bar{0}$ en R/I . Por tanto, $\iota_{\bar{S}}(\bar{r}) = 0$ en $\bar{S}^{-1}(R/I)$ y concluimos que $\frac{\bar{r}}{\bar{s}} = \bar{0}$ en $\bar{S}^{-1}(R/I)$. ■

Definición 2.2.6 (Anillo noetheriano). Sea R un anillo, R es noetheriano $\iff$ todo ideal de R es finitamente generado. Es decir,

$$R \text{ es noetheriano} \iff \forall I \subset R \text{ ideal} : \exists a_1, \dots, a_n \in I : I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle.$$

Ejemplos 2.2.13 (de anillos (no) noetherianos).

- [1] Como $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales, es noetheriano.
- [2] Si K es un cuerpo, entonces $K[x]$ es un DIP, luego es noetheriano.

- [3] $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{Z}_n$ es noetheriano.
- [4] Sea R un anillo no noetheriano e $I \subset R$ un ideal, entonces R/I es noetheriano.
- [5] Si K es un cuerpo, es noetheriano.
- [6] Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa de un anillo noetheriano R , entonces $S^{-1}R$ es noetheriano porque todo ideal de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal de R . Es decir, si $J \subset S^{-1}R$ es un ideal, entonces $\exists I \subset R$ ideal tal que $J = I^e$. Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Por tanto, $J = I^e = (\langle a_i \rangle_i)^e = \langle a_i \rangle_i$ en $S^{-1}R$.
- [7] Sea K un cuerpo, entonces $K[x_i]_{i \in \mathbb{N}}$ es un anillo no noetheriano. Sea $I = \langle x_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$. Entonces, I no es finitamente generado (ejercicio).
- [8] Sea K un cuerpo, entonces $K[x, y]$ es noetheriano.
- [9] Sea K un cuerpo, entonces $K[xy^n]_{n \in \mathbb{N}_0}$ es un anillo no noetheriano pese a que sea un subanillo de $K[x, y]$ (que sí lo es).

Proposición 2.2.7. *Sea R un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (i) R es noetheriano.
- (ii) Toda cadena creciente de ideales de R se estabiliza. Es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : I_1 \subset I_2 \subset \dots \subset I_n = I_{n+1} = \dots$.
- (iii) Todo conjunto Σ no vacío de ideales de R tiene un elemento maximal en Σ .

Demostración: (i) $\Rightarrow$ (ii): Sea $I_1 \subset I_2 \subset \dots$ una cadena creciente de ideales de R . Consideramos $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, que es un ideal de R . Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Entonces, $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$, luego $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$. Por tanto, $I = I_n$ y la cadena se estabiliza en n .

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Es inmediato, ya que toda cadena creciente en Σ se estabiliza y, por tanto, tiene un máximo.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Sea $I \subset R$ un ideal, queremos probar que I es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea $a_1 \in I$, tenemos que $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$, entonces $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena creciente de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \dots$$

Consideramos entonces $\Sigma = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$. Por hipótesis, Σ tiene un ideal maximal, es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ es maximal en Σ . Pero entonces, $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$, lo que

contradice la construcción de la cadena creciente. Por tanto, I es finitamente generado. ■

Teorema 2.2.8 (de la base de Hilbert). *Sea K un cuerpo, entonces $K[x]$ es noetheriano.*

Demostración: Sea $I \subset K[x]$ un ideal, supongamos por contradicción que I no es finitamente generado. Sea $f_1 \in I$ de grado mínimo $\deg f_1 = d_1$, entonces $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$ de grado mínimo $\deg f_2 = d_2$, entonces $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena creciente de grados de polinomios: $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots$. ■

H. Hojas de ejercicios

H.0 Repaso de estructuras algebraicas

[1.] Sea R un anillo. Demuestra que:

- (a) Si $a \in R$ es un divisor de cero, entonces a no puede ser una unidad;
- (b) Si R es finito, entonces todo $r \in R \setminus \{0\}$ es, o bien una unidad, o bien un divisor de cero;
- (c) Si R no es finito, el enunciado del apartado anterior no es necesariamente cierto.

Solución:

- (a) Se trata de la Proposición 1.1.4.
- (b) Sea $r \in R \setminus \{0\}$. Consideramos el conjunto $\{r^n : n \in \mathbb{N}\}$. Como R es finito, existen $n > m \geq 1$ tales que $r^n = r^m \implies r^n - r^m = 0 \implies r^m(r^{n-m} - 1) = 0$.

Supongamos que r no es ni divisor de cero ni invertible, entonces $r^m \neq 0$, por lo que $r^{n-m} - 1 = 0$, es decir $r^{n-m} = 1$. Entonces r es invertible (su inverso es r^{n-m-1}) y llegamos a una contradicción. ■

- (c) En el anillo $\mathbb{Z}$, todos los elementos en $\mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ no son ni unidades ni divisores de cero.

[2.] Encuentra todas las unidades y los divisores de cero en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ y en $K[x]$ donde K es un cuerpo.

Solución:

- (a)

[3.] Sobre las unidades en anillos de polinomios. Sea R un anillo y sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R .

- (a) Si R es un dominio de integridad demuestra que

$$\{\text{Unidades de } R[x]\} = \{\text{Unidades de } R\}.$$

- (b) Demuestra, dando un contraejemplo, que el enunciado anterior no es cierto si R no es un dominio de integridad. Sugerencia: piensa en $\mathbb{Z}_4[x]$ y usa elementos nilpotentes.
- (c) Sea K un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades del anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$?

Solución:

4. Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los divisores de cero de un anillo, junto con el 0, no forman, en general, un ideal.

Solución:

5. Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los elementos de un anillo que no son unidades no forman, en general, un ideal.

Solución:

6. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un dominio de integridad;
- (b) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo en R ;
- (c) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo minimal en R .

Solución:

7. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un cuerpo;
- (b) R sólo tiene dos ideales, $\langle 0 \rangle$ y R ;
- (c) El único ideal maximal de R es $\langle 0 \rangle$.

Solución:

8. Sea R un dominio de factorización única. El objetivo de este problema es probar que entonces $R[x]$ es también un dominio de factorización única. Para ello sigue los siguientes pasos:

- (a) Demuestra que todo elemento $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ que no sea una unidad se puede escribir como el producto de un número finito de elementos irreducibles. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas; en cualquier caso, la demostración sale por inducción en el grado.
- (b) En el apartado anterior has probado que en $R[x]$ todo elemento se puede escribir como un producto de un número finito de irreducibles. Para ver que esta factorización es única, usa que, si $Q(R)$ es el cuerpo de fracciones de R , entonces $Q(R)[x]$ es un dominio de factorización única. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas.

- (c) Concluye que si K es un cuerpo, entonces el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ es un dominio de factorización única.

Solución:

9. Sobre los ideales en $K[x]$. Sea K un cuerpo.

- (a) Demuestra que $K[x]$ es un dominio euclídeo.
- (b) Demuestra que en $K[x]$ todos los ideales son principales.
- (c) Demuestra que en $K[x]$ un ideal es maximal si y sólo si está generado por un polinomio irreducible.
- (d) Sea $p(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demuestra que $K[x]/\langle p(x) \rangle$ es un K -espacio vectorial de dimensión n sobre K .

Solución:

10. Sea K un cuerpo finito.

- (a) Demuestra que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ con $p = \text{char}(K)$. Concluye que $|K| = p^n$ para algún natural $n \geq 1$. Es decir, si un cuerpo es finito, entonces su cardinal es una potencia de p , donde p es la característica del cuerpo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Decir que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ es equivalente a pedir que $\mathbb{F}_p \subset K$ y que K sea un $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial de dimensión finita.

- (b) Demuestra que el homomorfismo de Frobenius que eleva cada elemento a la potencia p es un isomorfismo de anillos. Concluye que K es un cuerpo perfecto.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Un cuerpo es perfecto si es de característica cero o si su característica es un primo p y además contiene las raíces p -ésimas de todos sus elementos. Todos los cuerpos $\mathbb{F}_p$ son perfectos como consecuencia del Pequeño Teorema de Fermat. Este ejercicio nos dice que todos los cuerpos finitos son perfectos.

- (c) Demuestra que K es el cuerpo de descomposición para el polinomio $x^{p^n} - x$ sobre $\mathbb{F}_p$. Sugerencia: observa que K^* es un grupo multiplicativo con $p^n - 1$ elementos; concluye que todos los elementos de K son raíces de $x^{p^n} - x$.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Sea L un cuerpo. El cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x) \in L[x]$ sobre L es el cuerpo más pequeño que

contiene a L y a todas las raíces de $p(x)$. Hay un teorema que dice que este cuerpo siempre existe y además es único salvo isomorfismo.

- (d) Deduce del apartado anterior que todos los cuerpos con p^n elementos son isomorfos y que para cada natural $n \geq 1$ hay un cuerpo con p^n elementos. Denotamos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo (salvo isomorfismo) con p^n elementos.
- (e) Usa el apartado (c) para demostrar que si $n \mid m$ entonces $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ y la extensión es de grado m/n .

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El grado de una extensión de cuerpos $L \subset M$ es la dimensión de M como L -espacio vectorial.

- (f) Si $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ demuestra que la extensión es simple. Sugerencia: usa el Teorema del elemento primitivo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El Teorema del elemento primitivo nos dice que si $L \subset M$ es una extensión finita y separable, entonces es simple. Todas las extensiones de cuerpos perfectos son separables. Decir que $L \subset M$ es simple es pedir que $M = L[\alpha]$ para algún $\alpha \in M$, es decir, M es el subanillo de L más pequeño que contiene a L y al elemento α ; finalmente (y esto no es inmediato) se tiene que $L[\alpha] \cong L[x]/\langle p(x) \rangle$, donde $p(x) \in L[x]$ es un polinomio irreducible. De aquí se deduce que M es un espacio vectorial de dimensión n sobre L , donde n es el grado del polinomio $p(x)$. No os agobiéis si no habéis visto estas cosas. Me podéis preguntar y además, lo que de momento me importa es que sepáis hacer el siguiente apartado y el ejercicio 11.

- (g) Concluye que si K es finito, entonces para cada natural $m \geq 1$ existe al menos un polinomio irreducible de grado m . Sugerencia: usa los dos apartados anteriores.

Solución:

11. Sea K un cuerpo cualquiera. Demuestra que hay una cantidad infinita de elementos irreducibles en $K[x]$. Sugerencia: si K no es finito, es fácil y si $|K| < \infty$ usa el ejercicio anterior.

Solución:

H.1 Hoja 1: Anillos, ideales

H.1.1 Operaciones con ideales

1. El radical de un ideal. Sea $I \subset R$ un ideal y sea $\sqrt{I}$ su radical.

- (a) Demuestra que $\sqrt{I}$ es un ideal que además contiene a I .
- (b) Demuestra que todo ideal primo es radical.
- (c) Describe todos los ideales de $\mathbb{Z}$ que sean radicales.
- (d) Sea k un cuerpo. Describe todos los ideales de $k[x]$ que sean radicales. Sugerencia: utiliza el ejercicio 9 de la Hoja 0.

Consulta el ejercicio 3 de los problemas propuestos en clase la semana del 8 de septiembre.

2. Unión de ideales. La unión de ideales no siempre es un ideal.

- (a) Sean $I, J \subset R$ dos ideales. Demuestra que, en general, $I \cup J$ no es un ideal. En $\mathbb{Z}$ considera $3\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z}$. Observa que 2, 3 están en la unión pero $1 = 3 + (-1)2$ no está.
- (b) Sea $I_1 \subset I_2 \subset \dots \subset I_n \subset \dots$ una sucesión creciente (no necesariamente finita) de ideales en R . Demuestra que la unión $\bigcup_n I_n$ es un ideal en R . Lo hemos comentado en clase.
- (c) Demuestra que en $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle + \langle m \rangle = \langle k \rangle$ con $k = \text{mcd}(n, m)$. Es consecuencia de la Identidad de Bézout.

3. Intersección de ideales. La intersección de ideales siempre es un ideal que no hay que confundir con el producto de ideales.

- (a) Sea $\{I_i\}_{i \in I}$ una colección de ideales. Demuestra que $\bigcap_{i \in I} I_i$ es un ideal en R .
- (b) Demuestra que en $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle \cap \langle m \rangle = \langle k \rangle$ con $k = \text{mcm}(n, m)$.
- (c) Demuestra que si $I = \langle a_1, \dots, a_s \rangle$ y $J = \langle b_1, \dots, b_t \rangle$ entonces $I \cdot J = \langle a_i b_j : i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, t \rangle$. Por definición, el ideal $I \cdot J$ es el ideal generado por todos los productos de un elemento de I por otro de J . Por lo tanto, el conjunto de la derecha está en $I \cdot J$. Para probar la otra inclusión, supongamos que $f \in I \cdot J$. Por definición esto quiere decir que existen $c_1, \dots, c_n \in I$, $d_1, \dots, d_n \in J$ y $r_1, \dots, r_n \in R$ tales que

$$f = \sum_{i=1}^n r_i c_i d_i.$$

Ahora basta observar que como $I = \langle a_1, \dots, a_s \rangle$ existen $g_{i,j} \in R$, con $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, s$ tales que $c_i = \sum_{j=1}^s g_{i,j} a_j$ y existen $h_{i,\ell} \in R$, con $i = 1, \dots, n$, $\ell = 1, \dots, t$

tales que $d_i = \sum_{\ell=1}^t h_{i,\ell} b_\ell$. Finalmente, el resultado pedido se obtiene de reemplazar c_i, d_i en (1) por estas últimas expresiones y usar la propiedad distributiva en R .

- (d) Sean $I, J \subset R$ dos ideales. Demuestra que $I \cdot J \subset I \cap J$; encuentra un ejemplo para el que la inclusión sea estricta. En $R[x]$ toma $I = J = \langle x \rangle$.

4. ¿Cuándo es la intersección de ideales igual al producto? Se dice que dos ideales $I, J \subset R$ son coprimos si $I + J = R$.

- (a) Encuentra dos ideales coprimos en $\mathbb{Z}$, y otros dos en $R[x, y]$.
- (b) Demuestra que si I y J son coprimos, entonces $I \cdot J = I \cap J$. La inclusión de izquierda a derecha siempre se da. Para ver la otra, sea $c \in I \cap J$. Como $I + J = 1$, entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $a + b = 1$. Por lo tanto $c = ca + cb$. Por construcción $ca, cb \in I \cdot J$, luego $c \in I \cdot J$.
- (c) Sean $I_1, \dots, I_n$ ideales en R . Demuestra, usando inducción en n , que si los ideales son primos dos a dos entonces $\prod_i I_i = \bigcap_i I_i$.
- (d) Considera los ideales $I = \langle x \rangle, J = \langle y \rangle \subset R[x, y]$. Demuestra que $I \cdot J = I \cap J$ y sin embargo $I + J \neq \langle 1 \rangle$.

5. Conductores. Sea R un anillo conmutativo con unidad cualquiera. Dados dos ideales, $I, J \subset R$, definimos el conductor de J en I como:

$$(I : J) := \{a \in R : aJ \subset I\}.$$

- (a) Demuestra que $(I : J)$ es un ideal en R que además contiene a I .
- (b) Calcula $(\langle 12 \rangle : \langle n \rangle)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- (c) Intuitivamente, ¿qué es el ideal $(I : \langle a \rangle)$ para $a \in R$?
- (d) Sea $p \subset R$ un ideal primo. Calcula $(p : I)$ para todo $I \subset R$. ¿Por qué crees que obtienes ese resultado? Como p es primo, si I no está contenido en p entonces $(p : I) = p$. Por otro lado, si $I \subset p$ entonces $(p : I) = \langle 1 \rangle$.
- (e) Demuestra que si $J = \langle a_1, \dots, a_r \rangle$ entonces $(I : J) = \bigcap_{i=1}^r (I : \langle a_i \rangle)$.

6. La geometría que veremos... Sean $I_1, \dots, I_n$ ideales en R , y sea $p \subset R$ un ideal primo que contiene a $\bigcap_i I_i$, i.e., $\bigcap_i I_i \subset p$. Demuestra que:

- (a) $I_i \subset p$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) Si además $\bigcap_i I_i = p$ entonces $I_i = p$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$.

- (c) Las conclusiones en los apartados (a) y (b) pueden no cumplirse si la colección de ideales $\{I_i\}_{i \in \Lambda}$ no es finita. Encuentra un contraejemplo.

Sugerencia para (a): si $I_i \not\subset p$ para $i = 1, \dots, n$ entonces para cada i existe un elemento $b_i \in I_i$ con $b_i \notin p$; ahora considera $\prod b_i$. Sugerencia para (c): considera infinitos ideales primos en $\mathbb{Z}$.

[7.] ...pero de momento miramos ejemplos en $\mathbb{Z}$. En $\mathbb{Z}$ observa que $\langle 36 \rangle \subset \langle 3 \rangle, \langle 2 \rangle$; encuentra todas las maneras de escribir $\langle 36 \rangle$ como intersección de ideales. A la vista del problema anterior, ¿qué crees que va a suceder?

H.1.2 Anillos locales

Definición H.1.1. Se dice que un anillo R es local si sólo tiene un ideal maximal.

[8.] Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un anillo local con ideal maximal m ;
 - (b) R contiene un ideal m tal que todo elemento de $R \setminus m$ es una unidad.
- (a) $\implies$ (b) Si $a \in R \setminus m$ no fuera una unidad, entonces $\langle a \rangle \subsetneq R$ y por el teorema visto en clase, existiría un maximal n (necesariamente distinto de m) en el que estaría contenido. Esto contradice la hipótesis de que m es el único maximal de R . (b) $\implies$ (a) Si R no fuera local, existiría otro maximal $n \subset R$ distinto de m . Tomando un elemento $a \in n \setminus m$ tendríamos un elemento que no está en m y que no puede ser una unidad por estar contenido en un ideal maximal.

[9.] Sea k un cuerpo. Definimos el anillo de series formales en una variable t sobre k como el conjunto

$$k[[t]] := \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i : a_i \in k \right\}$$

con la suma y el producto habituales. Demuestra que $\alpha = \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$ es una unidad si y sólo si $a_0 \neq 0$. Concluye que $k[[t]]$ es un anillo local cuyo único ideal maximal es además principal.

Sea $\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$. Observa que si tomamos $\sum_{i=0}^{\infty} x_i t^i \in k[[t]]$, con x_i variables, la ecuación

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{\infty} x_i t^i \right) = 1$$

se puede resolver con soluciones en k de manera recursiva si y sólo si $a_0 \in k$ es no nulo:

$$a_0x_0 = 1; \quad a_0x_1 + a_1x_0 = 0, \dots, a_nx_0 + a_1x_{n-1} + \dots + a_0x_n = 0, \dots$$

Por lo tanto, toda serie $\sum_{i=0}^{\infty} a_it^i \in k[[t]]$ con a_0 no nulo es invertible. Por otro lado, toda serie $\sum_{i=0}^{\infty} a_it^i \in k[[t]]$ con $a_0 = 0$ está en $\langle t \rangle$. Dicho esto, el resultado se obtiene después de usar el ejercicio 8. Observad que para que el argumento funcione necesitamos trabajar en el anillo de series formales. En el anillo de polinomios $k[t]$ NO podemos resolver todas las ecuaciones recursivas.

H.2 Homomorfismos, cocientes y Teoremas de Isomorfía

1. Sea $f : R \rightarrow S$ un homomorfismo de anillos.

(a) Demuestra que si u es una unidad en R entonces $f(u)$ es una unidad en S .

Solución: Recuerda que $1_R \mapsto 1_S$

(b) Si $a \in R$ no es una unidad, ¿puede ser $f(a)$ una unidad en S ?

Solución: Considera $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3$ por ejemplo.

(c) Si $b \in R$ es un divisor de cero, ¿es $f(b)$ necesariamente un divisor de cero en S ?

Solución: Considera $\mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_6/\langle\bar{3}\rangle \cong \mathbb{Z}_3$ por ejemplo y mira la imagen de $\bar{2}$.

(d) Si b no es un divisor de cero en R , ¿puede ser $f(b)$ un divisor de cero en S ?

Solución: Considera $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$ por ejemplo.

2. Homomorfismos desde cuerpos. Demuestra las siguientes afirmaciones.

(a) Sea $f : K \rightarrow R$ un homomorfismo de anillos donde K es un cuerpo. Entonces f es necesariamente inyectivo.

Solución: Pedimos que $1_K \mapsto 1_R$, $\ker(f)$ es un ideal y un cuerpo no tiene ideales no triviales.

(b) Un anillo R es un cuerpo si y sólo si todo homomorfismo de anillos $R \rightarrow S$ es inyectivo.

Solución: La implicación de izquierda a derecha es (a). Para la otra, supongamos que todo homomorfismo desde R es inyectivo. Si R no fuera un cuerpo, contendría un ideal I no trivial ($\neq (0)$, $\neq R$). Pero entonces, el paso al cociente $R \rightarrow R/I$ no es inyectivo.

3. Considera el homomorfismo natural de paso al cociente:

$$\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/\langle 10 \rangle, \quad r \mapsto \bar{r}.$$

(a) Describe $\pi(\langle 3 \rangle)$, $\pi(\langle 5 \rangle)$, $\pi(\langle 15 \rangle)$, $\pi(\langle 30 \rangle)$, $\pi(\langle 2 \rangle)$ y $\pi(\langle 8 \rangle)$.

(b) Encuentra todos los ideales de $\mathbb{Z}/\langle 10 \rangle$ y calcula su preimagen por π .

(c) A la vista de los apartados anteriores, ¿cuál es la relación entre m y n si $\pi(\langle n \rangle) = \pi(\langle m \rangle)$?

(d) ¿Qué ideales de $\mathbb{Z}$ están en correspondencia biyectiva con los ideales de $\mathbb{Z}/\langle 10 \rangle$?

(e) ¿Cuántos ideales hay en $\mathbb{Z}/\langle n \rangle$?

[4.] ¿Existe algún homomorfismo de anillos entre $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_3$? ¿Y entre $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_{12}$? Encuentra la condición necesaria y suficiente para que exista un homomorfismo de anillos entre $\mathbb{Z}_n$ y $\mathbb{Z}_m$, con $n, m \geq 1$ naturales.

Solución: Observa que como pedimos que todo homomorfismo lleve la unidad en la unidad, siempre tenemos un homomorfismo natural desde los enteros que va a ser compatible con el homomorfismo buscado si es que existe. Así, podemos considerar el siguiente diagrama:

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_m} \mathbb{Z}/\langle m \rangle = \mathbb{Z}_m, \quad \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_n} \mathbb{Z}/\langle n \rangle = \mathbb{Z}_n.$$

Y lo que hay que pensar es cuándo π_m factoriza por π_n . Esto es una condición sobre los ideales $\langle m \rangle$ y $\langle n \rangle$ de $\mathbb{Z}$. En clase hemos visto la condición necesaria y suficiente para que un homomorfismo factorice por un cociente.

[5.] Encuentra todos los ideales primos que contienen al ideal $I \subset \mathbb{Q}[x, y]$ en los siguientes casos: $I = \langle xy \rangle$, $I = \langle x - y \rangle$, $I = \langle xy, x^2y \rangle$. Después describe los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/I$.

Solución: Observad que cualquier primo que contenga a $\langle xy \rangle$ debe contener a x o a y , por tanto contienen a $\langle x \rangle$ o a $\langle y \rangle$. Para encontrar los ideales primos que contienen a $\langle x \rangle$, podemos buscar los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x \rangle \cong \mathbb{Q}[y]$ y para encontrar los ideales primos que contienen a $\langle y \rangle$ podemos buscar los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/\langle y \rangle \cong \mathbb{Q}[x]$. De aquí concluimos que $\langle xy \rangle$ está contenido en los primos $\langle x \rangle$, $\langle y \rangle$, $\langle x, p(y) \rangle$ con $p(y) \in \mathbb{Q}[y]$ irreducible, y $\langle y, p(x) \rangle$ con $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ irreducible.

Por otro lado, $\langle x - y \rangle$ es primo, mirad el cociente $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x - y \rangle \cong \mathbb{Q}[x] \cong \mathbb{Q}[y]$. Usando estos cocientes concluimos que además está contenido en los primos de la forma $\langle x - y, p(y) \rangle$ con $p(y) \in \mathbb{Q}[y]$ irreducible, y $\langle x - y, p(x) \rangle$ con $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ irreducible.

Finalmente, $\langle xy, x^2y \rangle$ está contenido en los mismos primos que el ideal $\langle xy \rangle$. El argumento es similar al que he escrito más arriba.

[6.] Considera el k -homomorfismo $\varphi : k[x, y] \rightarrow k[t]$ con $\varphi(x) = t^2$ y $\varphi(y) = t^3$. Decide de manera razonada si φ factoriza por $k[x, y]/\langle x^2 - y^2 \rangle$. ¿Y por $k[x, y]/\langle x^3 - y^2 \rangle$?

[7.] Teorema chino del resto. Sea R un anillo y sean $I_1, \dots, I_n$ ideales en R . Consideramos el siguiente homomorfismo de anillos:

$$\varphi : R \rightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_n, \quad r \mapsto (r_1, \dots, r_n),$$

donde r_i denota la clase de r módulo I_i . Demuestra que:

(a) φ es sobreyectiva si y sólo si I_i e I_j son primos cuando $i \neq j$.

(b) φ es inyectiva si y sólo si $\bigcap I_i = (0)$.

Solución: (a) Consideramos primero el caso $n = 2$. ($\implies$) Si φ es sobreyectiva, entonces existe $r \in R$ tal que $\varphi(r) = (1, 0)$, i.e., $r \in I_2$ y $r = 1 + b$, con $b \in I_1$. Por lo tanto, $r - b = 1$ y los ideales I_1 e I_2 son coprimos.

($\impliedby$) Suponemos que $I_1 + I_2 = \langle 1 \rangle$. Para comprobar que φ es sobreyectiva, basta demostrar que $(1, 0), (0, 1) \in \text{Im}(\varphi)$. Como $I_1 + I_2 = \langle 1 \rangle$, existen $a \in I_1$, $b \in I_2$ tales que $a + b = 1$. Ahora, primero tomamos $r_1 := 1 - a = b$. Entonces $r_1 \equiv 1 \in R/I_1$ (usando que $r_1 = 1 - a$) y $r_1 \equiv 0 \in R/I_2$ (usando que $r_1 = b$), así que $\varphi(r_1) = (1, 0)$. Por otro lado, si tomamos $r_2 := 1 - b = a$ entonces $r_2 \equiv 0 \in R/I_1$ (usando que $r_2 = a$) y $r_2 \equiv 1 \in R/I_2$ (usando que $r_2 = 1 - b$), por lo que $\varphi(r_2) = (0, 1)$.

Para poder abordar el caso general, es conveniente considerar ahora el caso $n = 3$ porque es un poco distinto al caso $n = 2$. ($\implies$) Suponemos primero que φ es sobreyectiva y queremos probar que I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos. Como φ es sobreyectiva, el elemento $(1, 0, 0) \in \text{Im}(\varphi)$. Existe por lo tanto un elemento $r \in R$ tal que

$$r \equiv 1 \in R/I_1, \quad r \equiv 0 \in R/I_2, \quad r \equiv 0 \in R/I_3.$$

De la primera igualdad obtenemos que existe $a \in I_1$ de modo que $r = 1 + a$. Y de las otras dos deducimos que $r \in I_2 \cap I_3$. Por lo tanto, usando estas dos condiciones vistas primero con "ojos" desde I_1 e I_2 tenemos que $1 = a - r$, por lo que I_1 e I_2 son coprimos y luego vistas desde I_1 e I_3 , $1 = a - r$, por lo que I_1 e I_3 son coprimos. Usando argumentos similares dado que $(0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \text{Im}(\varphi)$ se concluye que los ideales I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos. Visto este caso, el caso general para esta implicación creo que es claro: si

$$\varphi : R \rightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_n, \quad r \mapsto (r_1, \dots, r_n),$$

es sobreyectiva, podemos usar que el elemento $e_i \in \text{Im}(\varphi)$ para probar que el ideal I_i es coprimo con el resto, usando las mismas ideas que en el caso $n = 3$.

Para la otra implicación ($\impliedby$) vamos a suponer primero que $n = 3$ y supongamos que I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos. Queremos probar que φ es sobreyectiva y para ello nos basta probar que $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \text{Im}(\varphi)$. Por ejemplo, para ver que $(1, 0, 0) \in \text{Im}(\varphi)$ primero observamos que como I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos, entonces I_1 es coprimo con $I_2 \cap I_3$: veamos. Como I_1 e I_2 son coprimos, existen $a \in I_1$, $b \in I_2$ de modo que:

$$a + b = 1,$$

y como I_1 e I_3 son coprimos, existen $c \in I_1$, $d \in I_3$ de modo que

$$c + d = 1.$$

Por lo tanto:

$$1 = (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd,$$

y observando que $ac + ad + bc \in I_1$ y que $bd \in I_2 \cap I_3$ tenemos que I_1 es coprimo con $I_2 \cap I_3$. De aquí deducimos que existe $r \in R$ tal que $\varphi(r) = (1, 0, 0)$. Basta tomar

$$r = 1 - ac - ad - bc = bd,$$

que visto desde I_1 nos da que $r \equiv 1 \in R/I_1$ (usando que $r = 1 - ac - ad - bc$) y visto desde I_2, I_3 nos da $r \equiv bd \equiv 0 \in R/I_i$ para $i = 2, 3$ (usando que $r = bd$). Con esto ya veis la idea para probar que también $(0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \text{Im}(\varphi)$.

Para tratar el caso general de esta implicación fijaos en que basta probar que $e_i \in \text{Im}(\varphi)$ para $i = 1, \dots, n$. Usando las mismas ideas que en el caso $n = 3$, fijado i , primero se trata de probar que, sabiendo que los ideales $I_1, \dots, I_n$ son coprimos dos a dos, entonces $\bigcap_{j \neq i} I_j$ es coprimo con I_i . Esto se hace de manera similar a como lo hemos abordado con $n = 3$. A continuación, se usa este hecho para "fabricar" la preimagen de e_i exactamente con las mismas ideas. Si no lo veis claro, escribidme.

8. Utilizando el Teorema chino del resto, demuestra que:

- (a) Si $(n, m) = 1$ entonces $\mathbb{Z}_{nm} \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$.
- (b) Demuestra que $R[x]/\langle (x^2 - 1)x^3 \rangle$ es isomorfo a la suma directa de tres anillos locales, que dos de ellos son un cuerpo y que el tercero tiene nilpotentes.

Solución: Usando el ejercicio 7, $R[x]/\langle (x^2 - 1)x^3 \rangle \cong R[x]/\langle x^3 \rangle \oplus R[x]/\langle (x - 1) \rangle \oplus R[x]/\langle (x + 1) \rangle \cong R[x]/\langle x^3 \rangle \oplus R \oplus R$.

9. Encuentra ejemplos de anillos que verifiquen las siguientes condiciones:

- (a) Un anillo que tenga exactamente 2 ideales maximales y al menos un nilpotente no nulo.
- (b) Un anillo con un único ideal primo $\mathfrak{p}$ (por tanto necesariamente maximal) que no sea un cuerpo.

Solución: (a) $k[x]/(x^2(x - 1))$, k cuerpo.

(b) $k[x]/(x^2)$, k cuerpo.

10. Sea $I \subset R$ un ideal, y sea M el conjunto de los ideales primos que contienen a I .

Demuestra que

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in M} \mathfrak{p}.$$

Sugerencia: considera el cociente R/I ; ¿qué es $\text{Nil}(R/I)$?

[11.] Utiliza el ejercicio anterior para demostrar que dados dos ideales $I, J \subset R$ se tiene que $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. *Sugerencia:* el ejercicio 6 de la hoja 1 puede ser útil.

Solución: Dado un ideal $L \subset R$, denotaremos por M_L al conjunto de los ideales primos que lo contienen. Observa que $M_{IJ} = M_I \cup M_J$ y $M_{I \cap J} = M_I \cup M_J$, donde, para las dos igualdades usamos las mismas ideas que en el ejercicio 6 (a) de la hoja 1. Para terminar, usa el ejercicio 10.

[12.] Demuestra que todo anillo R contiene un subanillo isomorfo a $\mathbb{Z}_n$ donde $n \in \mathbb{N}$ es justamente la característica de R . Concluye que si R es un dominio de integridad entonces su característica sólo puede ser 0 o un primo p . Para terminar, demuestra que existen dominios de integridad *infinitos* de cualquier característica 0 o prima.

[13.] Demuestra que todo ideal $I \subset R$ está contenido en un primo minimal siguiendo los siguientes pasos:

- (a) Considera el conjunto $\Sigma := \{\text{Ideales primos de } R \text{ que contienen a } I\}$ y demuestra que $\Sigma \neq \emptyset$.
- (b) Define en Σ el siguiente orden parcial: $\mathfrak{p} \leq \mathfrak{p}'$ si $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}$, y demuestra que toda cadena creciente de elementos en Σ tiene una cota superior en Σ .
- (c) Usa el Lema de Zorn.

Solución: (i) Tenemos que $\Sigma \neq \emptyset$ porque $I \neq R$ y por lo tanto está contenido en algún maximal de R . Finalmente, todo maximal es primo.

(ii) Observad que la intersección de una cadena decreciente de ideales primos $\bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$ vuelve a ser un ideal primo. Vimos en su día que la intersección (arbitraria) de ideales es un ideal. Desde luego la intersección es un ideal propio porque cada término lo es. Finalmente, si $ab \in \bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$, entonces $ab \in p_i$ para $i = 1, 2, \dots$. Ahora bien, si $a, b \notin \bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$, entonces existen $\ell, n \in \mathbb{N}$ tales que $a \notin p_\ell$ y $b \notin p_n$. Tomando $m = \max\{\ell, n\}$, tenemos que $a, b \notin p_m$ pero $ab \in p_m$ lo que es una contradicción.

(iii) Usando Zorn, Σ tiene algún elemento maximal y esto es un primo minimal que contiene a I .

Sea ahora R un anillo y sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo. Demuestra, usando ideas parecidas al

desarrollo anterior, que $\mathfrak{p}$ contiene un primo minimal, es decir, demuestra que existe un primo $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ tal que si $\mathfrak{t} \subset R$ es otro ideal primo con $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{q}$ entonces $\mathfrak{t} = \mathfrak{q}$.

14. Encuentra todos los primos minimales en $k[x]/\langle x^3(x-1) \rangle$, k cuerpo, y $\mathbb{R}[x, y]/\langle x - y^2 \rangle$.

Solución: Para encontrar los primos minimales de $k[x]/\langle x^3(x-1) \rangle$ basta buscar los primos minimales del ideal $\langle x^3(x-1) \rangle$ en $k[x]$. Los únicos ideales primos en $k[x]$ son (0) y los generados por polinomios irreducibles. Por lo tanto, los primos minimales que contienen a $\langle x^3(x-1) \rangle$ son los generados por los factores irreducibles de su generador. En consecuencia los minimales en $k[x]/\langle x^3(x-1) \rangle$ son $\langle x \rangle/\langle x^3(x-1) \rangle$ y $\langle x-1 \rangle/\langle x^3(x-1) \rangle$.

El anillo $\mathbb{R}[x, y]/\langle x - y^2 \rangle$ sólo tiene un primo minimal porque es $\langle x - y^2 \rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x, y]$. Para probar que $\langle x - y^2 \rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x, y]$, basta demostrar que es $x - y^2$ irreducible (porque $\mathbb{R}[x, y]$ es un DFU). Un modo de probarlo es el siguiente. Sea $R = \mathbb{R}[x]$. Entonces x es un elemento irreducible en R porque es un anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo y x es un polinomio de grado 1. Ahora $\mathbb{R}[x, y] = R[y]$ y aplicamos en este anillo el Criterio de Eisenstein generalizado al polinomio en la variable y con coeficientes en R : $y^2 - x$. Observad que el elemento irreducible x divide a todos los coeficientes menos al director (el que multiplica a y^2) y su cuadrado no divide al término independiente que es x . Por lo tanto $y^2 - x$ es irreducible en $\mathbb{R}[x, y]$ y en consecuencia genera un ideal primo.

Otro modo de probar que $\langle x - y^2 \rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x, y]$ es usando el homomorfismo de $\mathbb{R}$ -álgebras:

$$f : \mathbb{R}[x, y] \longrightarrow \mathbb{R}[y] \quad x \mapsto y^2 y \mapsto y,$$

para luego usar el Primer Teorema de Isomorfía:

$$\mathbb{R}[x, y]/\ker(f) \simeq \mathbb{R}[y]$$

porque f es sobreyectiva indicando que $\ker(f) = \langle y^2 - x \rangle$. Fijaos en que la inclusión $\langle y^2 - x \rangle \subset \ker(f)$ es inmediata. Pero sería conveniente convencernos de que se trata de una igualdad. Supongamos que $\langle y^2 - x \rangle \subsetneq \ker(f)$ y sea $p(x, y) \in \ker(f) \setminus \langle y^2 - x \rangle$. Como $y^2 - x$ es mónico en x podemos dividir $p(x, y)$ por $y^2 - x$ para obtener:

$$p(x, y) = q(x, y)(y^2 - x) + r(x, y)$$

con $r(x, y) \neq 0$ y de grado 0 en x , por lo que $r(x, y) = r(y)$ y

$$\langle y^2 - x, p(x, y) \rangle = \langle y^2 - x, r(y) \rangle \subset \ker(f)$$

lo que nos diría que $f(r(y)) = r(y) = 0 \in \mathbb{R}[y]$ lo cual es imposible salvo si $r(y) = 0$ porque $\mathbb{R}[y]$ es un anillo de polinomios en la variable y . Como este argumento se puede aplicar a

cualquier elemento de $\ker(f)$ deducimos que $\ker(f) = \langle y^2 - x \rangle$. De aquí se deduce que

$$\mathbb{R}[x, y] / \langle y^2 - x \rangle \simeq \mathbb{R}[y]$$

y como el segundo anillo es un dominio de integridad, necesariamente $\mathbb{R}[x, y] / \langle y^2 - x \rangle$ también lo es y en consecuencia $(\bar{0})$ es su único primo minimal.

H.3 Módulos, localización

- [1.] Sea $f : R \rightarrow S$ un homomorfismo de anillos y sea N un S -módulo. Demuestra que, vía f , N es de manera natural un R -módulo. En particular, observa que todo ideal de S es un R -módulo, y que S es un R -módulo.
- [2.] Sea R un anillo. Demuestra que $R[x_1, \dots, x_n]$ no es un R -módulo finitamente generado. Demuestra que en cambio es una R -álgebra finitamente generada. ¿Es $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$ una $\mathbb{Q}$ -álgebra finitamente generada? ¿Es $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$ un $\mathbb{Q}$ -módulo finitamente generado?
- [3.] Sean M y N dos R -módulos. Demuestra que el conjunto de los homomorfismos de R -módulos de M en N , $\text{Hom}_R(M, N)$, es un R -módulo.
- [4.] Sea M un R -módulo y sea $\text{Ann}_R(M) := \{a \in R : am = 0, \forall m \in M\}$.
 - (a) Demuestra que $\text{Ann}_R(M) \subset R$ es un ideal.
 - (b) Demuestra que M tiene estructura de $R/\text{Ann}_R(M)$ -módulo y que esta coincide con la que tiene como R -módulo.

Observación H.3.1. Se puede dar una demostración directa y clara de esta afirmación argumentando que la estructura de R -módulo de M se corresponde también con el siguiente homomorfismo de R -módulos:

$$f : R \rightarrow \text{End}_R(M) := \text{Hom}_R(M, M)$$

$$r \mapsto f_r : M \rightarrow M, \quad m \mapsto rm.$$

Y entonces se trata de observar que f factoriza por $R/\text{Ann}_R(M)$. Esto prueba que el efecto de multiplicar por elementos de R es el mismo que el de multiplicar por elementos de $R/\text{Ann}_R(M)$ porque estamos hablando del mismo homomorfismo f .

- (c) Considera el ideal $J = \langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}_{12}$. Demuestra que J es un $\mathbb{Z}_4$ -módulo.
- (d) Decide de manera razonada para qué valores de n , el ideal J del apartado anterior es de manera natural un $\mathbb{Z}_n$ -módulo.

Observación H.3.2. Puedes usar la indicación del apartado (b) y observa que podemos mirar a J desde $\mathbb{Z}$ vía el paso al cociente natural (esto le da a J estructura de $\mathbb{Z}$ -módulo):

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}.$$

Se vuelve a tener una demostración directa:

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(J), \quad r \mapsto f_r : J \rightarrow J, \quad m \mapsto rm.$$

Así observamos que $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(J) = \langle 4 \rangle$ y por lo tanto f factoriza por $\mathbb{Z}/\langle n \rangle$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ tal que $\langle n \rangle \subset \langle 4 \rangle$.

- (e) Sea $I = \langle 2 \rangle \subset \mathbb{Z}_6$. Demuestra que I es también un $\mathbb{Z}_3$ -módulo. Demuestra que $\langle 3 \rangle \subset \text{Ann}_{\mathbb{Z}_6}(I)$ y utiliza el ejercicio anterior.
- (f) Sea R un anillo, y sea $m \subset R$ un ideal maximal. Demuestra que m/m^2 es un R/m -espacio vectorial.

Observación H.3.3. De nuevo, hay que usar el ejercicio 3.

- [5.] Sea $S = \{2^n\} \subset \mathbb{Z}_4$. Describe $S^{-1}\mathbb{Z}_4$.

Solución: Observa que 2 es nilpotente. Como consecuencia $S^{-1}\mathbb{Z}_4 = \{0\}$.

- [6.] Sea R un anillo, y supongamos que $S \subset R$ es un conjunto multiplicativamente cerrado que contiene un elemento nilpotente. ¿Qué podemos decir de $S^{-1}R$?

Observación H.3.4. Haz antes el ejercicio anterior.

- [7.] Sea R un anillo y sea $p \subset R$ un ideal primo. Demuestra que R_p es un anillo local con ideal maximal pR_p .

Solución: En primer lugar hemos probado en clase que el ideal pR_p es primo. Usando el ejercicio 8 de la Hoja 1, basta probar que todo elemento de $R_p \setminus pR_p$ que no esté en pR_p es una unidad. Sea $b/s \in R_p \setminus pR_p$, $b \in R$, $s \in R \setminus p$. Entonces $b \notin p$ y por lo tanto $b \in R \setminus p$ que es la parte multiplicativa en la que hemos localizado para construir R_p . Así $b/1 \in R_p$ es una unidad y b/s también.

- [8.] Sea $S = \{12^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y considera el homomorfismo de paso al localizado $f : \mathbb{Z} \rightarrow S^{-1}\mathbb{Z}$.

- (a) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $f(I)e = \langle 1 \rangle$.

Solución: Estos son todos los ideales cuya intersección con S es no vacía. Como todos los ideales en $\mathbb{Z}$ son principales y $\mathbb{Z}$ es un DFU se tiene que los ideales pedidos son los de la forma:

$$I = \langle 3m^2\ell \rangle, \quad m, \ell \in \mathbb{N}.$$

- (b) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $f^{-1}(f(I)e) = I$.

(c) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $I \subsetneq f^{-1}(f(I)e) \not\subset \langle 1 \rangle$.

Solución: Recordemos que para cada ideal $I \subset R$,

$$(I^e)^c = \bigcup_{s \in S} (I : s).$$

Si $I = (0)$, entonces $(I^e)^c = I$, por lo tanto, podemos suponer que $I = \langle m \rangle$ para algún $m \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. En tal caso:

$$(I^e)^c = \bigcup_{s \in S} (I : s) = \bigcup_n (m : 12^n).$$

Visto así distinguimos dos casos (de nuevo usamos que $\mathbb{Z}$ es DFU):

- i. Si m es coprimo con 3 y 2, entonces $(m : 12^n) = \langle m \rangle$ y en consecuencia, $(I^e)^c = I$, que es lo que se pide en el apartado (b).
- ii. Si no estamos en el caso anterior, como 2 y 3 son irreducibles, necesariamente, $2 \mid m$ o $3 \mid m$. Ahora, por el apartado (a), necesariamente

$$m = 2^s 3^\ell r,$$

con r un entero que no es una unidad, no divisible por 2 ni por 3, $s, \ell \in \mathbb{N}$, siendo alguno de los dos mayor o igual que 1. Para estos valores de m se tiene que $r \in (\langle m \rangle : 12^n) \subset f^{-1}(f(I^e))$ pero $r \notin I$, lo que caracteriza los ideales pedidos en (c).

(d) ¿Cuáles son los ideales primos de $S^{-1}\mathbb{Z}$? ¿Cuáles son los ideales primos de $\mathbb{Z}$ con los que están en correspondencia biyectiva?

Solución: Por la teoría vista en clase, todos los ideales primos de $S^{-1}\mathbb{Z}$ son extendidos de ideales primos de $\mathbb{Z}$ cuya intersección con S es el vacío. Estos son los ideales generados por primos distintos de 2 y 3.

[9.] Sean $\{p_i\}_{i \in I}$ una colección de ideales primos. Demuestra que $S = R \setminus \bigcup_i p_i$ es multiplicativamente cerrado. Demuestra que no todo subconjunto multiplicativamente cerrado $S \subset R$ es el complemento de una unión de ideales primos.

Observación H.3.5. Toma $S = \{6n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{Z}$.

[10.] Se dice que un conjunto multiplicativamente cerrado $S \subset R$ es multiplicativamente saturado si siempre que $s_1 s_2 \in S$ se tiene que $s_1, s_2 \in S$. (Suponemos que S no contiene al elemento 0, lo que en particular garantiza que $R \setminus S \neq \emptyset$.)

(a) Demuestra que si S es multiplicativamente saturado entonces $R \setminus S$ es unión de ideales

primos siguiendo los siguientes pasos:

- i. Demuestra que todas las unidades de R están en S .
- ii. Sea $a \in R \setminus S$. Demuestra que $\langle a \rangle \cap S = \emptyset$.

Solución: Si $b \in \langle a \rangle \cap S$ entonces existe $r \in R$ tal que $b = ra$. Como además $b \in S$ y S es multiplicativamente saturado, entonces $r, a \in S$, lo que contradice la hipótesis sobre a .

- iii. Sea $a \in R \setminus S$. Demuestra que el conjunto $\Sigma := \{I \subset R \text{ ideal} : a \in I, I \cap S = \emptyset\}$ tiene un elemento maximal p .

Observación H.3.6. Se puede usar el Lema de Zorn. Observa que $\Sigma \neq \emptyset$, basta tomar como a un elemento que no esté en S y usar el apartado (ii).

- iv. Demuestra que p es un ideal primo (aunque p sea maximal en Σ no tiene por qué ser maximal en R).

Observación H.3.7. Si elegimos $a, b \notin p$, observa que $(\langle a \rangle + p) \cap S \neq \emptyset$ y $(\langle b \rangle + p) \cap S \neq \emptyset$. Elige $\alpha a + \mu \in (\langle a \rangle + p) \cap S$ y $\beta b + \rho \in (\langle b \rangle + p) \cap S$. ¿Qué sucede si $ab \in p$?

- v. Concluye que $R \setminus S$ es una unión de ideales primos.

Solución: Observa que para cada $a \in R \setminus S$ hay un primo $p \subset R \setminus S$ que lo contiene, por el apartado anterior.

- (b) Sea $S = R \setminus \{\text{divisores de cero de } R, 0\}$. Demuestra que S es multiplicativamente saturado y concluye que el conjunto de los divisores de cero de un anillo se puede escribir como una unión de primos. Comprueba que esto es así en $\mathbb{Z}_{12}$, en $\mathbb{Q}[x, y]/\langle xy \rangle$ y en $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x^2, xy \rangle$.

Solución: En el primer caso, el producto de dos elementos no nulos es cero, $p(x, y) \cdot q(x, y) = 0$ si y sólo si en $\mathbb{Q}[x, y]$, $p(x, y) \cdot q(x, y)$ es divisible por xy , pero este no divide a ninguno de los dos factores. Como $\mathbb{Q}[x, y]$ es un DFU y tanto x como y son irreducibles, esto implica que uno de los factores es necesariamente un múltiplo de xy y el otro es múltiplo de y . Ahora basta leer esta condición en el cociente. Por lo tanto, para el primer anillo los divisores de cero son $\langle x \rangle \cup \langle y \rangle$.

En el segundo anillo, observad que todo elemento de la forma $p(x, y)x + q(x, y)y$ que no sea 0 es un divisor de cero porque $x(p(x, y)x + q(x, y)y) = 0$. Por lo tanto, $\langle x, y \rangle \setminus \{0\}$ está contenido en la unión de los divisores de cero. Afirmamos que esos

son todos. Para probarlo, supongamos que existe un divisor de cero $h(x, y) \notin \langle x, y \rangle$. Existe por tanto $g(x, y) \neq 0$ tal que $h(x, y)g(x, y) = 0$. Levantando esta información en $\mathbb{Q}[x, y]$, $h(x, y)g(x, y) \in \langle x^2, xy \rangle$, $h(x, y) \notin \langle x, y \rangle$ y $g(x, y) \notin \langle x^2, xy \rangle$. En consecuencia, podemos suponer que:

$$h(x, y) = h(0, 0) + \alpha x + xA(x, y) + B(y),$$

con $h(0, 0)$ una constante no nula en $\mathbb{Q}$, α constante, $A(x, y) \in \langle x, y \rangle$, $B(y)$ un polinomio en y con $B(0) = 0$; y, por otro lado,

$$g(x, y) = g(0, 0) + \beta x + xC(x, y) + D(y),$$

donde $g(0, 0)$ y α son constantes, $C(x, y) \in \langle x, y \rangle$ y $D(y)$ es un polinomio que sólo depende de y con $D(0) = 0$. Ahora multiplicamos:

$$h(x, y)g(x, y) = h(0, 0)g(0, 0) + x(\alpha \cdot g(0, 0) + \beta h(0, 0)) + h(0, 0)D(y) + g(0, 0)B(y) + F(x, y),$$

donde $F(x, y) \in \langle x^2, xy \rangle$. Observad que tal y como hemos definido los términos, para que $h(x, y)g(x, y) \in \langle x^2, xy \rangle$ necesitamos que $h(0, 0)g(0, 0) = 0$, por lo que $g(0, 0) = 0$; además $\beta x h(0, 0) = 0$, por lo que $\beta = 0$ y finalmente, $h(0, 0)D(y) = 0$, por lo que $D(y) = 0$, es decir, $g(x, y) \in \langle x^2, xy \rangle$, i.e., $g(x, y) = 0$, lo que es una contradicción.