

Procesos estocásticos. Entrega 1: martingalas y funciones armónicas

Ejercicio 1. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Sea $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ una σ -álgebra. Sea $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -medible y sea $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -independiente. Sea $\varphi: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible Borel, tal que $\mathbb{E}[|\varphi(X, Y)|] < \infty$. Demuestra que

$$\mathbb{E}[\varphi(X, Y) \mid \mathcal{G}] = g(X),$$

donde $g(x) := \mathbb{E}[\varphi(x, Y)]$.

(Pista: recuerda que, si dos variables aleatorias independientes A y B tienen distribuciones μ y ν , respectivamente, entonces la distribución conjunta de (A, B) es la medida producto $\mu \times \nu$.)

Solución: Por unicidad de la esperanza condicional, basta con comprobar dos condiciones:

- (1) Veamos que $g(X)$ es $\mathcal{G}$ -medible y $g(X) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$.

Por hipótesis, tenemos que $\mathbb{E}[|\varphi(X, Y)|] < \infty$, es decir,

$$\mathbb{E}[|\varphi(X, Y)|] = \int_{\Omega} |\varphi(X(\omega), Y(\omega))| d\mathbb{P}(\omega) < \infty.$$

Como $(x, y) \mapsto |\varphi(x, y)|$ es una función medible Borel (por ser la composición de funciones medibles Borel), por el `teo-medida-inducida-integral-fn-medible/teorema 1`, tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |\varphi(x, y)| d\mathbb{P}_{(X, Y)}(x, y) = \int_{\Omega} |\varphi(X(\omega), Y(\omega))| d\mathbb{P}(\omega) < \infty.$$

Es decir, $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_{(X, Y)})$.

Como X es $\mathcal{G}$ -medible e Y es $\mathcal{G}$ -independiente, X e Y son independientes. Entonces, por el `teo-carac-independencia-var-aleatorias-medida-inducida/teorema 1`, $\mathbb{P}_{(X, Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$. Así, $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)$.

Entonces, $\exists A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ tal que $\mathbb{P}_X(A^c) = 0$ y $\forall x \in A: \int_{\mathbb{R}^d} |\varphi(x, y)| d\mathbb{P}_Y(y) < \infty$. Por tanto, $y \mapsto \varphi(x, y)$ está en $\mathcal{L}^1(\mathbb{P}_Y)$ para $\mathbb{P}_X$ -c.t.p. $x \in \mathbb{R}^d$. Entonces, por el

teo-medida-inducida-integral-fn-medible/teorema 1, tenemos que

$$\forall x \in A : g(x) = \mathbb{E}[\varphi(x, Y)] = \int_{\Omega} \varphi(x, Y(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x, y) \, d\mathbb{P}_Y(y).$$

Ahora bien, como $\mathbb{P}_X$ y $\mathbb{P}_Y$ son medidas de probabilidad en $\mathbb{R}^d$, en particular son σ -finitas. Como además $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)$, por el teorema de Fubini-Tonelli, g es $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ -medible y además, $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X)$.

Como X es $\mathcal{G}$ -medible, concluimos que $g(X)$ es $\mathcal{G}$ -medible. Además, por el teo-medida-inducida-in $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X)$ implica que $g(X) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$.

(2) Veamos que para todo $E \in \mathcal{G}$ se cumple $\int_E \varphi(X, Y) \, d\mathbb{P} = \int_E g(X) \, d\mathbb{P}$.

Sea $E \in \mathcal{G}$. Entonces, $\mathbb{1}_E$ es una función $\mathcal{G}$ -medible y, como X también es $\mathcal{G}$ -medible, el par $(X, \mathbb{1}_E) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d \times \{0, 1\}$ es $\mathcal{G}$ -medible. En consecuencia, $(X, \mathbb{1}_E)$ e Y son variables aleatorias independientes, luego por el teo-carac-independencia-var-aleatorias-medida-inducida $\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E), Y} = \mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E)} \otimes \mathbb{P}_Y$.

Ahorrándonos algunos detalles técnicos que resultan fáciles pero tediosos de comprobar, podemos escribir la siguiente cadena de igualdades:

$$\begin{aligned} \int_E \varphi(X, Y) \, d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} \mathbb{1}_E(\omega) \cdot \varphi(X(\omega), Y(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{teo-medida-inducida-integral-fn-medible/teorema 1}}{=} \int_{\mathbb{R}^d \times \{0, 1\} \times \mathbb{R}^d} b \cdot \varphi(x, y) \, d\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E), Y}(x, b, y) \\ &\stackrel{\text{independencia}}{=} \int_{\mathbb{R}^d \times \{0, 1\} \times \mathbb{R}^d} b \cdot \varphi(x, y) \, d(\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E)} \otimes \mathbb{P}_Y)(x, b, y) \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^d \times \{0, 1\}} b \left(\int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x, y) \, d\mathbb{P}_Y(y) \right) d\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E)}(x, b) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d \times \{0, 1\}} b \cdot g(x) \, d\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E)}(x, b) \\ &\stackrel{\text{teo-medida-inducida-integral-fn-medible/teorema 1}}{=} \int_{\Omega} \mathbb{1}_E(\omega) g(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) = \int_E g(X) \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Por unicidad de la esperanza condicional, como $g(X) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ es una variable $\mathcal{G}$ -medible y $\forall E \in \mathcal{G} : \int_E \varphi(X, Y) \, d\mathbb{P} = \int_E g(X) \, d\mathbb{P}$, concluimos que $g(X) = \mathbb{E}[\varphi(X, Y) \mid \mathcal{G}]$ c.s. ■

Ejercicio 2. Sea f una función armónica en $\mathbb{R}^d$. Sea $x \in \mathbb{R}^d$ y sean $\{\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ i.i.d. y uniformemente distribuidas en $\partial B_0(1)$ (la esfera de radio 1 y centro 0). Se define $\{S_n\}_{n \geq 0}$ por la recurrencia

$$S_0 = x, \quad S_n = \xi_n + S_{n-1}.$$

Demuestra que el proceso dado por $X_n := f(S_n)$ es una martingala.

Solución: Tomando $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{F}_n := \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$ y $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : S_n = \xi_n + S_{n-1} = x + \sum_{k=1}^n \xi_k \text{ es una variable aleatoria } \mathcal{F}_n\text{-medible.}$$

Veamos que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

1. Como f es armónica, en particular es continua, luego es medible Borel. Entonces, como $X_n = f(S_n)$ y S_n es $\mathcal{F}_n$ -medible, X_n también es $\mathcal{F}_n$ -medible.
2. Como $S_n = x + \sum_{k=1}^n \xi_k$, dado $\omega \in \Omega$, tenemos que

$$\|S_n(\omega)\| = \left\| x + \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) \right\| \leq \|x\| + \sum_{k=1}^n \|\xi_k(\omega)\| = \|x\| + n.$$

Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N}, \omega \in \Omega : S_n(\omega) \in \overline{B_0}(\|x\| + n)$. Entonces, como f es continua en $\mathbb{R}^d$, es acotada en $\overline{B_0}(\|x\| + n)$, luego

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists M_n > 0 : \forall \omega \in \Omega : |X_n(\omega)| = |f(S_n(\omega))| \leq M_n.$$

En consecuencia, $\mathbb{E}[|X_n|] = \int_{\Omega} |X_n(\omega)| d\mathbb{P}(\omega) \leq M_n < \infty$, es decir, $X_n \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$.

3. Por último, veamos que $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$. Para ello, tras fijar $n \in \mathbb{N}$, vamos a aplicar el ejercicio anterior con $\mathcal{G} = \mathcal{F}_n$, $X = S_n$, $Y = \xi_{n+1}$ y $\varphi(x, y) = f(x + y)$. Comprobemos que se cumplen las hipótesis del ejercicio anterior:

- a) S_n es $\mathcal{F}_n$ -medible por definición de S_n y $\mathcal{F}_n$.
- b) Como las ξ_n son independientes, ξ_{n+1} es independiente de $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$.
- c) Como f es medible Borel, φ también lo es, por ser la composición de funciones medibles Borel.
- d) $\mathbb{E}[|f(S_n + \xi_{n+1})|] = \mathbb{E}[|f(S_{n+1})|] = \mathbb{E}[|X_{n+1}|] < \infty$ por el punto (2) anterior.

Por tanto, por el ejercicio anterior, tenemos que

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[f(S_n + \xi_{n+1}) | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[\varphi(X, Y) | \mathcal{G}] = g(X) = g(S_n),$$

donde $g(x) = \mathbb{E}[\varphi(x, Y)] = \mathbb{E}[f(x + \xi_{n+1})]$.

Por último, como f es armónica, aplicando la propiedad de la media con $r = 1$, como ξ_{n+1} está uniformemente distribuida en $\partial B_0(1)$, tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \mathbb{E}[f(x + \xi_{n+1})] = \int_{\Omega} f(x + \xi_{n+1}(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \stackrel{\text{teo-medida-inducida-integral-fn-medible/teorema 1}}{=} \int_{\partial B_0(1)} f(x + y) \, d\mathbb{P}_{\xi_{n+1}}(y) \\ &= \frac{1}{\omega_d} \int_{\partial B_0(1)} f(x + y) \, d\sigma(y) = \frac{1}{\omega_d 1^{d-1}} \int_{\partial B(x,1)} f(y) \, d\sigma(y) \stackrel{\text{teo-propiedad-media-fn-armonica/teorema 1}}{=} f(x). \end{aligned}$$

Por tanto, $g = f$ y, en particular, $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = g(S_n) = f(S_n) = X_n$.

Como se cumplen las tres condiciones, concluimos que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$. ■