

Condiciones necesarias y suficientes para ser base de alguna topología

Proposición 1. Sea $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$, entonces

$\exists \mathcal{T}$ topología de $X : \mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T} \iff \mathcal{B}$ satisface las siguientes propiedades:

- (a) $\forall x \in X : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x$.
- (b) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$.

Demostración: Comprobemos ambas direcciones de la doble implicación.

$\Rightarrow$ Suponemos que $\mathcal{B}$ es una base de una topología $\mathcal{T}$ de X .

1. Como $\mathcal{T}$ es una topología, $X \in \mathcal{T}$ y como $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$, $\exists \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}$ tales que $X = \bigcup_{i \in I} B_i$. Sea $x \in X$ arbitrario, entonces $x \in X = \bigcup_{i \in I} B_i$

$$\implies \exists i_0 \in I : x \in B_{i_0} \in \mathcal{B} \implies \forall x \in X : \exists B_x = B_{i_0} \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset X.$$

2. Sea $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$ arbitrarios $\mathcal{B} \subset \implies B_1, B_2 \in \mathcal{T}$.

$$\implies x \in B_1 \cap B_2 = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \implies \exists \beta \in I : x \in B_\beta \in \mathcal{B} \subset \mathcal{T}.$$

Entonces $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x = B_\beta \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$.

$\Leftarrow$ Suponemos que $\mathcal{B}$ satisface las propiedades (a) y (b) y queremos ver que $\mathcal{B}$ es base de una topología $\mathcal{T}$ de X .

1. Identificamos $\mathcal{T}$ como el conjunto de todas las uniones de elementos de $\mathcal{B}$.

$$\implies \mathcal{T} = \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset G\} \text{ (la unicidad para más tarde).}$$

2. Comprobamos que $\mathcal{T}$ es una topología de X .

- i) $\emptyset \in \mathcal{T} \wedge X \in \mathcal{T}$ porque $\forall x \in X : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset X$.

ii) Sean $G_1, G_2 \in \mathcal{T}$, veamos que $G = G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.

$$\begin{aligned}\forall x \in G : x \in G_1 \wedge x \in G_2 &\implies \exists B_1, B_2 \in \mathcal{B} : x \in B_1 \subset G_1 \wedge x \in B_2 \subset G_2 \\ &\implies x \in B_1 \cap B_2 \subset G_1 \cap G_2 = G\end{aligned}$$

Ahora por la propiedad (b) $\exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2 \subset G \implies G = G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.

iii) Sean $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}$, queremos ver que $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$.

Sea $x \in G$ arbitrario $\implies \exists \beta \in I : x \in G_\beta \in \mathcal{T}$.

Ahora por la definición de $\mathcal{T}$: $\exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G_\beta \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha = G \in \mathcal{T}$.

3. Comprobamos que $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$, que es inmediato por la definición de $\mathcal{T}$ y la caracterización de una base para una topología dada.

$$\implies \mathcal{T} = \{\text{uniones de elementos de } \mathcal{B}\} \implies \mathcal{T} \text{ es } \text{única}.$$

Si $\mathcal{B}$ también es una base para otra topología $\mathcal{T}'$, entonces $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$ de forma inmediata. ■

Referenciado en

- Topología producto