

---

# LÓGICA MATEMÁTICA

---

Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Arturo Rodríguez Fanlo  
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid  
Segundo cuatrimestre

27 de enero de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Teoría de modelos</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1.1      | Lenguajes . . . . .                                        | 1         |
| 1.1.1    | Lenguajes y variables . . . . .                            | 1         |
| 1.1.2    | Términos y fórmulas . . . . .                              | 3         |
| 1.1.3    | Notación polaca y notación estándar . . . . .              | 4         |
| 1.1.4    | Tipos de variables en términos y fórmulas . . . . .        | 9         |
| 1.1.5    | Substitución de variables . . . . .                        | 11        |
| 1.2      | Estructuras . . . . .                                      | 15        |
| 1.2.1    | Morfismos . . . . .                                        | 16        |
| 1.2.2    | Interpretación de términos . . . . .                       | 22        |
| 1.2.3    | Satisfacción de fórmulas . . . . .                         | 25        |
| 1.2.4    | Preservación de fórmulas . . . . .                         | 28        |
| 1.2.5    | Fórmulas prenexas . . . . .                                | 30        |
| 1.3      | Teorías . . . . .                                          | 32        |
| 1.4      | Construcción de estructuras . . . . .                      | 35        |
| 1.4.1    | Producto cartesiano . . . . .                              | 39        |
| 1.5      | Subestructuras elementales . . . . .                       | 42        |
| 1.6      | Ultra productos . . . . .                                  | 47        |
| 1.7      | Resultados fundamentales de la teoría de modelos . . . . . | 49        |
| 1.7.1    | Compacidad . . . . .                                       | 49        |
| 1.7.2    | Tipos . . . . .                                            | 51        |
| 1.7.3    | Categoricidad . . . . .                                    | 52        |
| <b>H</b> | <b>Hojas de ejercicios</b>                                 | <b>55</b> |
| H.1      | Hoja 1: Lenguajes y estructuras . . . . .                  | 55        |
| H.2      | Hoja 2: Construcción de estructuras . . . . .              | 71        |



# 1. Teoría de modelos

## 1.1 Lenguajes

### 1.1.1 Lenguajes y variables

**Definición 1.1.1 (Lenguaje de primer orden).**  $L$  es un lenguaje de primer orden (FOL)

$\iff L$  es un conjunto de símbolos tal que existe una partición de  $L$  en:

- Símbolos formales  $\{\dot{=}, \top, \neg, \wedge, \exists\}$ .
- Símbolos de función:  $F = \bigcup_{k=0}^{\infty} F_k$ , donde  $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : F_k$  es un conjunto de símbolos de función de aridad  $k$ .
- Símbolos de relación:  $R = \bigcup_{k=0}^{\infty} R_k$ , donde  $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : R_k$  es un conjunto de símbolos de relación de aridad  $k$ .

**Definición 1.1.2 (Constante).** Sea  $L$  un FOL,  $c \in L$  es una constante  $\iff c$  es un símbolo de función de aridad 0 en  $L$ .

**Definición 1.1.3 (Proposición).** Sea  $L$  un FOL,  $p \in L$  es una proposición  $\iff p$  es un símbolo de relación de aridad 0 en  $L$ .

**Definición 1.1.4 (Signatura).** Sea  $L$  un FOL, la signatura de  $L$  es  $\bigsqcup_k F_k \sqcup \bigsqcup_k R_k \subset L$ .

*Observación 1.1.5.* Un lenguaje de primer orden  $L$  queda completamente determinado por su signatura. Por ello, en general, se identifica un lenguaje con su signatura.

**Ejemplos 1.1.1 (de lenguajes de primer orden).**

- 1 Lenguaje vacío: la signatura es vacía, es decir, solo tenemos los símbolos formales.
- 2 Lenguaje de grupos: viene dado por la signatura  $L_{\text{gr}} = \{\cdot, 1, \cdot^{-1}\}$  donde  $\cdot$  es un símbolo de función binario, 1 es una constante y  $\cdot^{-1}$  es un símbolo de función unario.

Alternativamente, el lenguaje aditivo de grupos es  $L_{\text{gr}}^+ = \{+, 0, -\}$ .

- 3 El lenguaje de anillos (y cuerpos) es  $L_{\text{a}} = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$  donde  $+$  y  $\cdot$  son símbolos de función binarios,  $-$  es un símbolo de función unario y 0 y 1 son constantes.
- 4 El lenguaje de órdenes es  $L_{<} = \{<\}$  donde  $<$  es un símbolo de relación binario.

- [5] El lenguaje de grafos es  $L_E = \{E\}$  donde  $E$  es un símbolo de relación binario.
- [6] El lenguaje de equivalencia es  $L_{\sim} = \{\sim\}$  donde  $\sim$  es un símbolo de relación binario.
- [7] Dado un cuerpo  $K$ , el lenguaje de  $K$ -espacios vectoriales es  $L_{K\text{-vec}} = \{+, -, 0\} \cup \{k \cdot\}_{k \in K}$  donde  $+$  es un símbolo de función binario,  $-$  es un símbolo de función unario,  $0$  es una constante y  $\forall k \in K : k \cdot$  es un símbolo de función unario.
- [8] El lenguaje de la aritmética es  $L_{\mathbb{N}} = \{\cdot, +, S, 0, <\}$  donde  $\cdot$  y  $+$  son símbolos de función binarios,  $S$  es un símbolo de función unario,  $0$  es una constante y  $<$  es un símbolo de relación binario.
- [9] El lenguaje de la aritmética con exponencial es la extensión de  $L_{\mathbb{N}}$  dada por la signatura  $L_{\mathbb{N}, \exp} = \{\cdot, +, \cdot, S, 0, <\}$  donde  $\cdot$  es un símbolo de función binario (elevar a la potencia).
- [10] El lenguaje de los reales es el lenguaje extensión del lenguaje de anillos dado por la signatura  $L_{\mathbb{R}} = \{+, \cdot, -, 0, 1, <\}$  donde  $<$  es un símbolo de relación binario.
- [11] El lenguaje de conjuntos es  $L_{\in} = \{\in\}$  donde  $\in$  es un símbolo de relación binario.

Es importante remarcar que los elementos de un lenguaje son solo símbolos sin significado alguno (excepto por la distinción formal entre el tipo de símbolo y su aridad). Dicho esto, es evidente que al construir un lenguaje tenemos en mente un uso y, por tanto, elegimos los símbolos de acuerdo con las interpretaciones previstas. Sin embargo, debemos tener presente que estas pretendidas interpretaciones (las cuales definiremos más adelante al hablar de estructuras) no están en el lenguaje en sí mismo.

Los lenguajes  $L_{<}$ ,  $L_E$ ,  $L_{\sim}$  y  $L_{\in}$  son esencialmente idénticos. En efecto, aunque implícitamente tenemos en mente utilizar  $L_{<}$  para órdenes,  $L_E$  para grafos,  $L_{\sim}$  para relaciones de equivalencia y  $L_{\in}$  para conjuntos, los lenguajes en sí mismos no indican que  $<$  sea un orden,  $E$  sea una relación de grafo,  $\sim$  sea una relación de equivalencia o  $\in$  sea la relación de pertenencia. En lo relativo al lenguaje, solo tenemos símbolos formales sin significado.

**Definición 1.1.6 (Conjunto de variables).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden,  $X$  es un conjunto de variables para  $L \iff X$  es un conjunto disjunto de  $L$ .

- A cada subconjunto de  $X$  se le llama **variable**.
- A cada variable se le dice **simple** si es un conjunto unitario.

### 1.1.2 Términos y fórmulas

**Definición 1.1.7 (Palabra).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden con variables  $X$ , una palabra en  $L$  es una tupla finita cuyos elementos son símbolos de  $L \cup X$ .

**Definición 1.1.8 (Término).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden con variables  $X$ , los términos de  $L$  son las palabras definidas inductivamente como sigue:

- Caso 0:  $\text{Ter}_0(L; X)$  es el conjunto de las constantes y variables simples.
- Caso  $n+1$ :  $\text{Ter}_{n+1}(L; X)$  es el conjunto que incluye a  $\text{Ter}_n(L; X)$  y contiene las palabras de la forma  $f t_1 \dots t_k$  donde  $f$  es un símbolo de función  $k$ -ario y  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}_n(L; X)$ .

El conjunto de términos de  $L$  se denota por  $\text{Ter}(L; X) := \bigcup_{n=0}^{\infty} \text{Ter}_n(L; X)$ .

**Definición 1.1.9 (Fórmula).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden con variables  $X$ , una fórmula de  $L$  es una palabra en  $L \cup X$  definida inductivamente como sigue:

- Caso 0:  $\text{For}_0(L; X)$  es el conjunto de las palabras de la forma  $R t_1 \dots t_m$  donde  $R$  es un símbolo de relación de aridad  $m$  y  $t_1, \dots, t_m \in \text{Ter}(L; X)$ . Además, incluye la palabra  $\top$  y las palabras de la forma  $t_1 t_2$  donde  $t_1, t_2 \in \text{Ter}(L; X)$ .
- Caso  $n+1$ :  $\text{For}_{n+1}(L; X)$  es el conjunto que incluye a  $\text{For}_n(L; X)$  y contiene las palabras de la forma:
  - (i)  $\wedge \varphi_1 \varphi_2$  donde  $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{For}_n(L; X)$ .
  - (ii)  $\neg \varphi$  donde  $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$ .
  - (iii)  $\exists x \varphi$  donde  $x$  es una variable simple y  $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$ .

El conjunto de fórmulas de  $L$  se denota por  $\text{For}(L; X) := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{For}_n(L; X)$ .

**Ejemplo 1.1.2 (de fórmula).** En  $L_{\mathbb{R}}$ ,  $\exists x \exists y \wedge \neg \wedge = \cdot x x y < x 0 \top$  es una fórmula. Normalmente, se escribiría como  $\exists x, y : (\neg(x^2 = y \wedge x < 0) \wedge \top)$ .

*Observación 1.1.10.* Si consideramos el caso con  $X = \emptyset$  y  $L$  un lenguaje proposicional (es decir, que su signatura solo contiene símbolos de relación 0-arios), la lógica de primer orden con  $L$  se reduce a la lógica proposicional, es decir,  $\text{Ter}(L; X) = \emptyset$  y  $\text{For}(L; X)$  son las fórmulas en lógica proposicional. De este modo, la lógica de primer orden es una generalización de la lógica proposicional, también llamada lógica de orden cero.

**Notación.** Toda biyección entre dos conjuntos de variables induce una biyección entre

los respectivos conjuntos de términos y fórmulas. Además, como los términos y las fórmulas utilizan solo un número finito de variables, en general podemos asumir que trabajamos con un número numerable de variables. En consecuencia, a la hora de definir los términos y fórmulas es esencialmente irrelevante la forma concreta del conjunto de variables. Es por ello que, salvo que sea estrictamente necesario, evitaremos especificar explícitamente la familia de variables  $X$  que utilizamos. Por tanto, a partir de ahora, normalmente escribiremos  $\text{Ter } L := \text{Ter}(L, X)$  y  $\text{For } L := \text{For}(L, X)$ .

### 1.1.3 Notación polaca y notación estándar

Por simplicidad, usamos solo los símbolos  $\top$  (tautología),  $\neg$  (negación),  $\wedge$  (conjunción) y  $\exists$  (existe) para las definiciones. Dicho esto, en la práctica, también usamos los símbolos  $\perp$  (falso),  $\vee$  (disyunción),  $\rightarrow$  (condicional),  $\leftrightarrow$  (equivalencia) y  $\forall$  (universal). Estos símbolos los introducimos como abreviaturas del siguiente modo: Escribimos

- $\perp$  para  $\neg\top$ ,
- $\forall\varphi\psi$  para  $\neg\wedge\neg\varphi\neg\psi$ ,
- $\rightarrow\varphi\psi$  para  $\vee\neg\varphi\psi$ , es decir, para  $\neg\wedge\varphi\neg\psi$ ,
- $\leftrightarrow\varphi\psi$  para  $\wedge\rightarrow\varphi\psi\rightarrow\psi\varphi$ , es decir, para  $\wedge\neg\wedge\varphi\neg\psi\neg\wedge\psi\neg\varphi$ ,
- $\forall x\varphi$  para  $\neg\exists x\neg\varphi$ .

Por otro lado, en las definiciones formales de términos y fórmulas estamos utilizando la notación polaca (que escribe las funciones, relaciones y conectivas como prefijos). Esta notación tiene la virtud de evitar el uso de paréntesis, pero resulta poco legible para los humanos. Para facilitar la lectura utilizamos la notación estándar: Escribimos

- $f(t_1, \dots, t_m)$  para  $f t_1 \dots t_m$  y  $(t_1 f t_2)$  para  $f t_1 t_2$  si  $f$  es binario;
- $R(t_1, \dots, t_m)$  para  $R t_1 \dots t_m$  y  $(t_1 R t_2)$  para  $R t_1 t_2$  si  $R$  es binario;
- $(t_1 \doteq t_2)$  para  $\doteq t_1 t_2$  y usamos  $=$  en lugar de  $\doteq$  si no hay ambigüedad;
- $(\varphi \wedge \psi)$  para  $\wedge\varphi\psi$ ,  $(\varphi \vee \psi)$  para  $\vee\varphi\psi$ ,  $(\varphi \rightarrow \psi)$  para  $\rightarrow\varphi\psi$  y  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  para  $\leftrightarrow\varphi\psi$ ;
- $(\exists x_1, \dots, x_n \varphi)$  para  $\exists x_1 \dots \exists x_n \varphi$  y  $(\forall x_1, \dots, x_n \varphi)$  para  $\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi$ ; y
- $\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i$  para  $\wedge \dots \wedge \varphi_1 \dots \varphi_n$  y  $\bigvee_{i=1}^n \varphi_i$  para  $\vee \dots \vee \varphi_1 \dots \varphi_n$ .

La notación estándar requiere de paréntesis para evitar la ambigüedad. Por ejemplo,  $p \vee q \wedge r$  puede ser  $(p \vee q) \wedge r$  o  $p \vee (q \wedge r)$ . Dicho esto, omitimos los paréntesis siempre que la omisión



no dé lugar a ambigüedades. En este sentido, para reducir al mínimo el uso de paréntesis, seguiremos el convenio de prioridad  $\neg \wedge \exists$ , según el cual primero actúa  $\neg$ , luego actúan las conectivas binarias ( $\wedge, \vee, \rightarrow$  o  $\leftrightarrow$ ), y, por último, los cuantificadores ( $\exists$  o  $\forall$ ). De este modo, para la fórmula  $\exists x ((\neg\varphi) \wedge \psi)$ , podemos escribir simplemente  $\exists x \neg\varphi \wedge \psi$ .

### Ejemplos 1.1.3 (de fórmulas y términos).

- [1] Todo elemento de  $\mathbb{N} \cup \{0\}$  se puede identificar con un término de  $L_{\mathbb{N}}$ . En efecto, 0 lo podemos identificar con su correspondiente constante  $\underline{0}$ . Por otro lado, dado  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos el término asociado  $\underline{n} := S.^n.S\underline{0}$ . Añadimos aquí la línea inferior para remarcar la diferencia entre el término del lenguaje  $n$  y el número natural  $n$  correspondiente.

- [2] Al igual que en el ejemplo anterior, todo entero  $a \in \mathbb{Z}$  se puede identificar con un término  $\underline{a}$  de  $L_{\mathbb{a}}$ . En efecto, 0 lo identificamos con la constante  $\underline{0}$ . Para  $a > 0$ , tomamos  $\underline{a} := +.^{a-1}.\underline{1}$ . Para  $a < 0$ , tomamos  $\underline{a} := -|a|$ .

- [3] En el lenguaje vacío, tenemos la fórmula  $\varphi_{\leq n} = \exists x_1 \dots x_n \forall y \bigvee_{i=1}^n y = x_i$ . Esta fórmula “expresa” que hay como mucho  $n$  elementos.

Por otro lado, tenemos también la fórmula  $\varphi_{\geq n} = \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j$ , que “expresa” que hay al menos  $n$  elementos.

La fórmula  $\varphi_{=n} = \varphi_{\leq n} \wedge \varphi_{\geq n}$  “expresa” que hay exactamente  $n$  elementos.

- [4] En el lenguaje  $L_{\sim}$ , los axiomas que definen relación de equivalencia son fórmulas:

- (i) Reflexividad:  $\forall x \ x \sim x$ .
- (ii) Simetría:  $\forall x, y \ x \sim y \leftrightarrow y \sim x$ .
- (iii) Transitividad:  $\forall x, y, z \ (x \sim y \wedge y \sim z) \rightarrow x \sim z$ .

De modo similar, los axiomas que definen orden, grafo, grupo, anillo o cuerpo son todos fórmulas en los correspondientes lenguajes.

- [5] En el lenguaje de grafos,  $\Delta(x, y, z) = xRy \wedge yRz \wedge zRx$  es una fórmula, que “indica” que  $x$ ,  $y$  y  $z$  forman un triángulo. De este modo, la fórmula  $\neg \exists x, y, z \ \Delta(x, y, z)$  “expresa” que no hay triángulos.
- [6] Para  $K$ -espacios vectoriales, la expresión  $\forall \lambda \in K \ \forall x, y \ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$  no es una fórmula en el lenguaje de  $K$ -espacios vectoriales. En efecto,  $\forall \lambda \in K$  cuantifica en el cuerpo  $K$ , lo cual no está contemplado en el lenguaje. Por el contrario, la expresión  $\forall x, y \ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$  sí es una fórmula en el lenguaje de  $K$ -espacios vectoriales.

- [7] La expresión  $\exists n \in \mathbb{N} x^n = 1$  se utiliza en teoría de grupos para indicar que  $x$  es un elemento de torsión. Sin embargo, esta expresión no es una fórmula en el lenguaje de grupos. En efecto,  $\exists n \in \mathbb{N}$  cuantifica en el conjunto de los números naturales, lo cual no está contemplado en el lenguaje  $L_{\text{gr}}$ .
- [8] La expresión  $\forall P (P(0) \wedge \forall n (P(n) \rightarrow P(n+1))) \rightarrow \forall n P(n)$ , que define el principio de inducción en  $\mathbb{N}$ , no es una fórmula en el lenguaje de la aritmética. En efecto,  $P$  es una variable que denota una relación unaria en  $\mathbb{N}$  (subconjunto de  $\mathbb{N}$ ) y el primer cuantificador  $\forall P$  cuantifica sobre todas las posibles relaciones unarias (subconjuntos de  $\mathbb{N}$ ). En lógica primer orden, los cuantificadores solo pueden cuantificar sobre variables que indican elementos.

### 1.1.3.1 Complejidad

**Definición 1.1.11 (Complejidad).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden, y sea  $t \in \text{Ter } L$ ,  $\chi(t)$  es la complejidad de  $t \iff \chi(t) = \min\{n \in \mathbb{N} : t \in \text{Ter}_n L\}$ .

Sea  $\varphi \in \text{For } L$ ,  $\chi(\varphi)$  es la complejidad de  $\varphi \iff \chi(\varphi) = \min\{n \in \mathbb{N} : \varphi \in \text{For}_n L\}$

A priori, es posible que una fórmula (o término) se pueda obtener de dos formas distintas a partir de fórmulas (o términos) de menor complejidad. Es decir, en principio, podría darse el caso de que las fórmulas (o los términos) sean ambiguos. Por ejemplo, en notación estándar sin paréntesis, la palabra  $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \vee \varphi_3$  se puede obtener de dos formas distintas como “ $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \vee \varphi_3$ ” o como “ $\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \vee \varphi_3)$ ” (es decir, usando primero  $\wedge$  y después  $\vee$ , o usando primero  $\vee$  y después  $\wedge$ ).

Del mismo modo, conviene notar que, en principio, la complejidad de los términos y las fórmulas no está unívocamente definida, es decir, en caso de existir ambigüedades, podría darse la situación de que una fórmula (o término) se pueda obtener de dos formas distintas como fórmula (o término) de complejidad distinta. Por ejemplo, con notación estándar sin paréntesis, la fórmula  $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3 \wedge \varphi_4$  puede corresponderse con la fórmula  $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \wedge (\varphi_3 \wedge \varphi_4)$ , de complejidad 3, o con la fórmula  $\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge \varphi_4))$ , de complejidad 4.

A continuación vamos a demostrar que este no es el caso en notación polaca, es decir, que no existen ambigüedades en las fórmulas y los términos tal y como los hemos definido.

**Lema 1.1.1.** *Sea  $L$  un lenguaje de primer orden,  $\eta_1, \dots, \eta_n$  y  $\eta'_1, \dots, \eta'_m$  todos términos o todas fórmulas. Entonces, las palabras  $\eta_1 \dots \eta_n$  y  $\eta'_1 \dots \eta'_m$  son iguales si y solo si  $n = m$  y  $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$ .*

**Demostración:** La implicación de derecha a izquierda es evidente. Demostramos la implicación de izquierda a derecha.

Tenemos que  $\eta_1 \dots \eta_n = \eta'_1 \dots \eta'_m$ . Sin pérdida de generalidad, asumimos que  $m \geq n$ . Evidentemente, es suficiente demostrar que  $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$ , pues en tal caso  $m = n$ . Supongamos por contradicción que  $\eta_i \neq \eta'_i$  para algún  $i \in \{1, \dots, n\}$  y tomamos  $k = \min\{i \in \mathbb{N}_n : \eta_i \neq \eta'_i\}$ . Entonces, en particular,  $\eta_1 \dots \eta_{k-1} = \eta'_1 \dots \eta'_{k-1}$ , luego eliminando los símbolos iniciales, tenemos que  $\eta_k \dots \eta_n = \eta'_k \dots \eta'_m$ .

Si  $|\eta_k| > |\eta'_k|$  (donde  $|\cdot|$  indica la longitud de la palabra), eliminando los símbolos finales, tenemos que  $\eta_k = \eta'_k \zeta$  con  $\zeta$  una palabra no vacía. Simétricamente, si  $|\eta'_k| > |\eta_k|$ , tenemos que  $\eta'_k = \eta_k \zeta$  para una palabra  $\zeta$  no vacía. En consecuencia, es suficiente demostrar lo siguiente:

**Afirmación:** Ningún fragmento inicial propio de un término es un término. Ningún fragmento inicial propio de una fórmula es una fórmula.

- (a) Términos: Sea  $\eta$  un término y  $\eta = \eta' \zeta$  con  $\eta'$  un término. Demostramos por inducción en la longitud de  $\eta$  que  $\eta = \eta'$  y  $\zeta = \emptyset$ . Si  $|\eta| = 1$ , como  $\eta'$  es un término, tenemos que  $1 \leq |\eta'| \leq |\eta| = 1$ , luego  $|\eta'| = |\eta| = 1$  y  $|\zeta| = 0$ .

Supongamos que  $|\eta| = l > 1$  y se cumple para todo término de longitud menor a  $l$ . Como  $|\eta| > 1$ , tenemos que  $\eta = f t_1 \dots t_k$  para cierto símbolo de función  $f$  de aridad  $k$  ( $k \neq 0$ ) y ciertos términos  $t_1, \dots, t_k$ . Como  $\eta = \eta' \zeta$ , concluimos que el primer símbolo de  $\eta'$  es  $f$ . Como  $\eta'$  es un término, tenemos que  $\eta' = f t'_1 \dots t'_k$  para ciertos términos  $t'_1, \dots, t'_k$ . Eliminando el primer símbolo, obtenemos que  $t_1 \dots t_k = t'_1 \dots t'_k \zeta$ .

Supongamos que existe  $i$  tal que  $t_i \neq t'_i$ . Tomamos  $m := \min\{i : t_i \neq t'_i\}$ . En tal caso, como  $t_1 \dots t_{m-1} = t'_1 \dots t'_{m-1}$ , eliminando los símbolos iniciales, tenemos que  $t_m \dots t_k = t'_m \dots t'_k \zeta$ . Si  $|t_m| > |t'_m|$ , entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos  $t_m = t'_m \zeta'$  con cierta palabra  $\zeta'$ . Ahora bien,  $|t_m| < l$ , luego  $\zeta' = \emptyset$  y  $t_m = t'_m$  por hipótesis de inducción. Si por el contrario  $|t_m| < |t'_m|$ , entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos  $t'_m = t_m \zeta'$  con cierta palabra  $\zeta'$ . Como  $|t'_m| < l$ , concluimos igualmente que  $\zeta' = \emptyset$  y  $t_m = t'_m$ . En ambos casos, hemos llegado a una contradicción con  $t_m \neq t'_m$ . Por tanto,  $t_1 = t'_1, \dots, t_k = t'_k$ .

Entonces, como  $\eta = f t_1 \dots t_k = \eta' \zeta$  y  $\zeta = \emptyset$ .

- (b) Fórmulas: Sea  $\eta$  una fórmula y  $\eta = \eta' \zeta$  con  $\eta'$  una fórmula. Demostramos por inducción en la longitud de  $\eta$  que  $\eta = \eta'$  y  $\zeta = \emptyset$ . Si  $|\eta| = 1$ , como  $\eta'$  es una fórmula, tenemos que  $0 < |\eta'| \leq |\eta| = 1$ , luego  $|\eta'| = |\eta| = 1$  y  $|\zeta| = 0$ .

Supongamos que  $|\eta| = l > 1$  y se cumple para toda fórmula de longitud menor a  $l$ .

Consideremos primero el caso de fórmulas de complejidad 0. Digamos que  $\eta = Rt_1 \dots t_m$  con  $R$  símbolo de relación  $m$ -ario ( $\doteq$  y  $m = 2$ ). Como  $\eta = \eta'\zeta$ , concluimos que el primer símbolo de  $\eta'$  es  $R$ . Como  $\eta'$  es una fórmula, tenemos que  $\eta' = Rt'_1 \dots t'_m$ . Entonces,  $t_1 \dots t_m = t'_1 \dots t'_m \zeta$ . Ahora bien, por el caso de términos ya demostrado, obtenemos que  $t_1 = t'_1, \dots, t_m = t'_m$  y  $\zeta = \emptyset$ . Por tanto,  $\eta = \eta'$ .

Consideremos  $\eta = \neg\varphi$ . Como  $\eta = \eta'\zeta$ , concluimos que el primer símbolo de  $\eta'$  es  $\neg$ . Por tanto, como  $\eta'$  es una fórmula,  $\eta' = \neg\phi$  con  $\phi$  fórmula. Entonces,  $\varphi = \phi\zeta$  con  $|\varphi| < l$ . Entonces, por hipótesis de inducción,  $\varphi = \phi$  y  $\zeta = \emptyset$ , luego  $\eta = \eta'$ .

Consideremos  $\eta = \exists x \varphi$ . Como  $\eta = \eta'\zeta$ , concluimos que los dos primeros símbolos de  $\eta'$  son  $\exists x$ . Por tanto, como  $\eta'$  es una fórmula,  $\eta' = \exists x \phi$  con  $\phi$  fórmula. Entonces,  $\varphi = \phi\zeta$  con  $|\varphi| < l$ . Entonces, por hipótesis de inducción,  $\varphi = \phi$  y  $\zeta = \emptyset$ , luego  $\eta = \eta'$ .

Finalmente, consideremos  $\eta = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ . Como  $\eta = \eta'\zeta$ , concluimos que el primer símbolo de  $\eta'$  es  $\wedge$ . Por tanto, como  $\eta'$  es una fórmula,  $\eta' = \wedge\phi_1\phi_2$ . O bien  $|\varphi_1| \geq |\phi_1|$  o  $|\varphi_1| \leq |\phi_1|$ . Eliminando los símbolos finales, tenemos que  $\varphi_1 = \phi_1\zeta'$  o  $\phi_1 = \varphi_1\zeta'$  para alguna palabra  $\zeta'$ . Como  $|\varphi_1| < l$  y  $|\phi_1| < l$ , concluimos por hipótesis de inducción que  $\varphi_1 = \phi_1$ . Ahora, como  $\varphi_2 = \phi_1\phi_2\zeta$ , eliminando los símbolos iniciales, tenemos que  $\varphi_2 = \phi_2\zeta$ . Como  $|\varphi_2| < l$ , concluimos que  $\varphi_2 = \phi_2$  y  $\zeta = \emptyset$  por hipótesis de inducción. En consecuencia,  $\eta = \eta'$  y  $\zeta = \emptyset$ . ■

**Teorema 1.1.2 (Lectura única).** *Sea  $L$  un lenguaje de primer orden.*

- (1) *Sea  $t$  un término. Entonces, existen  $u$  y  $t_1, \dots, t_k$  únicos con  $t = ut_1 \dots t_k$  tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
  - (a)  *$u$  es una constante y  $k = 0$ .*
  - (b)  *$u$  es una variable simple y  $k = 0$ .*
  - (c)  *$u$  es un símbolo de función de aridad  $k$  (con  $k \neq 0$ ) y  $t_1, \dots, t_k$  son términos.*
- (2) *Sea  $\varphi$  una fórmula. Entonces, existen  $u$  y  $\eta_1, \dots, \eta_m$  únicos con  $\varphi = u\eta_1 \dots \eta_m$  tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
  - (a)  *$u$  es un símbolo de relación de aridad  $m$  y  $\eta_1, \dots, \eta_m$  son términos (incluyendo  $\doteq$  y  $\top$  como símbolos de relación formales de aridades 2 y 0 respectivamente).*

- (b)  $u = \neg$ ,  $m = 1$  y  $\eta_1$  es una fórmula.
- (c)  $u = \wedge$ ,  $m = 2$  y  $\eta_1, \eta_2$  son fórmulas.
- (d)  $u = \exists$ ,  $m = 2$ ,  $\eta_1$  es una variable simple y  $\eta_2$  es una fórmula.

**Demostración:** En efecto, si  $\eta = u\eta_1 \dots \eta_m = u'\eta'_1 \dots \eta'_k$ , como  $u$  y  $u'$  son ambos el primer símbolo, tenemos que  $u = u'$ . Ahora, tenemos que  $\eta_1 \dots \eta_m = \eta'_1 \dots \eta'_k$ . Por tanto, por Lema 1.1.1,  $m = k$  y  $\eta_i = \eta'_i$  para cada  $i$ . ■

### 1.1.4 Tipos de variables en términos y fórmulas

**Definición 1.1.12 (Aparición).** Sean  $\zeta, \zeta'$  palabras, decimos que  $\zeta'$  aparece en  $\zeta$

$$\iff \exists 0 \leq i_0 \leq |\zeta| : \forall j \in \mathbb{N}_{|\zeta'|} : \zeta[i_0 + j] = \zeta'[j].$$

Una aparición de  $\zeta'$  en  $\zeta$  es un  $i_0$  tal que  $\forall j \in \mathbb{N}_{|\zeta'|} : \zeta[i_0 + j] = \zeta'[j]$ .

**Definición 1.1.13.** Sean  $s, t$  términos,  $s$  es un **subtérmino** de  $t \iff s$  aparece en  $t$ .

**Definición 1.1.14.** Sean  $\varphi, \psi$  fórmulas,  $\varphi$  es una **subfórmula** de  $\psi \iff \varphi$  aparece en  $\psi$ .

**Definición 1.1.15.** Sea  $t$  un término y  $x$  una variable simple.

- (i)  $x$  es una **variable real** de  $t \iff x$  aparece en  $t$ .
- (ii)  $x$  es una **variable ficticia** de  $t \iff x$  no aparece en  $t$ .

**Definición 1.1.16.** Sea  $\varphi$  una fórmula y  $x$  una variable simple que aparece en  $\varphi$ .

- (i) Una aparición de  $x$  en  $\varphi$  es una **aparición libre**  $\iff$  no está contenida en una subfórmula de la forma  $\exists x \psi$ .
- (ii) Una aparición de  $x$  en  $\varphi$  es una **aparición ligada**  $\iff$  está contenida en una subfórmula  $\psi$  tal que  $\exists x \psi$  es una subfórmula de  $\varphi$ .

**Definición 1.1.17.** Sea  $x$  una variable simple que aparece en una fórmula  $\varphi$ .

- (i)  $x$  es una **variable libre** de  $\varphi \iff x$  tiene al menos una aparición libre en  $\varphi$ .
- (ii)  $x$  es una **variable ligada** de  $\varphi \iff x$  no tiene apariciones libres en  $\varphi$ .

Es decir,  $x$  es una variable ligada de  $\varphi \iff x$  no aparece en  $\varphi$  o todas sus apariciones en  $\varphi$  son apariciones ligadas.

#### Ejemplos 1.1.4 (de apariciones y variables libres o ligadas).

- [1] Considérese la fórmula  $\varphi = (x \doteq y)$ . Aquí, tanto  $x$  como  $y$  tienen apariciones libres, por lo que son variables libres de  $\varphi$ .
- [2] Considérese la fórmula  $\psi = \exists x (x \doteq y)$ .
  - La variable  $x$  aparece bajo el alcance del cuantificador  $\exists x$ , por lo que todas sus apariciones son ligadas. Así,  $x$  es una variable ligada de  $\psi$ .
  - La variable  $y$  tiene una aparición libre, por lo que es una variable libre de  $\psi$ .
- [3] Considérese la fórmula  $\varphi' = (x \doteq 0) \wedge \exists x (x > 1)$ .
  - La primera aparición de  $x$  (en  $x \doteq 0$ ) es libre.
  - Las apariciones posteriores de  $x$  (en  $\exists x (x > 1)$ ) son ligadas.

Dado que  $x$  tiene al menos una aparición libre,  $x$  se considera una variable libre de  $\varphi'$ .

**Definición 1.1.18 (Término constante).** Un término  $t$  es un término constante  $\iff$  en  $t$  no aparece ninguna variable.

**Definición 1.1.19 (Enunciado).** Una fórmula  $\varphi \in \text{For } L$  es un enunciado si y solo si en  $\varphi$  no aparece ninguna variable libre. En tal caso, escribimos  $\varphi \in \text{For}^0 L$ .

**Notación:** Dada una variable  $x$ , denotamos por  $\text{Ter}^x L$  el conjunto de términos de  $L$  cuyas variables están todas en  $x$ , y escribimos  $\text{For}^x L$  para el conjunto de fórmulas en  $L$  cuyas variables libres están todas en  $x$ . En particular,  $\text{Ter}^0 L$  denota el conjunto de términos constantes y  $\text{For}^0 L$  el conjunto de enunciados.

Dado un término  $t$ , usamos la notación estándar  $t(x) := t$  para indicar implícitamente que  $t \in \text{Ter}^x L$ . De igual modo, dada una fórmula  $\varphi$ , usamos la notación estándar  $\varphi(x)$  para indicar implícitamente que  $\varphi \in \text{For}^x L$ .

Veremos más adelante que un término  $t(x)$  se interpreta como una función con variable  $x$ . De manera similar, veremos que una fórmula  $\varphi(x)$  se interpreta como una relación con variable  $x$ . Así, nuestra distinción entre variables reales frente a ficticias y variables libres frente a ligadas se debe entender como la distinción entre las variables que influyen en la interpretación y las que no.

## 1.1.5 Substitución de variables

### 1.1.5.1 Substitución en términos

**Definición 1.1.20 (Substitución en términos).** Sean  $t$  y  $\tau$  términos y  $x$  una variable simple, el término  $\text{Sub}_x^\tau[t]$  dado por sustituir  $x$  por  $\tau$  en  $t$  se define recursivamente respecto a la complejidad sintáctica de  $t$ :

(i) Para complejidad 0, consideramos dos posibles situaciones:

I. Si  $t = x$ , definimos  $\text{Sub}_x^\tau[t] = \tau$ .

II. Si  $t \neq x$ , definimos  $\text{Sub}_x^\tau[t] = t$ .

(ii) Para complejidad  $\chi > 0$ , si  $t = f t_1 \dots t_k$ , definimos  $\text{Sub}_x^\tau[t] = f \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_k]$ .

**Ejemplo 1.1.5.** Consideremos los términos  $p(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$  y  $q(x) = x + 1$ , podemos considerar el término por substitución  $p(x, q(x)) = x^2 + 2x(x + 1) + (x + 1)^2$ .

**Lema 1.1.3.** Sean  $t$  y  $\tau$  términos y  $x$  una variable simple. Supongamos que  $t \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$  es un término de complejidad  $\xi$  y  $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$  es un término de complejidad  $\zeta$ . Entonces,  $\text{Sub}_x^\tau[t] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$  es un término de complejidad  $\chi$  con  $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$ .

**Demostración:** Lo demostramos por inducción en la complejidad de  $t$ .

Si  $t$  tiene complejidad 0, entonces,  $t = x$  o  $t \neq x$ . Si  $t = x$ , entonces,  $\text{Sub}_x^\tau[t] = \tau$  y el lema se cumple trivialmente. Si  $t \neq x$ , entonces,  $\text{Sub}_x^\tau[t] = t$  y el lema se cumple.

Supongamos por hipótesis de inducción que  $t$  tiene complejidad  $\xi > 0$  y el lema se cumple para términos de complejidad menor a  $\xi$ . En ese caso,  $t = f t_1 \dots t_k$  con  $f$  símbolo de función  $k$ -ario y  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$  términos de complejidad menor a  $\xi$ .

Digamos que  $\xi_i$  es la complejidad de  $t_i$  para cada  $i$ . Entonces,  $\xi = \max_i \xi_i + 1$  por Teorema 1.1.2. Por definición,  $\text{Sub}_x^\tau[t] = f \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_k]$ . Por hipótesis de inducción, se tiene que  $\text{Sub}_x^\tau[t_i] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$ .

Por último, digamos que  $\chi_i$  es la complejidad de  $\text{Sub}_x^\tau[t_i]$  para cada  $i$ . En ese caso, por Teorema 1.1.2, la complejidad de  $\text{Sub}_x^\tau[t]$  es  $\chi = \max_i \chi_i + 1$ . Por hipótesis de inducción,  $\xi_i \leq \chi_i \leq \xi_i + \zeta$ , luego  $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$ . ■

### 1.1.5.2 Substitución en fórmulas

Ahora bien, en el caso de fórmulas, la definición  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]$  no es tan trivial. El problema radica en el caso de la cuantificación. En efecto, para definir  $\text{Sub}_x^\tau[\exists y \varphi]$  debemos distinguir dos posibles situaciones excepcionales: cuando  $y = x$  y cuando  $y$  aparece en  $\tau$ . Puesto que debemos interpretar las variables ligadas como ficticias (es decir, como si no apareciesen), solo debemos sustituir las apariciones libres de  $x$ . Por tanto, el caso  $y = x$  debemos ignorarlo ( $x$  sería una variable ligada en  $\psi = \exists y \varphi$ ). Por otro lado,  $\tau$  debe sustituir a  $x$  como “variable libre”. En consecuencia, si  $y$  aparece en  $\tau$ , debemos primero renombrar  $y$  como una nueva variable  $z$  para mantener  $\tau$  como “libre” en  $\varphi$ .

**Definición 1.1.21 (Sustitución en fórmulas).** Sean  $\varphi$  una fórmula,  $\tau$  un término y  $x$  una variable simple. Fijamos una variables  $v$  que incluye todas las variables que aparecen en  $\varphi$ ,  $\tau$  y  $x$ . La fórmula  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$  dada por sustituir  $x$  por  $\tau$  en  $\varphi$  se define recursivamente respecto a la complejidad sintáctica de  $\varphi$ :

- (i) Para  $\varphi = R t_1 \dots t_m$  (incluyendo  $\doteq$  y  $\top$ ), definimos  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$ .
- (ii) Si  $\varphi = \neg\psi$ , definimos  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$ .
- (iii) Si  $\varphi = \wedge \psi_1 \psi_2$ , definimos  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$ .
- (iv) Si  $\varphi = \exists y \psi$ , consideramos tres casos:
  - I. Si  $y$  no aparece en  $\tau$  e  $y \neq x$ , definimos  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$ .
  - II. Si  $y$  no aparece en  $\tau$  pero  $y = x$ , definimos  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$ .
  - III. Si  $y$  aparece en  $\tau$ ,  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^z[\psi]_{v,z}]$ , donde  $z := z_v$  no está en  $v^1$ .

**Notación:** Escribimos simplemente  $\text{Sub}_x^t[\eta]$  para  $\text{Sub}_x^t[\eta]_v$  con  $v$  el mínimo conjunto de variables que contiene todas las variables que aparecen en  $\tau$ ,  $\varphi$  y  $x$ .

### Ejemplos 1.1.6 (de sustitución en fórmulas).

- [1] Sea  $\varphi = \exists y (y < x)$  y substituímos  $x$  por el término  $\tau = z + 1$ . Como  $y$  no aparece en  $\tau$  y  $y \neq x$ , simplemente se sustituye dentro del cuantificador:

$$\text{Sub}_x^\tau[\varphi] = \exists y (y < z + 1).$$

- [2] Sea  $\varphi = \exists x (x < 0)$  y substituímos  $x$  por  $\tau = 5$ . Como la variable de sustitución

---

<sup>1</sup>La definición de sustitución presupone que disponemos de una función  $v \mapsto z_v$  que nos proporciona una nueva variable  $z_v$  para cada conjunto finito de variables  $v$ . Ignoremos por ahora los detalles técnicos sobre la definición de dicha función.



coincide con la variable ligada ( $x = x$ ), la sustitución no tiene efecto:

$$\text{Sub}_x^\tau[\varphi] = \exists x (x < 0).$$

- [3] Si sustituimos  $z$  por  $p(x, y) = x^2 + y^2$  en la fórmula  $\varphi(y, z) = \exists x \ x^2 + y = z$ , obtenemos

$$\varphi(y, p(x, y)) = \exists w \ w^2 + y = x^2 + y^2$$

donde  $w$  es una variable nueva que se introduce para evitar la captura de la variable  $x$  que aparece en el término de sustitución.

**Lema 1.1.4.** *Sean  $\varphi$  una fórmula,  $\tau$  un término y  $x$  una variable simple. Sea  $v$  un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en  $\varphi$ ,  $\tau$  y  $x$ . Supongamos que  $\varphi \in \text{For}^u \mathbf{L}$  es una fórmula de complejidad  $\chi$  y  $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$  es un término. Entonces,  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(u \setminus x) \cup w} \mathbf{L}$  es una fórmula de complejidad  $\chi$ . Además:*

- (1) *Si  $x$  es ficticia en  $\tau$  y no aparece ligada en  $\varphi$ , entonces,  $x$  no aparece en  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ .*
- (2) *Si las variables de  $\tau$  no aparecen ligadas en  $\varphi$ , entonces,  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$  es indep. de  $v$ .*
- (3) *Si las variables de  $\tau$  no aparecen ligadas en  $\varphi$ ,  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$  y  $\varphi$  tienen las mismas variables ligadas.*

**Demostración:** Lo demostramos por inducción en la complejidad de  $\varphi$ .

Si  $\varphi$  tiene complejidad 0, entonces,  $\varphi = R t_1 \dots t_m$  (incluyendo  $\dot{=}$  y  $\top$ ). Por definición,  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$ . Por Lema 1.1.3, concluimos que  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$  es una fórmula de complejidad 0. Además, si  $x$  no aparece en  $\tau$ , concluimos que  $x$  no aparece en  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ . Por otro lado, en este caso,  $\varphi$  y  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$  no tienen variables ligadas y  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$  no depende de  $v$ .

Supongamos que  $\varphi$  tiene complejidad  $\chi > 0$  y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ . En ese caso, o  $\varphi = \neg \phi$ ,  $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$  o  $\varphi = \exists y \phi$ . En los dos primeros casos,  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$  o  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$ , y concluimos por hipótesis de inducción. Consideremos el caso  $\varphi = \exists y \phi$ .

Si  $y = x$  e  $y$  no aparece en  $\tau$ , tenemos que  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$  por definición, y el enunciado se cumple trivialmente —nótese que  $x$  no aparece libre en  $\varphi$  en este caso—. Si  $y \neq x$  e  $y$  no aparece en  $t$ , tenemos que  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$  y concluimos por hipótesis de inducción. Si  $y$  aparece en  $\tau$ , tenemos que  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z}$ , donde  $z := z_v$  es una variable simple que no aparece en  $v$ . Por hipótesis de inducción,  $\text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z} \in \text{For}^{(v \setminus \{x,y\}) \cup v \cup z} \mathbf{L}$  es una fórmula de igual complejidad que  $\phi$ . Por tanto,  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$

es una fórmula de igual complejidad que  $\phi$ . Como  $z$  no aparece en  $\varphi$ ,  $\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}$  y  $\phi$  tienen las mismas variables ligadas. Si  $x$  no aparece ligada en  $\varphi$  y no aparece en  $\tau$ , concluimos por hipótesis de inducción que  $x$  no aparece en  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ . Como  $y$  aparece ligada en  $\varphi$ , no es necesario comprobar que  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$  y  $\varphi$  tienen las mismas variables ligadas (de hecho, no las tienen pues  $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$  tiene variable ligada  $z$ , la cual no aparece en  $\varphi$ ) o es independiente de  $v$  (de hecho, no lo es pues la elección de  $z$  depende de  $v$ ). ■

*Observación 1.1.22.* Un caso particular de substitución de variables es cuando el término  $t$  es también una variable, es decir, cuando se substituyen variables por variables. Este caso particular se denomina **cambio de variables**.

Dada una variable  $x = \{x_i\}_{i \in I}$ , una **copia** de  $x$  es otra variable  $y = \{y_i\}_{i \in I}$  junto con una biyección  $\sigma: x_i \mapsto y_i$  entre las dos variables  $x$  e  $y$ . Para una variable ordenada  $\bar{x} = (x_i)_{i \in I}$ , una **copia**  $\bar{y} = (y_i)_{i \in I}$  es otra variable ordenada de igual longitud. Una copia  $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$  de una variable ordenada  $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$  induce las correspondencias  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \dots \text{Sub}_{x_n}^{y_n}: \text{Ter}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{Ter}^y \mathbf{L}$  y  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \dots \text{Sub}_{x_n}^{y_n}: \text{For}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{For}^y \mathbf{L}$  dadas por substituir  $\bar{x}$  por  $\bar{y}$  en el orden fijado:

- Sea  $t(x_1, \dots, x_n)$  un término con variables en  $x_1, \dots, x_n$  y  $t_1, \dots, t_n$  términos. Escribimos  $t(t_1, \dots, t_n)$  para indicar que se substituyen simultáneamente  $x_1, \dots, x_n$  por  $t_1, \dots, t_n$ , es decir:

$$t(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\dots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\dots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [t(x_1, \dots, x_n)]] \dots]] \dots]]$$

donde  $w_1, \dots, w_n$  son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en  $t_1, \dots, t_n$  ni en  $t$ .

- Del mismo modo, para una fórmula  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  con variables libres en  $x_1, \dots, x_n$ , escribimos  $\varphi(t_1, \dots, t_n)$  para

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\dots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\dots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [\varphi(x_1, \dots, x_n)]] \dots]] \dots]]$$

donde  $w_1, \dots, w_n$  son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en  $t_1, \dots, t_n$  ni en  $\varphi$ .

**Ejemplo 1.1.7 (de cambio de variables).** Sea  $\varphi(x, y) = R(x, y)$ . Queremos realizar el cambio de variables  $x \mapsto y$  e  $y \mapsto x$ , es decir, obtener  $\varphi(y, x) = R(y, x)$ .

Si intentáramos realizar la substitución secuencialmente sin variables auxiliares, el resultado dependería del orden y sería incorrecto:

- Si substituímos primero  $x$  por  $y$ :  $\text{Sub}_x^y[R(x, y)] = R(y, y)$ . Al substituir después  $y$  por  $x$ , obtenemos  $R(x, x)$ .

- Si sustituimos primero  $y$  por  $x$  y después  $x$  por  $y$ , obtenemos  $R(y, y)$ .

Sin embargo, usando las variables auxiliares  $w_1, w_2$ :  $\text{Sub}_x^{w_1}[\text{Sub}_y^{w_2}[R(x, y)]] = R(w_1, w_2)$ . Y ahora sustituyendo  $w_1$  por  $y$  y  $w_2$  por  $x$ , obtenemos  $\text{Sub}_{w_1}^y[\text{Sub}_{w_2}^x[R(w_1, w_2)]] = R(y, x)$ .

## 1.2 Estructuras

**Definición 1.2.1 (Estructura).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden. Una  $L$ -estructura  $\mathfrak{A}$  es un par  $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$  formado por un conjunto no vacío  $A$  y una familia de interpretaciones  $z^{\mathfrak{A}}$  para cada símbolo  $z$  de la signatura de  $L$  tal que:

- (i) Si  $z$  es una constante, entonces  $z^{\mathfrak{A}} \in A$ .
- (ii) Si  $z$  es un símbolo de función de aridad  $k$ , entonces  $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$ .
- (iii) Si  $z$  es un símbolo de relación de aridad  $m$ , entonces  $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$ .

Al conjunto  $A$  se le denomina **universo** de  $\mathfrak{A}$  y a  $z^{\mathfrak{A}}$  **interpretación** de  $z$  en  $\mathfrak{A}$ .

**Notación (Abuso):** Es habitual denotar del mismo modo a la estructura y al universo, es decir,  $A := \mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ . Este abuso de notación se hará más frecuente según avance el curso.

### Ejemplos 1.2.1 (de estructuras).

- [1] Consideramos el lenguaje  $L_{\mathbb{N}} = \{\pm, \cdot, S, \underline{0}, <\}$  de la aritmética. Tenemos la  $L_{\mathbb{N}}$ -estructura estándar en  $\mathbb{N}$  dada por  $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$  donde  $+$   $:= \pm^{\mathbb{N}}$ ,  $\cdot$   $:= \cdot^{\mathbb{N}}$  y  $<$   $:= \leq^{\mathbb{N}}$  son la suma, el producto y el orden usual en  $\mathbb{N}$ ,  $0$   $:= \underline{0}^{\mathbb{N}}$  es el número 0 usual y  $\cdot^+$   $:= S^{\mathbb{N}}$  es la función sucesor usual (dada por  $n^+ = n + 1$ ).
- [2] Consideramos el lenguaje  $L_E = \{\underline{E}\}$  de grafos. Un grafo  $(V, E)$  es una  $L_E$ -estructura donde el conjunto de vértices  $V$  es el universo y el conjunto de aristas  $E$  es la interpretación de  $\underline{E}$ , es decir,  $E \subset V \times V$  tal que  $\underline{E}^V(x, y) \iff (x, y) \in E$ .
- [3] Consideramos el lenguaje  $L_{\text{gr}}$  de grupos. En principio, nuestra intención es usar  $L_{\text{gr}}$  para hablar de grupos. Sin embargo, no todas las  $L_{\text{gr}}$ -estructuras son grupos. En efecto, siempre que respetemos los tipos de símbolos y sus aridades, la definición de estructura permite interpretar los símbolos de manera arbitraria.

Por ejemplo,  $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, \cdot, \cdot^+, 27)$  con  $\cdot$   $:= \cdot^{\mathfrak{A}}$ ,  $\cdot^+$   $:= -^{\mathfrak{A}}$  y  $27$   $:= 1^{\mathfrak{A}}$  es una  $L_{\text{gr}}$ -estructura donde  $a^b$  es la operación de exponenciación usual y  $a^+ = a + 1$  es la función sucesor usual. Más adelante definiremos “modelos”, es decir, estructuras que cumplen ciertas propiedades fijadas.

**Definición 1.2.2 (Reducto y expansión).** Sean  $L \subset L'$  dos lenguajes de primer orden,  $\mathfrak{A} = \left( A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L} \right)$  una  $L$ -estructura y  $\mathfrak{A}' = \left( A', (z^{\mathfrak{A}'})_{z \in L'} \right)$  una  $L'$ -estructura. Decimos que  $\mathfrak{A}$  es un **reducto** de  $\mathfrak{A}'$  (o que  $\mathfrak{A}'$  es una **expansión** de  $\mathfrak{A}$ )

$$\iff A = A' \text{ y } z^{\mathfrak{A}} = z^{\mathfrak{A}'} \text{ para cada símbolo } z \in L.$$

**Ejemplo 1.2.2 (de reducto y expansión).** Consideramos el lenguaje de la aritmética  $L_{\mathbb{N}} = \{\pm, \cdot, S, 0, <\}$  y el lenguaje de los órdenes  $L_{<} = \{<\}$ . Como  $L_{<} \subset L_{\mathbb{N}}$ , la  $L_{<}$ -estructura  $(\mathbb{N}, <)$  es un reducto de la  $L_{\mathbb{N}}$ -estructura  $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$ . Equivalentemente,  $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$  es una expansión de  $(\mathbb{N}, <)$ .

*Observación 1.2.3.* Evidentemente, el  $L$ -reducto de una  $L'$ -estructura (con  $L \subset L'$ ) siempre existe y es único. Por otro lado, al realizar expansiones prefijando una interpretación, normalmente denotaremos el símbolo añadido al lenguaje del mismo modo que su interpretación pero con alguna decoración. Por ejemplo, dada una  $L$ -estructura  $A$  y un subconjunto  $P \subset A$ , podemos considerar la expansión  $A_P$  de  $A$  al lenguaje  $L_P = L \cup \{\underline{P}\}$  donde  $\underline{P}$  es un símbolo de relación unaria con interpretación  $\underline{P}^{A_P} = P$ .

**Ejemplo 1.2.3 (Expansión por parámetros).** Sea  $A$  una  $L$ -estructura y  $B \subset A$ , denotamos por  $L(B)$  el lenguaje obtenido al añadir unos símbolos nuevos  $\underline{B} = \{\underline{b}\}_{b \in B}$  (en correspondencia con  $B$ ) como constantes al lenguaje. La expansión  $A_B$  es la  $L(B)$ -estructura dada por la interpretación natural  $\underline{b}^{A_B} = b$  para cada  $b \in B$ . En este caso, el conjunto  $B$  se denomina **conjunto de parámetros** y  $\underline{B}$  son los símbolos de los parámetros.

## 1.2.1 Morfismos

**Definición 1.2.4 (Morfismo).** Sean  $\mathfrak{A}$  y  $\mathfrak{B}$  dos  $L$ -estructuras, una aplicación entre sus universos  $h: A \rightarrow B$  es un morfismo  $\iff$  se cumplen las siguientes condiciones:

- (i) Si  $c$  es una constante de  $L$ , entonces  $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$ .
- (ii) Si  $f$  es un símbolo de función  $k$ -ario de  $L$ , entonces  $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k)).$$

- (iii) Si  $R$  es un símbolo de relación  $k$ -ario de  $L$ , entonces  $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \implies (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$

**Definición 1.2.5 (Inclusión).** Sean  $\mathfrak{A}$  y  $\mathfrak{B}$  dos  $L$ -estructuras, un morfismo  $h: A \rightarrow B$  es una inclusión  $\iff h$  es inyectivo.

**Definición 1.2.6 (Inmersión).** Sean  $\mathfrak{A}$  y  $\mathfrak{B}$  dos L-estructuras, un morfismo  $h: A \rightarrow B$  es una inmersión  $\iff$  para  $R$  un símbolo de relación  $k$ -ario de L y  $a_1, \dots, a_k \in A$ ,

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$


**Definición 1.2.7 (Isomorfismo).** Sean  $\mathfrak{A}$  y  $\mathfrak{B}$  dos L-estructuras, un morfismo  $h: A \rightarrow B$  es un isomorfismo  $\iff$   $h$  es biyectivo y  $h^{-1}: B \rightarrow A$  es un morfismo.

**Definición 1.2.8 (Automorfismo).** Sea  $\mathfrak{A}$  una L-estructura, un morfismo  $h: A \rightarrow A$  es un automorfismo  $\iff$   $h$  es un isomorfismo.

Denotamos por  $\text{Aut}(A)$  al conjunto de automorfismos de  $A$  y por  $\text{Aut}(A/B)$  al conjunto de automorfismos de  $A$  que fijan cada elemento de  $B \subset A$ .


**Ejemplos 1.2.4 (de morfismos de grafos).** Consideramos lenguaje de grafos  $L_E = \{\underline{E}\}$  y la  $L_E$ -estructura  $B$  correspondiente al grafo (no dirigido) con vértices  $\{1, 2, 3, 4\}$  y aristas  $E_B = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}\}$  (un cuadrado con una diagonal).

- 1 **Inclusión que no es inmersión.** Sea  $A$  el grafo con los mismos vértices  $\{1, 2, 3, 4\}$  pero sin la diagonal:  $E_A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}\}$  (solo el cuadrado).



La identidad  $\iota: A \rightarrow B$ ,  $\iota(i) = i$ , es un morfismo inyectivo (inclusión), pues preserva las cuatro aristas de  $A$ . Sin embargo,  $\iota$  no es una inmersión:  $\{1, 3\} \in E_B$  pero  $\{1, 3\} \notin E_A$ . Es decir, al incluir  $A$  en  $B$  “aparece” la diagonal que conecta 1 y 3.

- 2 **Inmersión que no es isomorfismo.** Sea  $C$  el grafo dado por el triángulo con vértices  $\{1, 2, 3\}$  y aristas  $E_C = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}\}$ .



La aplicación  $h: C \rightarrow B$  dada por  $h(1) = 1$ ,  $h(2) = 2$  y  $h(3) = 3$  es una inmersión: las aristas se preservan. Sin embargo,  $h$  no es un isomorfismo, pues no es sobreyectiva.

( $4 \in B$  pero  $4 \notin h(C)$ ). Es decir, al inmersionar  $C$  en  $B$  “aparece” el vértice 4.

**Lema 1.2.1 (Composición de morfismos).** *La composición de morfismos es un morfismo, la composición de inclusiones es una inclusión, la composición de inmersiones es una inmersión y la composición de isomorfismos es un isomorfismo.*

**Demostración:** Sean  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$  y  $\mathfrak{C}$  tres L-estructuras y  $h: A \rightarrow B$ ,  $g: B \rightarrow C$  dos morfismos.

(i) Si  $c$  es una constante de L,  $(g \circ h)(c^{\mathfrak{A}}) = g(h(c^{\mathfrak{A}})) = g(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{C}}$ .

(ii) Si  $f$  es un símbolo de función  $k$ -ario y  $a_1, \dots, a_k \in A$ ,

$$(g \circ h)(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = g(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) = f^{\mathfrak{C}}((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)).$$

(iii) Si  $R$  es un símbolo de relación  $k$ -ario y  $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$ ,  $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$ , luego  $((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}}$ .

Si además  $h$  y  $g$  son inclusiones,  $g \circ h$  es inyectiva por ser composición de aplicaciones inyectivas, luego  $g \circ h$  es una inclusión.

Si  $h$  y  $g$  son inmersiones, para cada símbolo de relación  $R$   $k$ -ario y  $a_1, \dots, a_k \in A$ :

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}} \iff ((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}},$$

luego  $g \circ h$  es una inmersión.

Si  $h$  y  $g$  son isomorfismos,  $g \circ h$  es biyectiva por ser composición de biyecciones y  $(g \circ h)^{-1} = h^{-1} \circ g^{-1}$  es composición de morfismos, luego es un morfismo por lo anterior. Por tanto,  $g \circ h$  es un isomorfismo. ■

**Lema 1.2.2.** *Un morfismo es un isomorfismo si y solo si es una inmersión sobreyectiva.*

**Demostración:**

⇒ Sea  $h: A \rightarrow B$  un isomorfismo. En particular,  $h$  es sobreyectivo. Veamos que  $h$  es una inmersión. Sea  $R$  un símbolo de relación  $k$ -ario y sean  $a_1, \dots, a_k \in A$ . Si  $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$ , como  $h^{-1}$  es un morfismo,

$$(a_1, \dots, a_k) = (h^{-1}(h(a_1)), \dots, h^{-1}(h(a_k))) \in R^{\mathfrak{A}}.$$

Como además  $h$  es un morfismo, obtenemos que

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}},$$

luego  $h$  es una inmersión sobreyectiva.

⊞ Sea  $h: A \rightarrow B$  una inmersión sobreyectiva. Aplicando la condición de inmersión al símbolo  $\doteq$ , obtenemos  $a_1 = a_2 \iff h(a_1) = h(a_2)$ , luego  $h$  es inyectiva y, por tanto, biyectiva. Veamos que  $h^{-1}: B \rightarrow A$  es un morfismo:

(i) Constantes:  $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$  implica  $h^{-1}(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{A}}$ .

(ii) Funciones: dados  $b_1, \dots, b_k \in B$ , sean  $a_i := h^{-1}(b_i)$ . Entonces,

$$\begin{aligned} h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(b_1, \dots, b_k)) &= h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) \\ &= h^{-1}(h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k))) = f^{\mathfrak{A}}(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)). \end{aligned}$$

(iii) Relaciones: si  $(b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$  con  $a_i = h^{-1}(b_i)$ , como  $(h(a_1), \dots, h(a_k)) = (b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$ , la condición de inmersión implica que  $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$ , esto es,  $(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)) \in R^{\mathfrak{A}}$ . ■

**Lema 1.2.3 (Grupo de automorfismos).** Sea  $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$  una L-estructura. El conjunto de automorfismos  $\text{Aut}(A)$  forma un grupo con la composición.

**Demostración:** Verificamos los axiomas de grupo:

- (i) Clausura: la composición de automorfismos es un automorfismo por el Lema 1.2.1.
- (ii) Asociatividad: la composición de aplicaciones es asociativa.
- (iii) Elemento neutro: la identidad  $\text{id}_A$  es trivialmente un automorfismo.
- (iv) Inversos: si  $h \in \text{Aut}(A)$ , entonces  $h^{-1}: A \rightarrow A$  es un morfismo biyectivo (por definición de isomorfismo) y  $(h^{-1})^{-1} = h$  es un morfismo, luego  $h^{-1} \in \text{Aut}(A)$ . ■

**Lema 1.2.4.** Sea  $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$  una L-estructura. Entonces, para un subconjunto  $B \subset A$ ,  $\text{Aut}(A/B)$  es un subgrupo de  $\text{Aut}(A)$ .

**Demostración:** Verificamos que  $\text{Aut}(A/B)$  es un subgrupo de  $\text{Aut}(A)$ :

- (i) No vacío:  $\text{id}_A \in \text{Aut}(A/B)$ , pues  $\text{id}_A(b) = b$  para todo  $b \in B$ .
- (ii) Clausura: si  $h, g \in \text{Aut}(A/B)$ , para todo  $b \in B$  se tiene  $(g \circ h)(b) = g(h(b)) = g(b) = b$ , luego  $g \circ h \in \text{Aut}(A/B)$ .

- (iii) Inversos: si  $h \in \text{Aut}(A/B)$ , para todo  $b \in B$  se tiene  $h(b) = b$ , luego  $h^{-1}(b) = b$ , y por tanto  $h^{-1} \in \text{Aut}(A/B)$ . ■

**Ejemplos 1.2.5 (de no normalidad de  $\text{Aut}(A/B)$ ).** En general,  $\text{Aut}(A/B)$  no es un subgrupo normal de  $\text{Aut}(A)$ , independientemente de la riqueza del lenguaje  $L$ .

- [1] Sea  $L = \emptyset$  el lenguaje vacío (sin símbolos de relación, función ni constantes) y sea  $A$  la  $L$ -estructura con universo  $A = \{1, 2, 3\}$ . Al no haber símbolos que interpretar, todo automorfismo de  $A$  es simplemente una biyección  $A \rightarrow A$ , de modo que  $\text{Aut}(A) = S_3$ , el grupo simétrico de tres elementos.

Tomamos  $B = \{1\}$ . Entonces

$$\text{Aut}(A/B) = \{h \in S_3 : h(1) = 1\} = \{\text{id}, (2\ 3)\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Para ver que este subgrupo no es normal, elegimos  $\sigma = (2\ 3) \in \text{Aut}(A/B)$  y  $\tau = (1\ 2) \in \text{Aut}(A)$  y calculamos el conjugado:

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (1\ 2) \circ (2\ 3) \circ (1\ 2).$$

Evaluamos en cada elemento de  $A$ :

$$\begin{aligned} 1 &\xrightarrow{(1\ 2)} 2 \xrightarrow{(2\ 3)} 3 \xrightarrow{(1\ 2)} 3, \\ 2 &\xrightarrow{(1\ 2)} 1 \xrightarrow{(2\ 3)} 1 \xrightarrow{(1\ 2)} 2, \\ 3 &\xrightarrow{(1\ 2)} 3 \xrightarrow{(2\ 3)} 2 \xrightarrow{(1\ 2)} 1. \end{aligned}$$

Por tanto,  $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (1\ 3)$ . Como  $(1\ 3)(1) = 3 \neq 1$ , se tiene  $(1\ 3) \notin \text{Aut}(A/B)$ . Esto demuestra que  $\text{Aut}(A/B)$  no es normal en  $\text{Aut}(A)$ .

Intuitivamente, la normalidad falla porque  $\tau = (1\ 2)$  no preserva el conjunto  $B = \{1\}$ : se tiene  $\tau(1) = 2 \notin B$ . El conjugado  $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$  “traslada” la acción de  $\sigma$  de fijar  $B$  a fijar  $\tau(B) = \{2\}$ , que es un subconjunto distinto.

- [2] Incluso con un lenguaje no vacío cuya interpretación restrinja genuinamente el grupo de automorfismos, el estabilizador puntual puede no ser normal. Sea  $L = \{E\}$  con  $E$  un símbolo de relación binaria y sea  $A = (A, E^A)$  el grafo ciclo  $C_4$ : universo  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  con

$$E^A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}\}.$$

(Interpretamos  $E$  como una relación simétrica e irreflexiva, es decir, un grafo simple.)



Los automorfismos de  $C_4$  son exactamente las simetrías del cuadrado, es decir  $\text{Aut}(A) \cong D_4$ , el grupo diedral de orden 8. Concretamente:

**Rotaciones:**  $r_0 = \text{id}$ ,  $r_1 = (1\ 2\ 3\ 4)$ ,  $r_2 = (1\ 3)(2\ 4)$ ,  $r_3 = (1\ 4\ 3\ 2)$ .

**Reflexiones:**  $s_1 = (2\ 4)$ ,  $s_2 = (1\ 3)$ ,  $s_3 = (1\ 2)(3\ 4)$ ,  $s_4 = (1\ 4)(2\ 3)$ .

Se comprueba caso a caso que cada una de estas 8 permutaciones preserva  $E^A$ ; por ejemplo, para  $s_1 = (2\ 4)$ :  $\{1, 2\} \mapsto \{1, 4\}$ ,  $\{2, 3\} \mapsto \{4, 3\}$ ,  $\{3, 4\} \mapsto \{3, 2\}$ ,  $\{1, 4\} \mapsto \{1, 2\}$ , todas aristas de  $C_4$ . Nótese que el lenguaje no vacío ha reducido el grupo de  $S_4$  (orden 24) a  $D_4$  (orden 8).

Tomamos  $B = \{1\}$ . Entonces

$$\text{Aut}(A/B) = \{h \in D_4 : h(1) = 1\} = \{\text{id}, (2\ 4)\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Para ver que no es normal en  $D_4$ , elegimos  $\sigma = (2\ 4) \in \text{Aut}(A/B)$  y  $\tau = (1\ 2\ 3\ 4) \in \text{Aut}(A)$ . Calculamos  $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$  con  $\tau^{-1} = (1\ 4\ 3\ 2)$ :

$$\begin{aligned} 1 &\xrightarrow{(1\ 4\ 3\ 2)} 4 \xrightarrow{(2\ 4)} 2 \xrightarrow{(1\ 2\ 3\ 4)} 3, \\ 2 &\xrightarrow{(1\ 4\ 3\ 2)} 1 \xrightarrow{(2\ 4)} 1 \xrightarrow{(1\ 2\ 3\ 4)} 2, \\ 3 &\xrightarrow{(1\ 4\ 3\ 2)} 2 \xrightarrow{(2\ 4)} 4 \xrightarrow{(1\ 2\ 3\ 4)} 1, \\ 4 &\xrightarrow{(1\ 4\ 3\ 2)} 3 \xrightarrow{(2\ 4)} 3 \xrightarrow{(1\ 2\ 3\ 4)} 4. \end{aligned}$$

Luego  $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (1\ 3)$ , que es un automorfismo de  $C_4$  (la reflexión  $s_2$ ), pero  $(1\ 3)(1) = 3 \neq 1$ , así que  $(1\ 3) \notin \text{Aut}(A/B)$ . Por tanto,  $\text{Aut}(A/B)$  no es normal en  $\text{Aut}(A)$ .

La razón de fondo es la misma que en el ejemplo anterior:  $\tau = (1\ 2\ 3\ 4)$  no preserva  $B = \{1\}$  como conjunto ( $\tau(1) = 2 \notin B$ ). La condición necesaria y suficiente para que  $\text{Aut}(A/B)$  sea normal en  $\text{Aut}(A)$  es que todo  $\tau \in \text{Aut}(A)$  satisfaga  $\tau(B) = B$ , y esto es independiente de la riqueza del lenguaje  $L$ .

**Lema 1.2.5.** *Sea  $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$  una  $L$ -estructura y  $B \subset A$ . Entonces  $\text{Aut}(A_B) = \text{Aut}(A/B)$ , donde  $A_B$  es la expansión dada por añadir  $B$  como parámetros.*

**Demostración:** Un automorfismo  $h$  de  $\mathfrak{A}$  es un automorfismo de  $\mathfrak{A}_B$  si y solo si, además de ser un isomorfismo de  $L$ -estructuras, preserva la interpretación de las nuevas constantes: para cada  $c \in B$ ,  $h(\underline{c}^{\mathfrak{A}_B}) = \underline{c}^{\mathfrak{A}_B}$ , esto es,  $h(c) = c$ . Por tanto,  $\text{Aut}(\mathfrak{A}_B) = \text{Aut}(\mathfrak{A}/B)$ . ■

### 1.2.2 Interpretación de términos

**Definición 1.2.9 (Evaluación).** Sea  $\mathfrak{A}$  una L-estructura y  $x = \{x_i\}_{i \in I}$  una variable, una evaluación de  $x$  en  $A$  es una función  $a: x \rightarrow A$ ,  $x_i \mapsto a(x_i) =: a_i$ .

Denotamos por  $A^x$  el conjunto de todas las evaluaciones de  $x$  en  $A$ .

*Observación 1.2.10.* Si  $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$  es un variable ordenada, podemos identificar  $A^{\bar{x}}$  con  $A^n$  identificando la tupla  $\bar{a} = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$  con la evaluación  $x_i \mapsto a_i$ . Para indicar la variable, denotamos dicha evaluación como  $\bar{a}/\bar{x}$ . Si las variables están claras por el contexto, denotamos dicha evaluación simplemente mediante la tupla  $\bar{a}$ .

#### Ejemplos 1.2.6 (de evaluaciones).

- [1] Consideramos  $\mathbb{N}$  como  $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Dadas las variables simples  $x$ ,  $y$  y  $z$ , tenemos la evaluación que asigna  $x \mapsto 10$ ,  $y \mapsto 1$  y  $z \mapsto 3$ . Si ordenamos las variables como  $(x, y, z)$ , podemos identificar dicha evaluación con la tupla  $(10, 1, 3)$ . En este caso, denotamos dicha evaluación como  $10, 1, 3/x, y, z$ .

Dadas dos variables  $x$  e  $y$  (no necesariamente disjuntas) y evaluaciones respectivas  $a \in A^x$  y  $b \in A^y$ , denotamos por  $a; b \in A^{x \cup y}$  la **evaluación concatenada** definida mediante

$$a; b(z) = \begin{cases} b(z) & \text{si } z \in y, \\ a(z) & \text{si } z \in x \setminus y. \end{cases}$$

Es decir,  $a; b$  es la evaluación que primero asigna las variables de  $y$  de acuerdo con  $b$  y luego asigna las variables de  $x$  que no están en  $y$  de acuerdo con  $a$ .

- [2] Consideramos  $\mathbb{R}$  como  $L_{\mathbb{R}}$ -estructura. Dadas las variables simples  $x$  e  $y$ , tenemos la evaluación que asigna  $x \mapsto \pi$  e  $y \mapsto e$ . Ordenando la variable como  $(x, y)$ , denotamos esta evaluación como  $\pi, e/x, y$ . Dada una tercera variable simple  $z$ , tenemos la evaluación de  $(x, z)$  dada por  $0, 1/x, z$ . Concatenando las evaluaciones (ordenando las variables como  $(x, y, z)$ ), obtenemos la evaluación  $\pi, e/x, y; 0, 1/x, z = 0, e, 1/x, y, z$ .

**Definición 1.2.11 (Interpretación de términos).** Sea  $\mathfrak{A}$  una L-estructura,  $a \in A^x$  una evaluación y  $t \in \text{Ter}^x L$  un término. La interpretación  $t^{\mathfrak{A}}(a)$  se define recursivamente en la complejidad de  $t$  del siguiente modo:

- (i) Si  $t = c$  es una constante, entonces  $t^{\mathfrak{A}}(a) = c^{\mathfrak{A}}$ .
- (ii) Si  $t = x_i$  es una variable simple, entonces  $t^{\mathfrak{A}}(a) = a(x_i)$ .

(iii) Si  $t = f t_1 \dots t_k$  es un término compuesto, entonces  $t^{\mathfrak{A}}(a) = f^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}(a), \dots, t_k^{\mathfrak{A}}(a))$ .

*Observación 1.2.12.* Por el Teorema 1.1.2, la interpretación de términos está bien definida.

Fijada una variable  $x$  y dado un término  $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$ , la interpretación de  $t$  define una función  $t^A: A^x \rightarrow A$ . Es importante notar, sin embargo, que el dominio de  $t^A$  depende de la elección de la variable  $x$ , de tal forma que al añadir variables ficticias cambiamos el dominio. Dicho esto, vamos a demostrar que el valor de  $t^A$  no depende de las variables ficticias.

**Lema 1.2.6 (Independencia de variables ficticias).** *Sea  $A$  una  $\mathbf{L}$ -estructura,  $x'$  una variable,  $x \subseteq x'$  una subvariable y  $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$  un término. Sea  $a' \in A^{x'}$  una evaluación de  $x'$  y sea  $a \in A^x$  la correspondiente restricción de  $a'$  a  $x$ . Entonces,  $t^A(a) = t^A(a')$ .*

**Demostración:** Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de  $t$ .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si  $t = c$  es una constante,  $t^A(a) = c^A = t^A(a')$ .
- Si  $t = x_i$  es una variable simple, como  $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$ , tenemos que  $x_i \in x$ . En tal caso,  $t^A(a) = a(x_i) = a'(x_i) = t^A(a')$ , puesto que  $a$  es la restricción de  $a'$ .

Sea  $t$  un término de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que el resultado es cierto para todos los términos de complejidad menor que  $\chi$ . En tal caso,  $t = f t_1 \dots t_k$  con  $t_1, \dots, t_k$  términos de complejidad menor que  $\chi$ . Puesto que  $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$ , tenemos que  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$ . Por definición,  $t^A(a) = f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))$ . Por hipótesis de inducción,  $t_i^A(a) = t_i^A(a')$  para cada  $i \leq k$ . Por tanto,  $t^A(a) = f^A(t_1^A(a'), \dots, t_k^A(a')) = t^A(a')$ . ■

**Corolario 1.2.7.** *Sea  $A$  una  $\mathbf{L}$ -estructura,  $x = \{x_i\}_{i \in I}$  una variable,  $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$  un término, y  $a, a' \in A^x$  dos evaluaciones tales que  $a(x_i) = a'(x_i)$  para cualquier variable simple  $x_i$  de  $x$  que sí aparece en  $t$ . Entonces,  $t^A(a) = t^A(a')$ .*

**Corolario 1.2.8.** *Sea  $A$  una  $\mathbf{L}$ -estructura,  $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$  un término y  $a \in A^y$ ,  $b \in A^z$  dos evaluaciones con  $x \subseteq y$  y  $x \subseteq z$ . Supongamos que  $a$  y  $b$  coinciden en  $x$ . Entonces,  $t^A(a) = t^A(b)$ . En particular, para términos constantes,  $t^A(a)$  es independiente de  $a$ .*

**Demostración:** Consideramos las evaluaciones  $a; b$  y  $b; a$  de la variable  $y \cup z$ . Por definición, la restricción de  $a; b$  a  $z$  es precisamente  $b$ . Por tanto,  $t^A(b) = t^A(a; b)$  por el Lema 1.2.6. Del mismo modo,  $t^A(a) = t^A(b; a)$ . Por último, como  $a$  y  $b$  coinciden en  $x$ , tenemos que  $b; a$  y  $a; b$  coinciden en  $x$ . En consecuencia,  $t^A(b) = t^A(a; b) = t^A(b; a) = t^A(a)$ .

por el Corolario 1.2.7. ■

**Lema 1.2.9 (Substitución).** *Sean  $A$  una  $L$ -estructura,  $x$  una variable,  $a \in A^x$  una evaluación y  $x_0 \in x$  una variable simple. Sean  $t, t_0 \in \text{Ter}^x L$  términos. Entonces,*

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t^A(a; t_0^A(a)/x_0).$$

**Demostración:** Definimos la evaluación  $b := t_0^A(a)/x_0$ . Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de  $t$ .

Para términos de complejidad 0 tenemos tres casos.

- Si  $t = c$  es una constante, tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = c$ , luego  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = c^A = t^A(a; b)$ .
- Si  $t = x_i$  es una variable simple con  $x_i \neq x_0$ , tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = x_i$ , luego  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = a(x_i) = (a; b)(x_i) = t^A(a; b)$ .
- Si  $t = x_0$ , tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = t_0$ . Por tanto,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t_0^A(a) = b(x_0) = (a; b)(x_0) = t^A(a; b).$$

Sea  $t$  un término de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que  $\chi$ . En tal caso,  $t = f t_1 \dots t_k$  con  $t_1, \dots, t_k$  términos de complejidad menor que  $\chi$ . Puesto que  $t \in \text{Ter}^x L$ , tenemos que  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$ . Por definición,  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = f \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]$ . Por tanto, por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) &= f^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]^A(a)) \\ &= f^A(t_1^A(a; b), \dots, t_k^A(a; b)) = t^A(a; b). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

**Corolario 1.2.10.** *Sea  $A$  una  $L$ -estructura. Sea  $t(y_1, \dots, y_n)$  un término (y variable ordenada). Sean  $a \in A^x$  una evaluación y  $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}^x L$  términos (con  $x$  disjunta a  $y$ ). Entonces,  $t(t_1, \dots, t_n)^A(a) = t^A(t_1^A(a)/y_1; \dots; t_n^A(a)/y_n)$ .*

**Demostración:** Tenemos que  $t(t_1, \dots, t_n) = \text{Sub}_{y_1}^{t_1} \dots \text{Sub}_{y_n}^{t_n}[t(y_1, \dots, y_n)]$ . Por tanto, aplicando el Lema 1.2.9  $n$  veces, obtenemos  $t(t_1, \dots, t_n)^A(a) = t^A(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$ , tal y como indica el enunciado. ■

**Lema 1.2.11.** *Sean  $A$  y  $B$  dos  $L$ -estructuras,  $h: A \rightarrow B$  un morfismo,  $t \in \text{Ter}^x L$  un término*

y  $a \in A^x$  una evaluación. Entonces,  $h(t^A(a)) = t^B(h \circ a)$ , donde  $h \circ a \in B^x$ .

**Demostración:** Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de  $t$ .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si  $t = c$  es una constante, tenemos que  $h(t^A(a)) = h(c^A) = c^B = t^B(h \circ a)$ .
- Si  $t = x_i$  es una variable simple,  $h(t^A(a)) = h(a(x_i)) = (h \circ a)(x_i) = t^B(h \circ a)$ .

Sea  $t$  un término de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que  $\chi$ . En tal caso,  $t = f t_1 \dots t_k$  con  $t_1, \dots, t_k$  términos de complejidad menor que  $\chi$ . Puesto que  $t \in \text{Ter}^x L$ ,  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$ . Por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} h(t^A(a)) &= h(f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))) = f^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_k^A(a))) \\ &= f^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_k^B(h \circ a)) = t^B(h \circ a). \end{aligned}$$

■

### 1.2.3 Satisfacción de fórmulas

A continuación vamos a definir la satisfacción de fórmulas, es decir, vamos a dar significado a las fórmulas. En esencia, esto se reduce a dar significado a los símbolos formales del lenguaje. Evidentemente, lo hacemos de tal modo que  $\doteq$ ,  $\top$ ,  $\wedge$ ,  $\neg$  y  $\exists$  son, respectivamente, “igual”, “verdadero”, “y”, “no” y “existe”.

**Definición 1.2.13 (Satisfacción).** Sean  $A$  una  $L$ -estructura,  $a \in A^x$  una evaluación y  $\varphi \in \text{For} L$  una fórmula,  $a$  satisface  $\varphi$  en  $A$  ( $A \models \varphi(a)$ ) recursivamente en la complejidad de  $\varphi$  del siguiente modo:

- (i) Si  $\varphi = \top$ ,  $A \models \varphi(a)$ .
- (ii) Si  $\varphi = t_1 t_2$ ,  $A \models \varphi(a) \iff t_1^A(a) = t_2^A(a)$ .
- (iii) Si  $\varphi = R t_1 \dots t_m$ ,  $A \models \varphi(a) \iff (t_1^A(a), \dots, t_m^A(a)) \in R^A$ .
- (iv) Si  $\varphi = \wedge \varphi_1 \varphi_2$ ,  $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi_1(a)$  y  $A \models \varphi_2(a)$ .
- (v) Si  $\varphi = \neg \psi$ ,  $A \models \varphi(a) \iff A \not\models \psi(a)$ .
- (vi) Si  $\varphi = \exists y \psi$ ,  $A \models \varphi(a) \iff$  existe  $b \in A$  tal que  $A \models \psi(a; b/y)$ .

**Lema 1.2.12.** Sea  $A$  una  $L$ -estructura,  $x$  una variable,  $\varphi, \varphi' \in \text{For}^x L$  fórmulas y  $a \in A^x$  una evaluación. Entonces:

- (1)  $A \models \vee \varphi \varphi'(a)$  si y solo si  $A \models \varphi(a)$  o  $A \models \varphi'(a)$ .
- (2) Para toda  $y$  variable  $A \models \forall y \varphi(a)$  si y solo si  $A \models \varphi(a; b)$  para todo  $b \in A^y$ .

***Demostración:***

- (1) Por definición,  $\vee \varphi_1 \varphi_2 := \neg \wedge \neg \varphi_1 \neg \varphi_2$ . Por tanto,  $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$  si y solo si no se cumplen a la vez  $A \models \neg \varphi_1(a)$  y  $A \models \neg \varphi_2(a)$ . En otras palabras,  $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$  si y solo si  $A \not\models \neg \varphi_1(a)$  o  $A \not\models \neg \varphi_2(a)$ . Es decir,  $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$  si y solo si  $A \models \varphi_1(a)$  o  $A \models \varphi_2(a)$ .
- (2) Por definición,  $\forall y \varphi := \neg \exists y \neg \varphi$ . Por tanto,  $A \models \forall y \varphi(a)$  si y solo si no existe  $b \in A$  tal que  $A \models \neg \varphi(a; b/y)$ . En otras palabras,  $A \models \forall y \varphi(a)$  si y solo si  $A \not\models \neg \varphi(a; b/y)$  para todo  $b \in A$ . Dicho de otro modo,  $A \models \forall y \varphi(a)$  si y solo si  $A \models \varphi(a; b/y)$  para todo  $b \in A$ . ■

Fijada una variable  $x$  y dada una fórmula  $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$ , el conjunto definido por  $\varphi(x)$  es el subconjunto  $\varphi(A) := \{a \in A^x : A \models \varphi(a)\}$ , de tal forma que  $\varphi(x)$  se corresponde con la relación en  $A^x$  dada por  $\varphi(A)$ . Es importante notar, sin embargo, que el dominio de  $\varphi(A)$  depende de la elección de la variable  $x$ , de tal forma que al añadir variables ficticias cambiamos el dominio. Dicho esto, vamos a demostrar que el valor de  $A \models \varphi(a)$  no depende de las variables ficticias.

**Lema 1.2.13 (Independencia de variables no libres).** Sean  $A$  una  $\mathbf{L}$ -estructura,  $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$  y  $a \in A^y$  y  $b \in A^z$  evaluaciones, con  $x \subseteq y$  y  $x \subseteq z$ , tales que  $a$  y  $b$  coinciden en  $x$ . Entonces,  $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi(b)$ .

***Demostración:*** Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de  $\varphi$ .

Para  $\varphi = R t_1 \dots t_m$  (incluyendo  $\doteq$  y  $\top$ ), tenemos que  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$ . Por el Corolario 1.2.8,  $t_i^A(a) = t_i^A(b)$  para cada  $i$ , luego  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $R^A(t_1^A(b), \dots, t_m^A(b))$ , es decir, si y solo si  $A \models \varphi(b)$ .

Digamos que  $\varphi$  tiene complejidad  $\chi > 0$  y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ . Si  $\varphi = \neg \theta$  o  $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ , el resultado es inmediato por hipótesis de inducción. Consideremos el caso  $\varphi = \exists v \phi$ . Entonces,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si existe  $c \in A$  tal que  $A \models \phi(a; c/v)$ . Por hipótesis de inducción, tenemos que  $A \models \phi(a; c/v)$  si y solo si  $A \models \phi(b; c/v)$ . Por tanto,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si existe  $c \in A$  tal que  $A \models \phi(b; c/v)$ . En otras palabras,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $A \models \exists v \phi(b)$ , es decir, si y solo si  $A \models \varphi(b)$ . ■

En particular, el Lema 1.2.13 implica que para un enunciado  $\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$  y una  $\mathbf{L}$ -estructura  $A$ ,  $A \models \varphi$  no depende de evaluaciones. Si la satisfacción de  $\varphi$  tampoco depende de la estructura, entonces  $\varphi$  es una tautología:

**Definición 1.2.14 (Tautología).** Sea  $\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$  un enunciado,  $\varphi$  es una tautología ( $\models \varphi$ )

$$\iff A \models \varphi \text{ para toda } \mathbf{L}\text{-estructura } A.$$

**Ejemplos 1.2.7 (de tautologías).**  $\top$ ,  $\varphi \vee \neg \varphi$ ,  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ ,  $\forall x x = x$ .

**Lema 1.2.14 (Sustitución).** Sean  $A$  una  $\mathbf{L}$ -estructura,  $a \in A^x$  una evaluación y  $x_0$  una variable simple. Sean  $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$  una fórmula y  $t_0 \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$  un término. Entonces,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; t_0^A(a)/x_0).$$

**Demostración:** Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de  $\varphi$ . Escribimos  $b := t_0^A(a)/x_0$ . Supongamos que  $\varphi$  tiene complejidad 0. En tal caso,  $\varphi = R t_1 \dots t_m$  (incluyendo  $\doteq$  y  $\top$ ). Tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = R \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]$ . Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff R^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]^A(a)).$$

Ahora bien, por el Lema 1.2.9, tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_i]^A(a) = t_i^A(a; b)$  para cada  $i$ . Por tanto, concluimos que

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff R^A(t_1^A(a; b), \dots, t_m^A(a; b)),$$

es decir,  $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; b)$ .

Sea  $\varphi$  una fórmula de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ . Si  $\varphi = \neg \phi$  o  $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ , el resultado es inmediato por hipótesis de inducción. Consideremos el caso  $\varphi = \exists y \phi$ . Hay tres posibles situaciones:

Si  $y$  no aparece en  $t_0$  y  $y \neq x_0$ , entonces  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists y \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]$ . Por tanto,  $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$  si y solo si existe  $c \in A$  tal que  $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/y)$ . Por hipótesis de inducción, tenemos que  $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/y)$  si y solo si  $A \models \phi(a; b; c/y)$ . Como  $\varphi = \exists y \phi$ , concluimos que  $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$  si y solo si existe  $c \in A$  tal que  $A \models \phi(a; b; c/y)$ , es decir,  $A \models \varphi(a; b)$ .

Si  $y$  no aparece en  $t_0$ , pero  $y = x_0$ , entonces  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \phi$ . Como  $x_0$  no es libre en  $\varphi$ , por el Lema 1.2.13, concluimos que  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $A \models \varphi(a; b)$ .

Si  $y$  aparece en  $t_0$ , tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists z \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]]$  con  $z$  variable nueva. Por

tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff \text{existe } c \in A \text{ tal que } A \models \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]](a; c/z).$$

Por hipótesis de inducción, esto es cierto si y solo si  $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/z)$ , es decir, si y solo si  $A \models \phi(a; b; c/z)$ . Como  $z$  es una variable nueva, tenemos que  $z$  no aparece en  $\phi$ . Por tanto, por el Lema 1.2.13,  $A \models \phi(a; b; c/z; b/c/y)$  si y solo si existe  $c \in A$  tal que  $A \models \phi(a; b; c/y)$ .

En conclusión,  $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$  si y solo si existe  $c \in A$  tal que  $A \models \phi(a; b; c/y)$ , es decir,  $A \models \varphi(a; b)$ . ■

**Corolario 1.2.15.** *Sea  $A$  una  $L$ -estructura. Sea  $\varphi(y_1, \dots, y_n)$  una fórmula (con  $y$  variable ordenada). Sean  $a \in A^x$  una evaluación y  $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}^x L$  términos (con  $x$  disjunta a  $y$ ). Entonces,  $A \models \varphi(t_1, \dots, t_n)(a) \iff A \models \varphi(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$ .*

**Demostración:** Como  $x$  es disjunta a  $y$ , tenemos que

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) = \text{Sub}_{y_1}^{t_1} \dots \text{Sub}_{y_n}^{t_n}[\varphi(y_1, \dots, y_n)].$$

Por tanto, aplicando el Lema 1.2.14  $n$  veces, obtenemos  $A \models \varphi(t_1, \dots, t_n)(a)$  si y solo si  $A \models \varphi(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$ , tal y como indica el enunciado. ■

**Notación (Abuso).** Como consecuencia del lema de sustitución podemos simplificar enormemente la notación utilizando parámetros. Por ejemplo, en lugar de escribir  $\mathbb{R} \models e < xy(e/x; \pi/y)$  escribimos simplemente  $\mathbb{R} \models e < \pi$ , donde realizamos el ligero abuso de notación de identificar elementos y parámetros.

**Lema 1.2.16 (del reducto).** *Sean  $L \subseteq L'$  dos lenguajes de primer orden. Sea  $A'$  una  $L'$ -estructura y  $A$  su  $L$ -reducto. Entonces:*

- (1)  $t^{A'}(a) = t^A(a)$  para todo término  $t \in \text{Ter}^x L$  y cualquier  $a \in A^x$ .
- (2)  $A' \models \varphi(a)$  si y solo si  $A \models \varphi(a)$  para toda fórmula  $\varphi \in \text{For}^x L$  y cualquier  $a \in A^x$ .

**Demostración:** Ejercicio ?? de la Hoja 1. ■

**Lema 1.2.17 (de los parámetros).** *Sean  $L$  un lenguaje y  $A$  una  $L$ -estructura. Sea  $B$  un subconjunto de  $A$  y  $A_B$  la  $L(B)$ -expansión dada por añadir  $B$  como parámetros. Denotamos*



por  $\underline{B} := \{\underline{b}\}_{b \in B}$  las constantes nuevas añadidas a  $L(B)$ . Sean  $t \in \text{Ter}^x L(B)$ ,  $\varphi \in \text{For}^x L(B)$  y  $a \in A^x$ . Entonces:

- (1) Existen un término  $\tilde{t}(x, y) \in \text{Ter}^{xy} L$  con  $y = (y_1, \dots, y_n)$  disjunta a  $x$  y elementos  $b_1, \dots, b_n \in B$  tales que  $t = \tilde{t}(x, b_1, \dots, b_n)$ . En particular,  $t^{A_B}(a) = t^A(a; b)$ , donde  $b$  denota la evaluación dada por  $b_1, \dots, b_n / y_1, \dots, y_n$ .
- (2) Existen una fórmula  $\tilde{\varphi}(x, y) \in \text{For}^{xy} L$  con  $y = (y_1, \dots, y_n)$  disjunta a  $x$  (y que no aparecen en  $\varphi$ ) y elementos  $b_1, \dots, b_n \in B$  tales que  $\varphi = \tilde{\varphi}(x, b_1, \dots, b_n)$ . En particular,  $A_B \models \varphi(a)$  si y solo si  $A \models \tilde{\varphi}(a; b)$ , donde  $b$  denota la evaluación dada por  $b_1, \dots, b_n / y_1, \dots, y_n$ .

**Demostración:** Ejercicio ?? de la Hoja 1. ■

## 1.2.4 Preservación de fórmulas

**Definición 1.2.15 (Fórmula atómica).** Una fórmula  $\varphi$  es atómica  $\iff \chi(\varphi) = 0$ .

**Definición 1.2.16 (Fórmula literal).** Una fórmula  $\varphi \in \text{For} L$  es literal si y solo si  $\varphi$  es una fórmula atómica o la negación de una fórmula atómica.

**Definición 1.2.17 (Fórmula sin cuantificadores).** Una fórmula  $\varphi \in \text{For} L$  se dice sin cuantificadores si y solo si el símbolo  $\exists$  no aparece en  $\varphi$ .

**Definición 1.2.18 (Fórmula existencial).** Una fórmula  $\varphi \in \text{For} L$  es existencial si y solo si  $\varphi$  es de la forma  $\exists x_1 \dots \exists x_n \psi$  donde  $\psi$  es una fórmula sin cuantificadores.

Dicho de otra forma,  $\varphi$  es existencial si y solo si está construida mediante  $\vee$ ,  $\wedge$  y  $\exists$  a partir de fórmulas literales.

**Definición 1.2.19 (Fórmula universal).** Una fórmula  $\varphi \in \text{For} L$  es universal si y solo si  $\varphi$  es de la forma  $\forall x_1 \dots \forall x_n \psi$  donde  $\psi$  es una fórmula sin cuantificadores.

Dicho de otra forma,  $\varphi$  es universal si y solo si está construida mediante  $\vee$ ,  $\wedge$  y  $\forall$  a partir de fórmulas literales.

**Lema 1.2.18 (Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión).**

Sea  $h: A \rightarrow B$  una inmersión entre  $L$ -estructuras,  $a \in A^x$  una evaluación y  $\varphi \in \text{For}^x L$  una fórmula sin cuantificadores. Entonces,  $A \models \varphi(a) \iff B \models \varphi(h \circ a)$ .

**Demostración:** Lo demostramos por inducción en la complejidad de  $\varphi$ .

Consideramos el caso de fórmulas atómicas. Hay tres posibilidades. Para  $\top$ , tenemos que  $A \models \top$  y  $B \models \top$ . Para  $t_1 \doteq t_2$ , tenemos que  $A \models (t_1 \doteq t_2)(a)$  si y solo si  $t_1^A(a) = t_2^A(a)$ . Como  $h$  es inyectiva, tenemos que  $t_1^A(a) = t_2^A(a)$  si y solo si  $h(t_1^A(a)) = h(t_2^A(a))$ . Por el Lema 1.2.11, concluimos que  $A \models (t_1 \doteq t_2)(a)$  si y solo si  $t_1^B(h \circ a) = t_2^B(h \circ a)$ , es decir, si y solo si  $B \models (t_1 \doteq t_2)(h \circ a)$ . Para  $Rt_1 \dots t_m$ , tenemos que  $A \models Rt_1 \dots t_m(a)$  si y solo si  $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$ . Por definición de inmersión, tenemos que  $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$  si y solo si  $R^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_m^A(a)))$ . Ahora bien, por el Lema 1.2.11, obtenemos que  $A \models Rt_1 \dots t_m(a)$  si y solo si  $R^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_m^B(h \circ a))$ , es decir, si y solo si  $B \models Rt_1 \dots t_m(h \circ a)$ .

Ahora, sea  $\varphi$  una fórmula de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ .

Supongamos que  $\varphi = \neg \phi$  con  $\phi$  sin cuantificadores. En tal caso,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $A \not\models \phi(a)$ . Ahora bien, por hipótesis de inducción,  $A \models \phi(a)$  si y solo si  $B \models \phi(h \circ a)$ . Por tanto, concluimos que  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $B \not\models \phi(h \circ a)$ , es decir, si y solo si  $B \models \varphi(h \circ a)$ .

Supongamos que  $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$  con  $\varphi_1$  y  $\varphi_2$  sin cuantificadores. En tal caso,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $A \models \varphi_1(a)$  y  $A \models \varphi_2(a)$ . Por hipótesis de inducción, esto es equivalente a que  $B \models \varphi_1(h \circ a)$  y  $B \models \varphi_2(h \circ a)$ , es decir, a  $B \models \varphi(h \circ a)$ . Por tanto,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $B \models \varphi(h \circ a)$ . ■

**Lema 1.2.19 (Preservación de fórmulas existenciales).** *Sea  $h: A \rightarrow B$  una inmersión entre L-estructuras. Sea  $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$  una fórmula existencial y  $a \in A^x$  una evaluación. Si  $A \models \varphi(a)$ , entonces  $B \models \varphi(h \circ a)$ .*

**Demostración:** Lo demostramos por inducción en la complejidad de  $\varphi$ . Para fórmulas literales es un caso particular del Lema 1.2.16. Ahora, sea  $\varphi$  una fórmula de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ .

Supongamos que  $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$  con  $\varphi_1$  y  $\varphi_2$  existenciales. En tal caso, si  $A \models \varphi(a)$ , tenemos que  $A \models \varphi_1(a)$  y  $A \models \varphi_2(a)$ . Por hipótesis de inducción, esto implica que  $B \models \varphi_1(h \circ a)$  y  $B \models \varphi_2(h \circ a)$ . En consecuencia,  $B \models \varphi(h \circ a)$ .

Supongamos que  $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$  con  $\varphi_1$  y  $\varphi_2$  existenciales. En tal caso, si  $A \models \varphi(a)$ , tenemos que  $A \models \varphi_1(a)$  o  $A \models \varphi_2(a)$ . Por hipótesis de inducción, esto implica que  $B \models \varphi_1(h \circ a)$  o  $B \models \varphi_2(h \circ a)$ . En consecuencia,  $B \models \varphi(h \circ a)$ .

Finalmente, supongamos que  $\varphi = \exists y \phi$  con  $\phi$  existencial. Entonces,  $A \models \varphi(a)$  si y solo

si existe  $b \in A$  tal que  $A \models \phi(a; b/y)$ . Por hipótesis de inducción, concluimos que  $B \models \phi(h \circ a; h(b)/y)$ . Por tanto,  $B \models \varphi(h \circ a)$ . ■

**Lema 1.2.20.** Sea  $h: A \rightarrow B$  un isomorfismo entre  $L$ -estructuras. Sea  $\varphi \in \text{For}^x L$  una fórmula y  $a \in A^x$  una evaluación. Entonces,  $A \models \varphi(a) \iff B \models \varphi(h \circ a)$ .

## 1.2.5 Fórmulas prenexas

**Definición 1.2.20 (Equivalencia semántica).** Sean  $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{For}^x L$ ,  $\varphi_1$  es (semánticamente) equivalente a  $\varphi_2$  (escrito como  $\varphi_1 \equiv \varphi_2$ ) si y solo si para toda  $L$ -estructura  $A$  y para toda evaluación  $a \in A^x$ , se cumple que  $A \models \varphi_1(a) \iff A \models \varphi_2(a)$ .

*Observación 1.2.21.* Sea  $\varphi \in \text{For}^0 L$  un enunciado, entonces  $\varphi$  es una tautología si y solo si  $\varphi$  es semánticamente equivalente a  $\top$ .

*Observación 1.2.22.*  $\varphi_1$  y  $\varphi_2$  son equivalentes si y solo si  $\models \forall x (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$ .

**Lema 1.2.21 (Propiedades de la equivalencia semántica).**

- (1) La relación de equivalencia semántica es una relación de equivalencia en  $\text{For} L$ .
- (2) Si  $\varphi_1 \equiv \psi_1$  y  $\varphi_2 \equiv \psi_2$ , tenemos que  $\neg \varphi_1 \equiv \neg \psi_1$ ,  $\wedge \varphi_1 \varphi_2 \equiv \wedge \psi_1 \psi_2$  y  $\exists x \varphi_1 \equiv \exists x \psi_1$ .
- (3)  $\neg \neg \varphi \equiv \varphi$ .
- (4)  $\wedge \varphi \psi \equiv \wedge \psi \varphi$ .

**Definición 1.2.23 (Fórmula prenexa).** Una fórmula  $\varphi \in \text{For} L$  es prenexa si y solo si es de la forma  $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \psi$ , con  $\psi$  sin cuantificadores y  $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$  cuantificadores.

**Lema 1.2.22.** Sean  $\varphi, \psi \in \text{For} L$  y  $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$ . Entonces:

- (1)  $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1^c x_1 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi$ , donde  $Q^c$  denota el cuantificador dual de  $Q$  (es decir,  $\forall^c = \exists$  y  $\exists^c = \forall$ ).
- (2) Si  $x_1, \dots, x_n$  son variables simples que no son libres en  $\psi$ , se tiene que

$$(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi).$$

**Demostración:** (1) Lo demostramos por inducción en  $n$ .

Para  $n = 1$  tenemos dos casos. Si  $Q_1 = \forall$ , entonces,  $\neg \forall x_1 \varphi = \neg \neg \exists x_1 \neg \varphi \equiv \exists x_1 \neg \varphi$  por

definición de  $\forall$  y la equivalencia  $\neg\neg\phi \equiv \phi$ . Si  $Q_1 = \exists$ , entonces, usando que  $\varphi \equiv \neg\neg\varphi$ , obtenemos  $\neg\exists x_1 \varphi \equiv \neg\exists x_1 \neg\neg\varphi = \forall x_1 \neg\varphi$  por definición de  $\exists$ .

Sea  $n > 1$  y supongamos que es cierto para  $n - 1$ . Denotemos  $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$ . Por el caso  $n = 1$ , tenemos  $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi = \neg Q_1 x_1 \phi = Q_1 x_1 \neg\phi$ . Por hipótesis de inducción,  $\neg\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \neg\varphi$ , luego  $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \neg\varphi$ .

(2) Lo demostramos por inducción en  $n$ .

Para  $n = 1$ , queremos ver  $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x (\varphi \wedge \psi)$  y  $(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi)$ . Este caso es inmediato por Lema 1.1.34 (ejercicio hoja 1).

Sea  $n > 1$  y supongamos que es cierto para  $n - 1$ . Denotemos  $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$ . Por el caso  $n = 1$ , tenemos  $(Q_1 x_1 \phi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 (\phi \wedge \psi)$ . Por hipótesis de inducción,  $(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi)$ . ■

**Teorema 1.2.23 (Forma prenexa).** *Sea  $\varphi \in \text{ForL}$  una fórmula y sea  $v$  un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en  $\varphi$ . Entonces,*

$$\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\varphi},$$

con  $Q_1, \dots, Q_k \in \{\forall, \exists\}$  donde  $z_1, \dots, z_k$  no están en  $v$  y  $\hat{\varphi} \in \text{ForL}$  es una fórmula sin cuantificadores con variables en  $v, z_1, \dots, z_k$ .

En particular, toda fórmula es equivalente a una fórmula prenexa.

**Demostración:** Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de  $\varphi$ . Para  $\varphi$  atómica el resultado es obvio tomando  $k = 0$  y  $\hat{\varphi} = \varphi$ . Sea  $\varphi$  una fórmula de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que la afirmación se verifica para fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ . Sea  $v$  un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en  $\varphi$ .

Supongamos que  $\varphi = \neg\varphi'$ . Por hipótesis de inducción, tenemos que  $\varphi' \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}$ . Por el **lem-equivalencia-semantica-cuantificadores**/Lema 1, se sigue entonces que  $\varphi \equiv Q_1^\partial z_1 \dots Q_k^\partial z_k \neg\hat{\varphi}$  donde  $Q_i^\partial$  es el dual de  $Q_i$ .

Supongamos que  $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ . Por hipótesis de inducción, tenemos que  $\psi_1 \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\psi}_1$  donde  $z_1, \dots, z_k$  no aparecen en  $v$  y  $\hat{\psi}_1$  es una fórmula sin cuantificadores con variables  $v, z_1, \dots, z_k$ . Por el **lem-equivalencia-semantica-cuantificadores**/Lema 1,  $\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k (\hat{\psi}_1 \wedge \psi_2)$ . Ahora, por hipótesis de inducción aplicada a  $\psi_2$  con variables en  $v \cup \{z_1, \dots, z_k\}$ , tenemos que  $\psi_2 \equiv Q_{k+1} z_{k+1} \dots Q_n z_n \hat{\psi}_2$  donde  $z_{k+1}, \dots, z_n$  no aparecen en  $v \cup \{z_1, \dots, z_k\}$  y  $\hat{\psi}_2$

es una fórmula sin cuantificadores con variables  $v, z_1, \dots, z_n$ . Por el **lem-equivalencia-semantica-cuant** concluimos que  $\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_n z_n (\hat{\psi}_1 \wedge \hat{\psi}_2)$ .

Finalmente, supongamos que  $\varphi = \exists x \psi$ . Por el lema de substitución (renombramiento de variables ligadas),  $\varphi \equiv \exists z_1 \text{Sub}_x^{z_1}[\psi]$  donde  $z_1$  es una variable nueva que no aparece en  $v$ . Por hipótesis de inducción aplicada a  $\psi' = \text{Sub}_x^{z_1}[\psi]$  con el conjunto de variables  $v \cup \{z_1\}$ , tenemos que  $\psi' \equiv Q_2 z_2 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}'$  donde  $z_2, \dots, z_k$  son variables que no aparecen en  $v \cup \{z_1\}$ . Por tanto, concluimos que  $\varphi \equiv \exists z_1 Q_2 z_2 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}'$  donde  $z_1, \dots, z_k$  no aparecen en  $v$ . ■

*Observación 1.2.24.* Conviene notar que la demostración del Teorema 1.2.21 es puramente algorítmica, es decir, nos define un procedimiento explícito (con tantos pasos como complejidad tenga la fórmula) para calcular a partir de una fórmula dada una fórmula prenexa equivalente. En resumen, el procedimiento es el siguiente: primero cambiamos cada variable ligada por una nueva variable que no se utilice en ninguna otra parte de la fórmula. Después, cambiamos  $\neg\exists \equiv \forall\neg$ ,  $\neg\forall \equiv \exists\neg$ ,  $\wedge \equiv \exists\wedge$ ,  $\vee \equiv \exists\vee$ ,  $\wedge \equiv \forall\wedge$  y  $\vee \equiv \forall\vee$  sucesivamente hasta obtener una fórmula prenexa. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} (\exists x \varphi(x, y)) \wedge \neg(\psi(x) \vee \forall x \exists y \varphi(x, y, z)) &\equiv (\exists u \varphi(u, y)) \wedge \neg(\psi(x) \vee \forall v \exists w \varphi(v, w, z)) \\ &\equiv (\exists u \varphi(u, y)) \wedge \neg(\forall v \neg\psi(x) \wedge \neg\varphi(v, w, z)) \\ &\equiv (\exists u \varphi(u, y)) \wedge \exists v \forall w \neg\psi(x) \wedge \neg\varphi(v, w, z) \\ &\equiv \exists u \exists v \forall w \varphi(u, y) \wedge \neg\psi(x) \wedge \neg\varphi(v, w, z). \end{aligned}$$

### 1.3 Teorías

**Definición 1.3.1 (Enunciado).** Una fórmula  $\varphi \in \text{For } L$  es un enunciado si y solo si en  $\varphi$  no aparece ninguna variable libre. En tal caso, escribimos  $\varphi \in \text{For}^0 L$ .

**Definición 1.3.2 (Modelo).** Sea  $\Sigma \subset \text{For}^0 L$  un conjunto de enunciados y  $A$  una  $L$ -estructura,

$$A \text{ es un modelo de } \Sigma \text{ (escrito } A \models \Sigma) \iff A \models \varphi \text{ para todo } \varphi \in \Sigma.$$

**Definición 1.3.3 (Satisfacibilidad).** Un conjunto de enunciados  $\Sigma \subset \text{For}^0 L$  se dice satisfacible si y solo si existe una  $L$ -estructura  $A$  tal que  $A \models \Sigma$ .

**Definición 1.3.4 (Consecuencia semántica).** Sean  $\Sigma_1, \Sigma_2 \subset \text{For}^0 L$  conjuntos de enunciados,  $\Sigma_2$  es consecuencia semántica de  $\Sigma_1$  (o  $\Sigma_1$  implica  $\Sigma_2$  escrito  $\Sigma_1 \models \Sigma_2$ ) si y solo si para toda  $L$ -estructura  $A$ , si  $A \models \Sigma_1$  entonces  $A \models \Sigma_2$ .

*Observación 1.3.5.* La relación de consecuencia semántica es una relación de orden parcial sobre el conjunto de subconjuntos de  $\text{For}^0 \mathbf{L}$ .

*Observación 1.3.6.* Sean  $\Sigma_1 = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}, \Sigma_2 = \{\psi_1, \dots, \psi_m\} \subset \text{For}^0 \mathbf{L}$  finitos, tenemos que  $\Sigma_1 \models \Sigma_2$  si y solo si  $\models \bigwedge \Sigma_1 \rightarrow \bigwedge \Sigma_2$  donde  $\bigwedge \Sigma_1 := \varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n, \bigwedge \Sigma_2 := \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m$ .

**Definición 1.3.7 (Teoría).** Sea  $T \subset \text{For}^0 \mathbf{L}$ ,  $T$  es una teoría (semántica) si y solo si  $T$  es un conjunto de enunciados satisfactibles cerrado para consecuencias, es decir, para todo enunciado  $\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$ ,  $T \models \varphi$  si y solo si  $\varphi \in T$ .

**Proposición 1.3.1.** Sea  $A$  una  $\mathbf{L}$ -estructura, entonces

$$\text{Th}(A) := \{\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L} : A \models \varphi\} \text{ es una teoría.}$$

**Demostración:** Evidentemente,  $A \models \text{Th}(A)$ , luego  $\text{Th}(A)$  es satisfactible. Por otro lado, si  $\text{Th}(A) \models \varphi$ , entonces, como  $A \models \text{Th}(A)$ , tenemos que  $A \models \varphi$ , es decir,  $\varphi \in \text{Th}(A)$ . ■

**Ejemplos 1.3.1 (de teorías generadas por estructuras).**

- [1] La teoría de la aritmética.
- [2] La teoría de los reales.

**Proposición 1.3.2.** Sea  $\Sigma$  un conjunto de enunciados satisfactibles, entonces

$$\text{Th}(\Sigma) := \{\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L} : \Sigma \models \varphi\} \text{ es una teoría.}$$

**Demostración:** Evidentemente, si  $A \models \Sigma$ , entonces,  $A \models \text{Th}(\Sigma)$  —más aún,  $\Sigma \subset \text{Th}(\Sigma)$  trivialmente, luego  $A \models \text{Th}(\Sigma)$  si y solo si  $A \models \Sigma$ . En particular, como  $\Sigma$  es satisfactible,  $\text{Th}(\Sigma)$  es satisfactible. Por otro lado, si  $\text{Th}(\Sigma) \models \psi$ ,  $\Sigma \models \psi$ , es decir,  $\psi \in \text{Th}(\Sigma)$ . ■

**Ejemplos 1.3.2 (de teorías generadas por conjuntos de enunciados).**

- [1] La teoría de grupos.
- [2] La teoría de órdenes.

### 1.3.1 Teorías completas y axiomatización

**Definición 1.3.8 (Teoría completa).** Sea  $T$  una teoría,  $T$  es completa si y solo si existe una  $L$ -estructura  $A$  tal que  $T = \text{Th}(A)$ .

**Definición 1.3.9 (Axiomatización).** Sea  $T$  una teoría en un lenguaje  $L$  y  $\Sigma$  un conjunto de enunciados,  $\Sigma$  es una axiomatización de  $T$  si y solo si  $T = \text{Th}(\Sigma)$ .

**Definición 1.3.10 (Equivalencia elemental).** Sean  $A$  y  $B$  dos  $L$ -estructuras,  $A$  y  $B$  son elementalmente equivalentes ( $A \equiv B$ ) si y solo si para cualquier  $\varphi \in \text{For}^0 L$  se tiene que

$$A \models \varphi \iff B \models \varphi.$$

En otras palabras,  $A \equiv B$  si y solo si  $\text{Th}(A) = \text{Th}(B)$ .

**Teorema 1.3.3 (Caracterización de teorías completas).** Sea  $T$  una teoría. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1)  $T$  es completa.
- (2) Para cualesquiera enunciados  $\varphi, \psi \in \text{For}^0 L$ , si  $T \models \varphi \vee \psi$ , entonces  $T \models \varphi$  o  $T \models \psi$ .
- (3) Para todo enunciado  $\varphi \in \text{For}^0 L$ , o bien  $T \models \varphi$  o bien  $T \models \neg\varphi$ .
- (4)  $T$  es maximal satisfactible (respecto a la inclusión).
- (5) Cualesquiera dos modelos de  $T$  son elementalmente equivalentes.
- (6) Para cualquier modelo  $A$  de  $T$ ,  $T = \text{Th}(A)$ .

#### ***Demostración:***

(1)  $\Rightarrow$  (2) Sean  $\varphi, \psi \in \text{For}^0 L$  enunciados y  $A$  una estructura tal que  $T = \text{Th}(A)$ . Supongamos que  $T \models \varphi \vee \psi$ . Entonces,  $A \models \varphi \vee \psi$ , luego  $A \models \varphi$  o  $A \models \psi$ , es decir,  $\varphi \in T$  o  $\psi \in T$ .

(2)  $\Rightarrow$  (3) Para cualquier enunciado  $\varphi$ , tenemos que  $\varphi \vee \neg\varphi$  es una tautología. Por tanto,  $T \models \varphi \vee \neg\varphi$  y, por hipótesis,  $T \models \varphi$  o  $T \models \neg\varphi$ .

(3)  $\Rightarrow$  (4) Sea  $\Sigma$  un conjunto de enunciados con  $T \subset \Sigma$ . Entonces, existe un enunciado  $\varphi \in \Sigma \setminus T$ . Por hipótesis,  $T \models \neg\varphi$ , luego  $\neg\varphi \in T$ . Por tanto,  $\neg\varphi, \varphi \in \Sigma$ , lo que concluye que  $\Sigma$  no es satisfactible.

(4)  $\Rightarrow$  (5) Sean  $A$  y  $B$  dos modelos de  $T$ . Entonces,  $T \subset \text{Th}(A)$  y  $T \subset \text{Th}(B)$ , lo que implica

que  $\text{Th}(A) = T = \text{Th}(B)$ . En particular,  $A \equiv B$ .

(5)  $\Rightarrow$  (6) Sea  $A \models T$  y  $\varphi \in \text{Th}(A)$ . Para cualquier  $B \models T$  tenemos que  $B \equiv A$ , luego  $B \models \varphi$ . Por tanto,  $T \models \varphi$ . Como  $T$  es cerrada por consecuencias, concluimos que  $\varphi \in T$ . Como  $\varphi$  es arbitrario, concluimos que  $T = \text{Th}(A)$ .

(6)  $\Rightarrow$  (1) Trivial. ■

**Definición 1.3.11.** Sea  $T$  una teoría, denotamos por  $\mathcal{M}(T)$  a la clase de modelos de  $T$ , es decir,  $\mathcal{M}(T) := \{A \text{ L-estructura} : A \models T\}$ .

**Definición 1.3.12 (Clase de estructuras elemental).** Sea  $\Omega$  una clase de L-estructuras,  $\Omega$  es elemental  $\iff$  existe una teoría  $T$  tal que  $\Omega = \mathcal{M}(T)$ .

## 1.4 Construcción de estructuras

### 1.4.1 Subestructuras y extensiones

**Definición 1.4.1 (Subestructura).** Sean  $A$  y  $B$  dos L-estructuras,  $A$  es una subestructura de  $B$  (y  $B$  es una *extensión* de  $A$ ) (escrito  $A \leq B$ ) si y solo si  $A \subset B$  (como conjuntos universos) y la inclusión  $\iota: A \hookrightarrow B$  es una inmersión de estructuras.

**Lema 1.4.1 (Universos de subestructuras).** Sean  $\mathfrak{B} = (B, (z^{\mathfrak{B}})_{z \in L})$  una L-estructura y  $A$  un subconjunto no vacío de  $B$ . Entonces, existe una L-subestructura  $\mathfrak{A}$  de  $\mathfrak{B}$  con universo  $A$  si y solo si para todo símbolo de función  $k$ -ario  $f$  de  $L$  y para cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in A$ , se tiene que  $f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \in A$ .

*En otras palabras,  $A$  es el universo de una subestructura de  $\mathfrak{B}$  si y solo si es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de  $L$ . Además, en tal caso, dicha L-estructura es única.*

**Demostración:** Si  $A$  es el universo de una subestructura  $\mathfrak{A}$  de  $\mathfrak{B}$ , tenemos que

$$f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k) \in A.$$

Por otro lado, dado un subconjunto  $A$ , definimos la estructura  $\mathfrak{A}$  con universo  $A$  dada por  $f^{\mathfrak{A}} = f^{\mathfrak{B}}|_A$  para símbolos de función y  $R^{\mathfrak{A}} = R^{\mathfrak{B}}|_A$  para símbolos de relación. Como  $A$  es



cerrado para  $f^{\mathfrak{B}}$  para cada símbolo de función,  $\mathfrak{A}$  es efectivamente una estructura.

Si  $\mathfrak{A}'$  es otra estructura con universo  $A$  que es subestructura de  $\mathfrak{B}$ , tenemos que

$$f^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de función  $f \in L$  y cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in A$ . Igualmente,

$$R^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de relación  $R \in L$  y cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in A$ . Por tanto,  $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$ . ■

**Lema 1.4.2 (Subestructura intersección).** Sean  $B$  una  $L$ -estructura y  $\{A_j\}_{j \in J}$  un conjunto de subestructuras de  $B$  tales que  $\bigcap_j A_j \neq \emptyset$ . Entonces,

$$A := \bigcap_j A_j \text{ es el universo de una subestructura de } B.$$

Además, para cada  $j \in J$ ,  $A \leq A_j$  y; si para toda  $j$ ,  $C \leq A_j$ , entonces,  $C \leq A$ .

**Demostración:** Como cada  $A_j$  es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función,  $\bigcap_j A_j$  es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función. Por tanto, por el Lema 1.4.1,  $A := \bigcap_j A_j$  es el universo de una única subestructura de  $B$ .

Para  $a_1, \dots, a_k \in A$  y  $f$  símbolo de función, tenemos que

$$f^A(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k).$$

Para  $a_1, \dots, a_m \in A$  y  $R$  símbolo de relación,

$$R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m).$$

Por tanto,  $A \leq A_j$  para todo  $j$ .

Si  $C \leq A_j$  para todo  $j \in J$ , entonces,  $C \subseteq A$ . Además, para  $c_1, \dots, c_k \in C$  y  $f$  símbolo de función, tenemos que

$$f^C(c_1, \dots, c_k) = f^{A_j}(c_1, \dots, c_k) = f^A(c_1, \dots, c_k).$$

Para  $c_1, \dots, c_m \in C$  y  $R$  símbolo de relación, tenemos que

$$R^C(c_1, \dots, c_m) \iff R^{A_j}(c_1, \dots, c_m) \iff R^A(c_1, \dots, c_m).$$

Por tanto,  $C \leq A$ . ■

Este resultado nos permite definir el concepto de subestructura generada.

**Definición 1.4.2 (Subestructura generada).** Sea  $A$  una L-estructura y  $B$  un subconjunto no vacío de  $A$ ,  $\langle B \rangle$  es la subestructura generada por  $B$  si y solo si es la subestructura de  $A$  más pequeña (respecto a la inclusión) que contiene a  $B$ .

Por el Lema 1.4.2,  $\langle B \rangle = \bigcap \{A' \leq A : B \subseteq A'\}$ .

**Lema 1.4.3.** Sean  $A$  y  $B$  dos L-estructuras y  $C$  un subconjunto no vacío de  $A$  tal que  $\langle S \rangle = A$ . Sean  $h: A \rightarrow B$  y  $h': A \rightarrow B$  morfismos. Entonces,  $h = h'$  si y solo si  $h(s) = h'(s)$  para todo  $s \in S$ .

**Demostración:** Una implicación es trivial. Por el otro lado, supongamos que  $h(s) = h'(s)$  para todo  $s \in S$ . Sea  $D = \{a \in A : h(a) = h'(a)\}$ . Obviamente,  $S \subseteq D$ . En particular,  $c^A \in D$  para toda constante  $c$ . Si  $a_1, \dots, a_k \in D$  y  $f$  es un símbolo de función  $k$ -ario, tenemos que  $f^A(a_1, \dots, a_k) \in D$ . En efecto,

$$h(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f^A(h(a_1), \dots, h(a_k)) = f^A(h'(a_1), \dots, h'(a_k)) = h'(f^A(a_1, \dots, a_k)).$$

En conclusión,  $D$  es universo de una subestructura de  $A$  por Lema 1.4.1. Por tanto  $\langle S \rangle \subseteq D$  por definición de  $\langle S \rangle$ , lo que significa que  $A = D$  y  $h = h'$ . ■

**Teorema 1.4.4 (Forma explícita de la subestructura generada).**

Sean  $A$  una L-estructura y  $B$  un subconjunto no vacío de  $A$ . Entonces, el universo de  $\langle B \rangle$  es  $\{t^A(b) : t \in \text{Ter}(\mathbf{L}) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}$ .

**Demostración:** Sea

$$D = \{t^A(b) : t \in \text{Ter}(\mathbf{L}) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}.$$

*Observación 1.4.3.* Demostramos que dados  $d_1, \dots, d_n \in D$ , existen  $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}(\mathbf{L})$  y  $b \in B^y$  tales que  $d_i = t_i(b)$  para cada  $i$ .

**Demostración:** En efecto, si  $d_1, \dots, d_n \in D$ , existen términos  $t'_1(x_1), \dots, t'_n(x_n)$  y evaluaciones  $b'_1 \in B^{x_1}, \dots, b'_n \in B^{x_n}$  tales que  $c_i = t'_i(b'_i)$ . Tomamos copias disjuntas  $y_1, \dots, y_n$  de  $x_1, \dots, x_n$  (nota que las variables no tienen por qué ser simples). Consideramos los términos  $t_1, \dots, t_n$  dados por cambiar de variables. Consideramos las evaluaciones  $b_1 \in B^{y_1}, \dots, b_n \in B^{y_n}$  inducidas por el cambio de variables (es decir,  $b_i = b'_i \circ \sigma_i^{-1}$  donde  $\sigma_i : x_i \rightarrow y_i$  es la correspondencia por el cambio de variables). Consideramos la

evaluación  $b' = b_1 \cup \dots \cup b_n \in B^y$  conjunta de  $y = y_1 \cup \dots \cup y_n$ .

Por Corolario 1.1.28, tenemos que  $t_i^A(b) = t_i^A(b_i)$ . Por Lema 1.1.29,  $t_i^A(b_i) = t'_i(b'_i) = d_i$ . En consecuencia,  $t_i(b) = d_i$  para cada  $i$ . ■

Veamos que  $D$  es el universo de una L-estructura. Evidentemente es cerrado para la interpretación de constantes. Veamos que es cerrado por las funciones  $f^A$ . Dados  $d_1, \dots, d_k \in D$ , por la Afirmación 1, existen términos  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}(\mathbf{L})$  y una evaluación  $b \in B^y$  tales que  $d_i = t_i^A(b)$ . Por tanto,  $f^A(d_1, \dots, d_k) = f^A(t_1^A(b), \dots, t_k^A(b)) = t^A(b)$  donde  $t = ft_1 \dots t_k$ . Por Lema 1.2.1, concluimos que  $D$  es el universo de una subestructura.

Trivialmente,  $D$  contiene a  $B$ . Por tanto, como  $D$  es una subestructura, concluimos que  $\langle B \rangle \subset D$ . Por otro lado, como  $D$  es una subestructura de  $A$ , la  $\langle B \rangle \rightarrow A$  es un homomorfismo. Por Lema 1.1.31, para todo término  $t \in \text{Ter}(\mathbf{L})$  y cualquier  $b \in B^x$ , tenemos que  $t^A(b) = t^{\langle B \rangle}(b) \in \langle B \rangle$ . En consecuencia,  $D \subset \langle B \rangle$ . Por tanto,  $D = \langle B \rangle$ . ■

**Lema 1.4.5.** Sean  $B$  una L-estructura y  $A$  una subestructura de  $B$ . Sea  $\varphi(x)$  (equivalente a) una fórmula universal y  $a \in A^x$ . Si  $B \models \varphi(a)$ , entonces,  $A \models \varphi(a)$ .

**Demostración:** Tenemos que  $\neg\varphi$  es equivalente a una fórmula existencial (ejercicio de la hoja 1). Por tanto, por Lema 1.1.39, tenemos que  $A \models \neg\varphi(a)$  implica  $B \models \neg\varphi(a)$ , luego  $B \models \varphi(a)$  implica que  $A \models \varphi(a)$ . Q.E.D. ■

Sea  $\mathbb{T}$  una teoría. Decimos que  $\mathbb{T}$  es universal si existe un conjunto  $\Sigma$  de fórmulas universales que axiomatiza  $\mathbb{T}$ .

**Corolario 1.4.6.** Sea  $\mathbb{T}$  universal,  $B \models \mathbb{T}$  y  $A \leq B$ . Entonces,  $A \models \mathbb{T}$ .

*Observación 1.4.4.* (Lema del renombrado). Supongamos que  $f : A \rightarrow B$  es una inmersión. Entonces, existe  $g : B' \rightarrow B$  isomorfismo tal que  $A \leq B'$  y  $f = g|_A$ .

**Demostración:** Como  $f : A \rightarrow B$  es una inmersión,  $f$  es inyectiva. Tomamos un conjunto  $B'$  y una biyección  $g : B' \rightarrow B$  con  $A \subset B'$  tal que  $f = g|_A$ . A continuación, definimos la estructura en  $B'$  vía  $g$  para garantizar que  $g$  es un isomorfismo. Q.E.D. ■

Decimos que un conjunto con un orden parcial  $(X, <)$  es dirigido si para cualesquiera  $x, y \in X$  existe  $z \in X$  tal que  $x \leq z$  e  $y \leq z$ .

**Lema 1.4.7.** (*Extensión unión*). Sean  $\{A_i\}_{i \in I}$  un conjunto de  $L$ -estructuras dirigido respecto a la relación de subestructura. Entonces, existe una única  $L$ -estructura  $A$  con universo  $\bigcup A_i$  tal que  $A_i \leq A$  para cada  $i \in I$ . Además, si  $B$  es una  $L$ -estructura con  $A_i \leq B$  para cada  $i \in I$ , entonces,  $A \leq B$ .

**Demostración:** Definimos

$$f^A(a_1, \dots, a_k) = f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_k \in A_i$$

$$R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_m \in A_i.$$

Veamos que la estructura en  $A$  está bien definida. En primer lugar, veamos que las interpretaciones están unívocamente definidas. Sean  $i, j \in I$  arbitrarios y sea  $k \in I$  tal que  $A_i \leq A_k$  y  $A_j \leq A_k$ . Entonces,

$$f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_k}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k)$$

para cualquier símbolo de función y cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in A_i \cap A_j$ . Igualmente,

$$R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_k}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m)$$

para cualquier símbolo de relación y cualesquiera  $a_1, \dots, a_m \in A_i \cap A_j$ . Por tanto, las interpretaciones en  $A$  están bien definidas.

En segundo lugar, veamos que  $f^A$  y  $R^A$  están definidas en todo  $A$ . Es decir, veamos que para cualesquiera  $a_1, \dots, a_n \in A$ , existe  $i \in I$  tal que  $a_1, \dots, a_n \in A_i$ . En efecto, para cualesquiera  $a_1, \dots, a_n \in A$ , existen  $i_1, \dots, i_n \in I$  tales que  $a_k \in A_{i_k}$  para cada  $k \leq n$ . Ahora, como el conjunto  $I$  es dirigido, existe  $i \in I$  tal que  $A_{i_k} \leq A_i$  para cada  $k \leq n$ , luego  $a_1, \dots, a_n \in A_i$ .

Finalmente, sea  $B$  es una  $L$ -estructura extensión de  $A_i$  para cada  $i \in I$ . En tal caso,  $A \subset B$ . Sean  $a_1, \dots, a_k \in A$  y  $f$  símbolo de función. Existe  $i \in I$  tal que  $a_1, \dots, a_k \in A_i$ . Por tanto,

$$f^A(a_1, \dots, a_k) = f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k).$$

Sean  $a_1, \dots, a_m \in A$  y  $R$  símbolo de relación. Existe  $i \in I$  tal que  $a_1, \dots, a_m \in A_i$ . Por tanto,

$$R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m).$$

En conclusión,  $A \leq B$ . En particular, la estructura en  $A$  es única.

Q.E.D. ■

### 1.4.2 Producto cartesiano

**Definición 1.4.5 (Estructura producto).** Sea  $\{A_i\}_{i \in I}$  una familia no vacía de L-estructuras,  $\prod_{i \in I} A_i$  es la estructura producto de  $\{A_i\}_{i \in I} \iff$  es una estructura con universo  $\prod_{i \in I} A_i$  tal que

- (i) Para toda constante  $c$  de L,  $c^{\prod_{i \in I} A_i} = (c^{A_i})_{i \in I}$ .
- (ii) Para toda función  $k$ -aria  $f$  de L y cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in \prod_{i \in I} A_i$ ,  $f^{\prod_{i \in I} A_i}(a_1, \dots, a_k) = (f^{A_i}(a_1(i), \dots, a_k(i)))_{i \in I}$ .
- (iii) Para toda relación  $m$ -aria  $R$  de L y cualesquiera  $a_1, \dots, a_m \in \prod_{i \in I} A_i$ ,  $R^{\prod_{i \in I} A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1(i), \dots, a_m(i))$  para todo  $i \in I$ .

*Observación 1.4.6.* El conjunto  $\prod_{i \in I} A_i$  se define como el conjunto de tuplas (funciones)  $(a(i))_{i \in I}$  tales que  $a(i) \in A_i$  para cada  $i \in I$ . Recordemos que  $\prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$  si  $A_i \neq \emptyset$  para cada  $i \in I$ . En el caso con  $I$  infinito esto es precisamente el enunciado del axioma de elección.

**Ejemplo 1.4.1.** Considérese  $\mathbb{N}$  como  $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Entonces,  $\mathbb{N}^2$  como  $L_{\mathbb{N}}$ -estructura está dada por las interpretaciones

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2),$$

$$(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2),$$

$$(a_1, b_2)^+ = (a_1^+, b_2^+),$$

y

$$(a_1, a_2) < (b_1, b_2) \iff a_1 < b_1 \text{ y } a_2 < b_2.$$

**Lema 1.4.8.** Sea  $A := \prod_{i \in I} A_i$ . La proyección cartesiana  $\text{proj}_i : A \rightarrow A_i$  es un homomorfismo sobreyectivo para todo  $i \in I$ .

**Demostración:** Por definición, para  $a = (a(i))_{i \in I} \in A$ ,  $\text{proj}_i(a) = a(i)$ . Por tanto, por definición,  $\text{proj}_i(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f^{A_i}(\text{proj}_i(a_1), \dots, \text{proj}_i(a_k))$  para cada  $i \in I$ . Así pues, por definición,  $R_{A_i}(\text{proj}_i(a_1), \dots, \text{proj}_i(a_m))$  para cada  $i \in I$ . Por tanto,  $\text{proj}_i$  es un

homomorfismo. Evidentemente  $\text{proj}_i$  es sobreyectivo.

Q.E.D. ■

**Notación.** Sea  $A := \prod_{i \in I} A_i$ . Identificamos de forma natural  $A^x$  con  $\prod_{i \in I} A_i^x$ . En efecto, dada una evaluación  $a : x \rightarrow A$  con  $a(x_t) = (a(x_t)_i)_{i \in I}$ , tenemos la evaluación  $a(i) : x \rightarrow A_i$  dada por  $a(i)(x_t) = a(x_t)_i$ .

**Definición 1.4.7 (Fórmula de Horn básica).** Una fórmula es una fórmula de Horn básica  $\iff$  es de la forma  $\neg\varphi_1 \vee \dots \vee \neg\varphi_n \vee \psi$  o  $\neg\varphi_1 \vee \dots \vee \neg\varphi_n$  donde  $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \psi$  son fórmulas atómicas.

Dicho de otra forma, una fórmula de Horn básica es de la forma  $\varphi \rightarrow \psi$  o  $\neg\varphi$  donde  $\varphi$  es una conjunción de fórmulas atómicas y  $\psi$  es una fórmula atómica.

**Definición 1.4.8 (Fórmula de Horn).** Una fórmula es una fórmula de Horn  $\iff$  está construida mediante  $\wedge, \exists$  y  $\forall$  a partir de fórmulas de Horn básicas.

**Teorema 1.4.9.** Sean  $A := \prod_{i \in I} A_i$ ,  $\varphi(x)$  una fórmula de Horn y  $a \in A^x$ . Si  $A_i \models \varphi(a(i))$  para todo  $i \in I$ , entonces,  $A \models \varphi(a)$ .

**Demostración:** Lo demostramos por inducción en la complejidad. En primer lugar demostramos el caso de conjunciones de fórmulas primitivas.

**Proposición 1.4.10.** Supongamos que  $\varphi(x)$  es una conjunción de fórmulas atómicas y  $a \in A^x$ . Entonces,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $A_i \models \varphi(a(i))$  para todo  $i \in I$ .

**Demostración:** Por inducción en la complejidad. Si  $\varphi = Rt_1 \dots t_m$  es atómica (incluyendo  $\doteq$  y  $\top$ ), tenemos que  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$ . Por Lema 1.1.31,  $t^A(a) = (t^{A_i}(a(i)))_{i \in I}$  para todo término, luego  $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$  si y solo si  $R^{A_i}(t_1^{A_i}(a(i)), \dots, t_m^{A_i}(a(i)))$  para cada  $i \in I$ , es decir,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $A_i \models \varphi(a(i))$  para cada  $i \in I$ .

Supongamos que  $\varphi$  tiene complejidad  $\chi > 0$  y se cumple para fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ . Si  $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ , entonces, por hipótesis de inducción,  $A \models \varphi(a)$  si y solo si  $A \models \varphi_1(a)$  y  $A \models \varphi_2(a)$ , si y solo si  $A_i \models \varphi_1(a(i))$  y  $A_i \models \varphi_2(a(i))$  para todo  $i \in I$ , si y solo si  $A_i \models \varphi(a(i))$  para todo  $i \in I$ . ■

Si  $\varphi$  es atómica, concluimos por Afirmación ???. Supongamos que  $\varphi$  tiene complejidad  $\chi > 0$  y se cumple para fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ .

Si  $\varphi$  es una fórmula de Horn básica, tenemos que  $\varphi = \neg\phi \vee \psi$  o  $\varphi = \neg\phi$  con  $\phi$  conjunción de fórmulas atómicas y  $\psi$  fórmula atómica. Supongamos que  $A_i \models \varphi(a(i))$  para todo  $i \in I$ . Si  $A \models \phi(a)$ , entonces, por Afirmación ??,  $A_i \models \phi(a(i))$  para cada  $i \in I$ . En tal caso, como  $A_i \models \varphi(a(i))$  para cada  $i \in I$ , concluimos que  $A_i \models \psi(a(i))$  para todo  $i \in I$ . Por Afirmación ??, esto implica que  $A \models \psi(a)$ . Por tanto, hemos concluido que si  $A \models \phi(a)$ , entonces,  $A \models \psi(a)$ , es decir,  $A \models \varphi(a)$ .

Supongamos que  $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ . Si  $A_i \models \varphi(a(i))$  para todo  $i \in I$ , tenemos que  $A_i \models \varphi_1(a(i))$  y  $A_i \models \varphi_2(a(i))$  para todo  $i \in I$ . Por tanto, por hipótesis de inducción,  $A \models \varphi_1(a)$  y  $A \models \varphi_2(a)$ , es decir,  $A \models \varphi(a)$ .

Supongamos que  $\varphi = \exists y\phi$ . Si  $A_i \models \varphi(a(i))$  para todo  $i \in I$ , existe  $b_i \in A_i^y$  tal que  $A_i \models \phi(a(i); b_i)$  para cada  $i \in I$ . Por tanto, (por el axioma de elección) existe  $b \in A^y$  tal que  $b(i) = b_i$  para cada  $i \in I$ . Por hipótesis de inducción, concluimos que  $A \models \phi(a; b)$ , luego  $A \models \varphi(a)$ .

Finalmente, supongamos que  $\varphi = \forall y\phi$ . Si  $A_i \models \varphi(a(i))$  para todo  $i \in I$ . Sea  $b \in A^y$  arbitrario. Entonces,  $A_i \models \phi(a(i); b(i))$  para cada  $i \in I$ . Por tanto, por hipótesis de inducción, concluimos que  $A \models \phi(a; b)$ . Como  $b$  es arbitrario, concluimos que  $A \models \varphi(a)$ . ■

**Corolario 1.4.11.** Sean  $T$  una teoría de Horn y  $\{A_i\}_{i \in I}$  una familia no vacía de modelos de  $T$ . Entonces,  $\prod A_i \models T$ .

## 1.5 Subestructuras elementales

Sean  $A$  y  $B$  dos L-estructuras y  $h : A \rightarrow B$  una inmersión de estructuras. Decimos que  $h$  es una *inmersión elemental* si para toda fórmula  $\varphi \in \text{For } L$  y toda evaluación  $a \in A^x$  se tiene

$$A \models \varphi(a) \iff B \models \varphi(h(a)).$$

Sean  $B$  una L-estructura y  $A \leq B$  una subestructura. Decimos que  $A$  es una *subestructura elemental de  $B$*  (escrito  $A \preceq B$ ) si la inclusión  $\iota : A \rightarrow B$  es una inmersión elemental. Paralelamente, si  $A \preceq B$ , decimos que  $B$  es una *extensión elemental de  $A$* .

**Ejemplo 1.5.1.** Si  $A \preceq B$ , entonces,  $A \leq B$  y  $A \equiv B$ . Sin embargo, el recíproco no es cierto.

Por ejemplo,  $[0, 1]$  con el orden usual es una subestructura de  $[-1, 1]$  isomorfa a  $[-1, 1]$ .

En particular,  $[0, 1]$  y  $[-1, 1]$  son elementalmente equivalentes. Sin embargo,  $[0, 1]$  no es una subestructura elemental de  $[-1, 1]$ . En efecto, en  $[0, 1]$ , el 0 es el mínimo elemento, luego 0 satisface la fórmula  $\neg \exists x x < 0$  en  $[0, 1]$ . Sin embargo, en  $[-1, 1]$ , 0 no es el mínimo elemento, luego  $[-1, 1]$  no satisface  $\neg \exists x x < 0$ . En otras palabras, ser una subestructura elemental no solo tiene que ver con realizar las mismas propiedades sino que los mismos elementos cumplan las mismas propiedades.

Sea  $A$  un  $L$ -estructura. Recordemos que  $\text{Th}(A/B) := \{\varphi \in \text{For}^0 L : A \models \varphi\}$ . Dado un conjunto  $B$  de parámetros en  $A$ , definimos  $\text{Th}(A/B) := \{\varphi \in \text{For}^0 L(B) : A \models \varphi\}$ .

**Lema 1.5.1 (Diagrama elemental).** *Sean  $A$  una  $L$ -estructura y  $B_A$  una  $L(A)$ -estructura con  $L$ -reducto  $B$ . Entonces,  $B_A \models \text{Th}(A/A)$  si y solo si  $h : A \rightarrow B$  dada por  $h(a) = a^{B_A}$  es una inmersión elemental de  $L$ -estructuras.*

**Demostración:** Supongamos que  $B_A \models \text{Th}(A/A)$  y considera  $h : A \rightarrow B$  dada por  $h(a) = a^{B_A}$ . Sea  $\varphi(x) \in \text{For}_x^L$  y  $a \in A^x$ . Fijamos un orden  $x = (x_1, \dots, x_n)$  y  $a = (a_1, \dots, a_n)$ . Denotemos por  $\varphi(a) := \varphi(a_1, \dots, a_n)$  la fórmula en  $\text{For}_0^L(A)$  dada por sustituir la variable  $x_i$  por  $a_i$  en orden. Entonces, por el lema de substitución (Lema ??),

$$A \models \varphi(a) \implies \varphi(a) \in \text{Th}(A/A) \implies B_A \models \varphi(a) \implies B \models \varphi(h(a)).$$

Por tanto,  $h : A \rightarrow B$  es una inmersión elemental.

Por otro lado, supongamos que  $h$  es inmersión elemental. Sea  $\phi \in \text{For}_0^L(A)$ . En ese caso, por el lema de parámetros (ejercicio hoja 1), existe  $\varphi(x) \in \text{For}_x^L$  con  $x = (x_1, \dots, x_n)$  variable ordenada y  $a_1, \dots, a_n \in A$  tales que  $\phi = \varphi(a_1, \dots, a_n)$ . Sea  $a \in A^x$  la evaluación dada por  $x_i \mapsto a_i$ . Por Lema ??, tenemos que  $A \models \varphi(a)$ . Por tanto,  $B \models \varphi(h(a))$  y, por Lema ?? nuevamente,  $B_A \models \phi$ . Por tanto,  $B_A \models \text{Th}(A/A)$ . ■

**Teorema 1.5.2 (Test de Tarski).** *Sea  $A$  una  $L$ -estructura y  $B$  un subconjunto de  $A$ . Entonces,  $B$  es universo de una subestructura elemental de  $A$  si y solo si para toda fórmula  $\varphi \in \text{For}^x L$  con  $x$  variable simple y  $b \in B^y$  se tiene*

$$A \models \exists x \varphi(b) \iff \text{existe } b_0 \in B^x \text{ tal que } A \models \varphi(b; b_0).$$

**Demostración:** Supongamos primero que  $B$  es el universo de una  $L$ -subestructura elemental. Sea  $\varphi \in \text{For}^x L$  con  $x$  variable simple y  $b \in B^y$ . Como  $B$  es una subestructura elemental,  $A \models \exists x \varphi(b)$  si y solo si  $B \models \exists x \varphi(b)$ , es decir, si y solo si existe  $b_0 \in B^x$  tal



que  $B \models \varphi(b; b_0)$ . Ahora bien, como  $B$  es una subestructura elemental de  $A$ , tenemos que  $B \models \varphi(b; b_0)$  si y solo si  $A \models \varphi(b; b_0)$ . Por tanto, concluimos que  $A \models \exists x \varphi(b)$  si y solo si existe  $b_0 \in B^x$  tal que  $A \models \varphi(b; b_0)$ .

Para demostrar el recíproco, en primer lugar, comprobamos que  $B$  es el universo de una subestructura por Lema ???. En efecto, dado un símbolo de función  $f$  de aridad  $k$  y  $b_1, \dots, b_k \in B$ , tenemos que  $A \models \exists x = f(b_1, \dots, b_k)$ , luego existe  $b \in B$  tal que  $A \models b = f(b_1, \dots, b_k)$ , es decir,  $f^A(b_1, \dots, b_k) \in B$ .

Veamos ahora que  $B \preceq A$ . Demostraremos por inducción en la complejidad de  $\varphi \in \text{For}^y L$  que, para  $b \in B^y$ ,  $B \models \varphi(b)$  si y solo si  $A \models \varphi(b)$ . Para  $\varphi$  atómica es trivial: en efecto, como  $B$  es una subestructura de  $A$ ,  $B \models \varphi(b)$  si y solo si  $A \models \varphi(b)$  para toda fórmula atómica  $\varphi$  por Lema ???.

Supongamos que  $\varphi$  tiene complejidad  $\chi > 0$  y el test de Tarski se cumple para todas las fórmulas de complejidad menor a  $\chi$ . Los casos  $\varphi = \neg\psi$  y  $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$  son inmediatos.

Consideremos el caso  $\varphi = \exists x \psi$  con variables libres  $y_1, \dots, y_n$ . Si  $A \models \varphi(b)$  con  $b \in B^y$ , por la condición del test de Tarski,  $A \models \psi(b; b_0)$  para algún  $b_0 \in B^x$ . Por hipótesis de inducción, tenemos que  $B \models \psi(b; b_0)$ , luego  $B \models \varphi(b)$ . Recíprocamente, si  $B \models \varphi(b)$ , entonces, existe  $b_0 \in B^x$  tal que  $B \models \psi(b; b_0)$  y, por hipótesis de inducción,  $A \models \psi(b; b_0)$ , luego  $A \models \varphi(b)$ . ■

**Ejemplo 1.5.2 (Módulo de continuidad).** Consideramos la fórmula que expresa la continuidad de una función  $f$  en todo su dominio:

$$\varphi = \forall x \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y (|y - x| < \delta \rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon).$$

Entonces, un módulo de continuidad de  $f$  es un término  $\omega_x(\varepsilon)$  tal que

$$\forall x \forall \varepsilon > 0 \forall y (|y - x| < \omega_x(\varepsilon) \rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon).$$

Sea  $L$  un lenguaje y  $\mathbb{T}$  una  $L$ -teoría. Decimos que  $\mathbb{T}$  es una *teoría de Skolem* si verifica que para toda fórmula  $\varphi(x, y) \in \text{For}_y^x L$  con  $x$  variable simple existe un término  $t_{\exists x \varphi}(y) \in \text{Ter}^y L$  tal que

$$\mathbb{T} \models \forall y (\exists x \varphi(x, y)) \rightarrow \varphi(t_{\exists x \varphi}(y), y).$$

Decimos que  $t_{\exists x \varphi}$  es el *término* (o la *función*) de Skolem asociado a  $\exists x \varphi(x, y)$ .

Decimos que una  $L$ -estructura  $A$  es una *estructura de Skolem* si es modelo de una teoría de

Skolem. En otras palabras,  $A$  es una estructura de Skolem si para toda fórmula  $\varphi(x, y) \in \text{For}_y^x L$  con  $x$  variable simple existe un término  $t_{\exists x \varphi}(y) \in \text{Ter}^y L$  tal que

$$A \models \exists x \varphi(x, a) \implies A \models \varphi(t_{\exists x \varphi}^A(a), a),$$

para cualquier  $a \in A^y$ .

**Ejemplo 1.5.3 (de teoría de Skolem).** Consideremos el lenguaje de la aritmética  $L_{\mathbb{N}}$  con la estructura  $\mathbb{N}$  estándar. Para una fórmula  $\varphi(x, y) \in \text{For}^{xy} L$  con  $x$  variable simple, el término de Skolem asociado a  $\exists x \varphi(x, y)$  es

$$t_{\exists x \varphi}(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathbb{N} \models \neg \exists x \varphi(x, y) \\ \text{el menor } x \text{ tal que } \varphi(x, y) & \text{si } \mathbb{N} \models \exists x \varphi(x, y) \end{cases}$$

**Lema 1.5.3.** *Sea  $A$  una  $L$ -estructura de Skolem. Entonces, todas sus subestructuras son subestructuras elementales.*

**Demostración:** Sea  $B \preceq A$ . Como  $A$  es una estructura de Skolem, para toda fórmula  $\varphi(x, y)$  con  $x$  variable simple y  $b \in B^y$  se tiene

$$A \models \exists x \varphi(b) \implies A \models \varphi(b; t_{\exists x \varphi}^A(b)/x).$$

Como  $t_{\exists x \varphi}^A(b) \in B$ , concluimos que  $B \preceq A$  por el test de Tarski 1.2.15. ■

Para encontrar subestructuras elementales, extendemos la estructura añadiendo los términos de Skolem y tenemos subestructuras elementales de la extensión que, en particular, lo son de la estructura original.

**Lema 1.5.4 (Skolemización).** *Sea  $L$  un lenguaje. Existe una teoría de Skolem  $\text{Sk}$  en una expansión  $L_{\text{Sk}}$  del lenguaje con  $|L_{\text{Sk}}| = |L|^2$  tal que para cualquier  $L$ -estructura  $A$  existe una  $L_{\text{Sk}}$ -expansión  $A_{\text{Sk}}$  tal que  $A_{\text{Sk}} \models \text{Sk}$ .*

**Demostración:** Usaremos una cantidad numerable de variables. Construimos  $L_{\text{Sk}}$  y  $\text{Sk}$  recursivamente. Para  $n = 0$ , tomamos  $L_{\text{Sk}_0} = L$  y  $\text{Sk}_0 = \emptyset$ . Supongamos que ya hemos construido  $L_{\text{Sk}_n}$  y  $\text{Sk}_n$ , y buscamos construir  $L_{\text{Sk}_{n+1}}$  y  $\text{Sk}_{n+1}$ . Para cada fórmula  $\phi \in \text{For}^{xy} L_{\text{Sk}_n}$  con  $x$  variable simple añadimos un símbolo de función nuevo  $f_{\exists x \phi}$  de aridad  $|y|$  y tomamos  $L_{\text{Sk}_{n+1}} = L_{\text{Sk}_n} \cup \{f_{\exists x \phi} : \phi \in \text{For}^{xy} L_{\text{Sk}_n}\}$ . Entonces,  $|L_{\text{Sk}_{n+1}}| = |\text{For } L_{\text{Sk}_n}| = |L_{\text{Sk}_n}|$ .

---

<sup>2</sup>Cuando escribimos el cardinal de un lenguaje, en realidad nos referimos al cardinal del conjunto de fórmulas en ese lenguaje, es decir,  $|L| = |\text{For}(L)|$

Tomamos

$$\text{Sk}_{n+1} = \text{Sk}_n \cup \left\{ \forall y (\exists x \phi(x, y)) \rightarrow \phi(f_{\exists x \phi}(y), y) : \phi \in \text{For}^{xy} \text{L}_{\text{Sk}_n} \right\}.$$

Definimos  $\text{L}_{\text{Sk}} = \bigcup_n \text{L}_{\text{Sk}_n}$ , y  $\text{Sk} = \text{Th}(\bigcup_n \text{Sk}_n)$ .

Evidentemente,  $\text{Sk}$  es una teoría de Skolem, pues si  $\phi \in \text{For}^{xy} \text{L}_{\text{Sk}}$ , entonces,  $\phi \in \text{For}^{xy} \text{L}_{\text{Sk}_n}$  para algún  $n$  (pues  $\phi$  solo usa un número finito de símbolos). Por tanto,

$$\forall y (\exists x \phi(x, y)) \rightarrow \phi(f_{\exists x \phi}(y), y) \in \text{Sk}_{n+1} \subset \text{Sk}.$$

Ahora, sea  $A$  una  $\text{L}$ -estructura. Definimos recursivamente  $\text{L}_{\text{Sk}_n}$ -expansiones  $A_{\text{Sk}_n}$  modelo de  $\text{Sk}_n$ . Para  $n = 0$  no hay nada que hacer. Supongamos que ya hemos construido  $A_{\text{Sk}_n}$ . Por el axioma de elección, para cada  $\phi \in \text{For}^{xy} \text{L}_{\text{Sk}_n}$ , con  $x$  variable simple e  $y = (y_1, \dots, y_n)$  variable ordenada disjunta a  $x$ , y  $a = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$ , elegimos un elemento  $b_{\exists x \phi(a)} \in A$  tal que  $A_{\text{Sk}_n} \models \phi(b_{\exists x \phi(a)}, a_1, \dots, a_n)$  si  $\{b : A_{\text{Sk}_n} \models \phi(b, a)\} \neq \emptyset$ .

Definimos la  $\text{L}_{\text{Sk}_{n+1}}$ -expansión  $A_{\text{Sk}_{n+1}}$  dada por  $f_{\exists x \phi(a)}^{A_{\text{Sk}_{n+1}}}(a_1, \dots, a_n) = b_{\exists x \phi(a)}$ . Así, (por Lema 1.1.36) para cualquier  $\phi \in \text{For}^{xy} \text{L}_{\text{Sk}_n}$  y  $a \in A^y$ , si  $A_{\text{Sk}_n} \models \exists x \phi(x, a)$ , entonces,  $A_{\text{Sk}_{n+1}} \models \phi(f_{\exists x \phi}(a), a)$ . Por tanto,  $A_{\text{Sk}_{n+1}} \models \text{Sk}_{n+1}$ .

Tomamos la  $\text{L}_{\text{Sk}}$ -expansión  $A_{\text{Sk}}$  que extiende  $A_{\text{Sk}_n}$  para todo  $n$ . Entonces,  $A_{\text{Sk}} \models \text{Sk}$ , luego  $A_{\text{Sk}} \models \text{Sk}$ . ■

**Teorema 1.5.5 (Skolem).** *Sea  $A$  una  $\text{L}$ -estructura y  $C$  un subconjunto de  $A$ . Entonces, existe una subestructura elemental  $B \preceq A$  que contiene a  $C$  y cumple  $|B| \leq \max\{|C|, |\text{L}|\}$ .*

**Demostración:** Sea  $A_{\text{Sk}}$  una skolemización de  $A$  con  $|\text{L}_{\text{Sk}}| = |\text{L}|$ . Sea  $B_{\text{Sk}}$  la  $\text{L}_{\text{Sk}}$ -subestructura generada por  $C$  en  $A_{\text{Sk}}$  y  $B$  su reducto (podemos asumir que  $C \neq \emptyset$  tomando  $C \cup \{a\}$  con  $a$  arbitrario). Por Lema 1.2.1, tenemos que  $|B| \leq \max\{|C|, |\text{L}_{\text{Sk}}|\} = \max\{|C|, |\text{L}|\}$ . Por Lema 1.2.16, tenemos que  $B_{\text{Sk}} \preceq A_{\text{Sk}}$ , luego  $B \preceq A$ . ■

**Ejemplo 1.5.4 (Paradoja de Skolem).** El Teorema 1.2.18 implica en particular que, si existe un modelo de la teoría de conjuntos ZFC, existe un modelo numerable de la teoría de conjuntos ZFC; este resultado se conoce como la paradoja de Skolem.

En efecto, digamos que hay un modelo  $V \models \text{ZFC}$ . Ahora bien, por Teorema 1.2.18, existe  $V_0 \preceq V$  con  $V_0$  numerable, en particular  $V_0 \models \text{ZFC}$ . Sabemos por el teorema de Cantor que  $\text{ZFC} \models$  “existen conjuntos no numerables”, luego  $V_0 \models$  “contiene conjuntos no numerables”.

Pero hemos dicho que  $V_0$  es numerable, luego ¡tenemos un conjunto numerable que “contiene conjuntos no numerables”!

La paradoja se produce por el hecho de que estamos confundiendo dos conceptos de numerable muy diferentes. Por un lado, tenemos la noción de numerable extrínseca a  $V_0$ : aquí tenemos que  $V_0$  es numerable respecto a esta noción extrínseca. Por otro lado, tenemos una noción de numerable intrínseca a  $V_0$ , la cual se expresa con una fórmula  $\varphi(x) \in \text{For}_{L_\in}^x$  en el lenguaje de teoría de conjuntos (es decir,  $\varphi(x) = “x \text{ es numerable}”$  con  $x$  variable simple).

Tenemos que  $\text{ZFC} \models \exists x \neg \varphi(x)$ , luego  $V_0 \models \exists x \neg \varphi(x)$  y, por tanto,  $V_0$  contiene un elemento  $a$  tal que  $V_0 \models “a \text{ es no numerable}”$ . La afirmación “ $a$  es no numerable” significa que en  $V_0$  “no hay una biyección entre  $a$  y los naturales”.

Por otro lado, como  $V_0$  es numerable (en el sentido extrínseco), el subconjunto  $\{b : V_0 \models b \in a\}$  es numerable (en el sentido extrínseco) y, en consecuencia, hay una biyección extrínseca  $f$  entre  $\{b : V_0 \models b \in a\}$  y  $\mathbb{N}$ .

La paradoja surge al confundir la biyección extrínseca  $f$  entre  $\mathbb{N}$  y  $\{b : V_0 \models b \in a\}$  con una biyección intrínseca entre los naturales y  $a$ . Esta identificación es errónea por varios motivos.

En primer lugar, el conjunto de los naturales intrínseco a  $V_0$  no es necesariamente  $\mathbb{N}$ . En efecto, sabemos que  $V_0$  contiene un elemento  $\omega$  tal que  $V_0 \models “\omega \text{ es el conjunto de los números naturales}”$ , donde la fórmula  $\varphi(x) = “x \text{ es el conjunto de los números naturales}”$  es una fórmula en  $L_\in$  que usamos para definir los números naturales formalmente a partir de ZFC. Sin embargo,  $\omega$  no tiene por qué ser el modelo estándar  $\mathbb{N}$  de los números naturales, el cual es, en principio, extrínseco a  $V_0$ .

## 1.6 Ultra productos

**Definición 1.6.1 (Filtro).** Sea  $\Omega \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$  no vacío es un filtro  $\iff$

- (i) Si  $A, B \in \mathcal{F}$ , entonces  $A \cap B \in \mathcal{F}$ .
- (ii) Si  $A \in \mathcal{F}$  y  $A \subset B$ , entonces  $B \in \mathcal{F}$ .
- (iii)  $\emptyset \notin \mathcal{F}$ .

**Ejemplos 1.6.1 (de filtros).**

[1] Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico y sea  $x \in X$ . Entonces,

$$\mathcal{V}(x) := \{U \in \mathcal{T} : x \in U\} \text{ es un filtro.}$$

[2] Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida. Entonces,

$$\mathcal{F} := \{A \in \Sigma : \mu(A) = 0\} \text{ es un filtro.}$$

[3] El filtro de Fréchet: Sea  $\Omega$  un conjunto infinito. Entonces,

$$\mathcal{F} := \{A \subset \Omega : \Omega \setminus A \text{ es finito}\} \text{ es un filtro.}$$

**Definición 1.6.2 (Propiedad de intersección finita).** Sea  $\mathcal{S}$  una familia de conjuntos,  $\mathcal{S}$  tiene la propiedad de intersección finita

$$\iff \text{para todo subconjunto finito } S_0 \subset \mathcal{S}, \bigcap S_0 \neq \emptyset.$$

**Lema 1.6.1 (Filtro generado).** Sea  $\Omega \neq \emptyset$  y  $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(\Omega)$  con la propiedad de intersección finita. Entonces,

$$\langle \mathcal{S} \rangle := \{A \subset \Omega : \text{existe } S_0 \subset \mathcal{S} \text{ finito con } \bigcap S_0 \subset A\}$$

es un filtro de  $\Omega$  y es el mínimo filtro que contiene a  $\mathcal{S}$ .

**Demostración:** Como  $S \subset S$  para todo  $S \in \mathcal{S}$ , evidentemente  $\mathcal{S} \subset \langle \mathcal{S} \rangle$ . Si  $A \in \langle \mathcal{S} \rangle$  y  $A \subset B$ , existe  $S_0 \subset \mathcal{S}$  finito tal que  $\bigcap S_0 \subset A \subset B$ , luego  $B \in \langle \mathcal{S} \rangle$ .

Si  $A, B \in \langle \mathcal{S} \rangle$ , existen  $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2 \subset \mathcal{S}$  finitos tales que  $\bigcap \mathcal{S}_1 \subset A$  y  $\bigcap \mathcal{S}_2 \subset B$ , luego  $\bigcap \mathcal{S}_3 = \bigcap \mathcal{S}_1 \cap \bigcap \mathcal{S}_2 \subset A \cap B$  con  $\mathcal{S}_3 = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2 \subset \mathcal{S}$  finito. Finalmente, si  $\mathcal{F}$  es un filtro con  $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ , entonces,  $\bigcap \mathcal{S}_0 \in \mathcal{F}$  para todo  $\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}$  finito (por inducción en  $|\mathcal{S}_0|$ ), luego  $\langle \mathcal{S} \rangle \subset \mathcal{F}$ . ■

**Definición 1.6.3 (Ultrafiltro).** Sea  $\Omega \neq \emptyset$  y sea  $\mathcal{F}$  un filtro de  $\Omega$ ,  $\mathcal{F}$  es un ultrafiltro

$$\iff \mathcal{F} \text{ es un filtro maximal respecto a la inclusión, es decir, no existe un filtro } \mathcal{F}' \text{ con } \mathcal{F} \subsetneq \mathcal{F}'.$$

**Lema 1.6.2.** Sea  $\mathfrak{u}$  un filtro de  $\Omega$ . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1)  $\mathfrak{u}$  es ultrafiltro.
- (2) Para cualquier  $A \subset \Omega$ ,  $A \in \mathfrak{u}$  o  $A^c \in \mathfrak{u}$ .
- (3) Para cualesquiera  $A, B \subset \Omega$ , si  $A \cup B \in \mathfrak{u}$ , entonces,  $A \in \mathfrak{u}$  o  $B \in \mathfrak{u}$ .

**Lema 1.6.3 (Principio de ultrafiltros).** Sean  $\Omega \neq \emptyset$  y  $\mathcal{F}$  un filtro en  $\Omega$ . Entonces, existe un ultrafiltro  $\mathfrak{u}$  en  $\Omega$  tal que  $\mathcal{F} \subset \mathfrak{u}$ .

**Demostración:** Consideremos el conjunto  $K = \{\mathcal{N} \text{ filtro de } \Omega : \mathcal{F} \subset \mathcal{N}\}$ . Entonces,  $\mathcal{F} \in K$  y  $K$  está parcialmente ordenado por  $\subset$ . Veamos que  $K$  cumple el lema de Zorn.

Sea  $\Gamma = \{\mathcal{N}_j\}_{j \in \alpha}$  un subconjunto (no vacío) cualquiera de  $K$  totalmente ordenado por  $\subset$ . Consideremos  $\bigcup \Gamma$ . Evidentemente,  $\mathcal{F} \subset \bigcup \Gamma$ . Como  $\emptyset \notin \mathcal{N}_j$  para ningún  $j \in \alpha$ , tenemos que  $\emptyset \notin \bigcup \Gamma$ . Si  $A \in \bigcup \Gamma$  y  $A \subset B$ , entonces,  $A \in \mathcal{N}_j$  para algún  $j \in \alpha$ , luego  $B \in \mathcal{N}_j$  y  $B \in \bigcup \Gamma$ . Finalmente, si  $A, B \in \bigcup \Gamma$ , existen  $j, j' \in \alpha$  tales que  $A \in \mathcal{N}_j$  y  $B \in \mathcal{N}_{j'}$ . Como  $\Gamma$  es una cadena, o bien  $\mathcal{N}_j \subset \mathcal{N}_{j'}$  o  $\mathcal{N}_{j'} \subset \mathcal{N}_j$ . En cualquier caso, existe  $j \in \alpha$  tal que  $A, B \in \mathcal{N}_j$ , luego  $A \cap B \in \mathcal{N}_j$ , lo que concluye que  $A \cap B \in \bigcup \Gamma$ . Por tanto,  $\bigcup \Gamma$  es un filtro y  $\bigcup \Gamma \in K$  es una cota superior de  $\Gamma$ .

Por el lema de Zorn, existe un elemento maximal de  $K$ , esto es un ultrafiltro que contiene a  $\mathcal{F}$ . ■

## 1.7 Resultados fundamentales de la teoría de modelos

### 1.7.1 Compacidad

Sea  $\Sigma$  un conjunto de enunciados. Decimos que  $\Sigma$  es finitamente satisfactible si todo subconjunto finito de  $\Sigma$  es satisfactible.

**Teorema 1.7.1 (Compacidad).** Sea  $\Sigma$  un conjunto de enunciados finitamente satisfactible. Entonces  $\Sigma$  es satisfactible.

**Demostración:** Consideramos el conjunto  $I$  de los subconjuntos finitos de  $\Sigma$ . Para  $\Phi \subseteq \Sigma$  finito, sea

$$\langle \Phi \rangle := \{\Delta \in I : \Phi \subseteq \Delta\}.$$

Si  $\Phi, \Psi \in I$ , tenemos que  $\langle \Phi \rangle \cap \langle \Psi \rangle = \langle \Phi \cup \Psi \rangle \neq \emptyset$ . Por tanto, por Lema ??,

$$\mathcal{F} = \{Y \subseteq I : \{\Delta' \in I : \Delta \subseteq \Delta'\} \subseteq Y \text{ para algún } \Delta \in I\},$$

es un filtro. Por Lema ??, tenemos un ultrafiltro  $\mathfrak{u}$  en  $I$  que contiene a  $\mathcal{F}$ .

Para cada  $\Phi \in I$ , sea  $A_\Phi$  una L-estructura con  $A_\Phi \models \Phi$ . Por el teorema de Loś (Teorema ??), el ultraproducto  $\prod_{\mathfrak{u}} A_\Phi$  es un modelo de  $\Sigma$ . En efecto, para toda fórmula  $\varphi \in \Sigma$

se tiene que  $\langle \varphi \rangle \in \mathbf{u}$  y  $\langle \varphi \rangle \subseteq \{\Phi \in I : A_\Phi \models \varphi\}$ , luego  $\{\Phi \in I : A_\Phi \models \varphi\} \in \mathbf{u}$ , es decir,  $\prod_{\mathbf{u}} A_\Phi \models \varphi$ . ■

**Corolario 1.7.2 (de Bruijn-Erdős).** Sea  $k \in \mathbb{N}$ . Un grafo es  $k$ -coloreable si y solo si todos sus subgrafos finitos son  $k$ -coloreables.

**Demostración:** Sea  $V$  un grafo. Consideramos  $V$  como  $L_E$ -estructura y añadimos parámetros para todo elemento de  $V$ . Consideramos el lenguaje  $L$  expansión de  $L_E(V)$  dado por añadir  $k$  predicados  $P_1, \dots, P_k$ . Consideramos

$$\Sigma = \text{Diag}(V) \cup \{\varphi_1, \varphi_2\} \cup \left\{ \bigvee_{i=1}^k P_i(v) : v \in V \right\}$$

donde  $\varphi_1 = \forall x \bigwedge_{i \neq j} \neg P_i(x) \wedge P_j(x)$  indica que  $P_1, \dots, P_k$  son disjuntos y  $\varphi_2 = \forall x, y \neg \bigwedge_{i=1}^k (P_i(x) \wedge P_i(y) \wedge x E y)$  indica que  $P_1, \dots, P_k$  definen un coloreado del grafo (es decir, dos vértices conectados tienen colores distintos).

Sea  $\Delta \subseteq \Sigma$  finito. Entonces, existe un subconjunto  $V_0 \subseteq V$  finito tal que  $\Delta \subseteq \text{Diag}(V) \cup \{\varphi_1, \varphi_2\} \cup \{\bigvee_{i=1}^k P_i(v) : v \in V_0\}$ . Por hipótesis, existe un coloreado  $\gamma : V_0 \rightarrow \{1, \dots, k\}$  de  $V_0$ . Luego, consideramos la  $L$ -expansión  $V_\gamma$  de  $V$  dada por interpretar  $P_i^{V_\gamma}(v) \iff v \in V_0 \text{ y } \gamma(v) = i$ . Evidentemente,  $\text{Diag}(V) \models V_\gamma$  (pues  $V_\gamma$  es una expansión de  $V$ ). Como  $\gamma$  es un coloreado, tenemos que  $V_\gamma \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$ . Por último, para cada  $v \in V_0$ ,  $\gamma(v) = i$  para algún  $i \in \{1, \dots, k\}$ . Por tanto,  $V_\gamma \models \bigvee_{i=1}^k P_i(v)$ . En consecuencia,  $V_\gamma \models \Delta$ .

Por tanto,  $\Sigma$  es finitamente satisfactible. Por Teorema 3.1,  $\Sigma$  es satisfactible. Sea  $W$  un modelo de  $\Sigma$ . Como  $W \models \text{Diag}(V)$ , por el lema del diagrama atómico (Ejercicio 2 Hoja 2), tenemos que  $V \leq W$  como  $L_E$ -estructura, es decir, como grafo. Por otro lado, sea  $\gamma' : W \rightarrow \{1, \dots, k\}$  dada por  $\gamma'(w) = i$  si  $w \in P_i^W$  para cada  $i \in \{1, \dots, k\}$ . Como  $W \models \varphi_1$ , tenemos que  $\gamma'$  está bien definida. Como  $W \models \Sigma$ , tenemos que  $\gamma'(v) \in \{1, \dots, k\}$  para todo  $v \in V$ . Como  $W \models \varphi_2$ , tenemos que si  $v E v'$  y  $\gamma'(v) \in \{1, \dots, k\}$ , entonces  $\gamma'(v) \neq \gamma'(v')$ . En particular, concluimos que  $\gamma'|_V : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$  es un coloreado de  $V$ . ■

**Definición 1.7.1 (Finitamente axiomatizable).** Sea  $\Omega$  una clase elemental de  $L$ -estructuras,  $\Omega$  es finitamente axiomatizable  $\iff$  existe un conjunto finito de enunciados  $\Sigma$  tal que  $\Omega = \{A \text{ } L\text{-estructura} : A \models \Sigma\}$ .

**Lema 1.7.3.** Sea  $\Sigma \subset \text{For}^0 L$  y  $\varphi \in \text{For}^0 L$ . Entonces,  $\Sigma \models \varphi$  si y solo si existe  $\Delta \subset \Sigma$  finito

tal que  $\Delta \models \varphi$ .

**Proposición 1.7.4.** *Sea  $\Omega$  una clase de L-estructuras. Entonces,  $\Omega$  es finitamente axiomatizable si y solo si  $\Omega$  y  $\Omega^c := \{A \text{ L-estructura} : A \notin \Omega\}$  son clases elementales.*

**Demostración:** Si  $\Omega$  es finitamente axiomatizable, entonces, existe un enunciado  $\varphi = \bigwedge \Sigma$  tal que

$$\Omega = \{A \text{ L-estructura} : A \models \varphi\}.$$

En tal caso,  $\Omega^c = \{A \text{ una L-estructura} : A \models \neg\varphi\}$ , luego  $\Omega^c$  es elemental.

Supongamos que  $\Omega = \{A \text{ L-estructura} : A \models \Sigma\}$  y  $\Omega^c = \{A \text{ L-estructura} : A \models \Sigma'\}$  con  $\Sigma$  y  $\Sigma'$  conjuntos de enunciados. Entonces,  $\Sigma \cup \Sigma'$  es no satisfactible, ya que si  $A \models \Sigma \cup \Sigma'$ , tenemos que  $A \in \Omega$  y  $A \in \Omega^c$ , lo que es una contradicción. Por compacidad (Teorema 3.1), existe  $\Delta \subseteq \Sigma$  finito con  $\Delta \cup \Sigma'$  no satisfactible. Evidentemente,  $\Omega \subseteq \{A \text{ L-estructura} : A \models \Delta\}$ , pues  $\Delta \subseteq \Sigma$ . Por otro lado, sea  $A$  una L-estructura con  $A \models \Delta$ . Entonces, como  $\Delta \cup \Sigma'$  no es satisfactible,  $A \not\models \Sigma'$ . Es decir,  $A \notin \Omega^c$ , luego  $A \in \Omega$ . En conclusión,  $\Omega = \{A \text{ L-estructura} : A \models \Delta\}$  ■

**Definición 1.7.2 (Equivalencia módulo T).** Sean  $T$  una teoría y  $\varphi, \psi \in \text{For}^x L$ , decimos que  $\varphi$  y  $\psi$  son equivalentes módulo  $T$  si y solo si para cualquier L-estructura  $A$  tal que  $A \models T$  y cualquier  $a \in A^x$  se tiene que  $A \models \varphi(a) \iff A \models \psi(a)$ .

En otras palabras,  $\varphi$  y  $\psi$  son equivalentes módulo  $T$  si y solo si  $T \models \forall x \varphi \leftrightarrow \psi$ .

**Lema 1.7.5 (Caracterización de existenciales).** *Sea  $T$  una teoría y sean  $A, B$  dos L-estructuras tales que para toda inmersión  $h: A \rightarrow B$  y cualquier  $a \in A^x$ ,  $A \models \varphi(a)$  implica  $B \models \varphi(h(a))$ . Entonces,  $\varphi$  es equivalente módulo  $T$  a una fórmula existencial.*

**Demostración:** Supongamos lo contrario. Digamos  $x = (x_i)_{i < n}$ . Considere  $\Sigma_c = T \cup \{\varphi(c)\} \cup \{\neg\psi(c) : \psi \in \text{For}^x L \text{ es existencial y } T \models \forall x \psi \rightarrow \varphi\}$  con  $c = (c_i)_{i < n}$  nueva constante. Si  $\varphi$  no es existencial,  $\Sigma_c$  es finitamente satisfactible. En efecto, si  $\Sigma_c$  no es finitamente satisfactible, hay  $\psi(x)$  (disyunción de existenciales) con  $T \models \forall x \psi(x) \rightarrow \varphi$  tal que  $\neg\varphi(c) \wedge \psi(c)$  no es satisfactible en  $T$ , es decir,  $T \models \varphi(c) \rightarrow \psi(c)$ . Por el lema del elemento arbitrario, concluimos que  $T \models \forall x \varphi \rightarrow \psi$ , luego  $\varphi$  es equivalente a la fórmula existencial  $\psi$ .

Sea  $A \models \Sigma_c$  y considere  $a \in A^x$  dada por  $a_i = c_i^A$ . Considere  $\Sigma' = T \cup \text{Diag}(A) \cup \{\neg\varphi(a)\}$ . Si  $\Sigma'$  es satisfactible, por el lema del diagrama atómico, concluimos que hay una



inmersión  $h : A \rightarrow B$  con  $B \models T$  tal que  $B \not\models \varphi(h(a))$ , lo que contradice la hipótesis del enunciado. Luego, existe  $\psi(a, b) \in \text{Diag}(A)$  tal que  $\neg\varphi(a) \wedge \psi(a, b)$  no es satisfactible en  $T$ . Entonces,  $T \models \psi(a, b) \rightarrow \varphi(a)$ . Por el lema del elemento arbitrario, concluimos que  $T \models \forall x (\exists y \psi(x, y)) \rightarrow \varphi(x)$ . Por tanto, por elección de  $A_c \models \Sigma_c$ , tenemos que  $A \models \neg\exists y \psi(a, y)$ , al mismo tiempo,  $A \models \exists y \psi(a)$ , contradicción. ■

## 1.7.2 Tipos

Sea  $T$  una teoría, decimos que  $\Sigma \subseteq \text{For}^x L$  es satisfactible en  $T$  si existen  $M \models T$  y  $a \in M^x$  tales que  $M \models \Sigma(a)$ . Decimos que  $\Sigma \subseteq \text{For}^x L$  es finitamente satisfactible en  $T$  si todos sus subconjuntos finitos son satisfactibles en  $T$ .

Un *tipo parcial* en  $x$  de  $T$  es un subconjunto de fórmulas  $\Sigma \subseteq \text{For}^x L$  finitamente satisfactible. Un *tipo (completo)* en  $x$  de  $T$  es un tipo parcial maximal respecto a la inclusión. Escribimos  $S^x(T)$  para el *espacio de tipos* en  $x$  de  $T$ .

**Ejemplo 1.7.1.** Dado  $a \in M^x$ , tenemos el tipo

$$\text{tp}(a/A) := \text{tp}^M(a/A) := \{\varphi(x) \in \text{For}^x L(A) : M \models \varphi(a)\},$$

que es un tipo completo en  $\text{Th}(M/A)$ .

## 1.7.3 Categoricidad

**Definición 1.7.3 (Categoricidad absoluta).** Una teoría  $T$  es absolutamente categórica si todos sus modelos son isomorfos.

*Observación 1.7.4.* Por un ejercicio de la hoja 1, si  $T$  es finita, es absolutamente categórica.

**Teorema 1.7.6 (Löwenheim-Skolem-Tarski).** Sean  $L$  un LPO,  $\kappa$  un cardinal,  $A$  una  $L$ -estructura y  $C$  un subconjunto de  $A$ :

(*Descendente*) Si  $\max\{|C|, |L|\} \leq \kappa \leq |A|$ , entonces, existe  $B \preceq A$  con  $|B| = \kappa$  y  $C \subseteq B$ .

(*Ascendente*) Si  $\aleph_0 \leq |A| \leq \max\{|A|, |L|\} \leq \kappa$ , entonces, existe  $A \preceq B$  con  $|B| = \kappa$ .

**Demostración:** Para el caso descendente, tomamos  $C \subseteq C'$  tal que  $|C'| = \kappa$ . Por Teorema 2.21, tenemos que existe  $B \preceq A$  con  $|B| \leq \max\{|C'|, |L|\} \leq \kappa$  que contiene a  $C'$ , luego  $|B| = \kappa$  y  $C \subseteq B$ .

Para el caso ascendente, sea  $C$  un conjunto de constantes nuevas con  $|C| = \kappa$ . Consideramos el conjunto de enunciados en  $L(A, C)$  dado por

$$\Sigma = \text{Th}(A/A) \cup \{c \doteq c' : c, c' \in C \text{ y } c \neq c'\}.$$

Veamos que  $\Sigma$  es finitamente satisfacible. En efecto, sea  $\Delta \subseteq \Sigma$  finito, en particular,  $\Delta \subseteq \text{Th}(A/A) \cup \Delta'$  con  $\Delta' = \{c \doteq c' : c, c' \in C_0 \text{ y } c \neq c'\}$  con  $C_0 \subseteq C$  finito. Fijamos una numeración  $C_0 = \{c_1, \dots, c_m\}$ . Como  $A$  es infinito, existen  $a_1, \dots, a_m \in A$  con  $a_i \neq a_j$  para  $i \neq j$ . Sea  $A_\Delta$  la  $L(A, C)$ -expansión dada por  $c_i^{A_\Delta} = a_i$  para cada  $i \leq m$ . Entonces, tenemos que  $A_\Delta \models \text{Th}(A/A) \cup \Delta'$ , luego  $A_\Delta \models \Delta$ .

Por tanto, por el Teorema de Compacidad (Teorema 3.1), existe una  $L(A, C)$ -estructura  $B'_1$  modelo de  $\Sigma$ . Sea  $B_1$  su  $L$ -reducto. Por 2.16,  $A \preceq B_1$ . Como  $|C| = \kappa$  y para todo  $c, c' \in C$  tenemos  $B_1 \models c \neq c'$ , concluimos que  $|B_1| \geq \kappa$ . Finalmente, por el caso descendente aplicado a  $B_1$  y al subconjunto  $A$ , existe una  $L$ -subestructura elemental  $B$  de  $B_1$  con  $|B| = \kappa$  y  $A \subseteq B \subseteq B_1$ , tenemos que  $A \preceq B$ . ■

**Corolario 1.7.7.** *Si  $\mathcal{T}$  tiene un modelo infinito, entonces,  $\mathcal{T}$  tiene modelos de cardinalidad  $\kappa$  para todo  $\kappa \geq |\mathcal{L}|$ . En otras palabras, no existen teorías de primer orden con modelos infinitos categóricas.*

**Ejemplo 1.7.2 (Categoricidad de los naturales y los reales).** Dos resultados básicos (demostrados por Dedekind) que se estudian en teoría de conjuntos establecen que  $\mathbb{N}$  y  $\mathbb{R}$  están unívocamente determinados (salvo isomorfismo) a partir de sus axiomas.

Los números naturales  $\mathbb{N}$  se definen como el conjunto  $\mathbb{N}$  con un elemento  $0 \in \mathbb{N}$  y una función  $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que se cumplen los siguientes postulados:

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} \quad 0 &\neq S(n) \\ \forall n, m \in \mathbb{N} \quad S(n) = S(m) &\implies n = m \\ \forall P \subseteq \mathbb{N} \quad (0 \in P \wedge (\forall n \in P \implies n + 1 \in P)) &\implies P = \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Estos postulados se conocen como *postulados de Peano*<sup>3</sup> y, en particular, el tercer postulado se conoce como el *principio de inducción*<sup>4</sup>. Es fácil demostrar que si  $(\mathbb{N}, 0, S)$  y  $(\mathbb{N}, o, \sigma)$  cumplen los postulados de Peano, entonces, ambas estructuras son isomorfas (Ejercicio 9

<sup>3</sup>Los postulados de Peano también se denominan axiomas de Peano: en efecto, estos postulados se pueden interpretar como axiomas en lógica de segundo orden (donde también hay variables para relaciones o funciones). Sin embargo, en este curso vamos a reservar el término “axioma” para la noción formal de axiomas en lógica de primer orden.

<sup>4</sup>En realidad hay muchas variantes del principio de inducción. Este es el principio de inducción *discreto*

Hoja 3). En otras palabras, los números naturales son únicos.

Por otro lado, los números reales  $\mathbb{R}$  se define como el cuerpo totalmente ordenado que satisface el principio del supremo:

$$\forall D \subseteq \mathbb{R} \quad D \text{ tiene cota superior} \implies D \text{ tiene un supremo (mínima cota superior)}.$$

Nuevamente, los números reales son únicos módulo isomorfismo (ver anexo de teoría de conjuntos).

Ahora bien, los principios de inducción y del supremo que acabamos de enunciar no son fórmulas de primer orden. En efecto, ambos postulados involucran cuantificadores sobre subconjuntos, lo cual no está permitido en lógica de primer orden. En otras palabras, estos postulados asumen un mínimo de teoría de conjuntos ambiente para poder hablar de subconjuntos arbitrarios. Más rigurosamente, las fórmulas que involucran cuantificadores sobre subconjuntos se conocen como fórmulas en *lógica de segundo orden*. Así, los resultados de unicidad de  $\mathbb{N}$  y  $\mathbb{R}$  que hemos descrito son resultados que dependen del universo de conjuntos ambiente o, dicho de un modo más preciso, ambos resultados demuestran la unicidad de  $\mathbb{N}$  y  $\mathbb{R}$  como modelos de sus teorías de segundo orden. Por el contrario,  $\mathbb{N}$  y  $\mathbb{R}$  están lejos de ser únicos en lógica de primer orden. En efecto, si consideramos las teorías de primer orden de  $\mathbb{N}$  y  $\mathbb{R}$ , de acuerdo al teorema de Löwenheim-Skolem, existen modelos de  $\text{Th}(\mathbb{N})$  y  $\text{Th}(\mathbb{R})$  de cardinalidades arbitrarias.

**Definición 1.7.5.** Sea  $T$  una teoría y  $\kappa$  un cardinal infinito. Decimos que  $T$  es  $\kappa$ -categorica si todos sus modelos de cardinalidad  $\kappa$  son isomorfos.

---

*general.* El adjetivo “discreto” se utiliza para distinguirlo del *principio de inducción lineal*:

$$\forall P \quad (0 \in P \wedge (\forall n (\forall m < n \ m \in P) \rightarrow n \in P)) \rightarrow P = \mathbb{N};$$

el cual se formula con el orden en lugar de  $S$  y es más débil que el principio de inducción discreto. Por otro lado, el adjetivo “general” indica que se formula para todos los subconjuntos  $P$  de  $\mathbb{N}$  y se utiliza para distinguirlo de variaciones restringidas del principio de inducción.



# H. Hojas de ejercicios

## H.1 Hoja 1: Lenguajes y estructuras

Los ejercicios de mayor dificultad están indicados con “!”.

[1] Reescribe las siguientes fórmulas de notación estándar a notación polaca y viceversa. Indica en cada caso a qué lenguaje pertenecen.

- (a)  $\forall x x \neq 0 \rightarrow \exists y xy = 1.$
- (b)  $\wedge \neg \wedge \exists z \dot{=} y + x \cdot zz \neg < xy \neg \wedge < xy \neg \exists z \dot{=} y + x \cdot zz.$
- (c)  $\forall x \exists a, b, c, d x = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$
- (d)  $\neg \exists x \neg \neg \wedge \neg \exists y \neg \exists z \wedge ExzEzy \neg \exists y Exy.$
- (e)  $\exists x (\exists y y \in x) \wedge (\forall y y \in x \rightarrow \exists z y \in z \wedge z \in x).$

**Solución:**

- (a) Esta fórmula está en el lenguaje de anillos  $L_a$ . En notación polaca, la fórmula se escribe como  $\rightarrow \forall x \neg \dot{=} x 0 \exists y \dot{=} \cdot xy 1.$
- (b) Esta fórmula está en el lenguaje de la aritmética  $L_{\mathbb{N}}$ . En notación estándar, la fórmula se escribe como
- (c) Esta fórmula está en el lenguaje de la aritmética con exponencial  $L_{\mathbb{N}, \exp}$  (o en el lenguaje de anillos si consideramos  $a^2$  como  $\cdot a a$ ). En notación polaca, la fórmula se escribe como  $\forall x \exists a \exists b \exists c \exists d \dot{=} x + + + \cdot aa \cdot bb \cdot cc \cdot dd.$
- (d) Esta fórmula está en el lenguaje de grafos  $L_{gr}$ . En notación estándar, la fórmula se escribe como  $\forall x (\forall y \exists z xEz \wedge zEy) \vee (\exists y xEy).$
- (e) Esta fórmula está en el lenguaje de conjuntos  $L_{\in}$ . En notación polaca, la fórmula se escribe como  $\exists x \wedge \exists y \in y x \forall y \rightarrow \in y x \exists z \wedge \in y z \in z x.$

[2] Identifica si las siguientes expresiones se pueden escribir con fórmulas de primer orden en sus correspondientes lenguajes. En caso afirmativo, escribe la correspondiente fórmula. En caso negativo, da una justificación heurística:

- (a) Una fórmula en  $L_a$  que indique que un cuerpo tiene característica 2.

- (b) Una fórmula en  $L_a$  que indique que un cuerpo tiene característica 0.
- (c) Una fórmula en  $L_a$  que indique que todo polinomio de grado 3 tiene al menos una raíz.
- (d) Una fórmula en  $L_{\mathbb{N}}$  que defina qué es un número primo.
- (e) Una fórmula en  $L_E$  que indique que un grafo es conexo.
- (f) Una fórmula en  $L_{gr}$  que indique que un grupo es 2-nilpotente.
- (g) Una fórmula en  $L_{K\text{-vec}}$  que indique que un espacio vectorial tiene dimensión menor a 3.

**Solución:**

- (a) En el lenguaje de cuerpos  $L_a = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$ , una fórmula que indique que un cuerpo tiene característica 2 es  $\neg(1 = 0) \wedge (1 + 1 = 0)$ .
- (b) Que un cuerpo tenga característica 0 significa que no existe ningún número natural  $n$  tal que  $1_K + \dots + 1_K = 0_K$ . Esto no se puede expresar con una fórmula de primer orden, ya que requeriría cuantificar sobre los números naturales, lo cual no es posible en el lenguaje de cuerpos.
- (c) En el lenguaje de cuerpos  $L_a$ , una fórmula que indique que todo polinomio de grado 3 tiene al menos una raíz es  $\forall a, b, c \ a \neq 0 \rightarrow (\exists x \ x^3 + ax^2 + bx + c = 0)$ .
- (d) En el lenguaje de la aritmética  $L_{\mathbb{N}} = \{+, \cdot, S, 0, <\}$ , una fórmula que defina qué es un número primo es

$$x \neq 0 \wedge x \neq 1 \wedge (\forall y, z \ x = y \cdot z \rightarrow (y = 1 \vee z = 1)).$$

- (e) En el lenguaje de grafos  $L_E = \{E\}$ , no se puede expresar que un grafo es conexo con una fórmula de primer orden, ya que esto requeriría cuantificar sobre conjuntos de vértices o sobre caminos, lo cual no es posible en el lenguaje de grafos.
- (f) En el lenguaje de grupos  $L_{gr}$ , una fórmula que indique que un grupo es 2-nilpotente es  $\forall x, y, z \ [[x, y], z] = 1$ , donde  $[x, y]$  denota el conmutador  $xyx^{-1}y^{-1}$ .
- (g) En el lenguaje de espacios vectoriales  $L_{K\text{-vec}}$ , en general, no se puede expresar que un espacio vectorial tiene dimensión menor a 3 con una fórmula de primer orden, ya que esto requeriría cuantificar sobre  $K$ , que no está permitido en el lenguaje de espacios vectoriales. Sin embargo, si  $K$  es finito, entonces sí se puede:

$$\forall v_1, v_2, v_3 \ \bigvee_{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in K} \left( 0 = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 \wedge \bigvee_{i=1}^3 \lambda_i \neq 0 \right).$$

**3 Lectura única en notación estándar con paréntesis.** En este ejercicio veremos que el resultado de lectura única también se aplica a las fórmulas escritas en notación estándar utilizando paréntesis.

Definimos el conjunto de términos en notación estándar  $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}$  como el conjunto de palabras en el lenguaje  $\mathbf{L} \sqcup \{\perp, \vee, \rightarrow, \iff, \forall'\} \sqcup X \sqcup \{(\cdot)\}$  del siguiente modo:

(a)  $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}^0$  son las palabras de longitud 1 que consisten en un único símbolo de constante  $c_o$  o en un único símbolo de variable simple  $x$ .

(b) Para  $\chi > 0$ ,  $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}^\chi$  es el conjunto que incluye  $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$  y todas las palabras de la forma:

$f(t_1, \dots, t_k)$  donde  $f$  es un símbolo de función de aridad  $k \neq 2$  y  $t_1, \dots, t_k$  términos de complejidad menor a  $\chi$ .

$(t_1 f t_2)$  donde  $f$  es un símbolo de función binario y  $t_1, t_2$  son términos de complejidad menor a  $\chi$ .

Tomamos  $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st} = \bigcup_n \text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}^n$ .

Definimos el conjunto de las fórmulas en notación estándar  $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}$  como el conjunto de palabras en el lenguaje  $\mathbf{L} \sqcup X \sqcup \{\perp, \wedge, \forall'\} \sqcup \{(\cdot)\}$  del siguiente modo:

(a)  $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^0$  son las palabras de la forma:

$R(t_1, \dots, t_m)$  donde  $R$  es un símbolo de relación de aridad  $m \neq 2$  y  $t_1, \dots, t_m$  son términos (esto incluye  $\perp$ ).

$(t_1 R t_2)$  donde  $R$  es un símbolo de relación binario y  $t_1, t_2$  son términos (esto incluye  $\doteq$  como símbolo de igualdad).

(b) Para  $\chi > 0$ ,  $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^\chi$  es el conjunto que incluye  $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$  y todas las palabras de la forma:

$(\exists x \phi)$  o  $(\forall x \phi)$  donde  $x$  es una variable simple y  $\phi \in \text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$ ;

$(\psi_1 \vee \psi_2), (\psi_1 \wedge \psi_2), (\psi_1 \rightarrow \psi_2)$  o  $(\psi_1 \iff \psi_2)$  donde  $\psi_1, \psi_2 \in \text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$ ;

$(\neg \phi)$  donde  $\phi \in \text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$ .

Tomamos  $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st} = \bigcup_n \text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^n$ .

(a) Considera una palabra  $\eta$ . Define formalmente qué significa que los paréntesis estén bien emparejados en  $\eta$ .

(b) Considera una palabra  $\eta$  y un símbolo  $\eta[i]$  que no es ni “(” ni “)”. Define formalmente

qué significa que  $\eta[i]$  esté o no entre paréntesis y cuál es el nivel de paréntesis encajados en el que se encuentra.

- (c) Demuestra que si  $\eta$  y  $\eta'$  tienen los paréntesis bien emparejados,  $\eta\eta'$  también tiene los paréntesis bien emparejados.
- (d) Demuestra que si  $\eta$  es una palabra con paréntesis bien emparejados,  $(\eta)$  es una palabra con paréntesis bien emparejados y, además, todos los símbolos (excluyendo paréntesis) de  $(\eta)$  están encajados en al menos un paréntesis.
- (e) Demuestra que los términos y las fórmulas en notación estándar son palabras con paréntesis bien emparejados.
- (f) Concluye lectura única para términos y fórmulas escritos con notación estándar.

4 Calcula las siguientes substituciones:

- (a)  $\text{Sub}_x^{x+1}[x^2 + yx - 3]$ .
- (b)  $\text{Sub}_y^{xyx^{-1}}[x^{-1}yyx]$ .
- (c)  $\text{Sub}_x^{-1}[(\exists y y^2 = x \vee y = x) \wedge \forall x x^2 = x]$ .
- (d)  $\text{Sub}_\varepsilon^{x^2/2}[\forall x, y \exists \delta \delta > 0 \wedge (|x - y| < \delta \rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)]$ .

**Solución:** Atendemos a la Definición 1.1.20 y a la Definición 1.1.21.

- (a)  $\text{Sub}_x^{x+1}[x^2 + yx - 3] = (x + 1)^2 + y(x + 1) - 3$ .
- (b)  $\text{Sub}_y^{xyx^{-1}}[x^{-1}yyx] = x^{-1}xyx^{-1}xyx^{-1}x$ .
- (c) Sustituimos  $x$  por  $-1$  en  $(\exists y y^2 = x \vee y = x) \wedge \forall x x^2 = x$ .

Primera parte:  $\exists y y^2 = x \vee y = x$ . Como  $y \neq x$  y  $y$  no aparece en  $-1$ , usamos el caso I de la definición:

$$\text{Sub}_x^{-1}[\exists y y^2 = x \vee y = x] = \exists y \text{Sub}_x^{-1}[y^2 = x \vee y = x] = \exists y (y^2 = -1 \vee y = -1).$$

Segunda parte:  $\forall x x^2 = x$ . Como  $x$  es la variable cuantificada y  $x$  no aparece en  $-1$ , usamos el caso II: la variable ligada  $x$  no se sustituye, así que

$$\text{Sub}_x^{-1}[\forall x x^2 = x] = \forall x x^2 = x.$$

Por tanto, el resultado es:  $(\exists y y^2 = -1 \vee y = -1) \wedge \forall x x^2 = x$ .

- (d) Sustituimos  $\varepsilon$  por  $x^2/2$  en  $\forall x, y \exists \delta \delta > 0 \wedge (|x - y| < \delta \rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$ .



Como  $x$  aparece en  $x^2/2$  y también está cuantificada en la fórmula, debemos usar el caso III (renombrado de variables). Renombramos  $x$  e  $y$  por  $z$  y  $w$  respectivamente, que no aparecen en  $x^2/2$  ni en la fórmula original:

$$\forall z, w \exists \delta \delta > 0 \wedge (|z - w| < \delta \rightarrow |f(z) - f(w)| < \varepsilon).$$

Ahora sustituimos  $\varepsilon$  por  $x^2/2$  obteniendo como resultado final:

$$\forall z, w \exists \delta \delta > 0 \wedge (|z - w| < \delta \rightarrow |f(z) - f(w)| < x^2/2).$$

**5** Sea  $\eta$  una fórmula o término. ¿Es cierto que  $\text{Sub}_x^x[\eta] = \eta$ ? ¿Qué ocurre si sustituimos todas las variables libres de una fórmula por sí mismas?

**Solución:** La respuesta depende de si  $\eta$  es un término o una fórmula.

- (a) Si  $\eta$  es un término, entonces  $\text{Sub}_x^x[\eta] = \eta$ . Esto se demuestra por inducción sobre la complejidad de  $\eta$ .
- (b) Si  $\eta$  es una fórmula, entonces  $\text{Sub}_x^x[\eta]$  no es necesariamente igual a  $\eta$ . Por ejemplo, si  $\eta = \exists x x = x$ , entonces, como  $x$  es la variable cuantificada y aparece en  $x$ , al sustituir  $x$  por  $x$  debemos usar el caso III de la definición de sustitución, lo que implica renombrar la variable cuantificada. Por tanto,  $\text{Sub}_x^x[\exists x x = x] = \exists z z = z$  donde se ha tomado  $z$  como una variable distinta a  $x$ .

**6** Sean  $x_1, x_2, y_1, y_2$  variables simples distintas.

- (a) Demuestra que, si  $t$  es un término,  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t]]$ .
- (b) Demuestra que, para una fórmula  $\phi$ ,  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\phi]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\phi]]$  no es cierto en general.
- (c) Demuestra que, si  $\phi$  es una fórmula tal que  $y_1$  y  $y_2$  no aparecen ligadas en  $\phi$ , entonces,  $\text{Sub}_{y_1}^{x_1}[\text{Sub}_{y_2}^{x_2}[\phi]] = \text{Sub}_{y_2}^{x_2}[\text{Sub}_{y_1}^{x_1}[\phi]]$ .

**Solución:**

- (a) Lo demostramos por inducción en la complejidad de  $t$ . Para el caso de complejidad 0 hay tres posibilidades:

I. Si  $t = x_1$ ,  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[x_1]] = \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[x_1] = y_1$  y  $\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[x_1]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[y_1] = y_1$ .

II. Si  $t = x_2$ ,  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[x_2]] = \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[y_2] = y_2$  y  $\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[x_2]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[x_2] = y_2$ .

III. Si  $t \neq x_1, x_2$ ,  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t]] = \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t] = t$  y  $\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t] = t$ .

Suponemos que se cumple para términos de complejidad menor a  $\chi > 0$ . Si  $t$  es un término de complejidad  $\chi$ , entonces  $t = f t_1 \dots t_k$  para  $f$  símbolo de función y  $t_1, \dots, t_k$  términos de complejidad menor a  $\chi$ . Por la definición de substitución en términos, tenemos que

$$\begin{aligned} \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t]] &= \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[f t_1 \dots t_k] = f \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t_1]] \dots \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t_k]] \\ &\stackrel{\text{HI}}{\downarrow} f \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t_1]] \dots \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t_k]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t]]. \end{aligned}$$

(b) Basta con considerar el contraejemplo  $\phi \equiv \exists y_1 x_1 = x_2$ .

Primero calculamos  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\phi]]$ . La substitución interior da  $\exists y_1 x_1 = y_2$  pues  $y_1$  no aparece en  $y_2$ . Ahora, al aplicar  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}$  al resultado, como la variable cuantificada es  $y_1$  y el término sustituto es  $y_1$ , se produce un conflicto (caso III) y debemos renombrar la variable ligada  $y_1$  a una variable fresca  $z$ . El cálculo es  $\exists z \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{y_1}^z[x_1 = y_2]] = \exists z \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[x_1 = y_2] = \exists z (y_1 = y_2)$ .

Ahora calculamos  $\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\phi]]$ . La substitución interior  $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\exists y_1 x_1 = x_2]$  nos obliga a renombrar la variable ligada  $y_1$  (digamos a  $w$ ) resultando en  $\exists w (y_1 = x_2)$ . Luego sustituimos  $x_2$  por  $y_2$  obteniendo  $\exists w (y_1 = y_2)$ .

Si la función de elección de variables frescas  $v \mapsto z_v$  asigna variables distintas dependiendo del conjunto de variables libres presentes en ese paso intermedio (por ejemplo, si  $y_2$  fuera la primera variable fresca disponible en el primer caso pero no en el segundo, donde ya aparece libre), entonces  $z \neq w$  y las fórmulas finales son distintas cadenas de símbolos.

7 Demuestra lo siguiente:

- (a) La composición de homomorfismos es un homomorfismo, la composición de inclusiones es una inclusión, la composición de inmersiones es una inmersión y la composición de isomorfismos es un isomorfismo.
- (b) Un homomorfismo es un isomorfismo si y solo si es una inmersión sobreyectiva.
- (c) El conjunto de automorfismos forma un grupo con la composición.
- (d) Para cualquier subconjunto  $B$ ,  $\text{Aut}(A/B)$  es un subgrupo de  $\text{Aut}(A)$ .

(e)  $\text{Aut}(A_B) = \text{Aut}(A/B)$  donde  $A_B$  es la expansión dada por añadir  $B$  como parámetros.

**Solución:** Se trata de los lemas 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 respectivamente.

- 8 (a) Considera  $\mathbb{Q}$  y  $\mathbb{R}$  como  $L_{<}$ -estructuras con el orden usual. Demuestra que la inclusión usual  $\iota: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$  es una inmersión.
- (b) Considera  $I = (0, 1)$  y  $\bar{I} = [0, 1]$ . Demuestra que las inclusiones usuales  $\iota: I \rightarrow \bar{I}$  y  $\iota: \bar{I} \rightarrow \mathbb{R}$  son inmersiones. Demuestra que  $I \cong \mathbb{R}$  pero  $\bar{I} \not\cong \mathbb{R}$ .
- (c) Sea  $P$  un orden parcial finito. Demuestra que existe una inclusión  $f: P \rightarrow \mathbb{Q}$ . ¿Cuándo es una inmersión?
- (d) Sean  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{Q}$  con  $a_1 < \dots < a_n$  y  $b_1 < \dots < b_n$ . Calcula un automorfismo  $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$  tal que  $f(a_i) = b_i$  para cada  $i$ .
- (e) Demuestra que  $\text{Aut}(\mathbb{R}/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}$ . Considera  $\mathbb{R}$  como  $L_{\mathbb{R}}$ -estructura. Demuestra que  $\text{Aut}(\mathbb{R}) = \{\text{id}\}$ .
- (f) Sea  $I' = I \setminus \{1/2\}$ . Demuestra que  $\iota: I' \rightarrow I$  es una inmersión pero  $I' \not\cong I$ .

**Solución:**

- (a) Como el único símbolo en  $L_{<}$  es el símbolo de relación binaria  $<$  y  $\forall q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$  se tiene que  $(q_1, q_2) \in <^{\mathbb{Q}} \implies (\iota(q_1), \iota(q_2)) \in <^{\mathbb{R}}$ ,  $\iota$  es un morfismo.

Como también se cumple que  $(\iota(q_1), \iota(q_2)) \in <^{\mathbb{R}} \implies (q_1, q_2) \in <^{\mathbb{Q}}$ ,  $\iota$  es una inmersión.

- (b) Las inclusiones usuales  $I \rightarrow \bar{I}$  y  $\bar{I} \rightarrow \mathbb{R}$  son inmersiones por la misma razón que en el apartado anterior.

Para ver que  $I \cong \mathbb{R}$ , basta con considerar la función  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$ , que es un isomorfismo porque es biyectiva y preserva el orden.

Para ver que  $\bar{I} \not\cong \mathbb{R}$ , basta con observar que  $\bar{I}$  tiene un mínimo (el 0) y un máximo (el 1), mientras que  $\mathbb{R}$  no tiene ni mínimo ni máximo, por lo que no pueden ser isomorfos. En particular, si definimos la relación unaria  $P(x) := \forall y (x \neq y \rightarrow x < y)$ , entonces  $\bar{I} \models \exists x P(x)$  pero  $\mathbb{R} \not\models \exists x P(x)$ . Por tanto, por el Lema 1.2.18,  $\bar{I} \not\cong \mathbb{R}$ .

(c)

[9] Considera un anillo conmutativo  $R$  como  $L_a$ -estructura. Demuestra que, para todo término  $t \in \text{Ter}^x L_a$ , la interpretación  $t^R: R^x \rightarrow R$  es un polinomio en  $R$  con coeficiente en  $\mathbb{Z}$ .

**Solución:** Recordamos que  $L_a = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$ . Como hay un número finito de variables simples en  $t$ , podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $x = (x_1, \dots, x_n)$  es la tupla de variables simples que aparecen en  $t$ . Por la Observación 1.2.10, podemos identificar una evaluación  $a: x \rightarrow R$  con el elemento  $a = (a_1, \dots, a_n) \in R^n$  tal que  $a_i = a(x_i)$  para cada  $i$ .

Procedemos por inducción en la complejidad del término  $t$ .

**Caso base:** Si la complejidad de  $t$  es 0, entonces  $t$  es una variable o una constante.

- I. Si  $t = x_i$  es una variable simple, entonces  $t^R(a) = a_i$  para todo  $a \in R^x$ . Esto corresponde al polinomio  $P(x_1, \dots, x_n) = x_i$ , que tiene coeficientes en  $\{0, 1\} \subseteq \mathbb{Z}$ .
- II. Si  $t = c$  es una constante, entonces  $t^R(a) = c^R$  para todo  $a \in R^x$ . Esto corresponde a los polinomios constantes  $P(x) = 0$  o  $P(x) = 1$  (ya que 0 y 1 son las únicas constantes en  $L_a$ ), que tienen coeficientes en  $\mathbb{Z}$ .

**Paso inductivo:** Supongamos que el resultado es cierto para términos de complejidad menor a  $\chi > 0$ . Sea  $t$  un término de complejidad  $\chi$ . Entonces  $t$  es de la forma  $t_1 + t_2$ ,  $t_1 \cdot t_2$  o  $-t_1$ , donde  $t_1, t_2$  tienen complejidad menor a  $\chi$ . Por hipótesis de inducción, existen polinomios  $P_1, P_2 \in \mathbb{Z}[x]$  tales que  $t_1^R(a) = P_1(a)$  y  $t_2^R(a) = P_2(a)$  para todo  $a \in R^x$ .

- I. Si  $t = t_1 + t_2$ , entonces  $t^R(a) = t_1^R(a) + t_2^R(a) = P_1(a) + P_2(a) = (P_1 + P_2)(a)$ .
- II. Si  $t = t_1 \cdot t_2$ , entonces  $t^R(a) = t_1^R(a) \cdot t_2^R(a) = P_1(a) \cdot P_2(a) = (P_1 \cdot P_2)(a)$ .
- III. Si  $t = -t_1$ , entonces  $t^R(a) = -t_1^R(a) = -P_1(a) = (-P_1)(a)$ .

Como la suma, el producto y el opuesto de polinomios con coeficientes enteros también es un polinomio con coeficientes en  $\mathbb{Z}$ , concluimos que  $t^R$  es un polinomio con coeficientes enteros evaluado en los elementos de  $R$ . ■

[10] **Tablas de verdad y conectivas.** Sea  $A$  una  $L$ -estructura. Consideramos la función  $v^A: \text{For}^0 L \rightarrow \mathbb{F}_2$  (donde  $\mathbb{F}_2$  es el cuerpo de dos elementos) dada por

$$v^A(\phi) = \begin{cases} 1 & \text{si } A \models \phi, \\ 0 & \text{si } A \not\models \phi. \end{cases}$$

- (a) Definimos las funciones  $\neg_v: \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2$  y  $\wedge_v: \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2$  dadas por  $\neg_v(v^A(\phi)) = v^A(\neg\phi)$

y  $\wedge_v(v^A(\phi), v^A(\psi)) = v^A(\phi \wedge \psi)$ . Identifica  $\neg_v$  y  $\wedge_v$  mediante tablas indicando todos sus posibles valores (denominadas tablas de verdad). Concluye que  $\neg_v$  y  $\wedge_v$  no dependen de la estructura. Identifica  $\neg_v$  y  $\wedge_v$  con polinomios en  $\mathbb{F}_2$ .

- (b) Imitando el caso anterior, define  $\vee_v$ ,  $\rightarrow_v$  y  $\iff_v$ . Escribe sus tablas de verdad e identifica dichas conectivas con polinomios en  $\mathbb{F}_2$ .
- (c) Una conectiva  $n$ -aria es una función  $\circ : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$ . Demuestra que toda conectiva  $n$ -aria es un polinomio en  $n$ -variables.
- (d) Un conjunto de conectivas  $\Sigma$  es completo si todas las conectivas se pueden obtener mediante composiciones sucesivas a partir de  $\Sigma$ . Demuestra que  $\{\neg, \wedge\}$ ,  $\{\neg, \vee\}$  y  $\{\neg, \rightarrow\}$  son completos.
- (e) Demuestra que  $\{\wedge, \vee, \rightarrow\}$  y  $\{\neg, \iff\}$  no son completos.
- (f) ¿Existe un conjunto completo de conectivas que contenga una única conectiva?

**11 Interpretación y satisfacción en reductos.** Sean  $L \subseteq L'$  lenguajes. Sea  $A'$  una  $L'$ -estructura y  $A$  su  $L$ -reducto.

- (a) Demuestra que  $t^{A'}(a) = t^A(a)$  para todo término  $t \in \text{Ter}^x L$  y cualquier  $a \in A^x$ .
- (b) Demuestra que  $A' \models \phi(a)$  si y solo si  $A \models \phi(a)$  para toda fórmula  $\phi \in \text{For}^x L$  y cualquier  $a \in A^x$ .

**12 Lema de los parámetros.** Sean  $L$  un lenguaje y  $A$  una  $L$ -estructura. Sea  $B$  un subconjunto de  $A$  y considera la  $L(B)$ -expansión  $A_B$  dada por añadir  $B$  como parámetros. Denota por  $B := \{b\}_{b \in B}$  las constantes nuevas añadidas a  $L(B)$ . Sean  $t \in \text{Ter}^x L(B)$ ,  $\phi \in \text{For}^x L(B)$  y  $a \in A^x$ .

- (a) Demuestra que existen un término  $\tilde{t}(x, y) \in \text{Ter}^{xy} L$  con  $y = (y_1, \dots, y_n)$  disjunta a  $x$  y elementos  $b_1, \dots, b_n \in B$  tales que  $t = \tilde{t}(x, b_1, \dots, b_n)$ . Concluye que  $t^{A_B}(a) = \tilde{t}^A(a; b)$ , donde  $b$  denota la evaluación dada por  $b_1, \dots, b_n/y_1, \dots, y_n$ .
- (b) Demuestra que existen una fórmula  $\tilde{\phi}(x, y) \in \text{For}^{xy} L$  con  $y = (y_1, \dots, y_n)$  disjunta a  $x$  (y que no aparecen en  $\phi$ ) y elementos  $b_1, \dots, b_n \in B$  tales que  $\phi = \tilde{\phi}(x, b_1, \dots, b_n)$ . Concluye que  $A_B \models \phi(a)$  si y solo si  $A \models \tilde{\phi}(a; b)$ , donde  $b$  denota la evaluación dada por  $b_1, \dots, b_n/y_1, \dots, y_n$ .

**13** Sea  $h : A \rightarrow B$  un isomorfismo entre  $L$ -estructuras. Sea  $\phi \in \text{For}^x L$  una fórmula y  $a \in A^x$  una evaluación. Demuestra que  $A \models \phi(a)$  si y solo si  $B \models \phi(h(a))$ .

**14** (Forma normal disyuntiva). Una *fórmula disyuntiva* es una fórmula de la forma  $\bigvee \varphi_i$

con  $\varphi_i$  literales. Una *fórmula conjuntiva* es una fórmula de la forma  $\bigwedge \varphi_i$  con  $\varphi_i$  literales. Una *fórmula normal conjuntiva* es una fórmula de la forma  $\bigwedge \varphi_i$  con  $\varphi_i$  fórmulas disyuntivas. Una *fórmula normal disyuntiva* es una fórmula de la forma  $\bigvee \varphi_i$  con  $\varphi_i$  fórmulas conjuntivas. Demuestra que toda fórmula sin cuantificadores es equivalente a una fórmula en forma normal disyuntiva y a una fórmula en forma normal conjuntiva.

**15** Sean  $\varphi, \psi$  fórmulas y  $x$  una variable que no es libre en  $\psi$ . Demuestra que  $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x (\varphi \wedge \psi)$  y  $(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi)$ .

**Solución:** Sea  $y$  una tupla de variables simples que contiene a todas las variables libres de  $\varphi$  y  $\psi$ , incluyendo  $x$ . Sea  $A$  una estructura y  $a \in A^y$  una evaluación.

Para la primera equivalencia, tenemos:

$$\begin{aligned} A \models ((\exists x \varphi) \wedge \psi)(a) &\iff A \models (\exists x \varphi)(a) \text{ y } A \models \psi(a) \\ &\iff (\text{existe } b \in A \text{ tal que } A \models \varphi(a; b/x)) \text{ y } A \models \psi(a) \\ &\iff \text{existe } b \in A \text{ tal que } (A \models \varphi(a; b/x) \text{ y } A \models \psi(a)). \end{aligned}$$

Como  $x$  no es libre en  $\psi$ , las evaluaciones  $a$  y  $a; b/x$  coinciden en todas las variables libres de  $\psi$ . Por el Lema de independencia de variables no libres, tenemos que  $A \models \psi(a)$  si y solo si  $A \models \psi(a; b/x)$ . Así, se tiene que:

$$\begin{aligned} \exists b \in A : (A \models \varphi(a; b/x) \text{ y } A \models \psi(a)) &\iff \exists b \in A : (A \models \varphi(a; b/x) \text{ y } A \models \psi(a; b/x)) \\ &\iff \exists b \in A : A \models (\varphi \wedge \psi)(a; b/x) \\ &\iff A \models (\exists x (\varphi \wedge \psi))(a). \end{aligned}$$

Entonces, por definición de equivalencia semántica,  $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x (\varphi \wedge \psi)$ .

Por el mismo argumento, se puede demostrar que  $(\exists x \varphi) \vee \psi \equiv \exists x (\varphi \vee \psi)$  sustituyendo  $\wedge$  por  $\vee$  (e “y” por “o”) en el razonamiento anterior. Entonces, para la segunda equivalencia, basta con aplicar esto a  $\neg\varphi$  y  $\neg\psi$  y luego usar las leyes de De Morgan:

$$(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \neg(\exists x \neg\varphi) \wedge \psi \equiv \neg((\exists x \neg\varphi) \vee \neg\psi) \equiv \neg(\exists x (\neg\varphi \vee \neg\psi)) \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi). \quad \blacksquare$$

**16** Reescribe las siguientes fórmulas de manera equivalente como fórmulas prenexas:

- (a)  $((\forall x \ x < y) \rightarrow (\exists y \ x < y)) \wedge x < y$ .
- (b)  $(\exists x \ \forall y \ (\exists x \ x \neq y \wedge E \ y)) \vee (x = y \rightarrow \exists y \ E \ y)$ .
- (c)  $\forall x \ ((px = xp \wedge y) \rightarrow (\forall x \ (y \neq p \vee \exists x \ (zp = zp^2 \rightarrow \forall w \ wp = p))))$ .

**[17]** Para  $n \in \mathbb{N}$ , definimos recursivamente las  $\forall_n$ -fórmulas y las  $\exists_n$ -fórmulas del siguiente modo:

- (i) Las  $\exists_0$ -fórmulas y  $\forall_0$ -fórmulas son las fórmulas sin cuantificadores.
- (ii) Una  $\forall_{n+1}$ -fórmula es una fórmula construida mediante  $\wedge$ ,  $\vee$  y  $\forall$  a partir de las  $\exists_n$ -fórmulas (incluyendo estas).
- (iii) Una  $\exists_{n+1}$ -fórmula es una fórmula construida mediante  $\wedge$ ,  $\vee$  y  $\exists$  a partir de las  $\forall_{n+1}$ -fórmulas (incluyendo estas).

Las  $\exists_1$ -fórmulas son precisamente las fórmulas existenciales y las  $\forall_1$ -fórmulas son las fórmulas universales. Las  $\exists_2$ -fórmulas también se suelen denominar  $\exists\forall$ -fórmulas, las  $\exists_3$ -fórmulas se suelen llamar  $\exists\forall\exists$ -fórmulas, etcétera. Del mismo modo, las  $\forall_2$ -fórmulas se suelen denominar  $\forall\exists$ -fórmulas, las  $\forall_3$ -fórmulas se suelen llamar  $\forall\exists\forall$ -fórmulas, etcétera.

- (a) Demuestra que la negación de una  $\forall_n$ -fórmula es equivalente a una  $\exists_n$ -fórmula y viceversa.
- (b) Demuestra que toda fórmula es equivalente a una  $\forall_n$ -fórmula y a una  $\exists_n$ -fórmula para algún  $n$ .
- (c) Dada una fórmula  $\varphi$ , el grado  $\text{gr}(\varphi)$  es el mínimo  $n$  tal que  $\varphi$  es equivalente a una  $\forall_n$ -fórmula o a una  $\exists_n$ -fórmula (de modo similar se definen  $\text{gr}_{\forall}(\varphi)$  y  $\text{gr}_{\exists}(\varphi)$ ). Describe un algoritmo para calcular una cota para  $\text{gr}(\varphi)$ .
- (d) Demuestra que si  $\varphi$  es equivalente a una fórmula prenexa  $Q_1x_1 \dots Q_mx_m \phi$  donde  $n$  es el número de veces que alternan  $\exists$  y  $\forall$  en  $Q_1, \dots, Q_m$ , entonces  $\text{gr}(\varphi) \leq n$ . Recíprocamente, demuestra que si  $\text{gr}(\varphi) = n$ , entonces  $\varphi$  es equivalente a una fórmula prenexa  $Q_1x_1 \dots Q_mx_m \phi$  donde  $n$  es el número de veces que alternan  $\exists$  y  $\forall$  en  $Q_1, \dots, Q_m$ .

**[18]** (Lema del elemento arbitrario). Sea  $L$  un lenguaje y  $L(c)$  la extensión dada por añadir una nueva constante. Sea  $T$  una teoría en  $L$  y  $\varphi(x) \in \text{For}^x L$  con  $x$  variable simple. Demuestra que  $T \models \varphi(c)$  si y solo si  $T \models \forall x \varphi(x)$ .

**Solución:** Sea  $c \in L(c)$  la nueva constante añadida a  $L$ ,  $c^M$  su interpretación en un modelo  $M$  de  $T$  y  $c^M/x$  la evaluación dada por  $x \mapsto c^M$ . En este sentido,  $\varphi(c)$  es el enunciado que se obtiene al sustituir  $x$  por  $c$  en  $\varphi$ , es decir,  $\text{Sub}_x^c[\varphi]$ .

Veamos ambas implicaciones de la equivalencia  $T \models \text{Sub}_x^c[\varphi] \iff T \models \forall x \varphi$ .

**[ $\Leftarrow$ ]** Supongamos que  $T \models \forall x \varphi$ . Sea  $M'$  un modelo arbitrario de  $T$  visto como  $L(c)$ -estructura. Sea  $M$  su  $L$ -reducto. Como  $M \models T$  y  $T \models \forall x \varphi$ , entonces  $M \models \forall x \varphi$ . Por

definición, para toda evaluación  $b \in M^x$ ,  $M \models \varphi(b)$ . En particular, para  $a = c^{M'}/x$ , se tiene  $M \models \varphi(a)$ . Por el Lema de satisfacción de la sustitución,  $M \models \varphi(a)$  si y solo si  $M \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$ , luego  $M' \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$ . Como  $M'$  era arbitrario,  $\mathbf{T} \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$ .

$\Rightarrow$  Supongamos que  $\mathbf{T} \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$ . Sea  $M$  un modelo arbitrario de  $\mathbf{T}$  y sea  $d \in M$  un elemento arbitrario del universo. Consideramos la  $L(c)$ -expansión  $M'$  de  $M$  dada por interpretar la constante  $c$  como  $c^{M'} = d$ . Como  $\mathbf{T}$  es una teoría en  $L$  y  $M$  es su  $L$ -reducto,  $M' \models \mathbf{T}$ . Como  $\mathbf{T} \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$ , se tiene  $M' \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$ . Sea  $a = d/x$  la evaluación dada por  $x \mapsto d = c^{M'}$ . Por el Lema de satisfacción de la sustitución,  $M' \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$  si y solo si  $M \models \varphi(a)$ , luego  $M \models \varphi(a)$ . Como  $d \in M$  era arbitrario, para toda evaluación  $b \in M^x$  se tiene  $M \models \varphi(b)$ , es decir,  $M \models \forall x \varphi$ . Como  $M$  era arbitrario,  $\mathbf{T} \models \forall x \varphi$ . ■

[19] Demuestra que todo conjunto de fórmulas finito está contenido en una teoría completa.

[20] (Estructuras finitas). Sea  $A$  una estructura finita. Fijamos una enumeración  $a_1, \dots, a_n$  de sus elementos. Sea  $x_1, \dots, x_n$  una variable ordenada y  $a \in A^x$  la evaluación dada por  $x_i \mapsto a_i$ .

(a) Demuestra que si  $B \cong A$ , entonces  $|B| = |A|$ .

(b) Sea  $B$  una estructura con  $|B| = |A|$  y  $h: A \rightarrow B$  una biyección. Demuestra que si  $h$  no es un isomorfismo, existe una fórmula literal (atómica o negación de atómica)  $\varphi_h(x)$  tal que  $A \models \varphi_h(a)$  y  $B \not\models \varphi_h(h(a))$ .

(c) Sea  $B$  una estructura con  $|B| = |A|$  y supongamos que no existe un isomorfismo de  $A$  a  $B$ . Considera la fórmula

$$\varphi_B = \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j \wedge \bigwedge_{h \in B^A} \varphi_h(x)$$

donde  $B^A$  es el conjunto de funciones de  $A$  a  $B$  y  $\varphi_h(x)$  es la fórmula del apartado anterior. Demuestra que  $A \models \varphi_B$  pero  $B \not\models \varphi_B$ .

(d) Concluye que, para todo  $B$ ,  $A \equiv B$  si y solo si  $A \cong B$ .

(e) Demuestra que si el lenguaje es finito y  $X$  es finito, hay un número finito de  $L$ -estructuras con universo  $X$ .

(f) Demuestra que si el lenguaje es finito,  $\text{Th}(A)$  es finitamente axiomatizable.

**Solución:**



(a) Si  $B \cong A$ , entonces existe un isomorfismo  $h: A \rightarrow B$ . Como  $h$  es biyectiva y  $A$  es un conjunto finito, se tiene que  $|B| = |A|$ . ■

(b) Si  $h$  no es un isomorfismo, entonces, al ser biyectiva, falla la condición de homomorfismo o la preservación de relaciones en la dirección opuesta. Veamos ambos casos:

I. Si  $h$  no es un homomorfismo, entonces falla la condición de preservación de constantes, funciones o relaciones. Veamos los tres casos por separado:

- Si existe una constante  $c$  tal que  $h(c^A) \neq c^B$ , sea  $x_i$  la variable tal que  $a_i = c^A$ . Entonces, al tomar la fórmula  $x_i = c$ ,  $A \models (x_i = c)(a)$  pero  $B \not\models (x_i = c)(h(a))$  (pues  $h(a)_i = h(a_i) = h(c^A) \neq c^B$ ).
- Si existe un símbolo de función  $k$ -aria  $f$  y elementos  $u_1, \dots, u_k \in A$  tales que  $h(f^A(u_1, \dots, u_k)) \neq f^B(h(u_1), \dots, h(u_k))$ , sean  $x_{j_1}, \dots, x_{j_k}$  las variables correspondientes a  $u_1, \dots, u_k$  y  $x_r$  la variable correspondiente a  $v = f^A(u_1, \dots, u_k)$  (es decir,  $a_{j_\ell} = u_\ell$  y  $a_r = v$ ). Entonces, al tomar la fórmula  $\varphi \equiv f(x_{j_1}, \dots, x_{j_k}) = x_r$ , tenemos que  $A \models \varphi(a)$ . Sin embargo, en  $B$ :

$$(f(x_{j_1}, \dots, x_{j_k}))^B(h(a)) = f^B(h(u_1), \dots, h(u_k)) \neq h(v) = h(a_r) = h(a)_r.$$

Por tanto,  $B \not\models \varphi(h(a))$ .

- Si existe un símbolo de relación  $R$   $m$ -aria y tupla  $\bar{u} = (u_1, \dots, u_m) \in A^m$  tal que  $\bar{u} \in R^A$  pero  $h(\bar{u}) \notin R^B$ , sean  $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$  las variables correspondientes a  $u_1, \dots, u_m$ . Entonces, al tomar la fórmula  $R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})$ , tenemos que  $A \models R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})(a)$  pero  $B \not\models R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})(h(a))$ .

II. Si  $h$  es homomorfismo biyectivo pero no isomorfismo, la inversa no es homomorfismo. Esto solo puede ocurrir con las relaciones, luego existe  $R$  símbolo de relación  $m$ -aria y tupla  $\bar{u} = (u_1, \dots, u_m) \in A^m$  tal que  $h(\bar{u}) \in R^B$  pero  $\bar{u} \notin R^A$ . Sean  $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$  las variables correspondientes a  $u_1, \dots, u_m$ . Tomamos la fórmula  $\neg R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})$ . Entonces  $A \models \neg R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})(a)$  (pues  $\bar{u} \notin R^A$ ) y  $B \not\models \neg R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})(h(a))$  (pues  $h(\bar{u}) \in R^B$ ).

En todos los casos hemos encontrado una fórmula atómica o negación de atómica (literal) tal que  $A \models \varphi(a)$  y  $B \not\models \varphi(h(a))$ . ■

(c) ( $A \models \varphi_B$ ) Como  $a_1, \dots, a_n$  enumeran  $A$ , son distintos, luego  $A \models \bigwedge_{i \neq j} (x_i \neq x_j)(a)$ . Por otra parte, toda biyección  $h: A \rightarrow B$  no es un isomorfismo por hipótesis, luego

por el apartado anterior,  $A \models \varphi_h(a)$  para toda biyección  $h \in B^A$ . Por tanto,

$$A \models \left( \bigwedge_{i \neq j} (x_i \neq x_j) \wedge \bigwedge_{h \in B^A} \varphi_h(a) \equiv \varphi_B \right) (a), \text{ luego } A \models \varphi_B.$$

$(B \not\models \varphi_B)$  Como  $|B| = |A| = n$ , existe una tupla  $b = (b_1, \dots, b_n)$  de elementos de  $B$  distintos dos a dos tal que  $b_1, \dots, b_n$  enumeran  $B$ . Entonces, la función  $g: A \rightarrow B$  dada por  $g(a_i) = b_i$  es una biyección con  $g \in B^A$ .

Por hipótesis,  $g$  no es un isomorfismo, luego el apartado anterior proporciona una fórmula literal  $\varphi_g(x)$  tal que  $A \models \varphi_g(a)$  y  $B \not\models \varphi_g(g(a))$ , es decir,  $B \not\models \varphi_g(b)$  ya que  $g(a) = b$ . Por tanto, se tiene  $B \not\models \varphi_B(b)$ . Como  $b$  era una tupla arbitraria de elementos distintos dos a dos, y cualquier tupla que no sea de elementos distintos ya viola  $\bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j$ , concluimos que  $B \not\models \varphi_B$ . ■

(d) Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$  Supongamos que  $A \equiv B$ . La fórmula  $\psi_n = \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j \wedge \forall y \bigvee_i y = x_i$  expresa que hay exactamente  $n$  elementos. Como  $A \models \psi_n$  y  $A \equiv B$ , se tiene  $B \models \psi_n$ , luego  $|B| = n = |A|$ . Si  $A \not\cong B$ , por el apartado (c),  $A \models \varphi_B$  pero  $B \not\models \varphi_B$ , lo que contradice  $A \equiv B$ . Luego  $A \cong B$ .

$\Leftarrow$  Si  $A \cong B$ , por el Ejercicio 13, para todo enunciado  $\phi$  se tiene  $A \models \phi$  si y solo si  $B \models \phi$ , es decir,  $A \equiv B$ . ■

(e) Sea  $|X| = n$ . Una L-estructura con universo  $X$  queda determinada al elegir:

- Para cada constante  $c \in L$ , un elemento  $c^M \in X$ : hay  $n$  opciones por constante.
- Para cada símbolo de función  $k$ -aria  $f \in L$ , una función  $f^M: X^k \rightarrow X$ : hay  $n^{n^k}$  opciones por símbolo.
- Para cada símbolo de relación  $m$ -aria  $R \in L$ , un subconjunto  $R^M \subseteq X^m$ : hay  $2^{n^m}$  opciones por símbolo.

Como  $L$  es finito, el número total de L-estructuras con universo  $X$  es el producto finito de estas cantidades finitas, que es finito. ■

(f) Sea  $n = |A|$ . Por el apartado (e), el conjunto  $\mathcal{S}$  de L-estructuras con universo  $\{1, \dots, n\}$  es finito. Consideramos la relación de isomorfismo  $\cong$  en  $\mathcal{S}$  y sea

$$\mathcal{C} = \{[B]_{\cong} : B \in \mathcal{S} \wedge B \not\cong A\}$$

el conjunto de clases de isomorfismo de estructuras en  $\mathcal{S}$  no isomorfas a  $A$ . Como  $\mathcal{S}$  es finito,  $\mathcal{C}$  también lo es.

Para cada  $[B] \in \mathcal{C}$ , elegimos un representante  $B$ . Como  $B \not\cong A$ , por el apartado (d),  $B \not\models A$ , luego existe un enunciado  $\sigma_B$  tal que  $A \models \sigma_B$  y  $B \not\models \sigma_B$ . Definimos

$$\Sigma = \{\psi_n\} \cup \{\sigma_B : [B] \in \mathcal{C}\},$$

donde  $\psi_n$  es la fórmula que expresa “hay exactamente  $n$  elementos”. Entonces  $\Sigma$  es finito y  $A \models \Sigma$  ya que  $A \models \psi_n$  y  $A \models \sigma_B$  para toda  $[B] \in \mathcal{C}$  por construcción.

Veamos que  $\Sigma$  axiomatiza  $\text{Th}(A)$ , es decir, que todo modelo de  $\Sigma$  es elementalmente equivalente a  $A$ . Sea  $C \models \Sigma$ , como  $C \models \psi_n$ , se tiene  $|C| = n$ . Si  $C \not\cong A$ , entonces  $[C] \in \mathcal{C}$ , pero  $C \models \sigma_C$  (pues  $C \models \Sigma$ ), lo que contradice que  $C \not\models \sigma_C$ . Luego  $C \cong A$ , y por el apartado (d),  $C \equiv A$ , es decir,  $C \models \text{Th}(A)$ . ■

21 Demuestra que  $\mathbb{Z}^n \not\cong \mathbb{Z}^m$  como grupos para  $m \neq n$ . (Pista: ¿es la suma de dos impares par?)



## H.2 Hoja 2: Construcción de estructuras

[1] Sean  $A$  y  $B$  dos  $L$ -estructuras y  $h : A \rightarrow B$  una función.

- (a) Demuestra que si  $h$  es un homomorfismo,  $\text{Im}(h)$  es el universo de una subestructura de  $B$  y  $h : A \rightarrow \text{Im}(h)$  es un homomorfismo.
- (b) Demuestra que si  $\text{Im}(h)$  es el universo de una subestructura de  $B$  y  $h : A \rightarrow \text{Im}(h)$  es un homomorfismo, entonces  $h : A \rightarrow B$  es un homomorfismo.
- (c) Demuestra que  $h$  es una inmersión si y solo si  $\text{Im}(h)$  es el universo de una subestructura y  $h : A \rightarrow \text{Im}(h)$  es un isomorfismo.
- (d) Sea  $B_0 \leq B$  una subestructura. Demuestra que si  $h$  es un homomorfismo,  $h^{-1}(B_0)$  es el universo de una subestructura de  $A$ .

[2] (Diagrama atómico). Sea  $A$  una  $L$ -estructura. El diagrama atómico de  $A$  es el subconjunto de  $L(A)$ -enunciados sin cuantificadores que satisface  $A$ , es decir,

$$\text{Diag}(A) := \{\varphi \in \text{For}_L^0(A) : \varphi \text{ sin cuantificadores y } A \models \varphi\}.$$

Sea  $B \geq A$  una  $L(A)$ -estructura con  $L$ -reducto  $B$ . Demuestra que  $B \models \text{Diag}(A)$  si y solo si  $h : A \rightarrow B$  dada por  $h(a) = a^B$  es una inmersión.

[3] Sean  $A := \prod_{i \in I} A_i$ ,  $B$  una  $L$ -estructura y  $h_i : B \rightarrow A_i$  un homomorfismo para cada  $i \in I$ .

- (a) Demuestra que existe un único homomorfismo  $h : B \rightarrow A$  tal que  $h_i = \text{proj}_i \circ h$ .
- (b) Demuestra que si, además,  $h_{i_0}$  es una inmersión para algún  $i_0 \in I$ , entonces  $h$  es una inmersión.

[4] Un anillo  $A$  es von Neumann regular si para todo  $a \in A$  existe  $x \in A$  tal que  $a = axa$ . Determina si toda subestructura de un anillo von Neumann regular es un anillo von Neumann regular. Determina si el producto de anillos von Neumann regulares es un anillo von Neumann regular.

[5] **Teorema de isomorfía.** Sea  $h : A \rightarrow B$  un homomorfismo de  $L$ -estructuras y  $\ker h = \{(a, a') : h(a) = h(a')\}$ .

- (a) Demuestra que  $\ker h$  es una relación de equivalencia.
- (b) Demuestra que existe una única función  $\bar{h} : A/\ker h \rightarrow B$  tal que  $h = \bar{h} \circ q$  donde  $q : A \rightarrow A/\ker h$  es la función cociente. Demuestra que  $\bar{h}$  es inyectiva.

- (c) Demuestra que existe una única  $L$ -estructura cociente en  $A/\ker h$  tal que  $\bar{h}$  es una inmersión de estructuras. Concluye que  $A/\ker h \cong \text{Im}(h)$ .
- (d) Demuestra que  $q : A \rightarrow A/\ker h$  es un homomorfismo sobreyectivo.
- (e) Sea  $\varphi(x)$  una fórmula universal y  $a \in A^x$ . Demuestra que si  $B \models \varphi(h(a))$ , entonces  $A/\ker h \models \varphi(q(a))$ .

[6] Sea  $h : A \rightarrow B$  una función entre  $L$ -estructuras tal que

$$A \models \varphi(a) \implies B \models \varphi(h(a))$$

para toda fórmula  $\varphi \in \text{For}_L^x$  y cualquier  $a \in A^x$ . Demuestra que  $h$  es una inmersión elemental.

[7] **Lema de la cadena de Tarski.** Sea  $\{A_i\}_{i \in I}$  un conjunto de  $L$ -estructuras dirigido respecto a la relación de subestructura elemental (es decir, para cualesquiera  $i, j \in I$  existe  $k \in I$  tal que  $A_i, A_j \preceq A_k$ ).

- (a) Demuestra que la estructura unión  $\bigcup_{i \in I} A_i$  es una extensión elemental de  $A_i$  para cada  $i \in I$ .
- (b) Demuestra que si  $B$  una  $L$ -estructura tal que  $A_i \preceq B$  para cada  $i \in I$ , entonces  $\bigcup_{i \in I} A_i \preceq B$ .

[8] Demuestra que  $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}$  con respecto al orden. (Pista: utiliza el Ejercicio 8(b) de la Hoja 1).

[9] **Filtros e Ideales.** Una familia  $I$  de subconjuntos de  $\Omega$  es un ideal de conjuntos si cumple las siguientes tres propiedades:

- (a)  $\Omega \notin I$ .
- (b) Si  $A, B \in I$ , entonces  $A \cup B \in I$ .
- (c) Si  $A \in I$  y  $B \subseteq A$ , entonces  $B \in I$ .

Para una familia de conjuntos  $A \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ , el dual de  $A$  es  $A^* := \{\Omega \setminus A : A \in A\}$ .

- (a) Demuestra que  $F$  es un filtro si y solo si  $F^*$  es un ideal.
- (b) Demuestra que  $I$  es un ideal si y solo si  $I^*$  es un filtro.
- (c) Una función característica en  $\Omega$  es una función  $1 : \Omega \rightarrow \mathbb{F}_2$  con valores en el cuerpo de dos elementos  $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ . Demuestra que el espacio de funciones características  $\mathbb{F}_2^\Omega$  es un  $\mathbb{F}_2$ -álgebra (es decir, un anillo extensión de  $\mathbb{F}_2$ ).

- (d) Demuestra que  $I$  es un ideal de conjuntos de  $\Omega$  si y solo si  $\{1_A : A \in I\}$  es un ideal de  $\mathbb{F}_2^\Omega$ .
- [10] Sea  $u$  un filtro de  $\Omega$ . Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
- (a)  $u$  es ultrafiltro.
  - (b) Para cualquier  $A \subseteq \Omega$ ,  $A \in u$  o  $A^c \in u$ .
  - (c) Para cualesquiera  $A, B \subseteq \Omega$ , si  $A \cup B \in u$ , entonces  $A \in u$  o  $B \in u$ .
- [11] Demuestra que la estructura ultraproducto está bien definida.
- [12] Sea  $u$  el ultrafiltro principal en  $I$  dado por  $i_0$ . Demuestra que  $\prod_u A_i \cong A_{i_0}$ .
- [13] Sea  $A$  una  $L$ -estructura y  $u$  un ultrafiltro en  $I$ . Demuestra que la aplicación diagonal  $\iota : A \rightarrow A_u$  dada por  $a \mapsto [a]_u$  es una inmersión elemental.
- [14] Demuestra que las siguientes clases no son elementales:
- (a) Los cuerpos de característica finita en  $L_a$ .
  - (b) Los grafos conexos en  $L_E$ .
  - (c) Para  $K$  infinito, los  $K$ -espacios vectoriales de dimensión menor a 3 en  $L_{K\text{-vec}}$ .