

Anillo

Definición 1 (Anillo). Sean $*$, $\circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

(i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.

(ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.

(iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Referenciado en

- Subanillo-generado
- Prop-localizacion-anillo
- Num-complejos
- Subanillo
- Lem-ideal-total
- Ideal-generado
- Obs-anillo-cociente-morfismo-canonical
- Lem-producto-ideales
- Anillo-noetheriano
- Anillo-reducido
- Radical-ideal
- Serie-formal-potencias
- Ideal-maximal

- Ideal-primo
- Extension
- Cor-ideal-maximal-imp-primo
- Lem-subanillo-generado
- Lem-ideal
- Suma-ideales
- Nilpotencia-anillos
- Ideal
- Ideal-nilradical
- Morfismo-anillos
- Dominio-integridad
- Producto-ideales
- Dim-krull
- Ideal-finitamente-generado
- Long-cadena-ideales-primos
- Teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene
- Anillo-local
- Ideal-radical
- Anillo-cociente
- Ejer-interseccion-ideales
- Lem-cuerpo-iff-ideales-triviales
- Anillo-polinomios
- Prop-divisor-cero-no-unidad
- Teo-correspondencia-ideales-cociente
- Extension-anillos
- Lem-ideal-generado

- Cuerpo
- Ralgebra
- Modulo
- Parte-multiplicativa-anillo
- Ideal-principal
- Ejer-union-ideales-encajados
- Lem-suma-ideales
- Divisor-cero