

# Teorema de Fubini

**Teorema 1 (de Fubini).** Sean  $(X_1, \Sigma_1, \mu)$  y  $(X_2, \Sigma_2, \lambda)$  espacios de medida  $\sigma$ -finitos.

Sea  $f: X_1 \times X_2 \longrightarrow \mathbb{R}$  una función  $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ -medible. Si definimos

$$\begin{aligned} \varphi: X_1 &\longrightarrow \mathbb{R} & \psi: X_2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \int_{X_2} f(x, y) \, d\lambda(y) & y &\longmapsto \int_{X_1} f(x, y) \, d\mu(x), \end{aligned}$$

$$\implies \begin{cases} (1) & f \geq 0 \implies \varphi \text{ es } \Sigma_1\text{-medible y } \psi \text{ es } \Sigma_2\text{-medible.} \\ (2) & f \in \mathcal{L}^1(\mu \otimes \lambda) \implies \varphi \in \mathcal{L}^1(\mu) \text{ y } \psi \in \mathcal{L}^1(\lambda). \end{cases}$$

Además, en cualquiera de estos dos casos, se cumple que

$$\int_{X_1 \times X_2} f(x, y) \, d(\mu \otimes \lambda) = \int_{X_1} \varphi(x) \, d\mu(x) = \int_{X_2} \psi(y) \, d\lambda(y).$$

## Referenciado en

- Desigualdad-young-convolucion
- Lem-convolucion
- Ley-fuerte-grandes-numeros