

Anillo polinomios

Proposición 1 (Anillo de polinomios). *Sea A un anillo (conmutativo con unidad)*

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

- *Suma:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_0 + b_0).$
- *Producto:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k.$

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A .

Referenciado en

- prop-grado-polinomio
- variedad-algebraica-afin
- grado-polinomio
- lem-con-ceros-ideal-generado
- ideal-anulacion
- obs-con-ceros-ideal-generado-contenido-trivial
- cor-base-hilbert-n-var
- prop-variedad-algebraica-afin-ideal
- con-ceros-polinomios-esp-afin
- polinomio-monico-variable
- teo-cuerpo-imp-polinomios-dip
- elemento-entero-sobre-anillo
- teo-base-hilbert

- prop-di-imp-anillo-polinomios-di
- ralgebra-finitamente-generada
- elemento-algebraico-sobre-anillo