

Topología inducida por función sobreyectiva

Proposición 1. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un esp top, Y un conjunto y $f: X \rightarrow Y$ sobreyectiva

$\implies \exists!$ topología $\mathcal{T}_f$ en $Y : f: (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_f)$ es una aplicación cociente.

$\mathcal{T}_f$ se denomina la **topología** de Y **inducida** por f .

Demostración: Sea $\mathcal{T}_f = \{V \subset Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$. Vemos que $\mathcal{T}_f$ es una topología:

(i) $\emptyset \in \mathcal{T}_f$ porque $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_X$ e $Y \in \mathcal{T}_f$ porque $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}_X$.

(ii) $U, V \in \mathcal{T}_f \implies f^{-1}(U), f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$

$$\implies f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) \in \mathcal{T}_X \implies U \cap V \in \mathcal{T}_f.$$

(iii) $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}_f \implies \{f^{-1}(V_\alpha)\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}_X \implies f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(V_\alpha) \in \mathcal{T}_X$.

Entonces concluimos que $\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha \in \mathcal{T}_f$.

Por tanto, $\mathcal{T}_f$ es una topología en Y . Además, f es una aplicación cociente porque es sobreyectiva y $\forall V \in \mathcal{T}_f : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ por definición de $\mathcal{T}_f$.

Por último, sabemos que $\mathcal{T}_f$ es única dado que si consideramos $\mathcal{T}_Y$ otra topología en Y que hace de f una aplicación cociente, entonces

$$\forall V \subset Y : (V \in \mathcal{T}_Y \iff f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X \iff V \in \mathcal{T}_f) \implies \mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_f.$$

■

Referenciado en

- Esp-proyectivo
- Topologia-cociente