

Teo proyeccion ortogonal sistema ortonormal formula

Teorema 1. Sea H un espacio de Hilbert y $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ un sistema ortonormal. Consideramos $M = \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\})$, entonces

$$\forall x \in H : P_M(x) = \sum_{j=1}^n \langle x, u_j \rangle u_j.$$

Demostración: Por la prop-subesp-vectorial-generado-cerrado/Proposición 1, M es cerrado y, por tanto, por el teo-proyeccion-ortogonal/Teorema 1, tenemos que $x = P_M x + P_{M^\perp} x$.

Entonces, basta demostrar que $x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \in M^\perp$. Por ser $M = \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\})$, es suficiente demostrar que $\forall k \in \mathbb{N}_n : \left\langle x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \right\rangle = 0$. Pero como $\langle u_j, u_k \rangle = \delta_{jk}$, tenemos que

$$\left\langle x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \right\rangle = \langle x, u_k \rangle - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle \underbrace{\langle u_j, u_k \rangle}_{=\delta_{jk}} = \langle x, u_k \rangle - \langle x, u_k \rangle = 0.$$

■

Referenciado en

• ??