

# Corolario sobre la regularidad de la convolución

**Corolario 1.** Sea  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$  y  $g \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\forall \alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n$  con  $|\alpha| \leq k$  se tiene que  $\|D_x^\alpha g\|_\infty < \infty$ . Entonces,

$$f * g \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n) \quad \wedge \quad \forall \alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n : |\alpha| \leq k : D_x^\alpha (f * g) = f * (D_x^\alpha g).$$

**Demostración:** Basta con probar el caso  $\alpha = (1, 0, \dots, 0)$  y el resto se tiene por inducción.

Sea  $x \in \mathbb{R}^n$  y definimos  $F(x_1) = (g * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x - y) f(y) dy$  donde  $(x_2, \dots, x_n)$  son fijos. Queremos demostrar que

$$F'(x_1) = \frac{\partial}{\partial x_1} \int_{\mathbb{R}^n} g(x - y) f(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial g}{\partial x_1}(x - y) f(y) dy.$$

Aplicamos el teo-derivacion-bajo-el-signo-integral/Teorema 1 con  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $\mu$  es la medida de Lebesgue,  $t = x_1 \in [a, b]$  arbitrario, y  $f(y, x_1) = g(x_1, x_2, \dots, x_n - y) f(y) = g(x - y) f(y)$ .

Debemos verificar que  $\left| \frac{\partial}{\partial x_1} [g(x - y) f(y)] \right| \leq g(y) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$  donde  $g$  es la mayorante:

$$\left| \frac{\partial g(x - y) f(y)}{\partial x_1} \right| = \left| \frac{\partial g}{\partial x_1}(x - y) f(y) \right| \leq \left\| \frac{\partial g}{\partial x_1} \right\|_\infty \cdot |f(y)| \leq M \cdot |f(y)| \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n),$$

donde  $M = \left\| \frac{\partial g}{\partial x_1} \right\|_\infty < \infty$  por hipótesis. Por tanto, obtenemos

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \int_{\mathbb{R}^n} g(x - y) f(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial g}{\partial x_1}(x - y) f(y) dy = \frac{\partial g}{\partial x_1} * f(x) = f * \frac{\partial g}{\partial x_1}(x),$$

donde la última igualdad se sigue de la conmutatividad de la convolución. ■