

Teorema de Fubini

Teorema 1 (de Fubini). Sean (X_1, Σ_1, μ) y (X_2, Σ_2, λ) espacios de medida σ -finitos.

Sea $f: X_1 \times X_2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ -medible. Si definimos

$$\begin{aligned} \varphi: X_1 &\rightarrow \mathbb{R} & \psi: X_2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \int_{X_2} f(x, y) d\lambda(y) & y &\mapsto \int_{X_1} f(x, y) d\mu(x), \end{aligned}$$

$$\implies \begin{cases} (1) & f \geq 0 \implies \varphi \text{ es } \Sigma_1\text{-medible y } \psi \text{ es } \Sigma_2\text{-medible.} \\ (2) & f \in \mathcal{L}^1(\mu \otimes \lambda) \implies \varphi \in \mathcal{L}^1(\mu) \text{ y } \psi \in \mathcal{L}^1(\lambda). \end{cases}$$

Además, en cualquiera de estos dos casos, se cumple que

$$\int_{X_1 \times X_2} f(x, y) d(\mu \otimes \lambda) = \int_{X_1} \varphi(x) d\mu(x) = \int_{X_2} \psi(y) d\lambda(y).$$

Referenciado en

- teo-aproximacion-identidad-convolucion
- lem-convolucion
- teo-inversion-transformada-fourier
- ley-fuerte-grandes-numeros
- lem-transformada-fourier-convolucion
- lem-transformada-fourier-conmutativa-integral
- desigualdad-young-convolucion