
MATEMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Davide Barbieri

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

fecha

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Aprendizaje no supervisado	1
1.1	Principal component analysis (PCA)	1
1.1.1	Planteamiento del problema	1
1.1.2	Solución (teorema y algoritmo)	1
1.2	<i>Clustering</i> espectral en grafos	3
1.2.1	Grafos ponderados y definiciones básicas	3
1.2.2	El problema de corte normalizado (NCut)	4
1.2.3	Formulación variacional para $k = 2$	5
1.2.4	Relajación espectral del problema NCut	7
1.2.5	Interpretación probabilística: caminos aleatorios	7
1.2.6	<i>Spectral Clustering</i> para $k > 2$	8
1.2.7	Otros algoritmos de agrupamiento	9
2	Fundamentos del aprendizaje supervisado	13
2.1	Learning Theory	13
2.1.1	Formulación del problema	13
2.1.2	Sobre el objetivo y el aprendizaje estadístico	14
2.1.3	The Bias-Variance Tradeoff	18
2.2	Espacios de Hilbert a núcleo reproductor (RKHS)	18
3	Clasificación y optimización convexa	27
3.1	Clasificadores Lineales Binarios	27
3.1.1	Planteamiento del problema	27
3.1.2	Separabilidad por un hiperplano	28
3.1.3	Hard Margin SVM	29
3.1.4	Soft Margin SVM	35
3.1.5	Support Vector Machines con Núcleo Reproductor	36
3.2	Teorema de No Free Lunch (NFL)	41
3.3	Descenso del gradiente	44
3.3.1	Planteamiento del problema	44
3.3.2	Descenso del gradiente estocástico	45
3.4	Clasificación multiclase	48
3.4.1	El problema de clasificación con k clases	48

3.4.2	Reducción a clasificación binaria	51
3.4.3	Formulación directa: SVM de Crammer–Singer	53
3.4.4	Extensión con núcleo reproductor	55
3.4.5	Implementación y experimentos con <code>sklearn</code>	57
4	Introducción a las redes neuronales	59
4.1	Multilayer Perceptron (MLP)	59
4.1.1	Backpropagation (Reverse differentiation)	60
4.2	Teorema de aproximación universal	63
4.2.1	Funciones <i>Ridge</i>	63
A	Apéndices	67
A.1	Probabilidad condicionada	67
A.1.1	Esperanza condicionada respecto de una σ -álgebra	67
A.1.2	Esperanza condicionada dado un valor de una v.a.	68
A.1.3	De la esperanza condicionada a la medida condicionada	69
A.2	Análisis funcional	73

1. Aprendizaje no supervisado

1.1 Principal component analysis (PCA)

1.1.1 Planteamiento del problema

Sean $\{x_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{C}^n$ un conjunto de datos y sea $k < m$. El objetivo de PCA es encontrar la proyección de $\mathbb{C}^n$ de rango k (proyección sobre un subespacio $M \subset \mathbb{C}^n$ de dimensión k) que minimice el error cuadrático entre los datos originales y los datos proyectados:

$$\mathcal{E} = \sum_{i=1}^m \|x_i - \mathbb{P}_M x_i\|^2,$$

donde $\mathbb{P}_M$ es la proyección ortogonal sobre M . El PCA nos permite:

- Aproximar un conjunto de datos por un subespacio de dimensión menor.
- Una base ortonormal del subespacio M proporciona un diccionario “óptimo” para representar linealmente los datos.

1.1.2 Solución (teorema y algoritmo)

Sea $A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_m \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times m}$ y sea $A = U\Sigma V^*$ su descomposición en valores singulares (SVD). Es decir, $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $V \in \mathbb{C}^{m \times m}$ son matrices unitarias y $\Sigma \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$ es una matriz diagonal con los valores singulares $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ en la diagonal, donde $r = \text{rang}(A)$.

Entonces, $M := \text{span}\{U^{(1)}, \dots, U^{(k)}\}$, donde $U^{(i)}$ es la i -ésima columna de U , es el subespacio que minimiza el error cuadrático $\mathcal{E}$. En consecuencia, la proyección ortogonal de los datos sobre M viene dada por

$$\forall x \in \mathbb{C}^n : \mathbb{P}_M x = \sum_{i=1}^k \langle x, U^{(i)} \rangle U^{(i)}.$$

Teorema 1.1.1. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $A = U\Sigma V^*$ su SVD y $k \leq \text{rang}(A)$. Definimos

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i U^{(i)} \otimes V^{(i)} \quad \text{donde} \quad (v \otimes w)_{ij} = v_i \overline{w_j}.$$

$$\implies \forall B \in \mathbb{C}^{n \times m} : \text{rang}(B) = k : \|A - B\|_{Fro}^2 \geq \|A - A_k\|_{Fro}^2 = \sum_{i=k+1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2.$$

¿Por qué nos vale esto? La i -ésima columnas de A_k es $A_k^{(i)} = \sum_{\ell=1}^k \sigma_\ell \overline{V_{i\ell}} U^{(\ell)}$ donde $U^{(\ell)}$ es la ℓ -ésima columna de U y $\sigma_\ell \overline{V_{i\ell}} = \langle A^{(i)}, U^{(\ell)} \rangle = \langle x_i, U^{(\ell)} \rangle$. Entonces,

$$A_k^{(i)} = \sum_{\ell=1}^k \langle x_i, U^{(\ell)} \rangle U^{(\ell)} = \mathbb{P}_{\text{span}\{U^{(1)}, \dots, U^{(k)}\}} x_i = \mathbb{P}_M x_i.$$

Demostración: Dividimos la demostración en diferentes pasos:

Paso 1. Recordamos que la norma de Frobenius se puede escribir como $\|A\|_{\text{Fro}}^2 = \text{tr}(A^* A)$.

Por tanto,

$$\begin{aligned} \|A - A_k\|_{\text{Fro}}^2 &= \|U\Sigma V^* - U\Sigma_k V^*\|_{\text{Fro}}^2 = \|U(\Sigma - \Sigma_k)V^*\|_{\text{Fro}}^2 \\ &= \text{tr}(V(\Sigma - \Sigma_k)^* V^*) = \sum_{\ell=k+1}^{\text{rang } A} \sigma_\ell^2, \end{aligned}$$

puesto que $\Sigma - \Sigma_k$ es una matriz diagonal con los ceros en los primeros k elementos de la diagonal y los valores singulares $\sigma_{k+1}, \dots, \sigma_r$ en el resto.

Por tanto, basta demostrar que $\forall B \in \mathbb{C}^{n \times m} : \text{rang}(B) = k : \|A - B\|_{\text{Fro}}^2 \geq \sum_{\ell=k+1}^{\text{rang } A} \sigma_\ell^2$.

Paso 2. Sea $B \in \mathbb{C}^{n \times m}$ con $\text{rang}(B) = k$. Sea $B = XTY^*$ su SVD, con $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $Y \in \mathbb{C}^{m \times m}$ unitarias y $T \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$ diagonal. Entonces,

$$\begin{aligned} \|A - B\|_{\text{Fro}}^2 &= \|A\|_{\text{Fro}}^2 + \text{tr}(B^* B - B^* A - A^* B) \\ &= \|A\|_{\text{Fro}}^2 + \sum_{\ell=1}^k t_\ell^2 - \sum_{\ell=1}^k t_\ell \text{tr}((y_\ell \otimes x_\ell)A + A^*(x_\ell \otimes y_\ell)), \end{aligned}$$

como $\sum_{\ell=1}^k t_\ell^2 = \sum_{\ell=1}^k t_\ell^2 \text{tr}(C_{y_\ell \otimes y_\ell})$ y $(y_\ell \otimes x_\ell)A = y_\ell \otimes (A^* x_\ell)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|A - B\|_{\text{Fro}}^2 &= \|A\|_{\text{Fro}}^2 + \sum_{\ell=1}^k \text{tr}((A^* x_\ell - t_\ell y_\ell) \otimes (A^* x_\ell - t_\ell y_\ell)) - \sum_{\ell=1}^k \text{tr}(A^* x_\ell \otimes A^* x_\ell) \\ &\geq \|A\|_{\text{Fro}}^2 - \sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2, \end{aligned}$$

donde la desigualdad se obtiene porque $\text{tr}(v \otimes v) = \|v\|^2 \geq 0$.

Paso 3. Acotamos ahora $\sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2$. Como $A = U\Sigma V^*$, tenemos que $A^* = V\Sigma^* U^*$, y por tanto $A^* x_\ell = V\Sigma^* U^* x_\ell$. Entonces,

$$\sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2 = \sum_{\ell=1}^k \|V\Sigma^* U^* x_\ell\|^2 = \sum_{\ell=1}^k \|\Sigma^* U^* x_\ell\|^2,$$

donde hemos usado que V es unitaria y por tanto preserva la norma. Desarrollando la

norma,

$$\sum_{\ell=1}^k \|\Sigma^* U^* x_\ell\|^2 = \sum_{\ell=1}^k \sum_{i=1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2 |\langle U^{(i)}, x_\ell \rangle|^2 = \sum_{i=1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2 \sum_{\ell=1}^k |\langle U^{(i)}, x_\ell \rangle|^2.$$

Observamos que $\sum_{\ell=1}^k |\langle U^{(i)}, x_\ell \rangle|^2 = \|\mathbb{P}_k U^{(i)}\|^2$, donde $\mathbb{P}_k$ es el proyector ortogonal sobre $\text{span}\{x_1, \dots, x_k\}$. Denotando $p_i = \|\mathbb{P}_k U^{(i)}\|^2$, tenemos que:

- $p_i \leq 1$ para todo i , ya que $\|\mathbb{P}_k U^{(i)}\| \leq \|U^{(i)}\| = 1$.
- $\sum_{i=1}^{\text{rang } A} p_i \leq k$, ya que $\mathbb{P}_k$ proyecta sobre un subespacio de dimensión k .

Para maximizar $\sum_{i=1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2 p_i$ sujeto a estas restricciones, como $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots$, el máximo se alcanza cuando $p_1 = \dots = p_k = 1$ y $p_i = 0$ para $i > k$. Por tanto,

$$\sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2 \leq \sum_{i=1}^k \sigma_i^2.$$

Paso 4. Retomando la cota del Paso 2,

$$\|A - B\|_{\text{Fro}}^2 \geq \|A\|_{\text{Fro}}^2 - \sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2 \geq \|A\|_{\text{Fro}}^2 - \sum_{i=1}^k \sigma_i^2 = \sum_{i=k+1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2,$$

lo que, junto con el Paso 1, concluye la demostración. ■

1.2 *Clustering* espectral en grafos

El objetivo del *clustering* espectral es particionar un conjunto de datos en grupos de manera que los elementos de un mismo grupo estén “más conectados” entre sí que con elementos de otros grupos. Para formalizar esto, representamos los datos como un grafo ponderado.

1.2.1 Grafos ponderados y definiciones básicas

Definición 1.2.1 (Grafo ponderado no dirigido). Un grafo ponderado no dirigido es una tupla $G = (V, W)$ donde:

- $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ es el conjunto de vértices.
- $W \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es la matriz de pesos, con $w_{ij} = w_{ji} \geq 0$.

Ejemplo 1.2.1. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\{x_i\}_{i=1}^m \subset X$ un conjunto de datos. Dado $\varepsilon > 0$, podemos construir un grafo ponderado donde $V = \{1, \dots, m\}$ y

$$w_{ij} = \begin{cases} e^{-d(x_i, x_j)^2} & \text{si } d(x_i, x_j) \leq \varepsilon, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Este grafo captura las relaciones de vecindad entre los datos: cuanto más cercanos estén x_i y x_j , mayor será el peso w_{ij} .

Definición 1.2.2 (Grado, volumen y conexión). Sea $G = (V, W)$ un grafo ponderado.

- El **grado** del vértice i es $d_i = \sum_{j=1}^m w_{ij}$. Denotamos por $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_m)$ la matriz diagonal de grados.
- El **volumen** de un subconjunto $S \subset V$ es $\text{vol}(S) = \sum_{i \in S} d_i$.
- La **conexión** entre $S, T \subset V$ es $W(S, T) = \sum_{i \in S} \sum_{j \in T} w_{ij}$.

Definición 1.2.3 (Laplaciano de un grafo). Sea $G = (V, W)$ un grafo ponderado. El **laplaciano** de G es la matriz $L = D - W$.

Observación 1.2.4 (Analogía con el laplaciano continuo). El nombre “laplaciano” proviene de la siguiente analogía. Sea $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ una función sobre los vértices (escribimos $f_i = f(v_i)$). Entonces,

$$\langle f, Lf \rangle = \sum_{i=1}^m d_i f_i^2 - \sum_{i,j=1}^m w_{ij} f_i f_j = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m w_{ij} (f_i - f_j)^2.$$

Esta expresión mide la “variación” de f sobre el grafo, análogamente a cómo para $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d)$ con $f, |\nabla f|, \Delta f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, se tiene $\langle f, -\Delta f \rangle_{L^2} = \|\nabla f\|_{L^2}^2$.

1.2.2 El problema de corte normalizado (NCut)

Definición 1.2.5 (Corte y corte normalizado). Sea $G = (V, W)$ un grafo ponderado y sea $\{A_j\}_{j=1}^k$ una partición de V (es decir, $V = \bigsqcup_{j=1}^k A_j$).

- El **corte** de la partición es

$$\text{cut}(\{A_j\}_{j=1}^k) = \sum_{j=1}^k W(A_j, A_j^c),$$

que mide el “costo” de separar el grafo en los subgrupos $A_1, \dots, A_k$.

- El **corte normalizado** (NCut) es

$$\text{Ncut}(\{A_j\}_{j=1}^k) = \sum_{j=1}^k \frac{W(A_j, A_j^c)}{\text{vol}(A_j)},$$

que penaliza además los grupos con volumen pequeño.

Observación 1.2.6. Para $k = 2$ (partición en dos grupos A y $B = A^c$), el corte normalizado se puede escribir como

$$\text{Ncut}(A, B) = W(A, B) \left(\frac{1}{\text{vol}(A)} + \frac{1}{\text{vol}(B)} \right).$$

Esta expresión es el producto de dos términos: la **separación** $W(A, B)$ (queremos que sea pequeña, es decir, A y B poco conectados) y el **balance** $\frac{1}{\text{vol}(A)} + \frac{1}{\text{vol}(B)}$ (que es mínimo cuando $\text{vol}(A) = \text{vol}(B)$). Por tanto, minimizar NCut favorece particiones con grupos bien separados y de tamaño equilibrado.

El **problema NCut** consiste en encontrar la partición que minimiza el corte normalizado:

$$\{A_j^*\}_{j=1}^k = \arg \min_{\{A_j\}_{j=1}^k \text{ partición}} \text{Ncut}(\{A_j\}_{j=1}^k).$$

1.2.3 Formulación variacional para $k = 2$

El siguiente lema relaciona el corte normalizado con una forma cuadrática.

Lema 1.2.1. Sea $V = A \cup B$ una partición y definamos $f^{(A,B)}: V \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$f_i^{(A,B)} = \begin{cases} \sqrt{\frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)}} & \text{si } i \in A, \\ -\sqrt{\frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(B)}} & \text{si } i \in B. \end{cases}$$

Entonces,

$$\text{Ncut}(A, B) = \frac{1}{2 \text{vol}(V)} \sum_{i,j=1}^m w_{ij} (f_i^{(A,B)} - f_j^{(A,B)})^2.$$

Demostración: Observamos que $(f_i - f_j)^2 = 0$ si i, j están en el mismo grupo. Si $i \in A$ y $j \in B$ (o viceversa), entonces

$$(f_i - f_j)^2 = \left(\sqrt{\frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)}} + \sqrt{\frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(B)}} \right)^2 = \frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)} + \frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(B)} + 2.$$

Simplificando esta expresión y usando que $W(A, B) = W(B, A)$, se obtiene

$$\sum_{i,j=1}^m w_{ij}(f_i - f_j)^2 = 2W(A, B) \left(\frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)} + \frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(B)} + 2 \right) \cdot \frac{\text{vol}(A) \text{vol}(B)}{(\text{vol}(A) + \text{vol}(B))^2} \cdot \text{vol}(V),$$

que tras simplificar da $2 \text{vol}(V) \text{Ncut}(A, B)$. ■

Teorema 1.2.2. *El problema Ncut con $k = 2$ es equivalente al problema de optimización*

$$\arg \min \left\{ \frac{\langle f, Lf \rangle}{\langle f, Df \rangle} : \sum_{i=1}^m f_i d_i = 0, f_i \in \left\{ \pm \sqrt{\frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)}} \right\} \right\}.$$

Demostración: La demostración se divide en tres pasos:

Paso 1. Por la observación sobre el laplaciano, para cualquier $f \in \mathbb{R}^m$,

$$\langle f, Lf \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m w_{ij}(f_i - f_j)^2.$$

Paso 2. Sea $f: V \rightarrow \{p^2, -q^2\}$ y definamos $A = \{i : f_i = p^2\}$, $B = \{i : f_i = -q^2\}$. La restricción $\sum_{i=1}^m d_i f_i = 0$ implica

$$p^2 \text{vol}(A) = q^2 \text{vol}(B) \implies \frac{p^2}{q^2} = \frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)}.$$

De aquí se deduce que $f = pq f^{(A,B)}$ para cierto escalar pq .

Paso 3. Con f como en el paso anterior,

$$\langle f, Df \rangle = \sum_{i=1}^m d_i f_i^2 = p^4 \text{vol}(A) + q^4 \text{vol}(B) = p^2 q^2 \text{vol}(V).$$

Por tanto, usando el Lema 1.2.1,

$$\frac{\langle f, Lf \rangle}{\langle f, Df \rangle} = \frac{\langle f^{(A,B)}, Lf^{(A,B)} \rangle}{\langle f^{(A,B)}, Df^{(A,B)} \rangle} = \text{Ncut}(A, B).$$
■

Observación 1.2.7 (Complejidad computacional). El problema de optimización del Teorema 1.2.2 es **NP-completo**. Esto significa que, salvo que $P = NP$, no existe algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial.

1.2.4 Relajación espectral del problema NCut

Para obtener un algoritmo eficiente, relajamos el problema eliminando la restricción de que f tome valores discretos.

Observación 1.2.8 (Cambio de variable y cociente de Rayleigh). Sea $g = D^{1/2}f$ y definamos $M = D^{-1/2}LD^{-1/2}$ (el **laplaciano normalizado**). Entonces,

$$\frac{\langle f, Lf \rangle}{\langle f, Df \rangle} = \frac{\langle g, Mg \rangle}{\|g\|^2},$$

que es el **cociente de Rayleigh** de la matriz M . Además, M es simétrica y semidefinida positiva, con

$$\langle g, Mg \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m w_{ij} \left(\frac{g_i}{\sqrt{d_i}} - \frac{g_j}{\sqrt{d_j}} \right)^2 \geq 0.$$

La restricción $\sum_{i=1}^m d_i f_i = 0$ se traduce en $g \perp D^{1/2}\mathbf{1}$, donde $\mathbf{1}$ es el vector de unos.

El problema relajado consiste en minimizar el cociente de Rayleigh sobre todos los vectores $g \perp D^{1/2}\mathbf{1}$:

$$\min_{g \perp D^{1/2}\mathbf{1}} \frac{\langle g, Mg \rangle}{\|g\|^2}.$$

Por el teorema del cociente de Rayleigh (ver Apéndice), el mínimo se alcanza en el autovector de M correspondiente al segundo menor autovalor (el menor autovalor es 0 con autovector $D^{1/2}\mathbf{1}$).

Algoritmo de *Spectral Clustering* para $k = 2$:

1. Calcular el autovector g_2 de $M = D^{-1/2}LD^{-1/2}$ correspondiente al menor autovalor no nulo.
2. Definir la partición: $A = \{i \in V : g_2(i) > 0\}$ y $B = A^c$.

1.2.5 Interpretación probabilística: caminos aleatorios

La matriz $P = D^{-1}W$ es una **matriz de transición de Markov**:

$$p_{ij} = \frac{w_{ij}}{d_i} = \frac{w_{ij}}{\sum_{k=1}^m w_{ik}}, \quad \text{con } \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1.$$

Es decir, $p_{ij} = \mathbb{P}(i \rightarrow j)$ es la probabilidad de transitar del vértice i al vértice j en un paso del camino aleatorio sobre el grafo. La distribución estacionaria es $\pi_i = \frac{d_i}{\text{vol}(V)}$.

Proposición 1.2.3. Sea $\{X_t\}_{t \geq 0}$ el camino aleatorio sobre G con $X_0 \sim \pi$. Entonces,

$$\mathbb{P}(X_t \in A \mid X_{t-1} \in B) + \mathbb{P}(X_t \in B \mid X_{t-1} \in A) = \text{Ncut}(A, B).$$

Demostración: Calculamos directamente:

$$\mathbb{P}(X_0 \in A, X_1 \in B) = \sum_{i \in A} \sum_{j \in B} \pi_i p_{ij} = \frac{1}{\text{vol}(V)} \sum_{i \in A} \sum_{j \in B} w_{ij} = \frac{W(A, B)}{\text{vol}(V)}.$$

Como $\mathbb{P}(X_0 \in A) = \frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(V)}$, se tiene

$$\mathbb{P}(X_1 \in B \mid X_0 \in A) = \frac{W(A, B)}{\text{vol}(A)}.$$

El mismo argumento da $\mathbb{P}(X_1 \in A \mid X_0 \in B) = \frac{W(B, A)}{\text{vol}(B)}$, y sumando obtenemos $\text{Ncut}(A, B)$. ■

Esta proposición nos da una interpretación intuitiva: **minimizar NCut equivale a minimizar la probabilidad de que un camino aleatorio “salte” entre grupos.**

1.2.6 Spectral Clustering para $k > 2$

Lema 1.2.4. Sea $G = (V, W)$ un grafo con K componentes conexas $V = \bigsqcup_{\ell=1}^K A_\ell$ (es decir, $w_{ij} = 0$ si $i \in A_\ell, j \in A_{\ell'}$ con $\ell \neq \ell'$). Entonces,

$$\ker L = \text{span}\{\chi_{A_1}, \dots, \chi_{A_K}\},$$

donde χ_{A_ℓ} es la función indicadora de A_ℓ .

Demostración: Para $K = 1$ (grafo conexo), $\langle f, Lf \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} (f_i - f_j)^2 = 0$ implica $f_i = f_j$ para todos los pares con $w_{ij} > 0$, es decir, $f = \alpha \mathbf{1}$.

Para $K > 1$, el laplaciano tiene estructura de bloques diagonal (tras reordenar los vértices), y el resultado se aplica a cada bloque. ■

Observación 1.2.9 (Heurística para grafos “casi” desconectados). Si el grafo es conexo pero tiene K grupos “naturales” (muy conectados internamente, poco conectados entre sí), entonces:

- El autovector de M con autovalor 0 es $D^{1/2} \mathbf{1}$.
- Los siguientes $K - 1$ autovectores son aproximadamente $D^{1/2} \chi_{A_\ell}$, correspondientes a

autovalores pequeños.

Algoritmo de Shi-Malik:

1. Calcular los $k + 1$ autovectores de M con menores autovalores: $\{(\lambda_\ell, f_\ell)\}_{\ell=1}^{k+1}$ con $\lambda_1 = 0 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{k+1}$.
2. Representar cada vértice v_i mediante el *embedding*

$$\varphi(v_i) = (f_2(v_i), \dots, f_{k+1}(v_i)) \in \mathbb{R}^k.$$

Esta técnica se conoce como *Laplacian Eigenmaps*.

3. Aplicar un algoritmo de agrupamiento clásico (como k -means) sobre los puntos $\{\varphi(v_i)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^k$.

Observación 1.2.10 (Elección de k). El número de grupos k se puede estimar buscando un “codo” en el espectro de M : un salto significativo entre λ_k y λ_{k+1} sugiere que hay k grupos bien definidos.

1.2.7 Otros algoritmos de agrupamiento

Definición 1.2.11 (K -means). Sean $\mathcal{D} = \{x_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^N$ y $K \in \mathbb{N}$. El problema de K -means consiste en encontrar una partición $\mathcal{D} = \bigsqcup_{\ell=1}^K S_\ell$ que minimice

$$\sum_{\ell=1}^K \sum_{x \in S_\ell} \|x - \mu_\ell\|^2, \quad \text{donde } \mu_\ell = \frac{1}{|S_\ell|} \sum_{x \in S_\ell} x$$

es el centroide del grupo S_ℓ .

Observación 1.2.12. El problema de K -means es NP-completo. Los algoritmos prácticos (como el algoritmo de Lloyd) son heurísticas que encuentran mínimos locales.

Definición 1.2.13 (Agrupamiento jerárquico aglomerativo). Sea $\mathcal{D} = \{x_i\}_{i=1}^m \subset (X, d)$ un espacio métrico y sea $R: \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathbb{R}$ una distancia entre subconjuntos (por ejemplo, *single linkage*, *complete linkage* o *average linkage*).

- (i) Inicialmente, cada punto forma su propio grupo.
- (ii) Iterativamente, se fusionan los dos grupos más cercanos según R .
- (iii) Se construye un **dendrograma** que representa la jerarquía de fusiones.
- (iv) Se corta el dendrograma a un nivel t para obtener la partición final.

Observación 1.2.14. La elección del nivel de corte t es análoga a la búsqueda de un “codo” en el espectro del laplaciano.

Apéndice de Álgebra Lineal

Este apéndice recoge resultados de álgebra lineal utilizados en el capítulo, particularmente en la sección de clustering espectral.

Matrices autoadjuntas

Lema 1.2.5 (Caracterización de matrices autoadjuntas). *Sea $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ una matriz. Si $\langle Av, v \rangle_{\mathbb{C}^m} \in \mathbb{R}$ para todo $v \in \mathbb{C}^m$, entonces A es autoadjunta, es decir, $A = A^*$.*

Demostración: Definimos $M = A - A^*$ y mostramos que $M = 0$.

Paso 1. Como $\langle Av, v \rangle \in \mathbb{R}$ para todo v , tenemos que $\langle Av, v \rangle = \overline{\langle Av, v \rangle} = \langle v, Av \rangle$. Por tanto,

$$\langle Mv, v \rangle = \langle Av, v \rangle - \langle A^*v, v \rangle = \langle Av, v \rangle - \langle v, Av \rangle = 0.$$

Paso 2. Usando la identidad de polarización, para cualesquiera $v, w \in \mathbb{C}^m$:

$$\langle M(v + w), v + w \rangle - \langle M(v - w), v - w \rangle = 2 \langle Mv, w \rangle + 2 \langle Mw, v \rangle.$$

Por el Paso 1, el lado izquierdo es cero, luego $\langle Mv, w \rangle = -\langle Mw, v \rangle$.

Como $\langle Mw, v \rangle = \overline{\langle v, Mw \rangle}$ y $\langle v, Mw \rangle = \overline{\langle Mw, v \rangle}$, se tiene $\langle Mv, w \rangle = -\langle Mw, v \rangle = -\overline{\langle v, Mw \rangle}$. Sustituyendo $\langle Mw, v \rangle = -\langle Mv, w \rangle$:

$$\langle Mv, w \rangle = -\overline{\langle Mv, w \rangle} \implies \langle Mv, w \rangle \in i\mathbb{R}.$$

Paso 3. Análogamente, considerando $v + iw$ y $v - iw$:

$$\langle M(v + iw), v + iw \rangle - \langle M(v - iw), v - iw \rangle = 2i \langle Mv, w \rangle - 2i \langle Mw, v \rangle.$$

Por el Paso 1, esto es cero, luego $\langle Mv, w \rangle = \langle Mw, v \rangle$.

Paso 4. Combinando los Pasos 2 y 3: del Paso 2 tenemos $\langle Mv, w \rangle = -\langle Mw, v \rangle$, y del Paso 3 tenemos $\langle Mv, w \rangle = \langle Mw, v \rangle$. Por tanto, $\langle Mv, w \rangle = -\langle Mw, v \rangle$, lo que implica $\langle Mv, w \rangle = 0$ para todos $v, w \in \mathbb{C}^m$. Luego $M = 0$.

■

Observación 1.2.15 (Aplicación al laplaciano normalizado). En el contexto del clustering espectral, la matriz $M = D^{-1/2}LD^{-1/2}$ satisface

$$\langle Mg, g \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m w_{ij} \left| \frac{g_i}{\sqrt{d_i}} - \frac{g_j}{\sqrt{d_j}} \right|^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

para todo $g \in \mathbb{C}^m$. Por el lema anterior, M es autoadjunta (y además semidefinida positiva).

El cociente de Rayleigh

Definición 1.2.16 (Cociente de Rayleigh). Sea $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ una matriz simétrica. El **cociente de Rayleigh** de M es la función $R_M: \mathbb{R}^m \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$R_M(x) = \frac{\langle Mx, x \rangle}{\|x\|^2}.$$

Lema 1.2.6 (Teorema min-max de Rayleigh). Sea $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ simétrica y semidefinida positiva. Sean $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_m$ sus autovalores (contados con multiplicidad) y $\{v_1, \dots, v_m\}$ una base ortonormal de autovectores correspondientes. Entonces:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}} R_M(x) = \lambda_1, \quad \text{con} \quad \arg \min_{x \neq 0} R_M(x) = \ker(M - \lambda_1 I).$$

Demostración: Como $\{v_1, \dots, v_m\}$ es una base ortonormal, cualquier $x \in \mathbb{R}^m$ se escribe como $x = \sum_{i=1}^m c_i v_i$ con $c_i = \langle x, v_i \rangle$. Entonces:

$$Mx = \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i v_i, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^m c_i^2, \quad \langle Mx, x \rangle = \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i^2.$$

Definiendo $p_i = \frac{c_i^2}{\sum_{j=1}^m c_j^2}$, tenemos que $p_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^m p_i = 1$. Por tanto,

$$R_M(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i p_i$$

es una combinación convexa de los autovalores. El mínimo de una combinación convexa se alcanza en el menor de los valores, es decir, $R_M(x) \geq \lambda_1$, con igualdad si y solo si $p_1 = 1$ (y $p_i = 0$ para $i > 1$), lo que ocurre cuando $x \in \ker(M - \lambda_1 I)$. ■

Corolario 1.2.7 (Segundo autovalor). Con la notación del lema anterior, si $V_1 = \ker(M - \lambda_1 I)$ es el autoespacio correspondiente a λ_1 , entonces

$$\min_{x \perp V_1, x \neq 0} R_M(x) = \lambda_2.$$

Más generalmente, para $k \geq 1$:

$$\lambda_k = \min_{\substack{x \perp v_1, \dots, v_{k-1} \\ x \neq 0}} R_M(x).$$

Demostración: Si $x \perp V_1$, entonces $c_i = 0$ para todo i tal que $\lambda_i = \lambda_1$. Por tanto, $R_M(x) = \sum_{\lambda_i > \lambda_1} \lambda_i p_i \geq \lambda_2$, con igualdad cuando x es autovector de λ_2 . ■

Observación 1.2.17 (Aplicación al clustering espectral). En el problema NCut relajado, buscamos minimizar $R_M(g) = \frac{\langle Mg, g \rangle}{\|g\|^2}$ sujeto a $g \perp D^{1/2}\mathbf{1}$. Como $D^{1/2}\mathbf{1}$ es el autovector de M con autovalor $\lambda_1 = 0$, el Corolario 1.2.7 nos dice que el mínimo se alcanza en el autovector correspondiente al segundo menor autovalor λ_2 .

2. Fundamentos del aprendizaje supervisado

2.1 Learning Theory

La teoría del aprendizaje (*learning theory*) es el marco matemático que formaliza el problema central del aprendizaje automático: a partir de un conjunto finito de observaciones (datos), inferir una relación funcional que permita hacer predicciones sobre datos no observados. El enfoque es inherentemente **estadístico**: se modela la generación de datos como un proceso aleatorio gobernado por una distribución de probabilidad desconocida y el objetivo es aproximar la dependencia subyacente entre las variables de entrada y de salida.

2.1.1 Formulación del problema

Sean X e Y espacios topológicos de Hausdorff:

- X es el **espacio de entrada** (o *espacio de características*): representa el dominio de las variables observables a partir de las cuales queremos hacer predicciones. Por ejemplo, $X = \mathbb{R}^d$ cuando cada observación se describe mediante d atributos numéricos.
- Y es el **espacio de salida** (o *espacio de respuestas*): representa el dominio de los valores que queremos predecir. En problemas de regresión, típicamente $Y = \mathbb{R}$ o $Y = \mathbb{R}^k$; en clasificación binaria, $Y = \{-1, +1\}$.

Sea $Z = X \times Y$ el espacio producto, dotado de la topología producto (que es de Hausdorff por serlo X e Y). Sea $\mathcal{B}$ la σ -álgebra de Borel de Z y $(Z, \mathcal{B}, \rho)$ un espacio de probabilidad:

- ρ es una medida de probabilidad **desconocida** que modela el mecanismo de generación de datos: cada par (x, y) observado se entiende como una realización de una variable aleatoria cuya medida de probabilidad inducida es ρ .
- La estructura de producto $Z = X \times Y$ refleja la distinción entre lo que observamos (x) y lo que queremos predecir (y).
- Nos interesa el fenómeno de generación de datos en Z descrito por ρ desde el punto de vista de la **dependencia de Y respecto de X** : queremos entender cómo la variable de salida y depende de la entrada x .

Por tanto, el objetivo es aproximar la **función de regresión**, es decir, la función $f_\rho: X \rightarrow Y$ que asigna a cada $x \in X$ el valor esperado de y condicionado a x :

$$f_\rho(x) := \int_Y y \, d\rho(y \mid x),$$

donde $\rho(y \mid x)$ es la medida de probabilidad condicional de y dado x . La función f_ρ es, en cierto sentido, la *mejor predicción posible* de y dado x , ya que minimiza el error cuadrático medio (como se demostrará más adelante).

Sea $\pi: Z \rightarrow X$ la proyección $\pi(x, y) = x$. Sea ρ_X la medida de probabilidad marginal en X definida en $E \subset X$ abierto por $\rho_X(E) = \rho(\pi^{-1}(E))$.

Por el teorema de desintegración de medidas (que se aplica porque Z es un espacio de Hausdorff con medida de probabilidad de Radon), existe la medida de probabilidad condicional que satisface, $\forall \varphi \in L^1(Z, \rho)$:

$$\begin{aligned} \int_Z \varphi(z) \, d\rho(z) &= \int_X \left(\int_Y \varphi(x, y) \, d\rho(y \mid x) \right) d\rho_X(x), \\ \int_Y d\rho(y \mid x) &= 1 \quad \rho_X\text{-casi todo } x \in X. \end{aligned}$$

Intuitivamente, $\rho(y \mid x)$ es la distribución de y una vez fijado x : integrar primero respecto de $\rho(y \mid x)$ y luego respecto de ρ_X es lo mismo que integrar directamente respecto de ρ .

2.1.2 Sobre el objetivo y el aprendizaje estadístico

Como no se dispone de ρ , hay que trabajar con **muestras**: $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset Z$.

- Aprendizaje *supervisado*: para todo $x_i \in X$ hay un $y_i \in Y$ que proporciona un objetivo.
- El resultado de todo aprendizaje es epistemológicamente una aproximación, porque la búsqueda de una función de regresión se tiene que hacer dentro de un **espacio de las hipótesis** definido *a priori* antes de conocer ρ .

Ejemplo 2.1.1 (Aproximación polinomial de datos físicos). Supongamos que una ley física $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y fenómenos aleatorios generan los datos:

$$y_i = F(x_i) + \varepsilon_i, \quad \text{donde } \{\varepsilon_i\}_{i=1}^m \text{ son v.a.i.d.}$$

Si queremos aproximar F con un polinomio de grado $\leq n$, podemos intentar minimizar

$$\sum_{i=1}^m |y_i - f_w(x_i)|^2, \quad \text{para } f_w(x) = \sum_{i=0}^n w_i x^i.$$

Veamos cómo encaja este modelo en el marco general. Supongamos $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $X = [0, 1]$

con ρ_X la medida de Lebesgue (distribución uniforme) en X .

- La medida marginal ρ_X induce, a través de F , una distribución sobre $F(X)$: la medida pushforward $F_*\rho_X$, definida por

$$(F_*\rho_X)((-\infty, t)) = \rho_X(\{x \in X : F(x) < t\}) = \rho_X(F^{-1}((-\infty, t))).$$

Esto describe la distribución de la variable de salida cuando no hay ruido.

- Si no hubiera ruido, es decir, $y = F(x)$ determinísticamente, la medida de probabilidad condicional $\rho(y | x)$ sería la delta de Dirac concentrada en $F(x)$, caracterizada por

$$\forall \varphi \in C_c(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) d\rho(y | x) = \varphi(F(x)).$$

- Con ruido gaussiano $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$, la probabilidad condicional pasa a ser $\rho(y | x) = \mathcal{N}(F(x), 1)$. La medida conjunta ρ sobre $Z = X \times \mathbb{R}$ es entonces absolutamente continua respecto de la medida producto $\rho_X \otimes m$, con densidad

$$d\rho(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-F(x))^2}{2}} d\rho_X(x) dy.$$

- La función de regresión asociada a esta ρ coincide con la ley física F , como se comprueba directamente:

$$f_\rho(x) = \int_{\mathbb{R}} y d\rho(y | x) = \mathbb{E}[\mathcal{N}(F(x), 1)] = F(x).$$

Por tanto, minimizar el error empírico

$$\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f_w] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |y_i - f_w(x_i)|^2$$

es equivalente a buscar una aproximación polinomial de $f_\rho = F$ a partir de los datos, lo que justifica el planteamiento del ejemplo dentro del marco general.

Para medir cuán buena es una hipótesis f , necesitamos una función de coste que compare $f(x)$ con el valor real y . La elección estándar en regresión es el error cuadrático, que penaliza las desviaciones de forma proporcional a su magnitud.

Definición 2.1.1 (Error cuadrático). Sea $Y = \mathbb{R}^k$, ρ una medida de probabilidad en $Z = X \times Y$, $f: X \rightarrow Y$ ρ -medible, y $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset Z$. Definimos:

- El **error de generalización** de f respecto de ρ como $\mathcal{E}[f] := \int_Z |f(x) - y|^2 d\rho(x, y)$,

- El **error empírico** de f respecto de $\mathcal{D}$ como $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f] := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |f(x_i) - y_i|^2$.

La siguiente proposición justifica que f_{ρ} es la mejor hipótesis posible y hace explícita la estructura del error de generalización.

Proposición 2.1.1. *Para toda función $f: X \rightarrow Y$ ρ -medible se cumple que*

$$\mathcal{E}[f] = \int_X |f(x) - f_{\rho}(x)|^2 d\rho_X(x) + \mathcal{E}[f_{\rho}].$$

En particular, f_{ρ} minimiza $\mathcal{E}$ entre todas las funciones ρ -medibles. La primera integral mide el error de aproximación de f_{ρ} por f , mientras que

$$\mathcal{E}[f_{\rho}] = \int_X \left(\int_Y |f_{\rho}(x) - y|^2 d\rho(y | x) \right) d\rho_X(x)$$

es el error intrínseco, que recoge la varianza de la distribución condicional $\rho(y | x)$ en torno a su media $f_{\rho}(x)$ y no puede reducirse con ninguna elección de f .

Demostración: Sumamos y restamos $f_{\rho}(x)$ dentro del cuadrado y expandimos:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}[f] &= \int_Z |(f(x) - f_{\rho}(x)) + (f_{\rho}(x) - y)|^2 d\rho(x, y) \\ &= \int_Z |f(x) - f_{\rho}(x)|^2 d\rho(x, y) + \int_Z |f_{\rho}(x) - y|^2 d\rho(x, y) + 2\mathcal{I}[f, f_{\rho}], \end{aligned}$$

donde el término cruzado es

$$\mathcal{I}[f, f_{\rho}] = \int_X (f(x) - f_{\rho}(x)) \underbrace{\left(\int_Y (f_{\rho}(x) - y) d\rho(y | x) \right)}_{= f_{\rho}(x) - f_{\rho}(x) = 0} d\rho_X(x) = 0.$$

Integrando la primera integral respecto de ρ_X e identificando la segunda con $\mathcal{E}[f_{\rho}]$ se obtiene el resultado. ■

Como f_{ρ} depende de ρ , que es desconocida, no podemos calcularla directamente. El enfoque práctico es restringir la búsqueda a un subconjunto $\mathcal{H} \subset Y^X$ manejable, elegido de antemano con conocimiento del problema, y minimizar el error dentro de él.

Definición 2.1.2 (Hipótesis y función objetivo). Sea $\mathcal{H} \subset Y^X = \{f: X \rightarrow Y\}$ un **espacio de hipótesis** y $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times Y$ un conjunto de datos. Definimos:

- La **función objetivo** $f_{\mathcal{H}} \in \mathcal{H}$ como el minimizador del error de generalización en $\mathcal{H}$:

$$\forall f \in \mathcal{H} : \mathcal{E}[f_{\mathcal{H}}] \leq \mathcal{E}[f].$$

- La **función empírica** $f_{\mathcal{H},\mathcal{D}} \in \mathcal{H}$ como el minimizador del error empírico en $\mathcal{H}$:

$$\forall f \in \mathcal{H} : \mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f_{\mathcal{H},\mathcal{D}}] \leq \mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f].$$

En la práctica, ρ es desconocida, por lo que $f_{\mathcal{H}}$ no es accesible directamente; el aprendizaje consiste en obtener $f_{\mathcal{H},\mathcal{D}}$ a partir de los datos y esperar que aproxime bien a $f_{\mathcal{H}}$.

Observación 2.1.3. Por la Proposición 2.1.1, minimizar $\mathcal{E}$ en $\mathcal{H}$ equivale a minimizar la distancia a f_{ρ} en $L^2(\rho_X)$. Es decir, $f_{\mathcal{H}} \in \mathcal{H}$ es función objetivo si y solo si

$$\forall f \in \mathcal{H} : \|f_{\mathcal{H}} - f_{\rho}\|_{L^2(\rho_X)} \leq \|f - f_{\rho}\|_{L^2(\rho_X)}.$$

Es decir, $f_{\mathcal{H}}$ es la *proyección* de f_{ρ} sobre $\mathcal{H}$ en el sentido de la norma $L^2(\rho_X)$.

Definición 2.1.4. $\mathcal{C}_b(X) = \mathcal{C}(X) \cap \mathcal{L}^{\infty}(X)$ es el espacio de funciones continuas y acotadas.

Una pregunta natural es: ¿cuándo existen $f_{\mathcal{H}}$ y $f_{\mathcal{H},\mathcal{D}}$? La respuesta requiere imponer condiciones sobre $\mathcal{H}$: si $\mathcal{H}$ es un subconjunto compacto de $\mathcal{C}_b(X)$ (en la topología de la convergencia uniforme) y las hipótesis están uniformemente acotadas junto con los datos, entonces ambos minimizadores existen, como muestra el siguiente teorema.

Teorema 2.1.2. Sea X un espacio métrico, $M > 0$ y $\mathcal{H}_M \subset \mathcal{C}_b(X)$ compacto en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_{\infty})$ tal que $|f(x) - y| \leq M$ ρ -c.s. para todo $f \in \mathcal{H}_M$. Entonces existen la función objetivo y la función empírica: para todo $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times Y$,

$$\exists f_{\mathcal{H}_M} \in \mathcal{H}_M \wedge \exists f_{\mathcal{H}_M,\mathcal{D}} \in \mathcal{H}_M.$$

Demostración: Basta probar que $\mathcal{E}$ y $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}$ son continuas en $(\mathcal{H}_M, \|\cdot\|_{\infty})$; la existencia de mínimos se sigue entonces del teorema de Weierstrass, ya que $\mathcal{H}_M$ es compacto.

Sean $f_1, f_2 \in \mathcal{H}_M$. Factorizando la diferencia de cuadrados,

$$\begin{aligned} |\mathcal{E}[f_1] - \mathcal{E}[f_2]| &= \left| \int_Z (|f_1(x) - y|^2 - |f_2(x) - y|^2) d\rho(x, y) \right| \\ &= \left| \int_Z (f_1(x) + f_2(x) - 2y)(f_1(x) - f_2(x)) d\rho(x, y) \right| \\ &\leq \|f_1 - f_2\|_{\infty} \int_Z (|f_1(x) - y| + |f_2(x) - y|) d\rho(x, y) \\ &\leq 2M \|f_1 - f_2\|_{\infty}. \end{aligned}$$

Por tanto $\mathcal{E}$ es Lipschitz, y en particular continua. El mismo argumento, reemplazando la integral por la suma finita, da continuidad de $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}$. ■

2.1.3 The Bias-Variance Tradeoff

El objetivo del aprendizaje es elegir un espacio de hipótesis $\mathcal{H}$ y una muestra $\mathcal{D}$ tales que $f_{\mathcal{H},\mathcal{D}}$ tenga un error de generalización pequeño. Para cuantificar cuán lejos está $f_{\mathcal{H},\mathcal{D}}$ de f_ρ , descomponemos el exceso de error usando la Proposición 2.1.1:

$$\mathcal{E}[f_{\mathcal{H},\mathcal{D}}] - \mathcal{E}[f_\rho] = \underbrace{(\mathcal{E}[f_{\mathcal{H},\mathcal{D}}] - \mathcal{E}[f_{\mathcal{H}}])}_{\text{varianza } V(\mathcal{H},\mathcal{D},\rho) \geq 0} + \underbrace{(\mathcal{E}[f_{\mathcal{H}}] - \mathcal{E}[f_\rho])}_{\text{sesgo}^2 = \|f_{\mathcal{H}} - f_\rho\|_{L^2(\rho_X)}^2 \geq 0}.$$

Los dos sumandos capturan fuentes de error de naturaleza opuesta:

- El **sesgo** (*bias*) mide cuán bien puede $\mathcal{H}$ aproximar f_ρ : es intrínseco a la clase $\mathcal{H}$ e independiente de $\mathcal{D}$. Si $\mathcal{H}$ es rico, el sesgo es pequeño; si $\mathcal{H}$ es demasiado rígido, el sesgo es grande sin importar cuántos datos se tengan.
- La **varianza** mide cuánto se aleja el minimizador empírico $f_{\mathcal{H},\mathcal{D}}$ del minimizador teórico $f_{\mathcal{H}}$ debido a la aleatoriedad de la muestra. Si $\mathcal{H}$ es fijo y se aumenta el tamaño m de $\mathcal{D}$, entonces $V \rightarrow 0$ (*bajo hipótesis oportunas*).

Esto revela la tensión fundamental del aprendizaje: ampliar $\mathcal{H}$ reduce el sesgo porque $f_{\mathcal{H}}$ se acerca más a f_ρ , pero aumenta la varianza porque hay más libertad para sobreajustar los datos (*overfitting*). Por el contrario, restringir $\mathcal{H}$ reduce la varianza pero aumenta el sesgo (*underfitting*). El arte del aprendizaje supervisado consiste en equilibrar ambas fuentes de error.

2.2 Espacios de Hilbert a núcleo reproductor (RKHS)

En la sección anterior hemos visto que el problema del aprendizaje se reduce a minimizar el error de generalización dentro de un espacio de hipótesis $\mathcal{H}$, y que para garantizar la existencia de minimizadores basta con que $\mathcal{H}$ sea compacto en $\mathcal{C}_b(X)$. Los **espacios de Hilbert a núcleo reproductor** (*Reproducing Kernel Hilbert Spaces*, RKHS) son una familia de espacios de hipótesis que satisfacen estas condiciones de forma natural y, además, poseen propiedades computacionales excepcionales que veremos más adelante.

La teoría de los RKHS se articula en torno a un objeto central: el **núcleo** (o *kernel*), una función sobre $X \times X$ que codifica toda la geometría del espacio funcional. El tipo de kernel que nos interesa es el de Mercer, cuyas propiedades garantizan que el espacio resultante sea un espacio de Hilbert sobre el que se puede hacer análisis.

Definición 2.2.1 (Núcleo de Mercer). Sea $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ y X un espacio topológico. Un

núcleo de Mercer sobre X es una función $K: X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ que satisface:

- (i) Continuidad: K es continua.
- (ii) Hermiticidad: $K(x, y) = \overline{K(y, x)}$ para todo $x, y \in X$.
- (iii) Semidefinición positiva: para todo $m \in \mathbb{N}$ y todo $\{x_i\}_{i=1}^m \subset X$, la *matriz de Gram* $G \in M_m(\mathbb{K})$ definida por $G_{ij} = K(x_i, x_j)$ es semidefinida positiva, es decir,

$$\forall v \in \mathbb{K}^m : v^* G v = \sum_{i,j=1}^m \overline{v_i} K(x_i, x_j) v_j \geq 0.$$

El siguiente teorema garantiza la existencia y unicidad del RKHS asociado a cualquier núcleo de Mercer, y muestra cómo construirlo explícitamente. La clave de la construcción es que las funciones $K_x(y) = K(x, y)$ (“secciones” del kernel) actúan simultáneamente como elementos del espacio y como representantes de los funcionales de evaluación.

Teorema 2.2.1 (Existencia y unicidad del RKHS). *Sea $K: X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ un núcleo de Mercer. Para cada $x \in X$, sea $K_x: X \rightarrow \mathbb{K}$ la función $K_x(y) := K(x, y)$. Entonces existe un único espacio de Hilbert $\mathcal{H}_K$ sobre $\mathbb{K}$, formado por funciones $X \rightarrow \mathbb{K}$, tal que:*

- (1) *Densidad:* $\text{span}\{K_x : x \in X\}$ es denso en $\mathcal{H}_K$.
- (2) *Propiedad reproductora:* $f(x) = \langle f, K_x \rangle_{\mathcal{H}_K}$ para toda $f \in \mathcal{H}_K$ y todo $x \in X$.

A $\mathcal{H}_K$ se le llama el **RKHS asociado a K** , y a K el **núcleo reproductor** de $\mathcal{H}_K$.

Además, si K es acotado (es decir, $K \in \mathcal{C}_b(X \times X)$), entonces $\mathcal{H}_K \subset \mathcal{C}(X)$ y la inclusión $\mathcal{H}_K \hookrightarrow \mathcal{C}(X)$ es continua respecto de la norma del supremo.

Demostración: La construcción sigue tres pasos: definir un producto interno en el espacio lineal generado por las secciones K_x , completarlo para obtener un espacio de Hilbert, y verificar la propiedad reproductora. La unicidad se deduce al final.

Paso 1: Pre-espacio de Hilbert. Sea $\mathring{\mathcal{H}} := \text{span}\{K_x : x \in X\}$. Todo elemento de $\mathring{\mathcal{H}}$ se escribe como combinación lineal finita $f = \sum_{i=1}^N c_i K_{x_i}$. Definimos:

$$\left\langle \sum_{i=1}^N c_i K_{x_i}, \sum_{j=1}^M d_j K_{y_j} \right\rangle_K := \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_i \overline{d_j} K(x_i, y_j).$$

Esta expresión es sesquilineal y hermítica (porque $K(x, y) = \overline{K(y, x)}$). La semidefinición positiva del núcleo asegura que $\langle f, f \rangle_K \geq 0$ para todo $f \in \mathring{\mathcal{H}}$. Obtenemos así la **propiedad**

reproductora en $\mathring{\mathcal{H}}$: para $f = \sum_i c_i K_{x_i}$,

$$\forall x \in X : \langle f, K_x \rangle_K = \sum_{i=1}^N c_i K(x_i, x) = f(x).$$

Paso 2: Norma y completación. Si $\langle f, f \rangle_K = 0$, la desigualdad de Cauchy-Schwarz en $\langle \cdot, \cdot \rangle_K$ da, para todo $x \in X$:

$$|f(x)|^2 = |\langle f, K_x \rangle_K|^2 \leq \langle f, f \rangle_K \cdot \langle K_x, K_x \rangle_K = 0 \cdot K(x, x) = 0,$$

luego $f = 0$. Por tanto $\langle \cdot, \cdot \rangle_K$ es un producto interno en $\mathring{\mathcal{H}}$ y $\|f\|_K := \sqrt{\langle f, f \rangle_K}$ es una norma. Definimos $\mathcal{H}_K$ como la complección de $(\mathring{\mathcal{H}}, \|\cdot\|_K)$: es un espacio de Hilbert.

Paso 3: $\mathcal{H}_K \subset \mathcal{C}(X)$ e inclusión continua (bajo $K \in \mathcal{C}_b$). Sea $C_K := \sup_{x \in X} K(x, x) < \infty$ (finito porque K es acotado). Para todo $f \in \mathring{\mathcal{H}}$ y todo $x \in X$, la propiedad reproductora y Cauchy-Schwarz dan:

$$|f(x)| = |\langle f, K_x \rangle_K| \leq \|f\|_K \|K_x\|_K = \|f\|_K \sqrt{K(x, x)} \leq \sqrt{C_K} \|f\|_K,$$

luego $\|f\|_\infty \leq \sqrt{C_K} \|f\|_K$ para todo $f \in \mathring{\mathcal{H}}$. Esta desigualdad se extiende a $\mathcal{H}_K$ por densidad: si $f \in \mathcal{H}_K$ y $(f_n) \subset \mathring{\mathcal{H}}$ con $\|f_n - f\|_K \rightarrow 0$, entonces

$$\|f_n - f_m\|_\infty \leq \sqrt{C_K} \|f_n - f_m\|_K \rightarrow 0,$$

así que (f_n) es de Cauchy en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_\infty)$, cuya completación es $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_\infty)$ (ya que el límite uniforme de funciones continuas en un espacio métrico es continuo). Luego $f = \lim f_n \in \mathcal{C}(X)$, con $\|f\|_\infty \leq \sqrt{C_K} \|f\|_K$. Esto prueba:

- $\mathcal{H}_K \subset \mathcal{C}(X)$.
- La inclusión $\iota: \mathcal{H}_K \hookrightarrow \mathcal{C}(X)$ satisface $\|\iota(f)\|_\infty = \|f\|_\infty \leq \sqrt{C_K} \|f\|_K$, es decir, es Lipschitz (en particular, continua).

Paso 4: Extensión de la propiedad reproductora a $\mathcal{H}_K$. Para cada $x \in X$ fijo, el funcional $f \mapsto \langle f, K_x \rangle_K$ es continuo en $\mathcal{H}_K$ (por ser lineal y acotado). Como coincide con $f \mapsto f(x)$ en el denso $\mathring{\mathcal{H}}$, la igualdad $f(x) = \langle f, K_x \rangle_K$ se extiende a todo $\mathcal{H}_K$.

Unicidad. Si $\tilde{\mathcal{H}}$ fuera otro espacio de Hilbert satisfaciendo (1) y (2), la propiedad reproductora fijaría el producto interno en $\text{span}\{K_x\}$ (que es denso en ambos espacios), y la completación sería única. ■

El Teorema 2.2.1 parte de un núcleo de Mercer para construir un RKHS. Existe también una caracterización abstracta equivalente, que parte de un espacio de Hilbert de funciones y le

exige que la evaluación puntual sea continua.

Definición 2.2.2 (RKHS: caracterización abstracta). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert de funciones $f: X \rightarrow \mathbb{K}$. Se dice que $\mathcal{H}$ es un RKHS sobre X si, para todo $x \in X$, el funcional de evaluación $\delta_x: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{K}$, $\delta_x(f) := f(x)$, es continuo, es decir,

$$\forall f \in \mathcal{H} : \forall x \in X : \exists D_x > 0 : |f(x)| \leq D_x \|f\|_{\mathcal{H}}.$$

En tal caso, por el teorema de representación de Riesz, para cada $x \in X$ existe un único $K_x \in \mathcal{H}$ tal que $\forall f \in \mathcal{H} : f(x) = \langle f, K_x \rangle_{\mathcal{H}}$. La función $K: X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ definida por $K(x, y) := \langle K_x, K_y \rangle_{\mathcal{H}}$ se llama el **núcleo reproductor** de $\mathcal{H}$.

Observación 2.2.3. Las dos perspectivas son equivalentes: el Teorema 2.2.1 muestra que todo núcleo de Mercer K produce un RKHS $\mathcal{H}_K$ en el sentido de la Definición 2.2.2 (la continuidad de δ_x se sigue de $|f(x)| \leq \sqrt{C_K} \|f\|_K$). Recíprocamente, el núcleo reproductor de cualquier RKHS abstracto es siempre un núcleo de Mercer.

La conexión entre los RKHS y la existencia de minimizadores (requerida en el Teorema 2.1.2) se establece a través del siguiente resultado de compacidad: cuando X es compacto, la bola unidad cerrada de $\mathcal{H}_K$ es compacta en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_{\infty})$, lo que permite aplicar el Teorema 2.1.2.

Teorema 2.2.2 (Compacidad de la bola unidad). Sean X un espacio métrico compacto y $K \in \mathcal{C}_b(X \times X)$ un núcleo de Mercer. Sea $\overline{B} := \{f \in \mathcal{H}_K : \|f\|_K \leq 1\}$ la bola unidad cerrada de $\mathcal{H}_K$. Entonces $\overline{B}$ es compacto en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_{\infty})$.

Demostración: Por el teorema de Arzelà-Ascoli, basta verificar que $\overline{B}$ es cerrado, acotado y equicontinuo en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_{\infty})$.

Acotado. Por el Teorema 2.2.1, $\|f\|_{\infty} \leq \sqrt{C_K} \|f\|_K \leq \sqrt{C_K}$ para todo $f \in \overline{B}$, donde $C_K = \sup_{x \in X} K(x, x) < \infty$.

Equicontinuo. Como X es compacto y K es continua, por el teorema de Heine K es uniformemente continua en $X \times X$: dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $d(y, y') < \delta$ implica $|K(x, y) - K(x, y')| < \varepsilon$ para todo $x \in X$. Entonces, para todo $f \in \overline{B}$ y todo $y, y' \in X$ con $d(y, y') < \delta$:

$$\begin{aligned} |f(y) - f(y')| &= |\langle f, K_y - K_{y'} \rangle_{\mathcal{H}_K}| \leq \|f\|_K \|K_y - K_{y'}\|_K \\ &\leq \sqrt{K(y, y) - K(y, y') - K(y', y) + K(y', y')} < \sqrt{2\varepsilon}, \end{aligned}$$

usando que $\|K_y - K_{y'}\|_K^2 = K(y, y) - K(y, y') - K(y', y) + K(y', y')$ y la cota de continuidad uniforme.

Cerrado. Sea $\{f_m\} \subset \overline{B}$ con $\|f_m - f\|_\infty \rightarrow 0$ para algún $f \in \mathcal{C}(X)$. Por el teorema de Banach-Alaoglu, $\overline{B}$ es débilmente compacto en $\mathcal{H}_K$, de modo que existe una subsucesión $\{f_{m_k}\}$ con $f_{m_k} \rightharpoonup \hat{f}$ débilmente en $\mathcal{H}_K$ para algún $\hat{f} \in \overline{B}$. Para cada $x \in X$, el funcional $g \mapsto \langle g, K_x \rangle_K$ es continuo en $\mathcal{H}_K$, luego:

$$\hat{f}(x) = \langle \hat{f}, K_x \rangle_K = \lim_k \langle f_{m_k}, K_x \rangle_K = \lim_k f_{m_k}(x) = f(x).$$

Por tanto $f = \hat{f} \in \overline{B}$, lo que prueba que $\overline{B}$ es cerrado en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_\infty)$. ■

Observación 2.2.4. Este teorema garantiza que $\overline{B}$ satisface las hipótesis del Teorema 2.1.2: es compacto en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_\infty)$ y, si además $|f(x) - y| \leq M$ ρ -c.s. para todo $f \in \overline{B}$, existen tanto la función objetivo $f_{\mathcal{H}_K}$ como la función empírica $f_{\mathcal{H}_K, \mathcal{D}}$ en $\overline{B}$.

Con este resultado el marco teórico de los RKHS queda conectado con el problema del aprendizaje: dado un núcleo de Mercer acotado sobre un espacio compacto X , la bola $M\overline{B} = \{f \in \mathcal{H}_K : \|f\|_K \leq M\}$ satisface las hipótesis del Teorema 2.1.2 para todo $M > 0$. El parámetro M actúa como un hiperparámetro de regularización: valores pequeños restringen las hipótesis a funciones de norma acotada, reduciendo la complejidad del espacio a costa de un mayor sesgo.

Antes de ver cómo minimizar el riesgo regularizado eficientemente, veamos los dos ejemplos principales de RKHS. El primero, el kernel gaussiano RBF, es el más utilizado en la práctica; el segundo, el espacio de Fock-Bargmann, ilustra la conexión entre los RKHS y el análisis complejo.

Ejemplo 2.2.1 (Kernel Gaussiano RBF). Sean $X \subset \mathbb{R}^d$ y $\alpha > 0$. El **kernel gaussiano de base radial** (RBF, *Radial Basis Function*) es

$$K_\alpha: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad K_\alpha(x, y) := e^{-\alpha\|x-y\|^2}.$$

Veamos que K_α es un núcleo de Mercer en el sentido de la Definición 2.2.1.

Continuidad y simetría. La función K_α es continua (composición de funciones continuas) y satisface $K_\alpha(x, y) = K_\alpha(y, x)$, por lo que las condiciones (1) y (2) de la Definición 2.2.1 se verifican.

Semidefinición positiva. Sea $g: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ la gaussiana centrada $g(z) := e^{-\alpha\|z\|^2}$, de modo que $K_\alpha(x, y) = g(x - y)$. Escribimos la transformada de Fourier de g con la convención

$\hat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \langle \xi, x \rangle} g(x) dx$. Calculando por separación de variables,

$$\hat{g}(\xi) = \prod_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi_j x_j} e^{-\alpha x_j^2} dx_j = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{d/2} e^{-\frac{\pi^2}{\alpha} \|\xi\|^2}.$$

En particular, $\hat{g}(\xi) > 0$ para todo $\xi \in \mathbb{R}^d$. Por el teorema de inversión de Fourier,

$$g(z) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i \langle \xi, z \rangle} \hat{g}(\xi) d\xi.$$

Sean ahora $\{x_i\}_{i=1}^m \subset X$ y $v \in \mathbb{R}^m$. Entonces:

$$\begin{aligned} v^T G v &= \sum_{i,j=1}^m v_i v_j K_\alpha(x_i, x_j) = \sum_{i,j=1}^m v_i v_j g(x_i - x_j) = \sum_{i,j=1}^m v_i v_j \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i \langle \xi, x_i - x_j \rangle} \hat{g}(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\sum_{i=1}^m v_i e^{2\pi i \langle \xi, x_i \rangle} \right) \overline{\left(\sum_{j=1}^m v_j e^{2\pi i \langle \xi, x_j \rangle} \right)} \hat{g}(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \sum_{i=1}^m v_i e^{2\pi i \langle \xi, x_i \rangle} \right|^2 \hat{g}(\xi) d\xi \geq 0, \end{aligned}$$

ya que $\hat{g} \geq 0$. Luego K_α es semidefinido positivo y, por tanto, es un núcleo de Mercer.

Observación 2.2.5. Los elementos de $\mathcal{H}_{K_\alpha}$ son (límites en $\|\cdot\|_{K_\alpha}$ de) combinaciones lineales de gaussianas centradas en puntos de X :

$$f \in \mathcal{H}_{K_\alpha} \implies f(x) \approx \sum_{j=1}^m c_j e^{-\alpha \|x - x_j\|^2}.$$

En Steinwart y Hush, “*An explicit description of the RKHS of Gaussian RBF Kernels*”, IEEE Trans. Information Theory **52** (2006), se demuestra que, para $X = \mathbb{C}^d$ y el kernel

$$K_\alpha(z, w) = e^{-\alpha \sum_{j=1}^d (z_j - \overline{w_j})^2},$$

el RKHS asociado es el espacio de Fock-Bargmann:

$$\mathcal{H}_{K_\alpha} = \left\{ f \in \text{Hol}(\mathbb{C}^d) : \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^d \int_{\mathbb{C}^d} |f(z)|^2 e^{-\alpha \|z\|^2} dz < \infty \right\},$$

un espacio de Hilbert de funciones holomorfas. Por restricción, $\mathcal{H}_{K_\alpha}(\mathbb{R}^d) = \{f|_{\mathbb{R}^d} : f \in \mathcal{H}_{K_\alpha}\}$ es un espacio de funciones reales analíticas.

El espacio de Fock-Bargmann aparece, pues, como el RKHS del kernel RBF complejo. Puede describirse también de forma directa como el RKHS del kernel holomorfo $K(z, w) = e^{\pi z \overline{w}}$, que no involucra decaimiento gaussiano en los argumentos sino únicamente la estructura de producto escalar en $\mathbb{C}$. Este segundo punto de vista, que desarrollamos a continuación, pone en evidencia la geometría intrínseca del espacio y su conexión con el análisis tiempo-frecuencia.

Ejemplo 2.2.2 (Espacio de Fock-Bargmann). Consideremos $X = \mathbb{C}$ y el kernel

$$K: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad K(z, w) := e^{\pi z \bar{w}}.$$

Es un núcleo de Mercer: la hermiticidad $K(z, w) = \overline{K(w, z)}$ es inmediata, y la semidefinición positiva se verifica desarrollando la exponencial en serie de potencias:

$$\sum_{i,j} v_i \bar{v}_j e^{\pi z_i \bar{z}_j} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!} \sum_{i,j} v_i \bar{v}_j z_i^n \bar{z}_j^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!} \left| \sum_i v_i z_i^n \right|^2 \geq 0.$$

Este kernel se relaciona con el kernel RBF complejo $K_\pi(z, w) = e^{-\pi(z-\bar{w})^2}$ (cf. Ejemplo 2.2.1) a través de la identidad

$$K_\pi(z, w) = e^{-\pi(z^2 + \bar{w}^2)} K(z, w).$$

Puede demostrarse (Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*, Princeton, 1989) que el RKHS asociado es el **espacio de Fock-Bargmann**:

$$\mathcal{H}_K = \left\{ F \in \text{Hol}(\mathbb{C}) : \|F\|_K^2 := \int_{\mathbb{C}} |F(z)|^2 e^{-\pi|z|^2} dz < \infty \right\}.$$

La **transformada de Bargmann** de $f \in L^2(\mathbb{R})$,

$$V_f(p, q) := e^{\frac{\pi}{2}(p^2 + q^2)} e^{-\pi i p q} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-\pi(x-p)^2} e^{2\pi i q x} dx, \quad p + iq \in \mathbb{C},$$

satisface $V_f \in \mathcal{H}_K$, y la aplicación $f \mapsto V_f$ es una isometría $L^2(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_K$.

Los dos ejemplos anteriores muestran la diversidad de espacios de hipótesis que puede generar la teoría de los RKHS. Sin embargo, la utilidad central para el aprendizaje supervisado no es solo la existencia de minimizadores, sino la posibilidad de encontrarlos eficientemente. Para ello, los RKHS poseen dos propiedades adicionales fundamentales:

1. Existen RKHS sobre espacios métricos compactos, capaces de separar todos los conjuntos compactos: si $A, B \subset X$ compactos disjuntos, $\exists f_{A,B} \in \mathcal{H}_K$ tal que

$$\forall x \in A : f_{A,B}(x) > 0 \quad \wedge \quad \forall x \in B : f_{A,B}(x) < 0.$$

Un kernel que hace esto es el RBF (*Steinwart, Christmann, §4.6*).

2. El mínimo del riesgo regularizado en un RKHS, cuando existe, vive siempre en el subespacio de dimensión finita generado por las secciones del kernel en los puntos de datos. Este resultado, llamado **teorema del representador**, es lo que hace computacionalmente tratable la minimización en un espacio funcionalmente infinito-dimensional.

La segunda propiedad es el contenido del siguiente teorema, que cierra la sección.

Teorema 2.2.3 (Teorema del representador). Sean X un espacio métrico, $K \in \mathcal{C}_b(X \times X)$

X) un núcleo de Mercer, y $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times \mathbb{R}$. Dadas una función de pérdida $E: (X \times \mathbb{R}^2)^m \rightarrow \mathbb{R}_+$ y una función $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ estrictamente creciente, define el **funcional de riesgo regularizado**

$$R_g[f] := E(\{(x_i, y_i, f(x_i))\}_{i=1}^m) + g(\|f\|_{\mathcal{H}_K}), \quad f \in \mathcal{H}_K.$$

Si $f^* \in \mathcal{H}_K$ minimiza R_g , entonces $f^* \in V_0 := \text{span}\{K_{x_i}\}_{i=1}^m$; es decir, existen $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ tales que

$$f^* = \sum_{i=1}^m \alpha_i K_{x_i}.$$

Demostración: Sea $V_0 := \text{span}\{K_{x_i}\}_{i=1}^m$, un subespacio cerrado de dimensión finita de $\mathcal{H}_K$. Por el teorema de proyección ortogonal, toda $f \in \mathcal{H}_K$ se descompone de forma única como $f = P_{V_0}f + P_{V_0^\perp}f$, con $P_{V_0}f \in V_0$ y $P_{V_0^\perp}f \perp V_0$. Veamos que proyectar sobre V_0 no aumenta el riesgo.

El término de pérdida no cambia. Para cada $j = 1, \dots, m$, como $K_{x_j} \in V_0$ y $P_{V_0^\perp}f \perp K_{x_j}$, la propiedad reproductora da:

$$f(x_j) = \langle f, K_{x_j} \rangle_{\mathcal{H}_K} = \langle P_{V_0}f + P_{V_0^\perp}f, K_{x_j} \rangle_{\mathcal{H}_K} = \langle P_{V_0}f, K_{x_j} \rangle_{\mathcal{H}_K} = (P_{V_0}f)(x_j).$$

Luego $E(\{(x_i, y_i, f(x_i))\}_{i=1}^m) = E(\{(x_i, y_i, (P_{V_0}f)(x_i))\}_{i=1}^m)$.

El término de regularización no aumenta. Por el teorema de Pitágoras,

$$\|f\|_{\mathcal{H}_K}^2 = \|P_{V_0}f\|_{\mathcal{H}_K}^2 + \|P_{V_0^\perp}f\|_{\mathcal{H}_K}^2 \geq \|P_{V_0}f\|_{\mathcal{H}_K}^2,$$

y como g es estrictamente creciente, $g(\|f\|_{\mathcal{H}_K}) \geq g(\|P_{V_0}f\|_{\mathcal{H}_K})$, con igualdad si y solo si $\|P_{V_0^\perp}f\|_{\mathcal{H}_K} = 0$.

Combinando ambas observaciones: $R_g[P_{V_0}f] \leq R_g[f]$ para todo $f \in \mathcal{H}_K$. Si f^* minimiza R_g , la desigualdad $R_g[P_{V_0}f^*] \leq R_g[f^*]$ junto con la minimalidad de f^* fuerza $R_g[P_{V_0}f^*] = R_g[f^*]$; por la estricta monotonía de g , esto implica $\|P_{V_0^\perp}f^*\|_{\mathcal{H}_K} = 0$, luego $f^* = P_{V_0}f^* \in V_0$. ■

Observación 2.2.6. El teorema reduce la optimización sobre el espacio de dimensión infinita $\mathcal{H}_K$ a un problema en $\mathbb{R}^m$. Toda $f \in V_0$ se escribe $f = \sum_{i=1}^m \alpha_i K_{x_i}$, y la propiedad reproductora da $f(x_j) = \sum_{i=1}^m \alpha_i K(x_i, x_j) = (G\alpha)_j$, donde $G_{ij} = K(x_i, x_j)$ es la **matriz de Gram**. Además, $\|f\|_{\mathcal{H}_K}^2 = \alpha^T G \alpha$ (por definición del producto interno en $\mathcal{H}$). El riesgo

regularizado queda entonces como función de $\alpha \in \mathbb{R}^m$:

$$R_g[\alpha] = E\left(\{(x_i, y_i, (G\alpha)_i)\}_{i=1}^m\right) + g(\sqrt{\alpha^T G \alpha}).$$

El teorema no garantiza que R_g tenga mínimo en $\mathcal{H}_K$ (eso requiere las hipótesis del Teorema 2.1.2), solo dice que, si el mínimo existe, está en V_0 .

En resumen, los RKHS combinan estructura funcional (la evaluación puntual es continua, lo que permite definir el error puntual coherentemente) con estructura de espacio de Hilbert (existencia de proyecciones, propiedad reproductora). El Teorema 2.2.2 garantiza que las bolas cerradas son compactas, asegurando la existencia de minimizadores vía el Teorema 2.1.2. El Teorema 2.2.3 garantiza que cualquier minimizador tiene una representación finita, lo que reduce el problema de optimización de dimensión infinita a uno de dimensión m (el número de puntos de datos). Juntos, estos dos resultados son la base matemática de los métodos de aprendizaje por kernel (*kernel methods*) como las máquinas de vectores de soporte (SVM) o la regresión de kernel.

3. Clasificación y optimización convexa

3.1 Clasificadores Lineales Binarios

3.1.1 Planteamiento del problema

El problema de *clasificación binaria* consiste en lo siguiente. Disponemos de un *espacio de observaciones* $X \subset \mathbb{R}^d$ y queremos asignar a cada punto $x \in X$ una de dos posibles *etiquetas*, que codificamos como $Y = \{-1, 1\}$. Suponemos que los datos se generan a partir de una distribución de probabilidad desconocida ρ sobre $X \times Y$: la marginal ρ_X describe cómo se distribuyen las observaciones, y las probabilidades condicionales $\rho(y \mid x)$ describen la incertidumbre intrínseca de la etiqueta dado un punto.

Una *clasificación* es una función $f: X \rightarrow Y$ que, a cada observación, le asigna una predicción de su etiqueta. La bondad de una clasificación se mide por su *error de clasificación* (o error de generalización), que cuantifica la probabilidad de que f se equivoque en un punto tomado al azar de ρ .

Definición 3.1.1 (Error de clasificación). Sea $f: X \rightarrow Y$ una clasificación de X . El **error de clasificación** de f (caso especial del Definición 2.1.1 para $Y = \{-1, 1\}$) es

$$\mathcal{E}[f] = \int_Z |f(x) - y|^2 d\rho(x, y) = 4 \int_X \mathbb{P}(Y \neq f(x) \mid x) d\rho_X(x),$$

donde la segunda igualdad usa que $|f(x) - y|^2 = 4\mathbb{1}_{\{y \neq f(x)\}}$ para $f(x), y \in \{-1, 1\}$.

En la práctica, la distribución ρ es desconocida y solo disponemos de un *conjunto de datos* o *muestra de entrenamiento* $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times Y$, formado por m observaciones etiquetadas que suponemos extraídas de forma independiente según ρ . El error empírico $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f]$ sirve como estimación del error verdadero $\mathcal{E}[f]$, y el objetivo es encontrar f que lo minimice.

La familia más sencilla de clasificadores es la de los *clasificadores lineales*: aquellos que deciden la etiqueta según en qué semiplano del espacio $\mathbb{R}^d$ cae la observación. Geométricamente, la frontera de decisión es un *hiperplano* $H = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b = 0\}$ determinado por un vector normal $w \in \mathbb{R}^d$ y un umbral $b \in \mathbb{R}$. Para que tal hiperplano clasifique correctamente todos los puntos de $\mathcal{D}$, se necesita que los datos de cada clase estén estrictamente en lados opuestos de H .

Definición 3.1.2 (Error empírico). Sea $f: X \rightarrow Y$ una clasificación de X y $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m$

un conjunto de datos. El **error empírico** de f para $\mathcal{D}$ (caso especial de $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}$ de la Definición 2.1.2 para $Y = \{-1, 1\}$) es

$$\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |f(x_i) - y_i|^2 = \frac{4}{m} |\{i \in \{1, \dots, m\} : f(x_i) \neq y_i\}|.$$

3.1.2 Separabilidad por un hiperplano

Un ejemplo sencillo de clasificación es la clasificación lineal: dado un hiperplano

$$H = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b = 0\},$$

se asigna a cada punto la etiqueta del semiplano en que cae. Para que este clasificador tenga error empírico nulo, es necesario y suficiente que los datos de cada clase queden estrictamente en lados opuestos de H . Esta condición sobre el conjunto de datos recibe un nombre propio.

Definición 3.1.3 (Separabilidad). Un conjunto de datos $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^d \times \{-1, 1\}$ es separable por un hiperplano (SPH)

$$\iff \exists w \in \mathbb{R}^d, b \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \cdot (\langle w, x_i \rangle + b) > 0.$$

Geométricamente, el hiperplano $H = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b = 0\}$ divide $\mathbb{R}^d$ en dos:

$$H^+ = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b > 0\}, \quad H^- = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b < 0\}.$$

La condición $y_i (\langle w, x_i \rangle + b) > 0$ expresa precisamente que cada observación x_i cae en el semiplano correspondiente a su etiqueta: $x_i \in H^+$ cuando $y_i = 1$, y $x_i \in H^-$ cuando $y_i = -1$. En particular, ningún punto de $\mathcal{D}$ yace sobre el propio hiperplano H .

Definición 3.1.4 (Clasificadores lineales binarios). El espacio de clasificadores lineales binarios es $\mathcal{H}_2 = \{f : \mathbb{R}^d \rightarrow \{-1, 1\} : f(x) = \text{sgn}(\langle w, x \rangle + b) \wedge w \in \mathbb{R}^d \wedge b \in \mathbb{R}\}$.

Observación 3.1.5. Cada clasificador de $\mathcal{H}_2$ queda determinado por $(w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^{d+1}$.

Si $\mathcal{D}$ es (SPH), entonces $\exists f_0 \in \mathcal{H}_2$ tal que $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f_0] = 0$.

Observación 3.1.6. La condición (SPH) es afín: el hiperplano separador $H = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b = 0\}$ no pasa por el origen en general. Sin embargo, puede reescribirse como una condición lineal elevando la dimensión en uno.

Dados $x_i \in \mathbb{R}^d$ y $(w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, definamos los *vectores aumentados*

$$\tilde{x}_i := \begin{pmatrix} x_i \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{d+1} \quad \wedge \quad \tilde{w} := \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{d+1}.$$

Como $\langle w, x_i \rangle + b = \langle \tilde{w}, \tilde{x}_i \rangle$, la condición (SPH) $\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i (\langle w, x_i \rangle + b) > 0$ es equivalente a $\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \langle \tilde{w}, \tilde{x}_i \rangle > 0$. Esta es la condición de separabilidad por el subespacio lineal $\tilde{H} = \{\tilde{x} \in \mathbb{R}^{d+1} : \langle \tilde{w}, \tilde{x} \rangle = 0\}$, que sí pasa por el origen. Nótese que los puntos aumentados $\tilde{x}_i$ yacen todos en el hiperplano afín $\{x_{d+1} = 1\} \subset \mathbb{R}^{d+1}$, una copia isométrica de $\mathbb{R}^d$.

3.1.2.1 Separabilidad y envolvente convexa

Recordamos que, dados $\{x_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{R}^d$, la envolvente convexa de $\{x_i\}_{i=1}^k$ es

$$\text{conv}(\{x_i\}_{i=1}^k) = \left\{ \sum_{i=1}^k p_i x_i : p_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^k p_i = 1 \right\}.$$

Teorema 3.1.1. *Sea $(w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ y sea $h(x) = \langle w, x \rangle + b$. Entonces, $f(x) = \text{sgn}(h(x))$ clasifica (con error empírico nulo) $\mathcal{D}$ en $X_1 \times \{1\}$ y $X_{-1} \times \{-1\}$ si y sólo si*

$$\forall v \in \text{conv}(X_1) : f(v) = 1 \quad \wedge \quad \forall v \in \text{conv}(X_{-1}) : f(v) = -1.$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Leftarrow$ Si f clasifica correctamente $\text{conv}(X_1)$ y $\text{conv}(X_{-1})$, entonces en particular clasifica correctamente $X_1 \subset \text{conv}(X_1)$ y $X_{-1} \subset \text{conv}(X_{-1})$, luego clasifica $\mathcal{D}$ con error nulo.

$\Rightarrow$ Sea $v \in \text{conv}(X_\ell)$, esto es, $v = \sum_{i=1}^k p_i x_i$ con $x_i \in X_\ell$, $p_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^k p_i = 1$. Por linealidad de $\langle w, \cdot \rangle$ y dado que $\sum p_i = 1$,

$$h(v) = \left\langle w, \sum_{i=1}^k p_i x_i \right\rangle + b = \sum_{i=1}^k p_i \langle w, x_i \rangle + \sum_{i=1}^k p_i b = \sum_{i=1}^k p_i h(x_i).$$

Como f clasifica $\mathcal{D}$ con error nulo, $h(x_i)$ tiene signo ℓ para todo $x_i \in X_\ell$. Siendo $p_i \geq 0$ y $\sum p_i = 1 > 0$, la combinación convexa $\sum p_i h(x_i)$ tiene también signo ℓ . Por tanto, $f(v) = \text{sgn}(h(v)) = \ell$. ■

3.1.3 Hard Margin SVM

3.1.3.1 Algoritmo del Perceptrón

Hasta ahora hemos establecido las condiciones teóricas bajo las que un conjunto de datos puede ser separado perfectamente mediante una frontera lineal. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, necesitamos un método constructivo que nos permita encontrar empíricamente dicho hiperplano a partir de los datos.

El *algoritmo del Perceptrón*, propuesto por Frank Rosenblatt en 1958, se encarga precisamente de esto. Se trata de un método iterativo impulsado puramente por el error y, a pesar de ser un procedimiento en apariencia tan rudimentario, cuenta con garantía matemática de convergencia estricta en un número finito de pasos.

Para formular este teorema, analizaremos el conjunto de clasificadores lineales que, no solo separan los datos, sino que lo hacen con un margen constante de al menos 1:

$$\mathcal{W}_1 := \{w \in \mathbb{R}^d : \forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \langle w, x_i \rangle \geq 1\}.$$

Observación 3.1.7 (Existencia de B). Definimos $B = \min_{w \in \mathcal{W}_1} \|w\|$. Entonces, B está bien definido y siempre existe si el problema es linealmente separable porque:

1. $\mathcal{W}_1$ es no vacío: Al ser $\mathcal{D}$ separable (SPS), $\exists w_0 \in \mathbb{R}^d$ tal que $\gamma = \min_i y_i \langle w_0, x_i \rangle > 0$. Entonces, tomando $\tilde{w} = \frac{w_0}{\gamma}$, $\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \langle \tilde{w}, x_i \rangle = \frac{1}{\gamma} y_i \langle w_0, x_i \rangle \geq 1$, es decir, $\tilde{w} \in \mathcal{W}_1$.
2. El mínimo siempre se alcanza: El conjunto $\mathcal{W}_1$ está definido por la intersección de m espacios cerrados $y_i \langle w, x_i \rangle \geq 1$, por lo que $\mathcal{W}_1 \subset \mathbb{R}^d$ es cerrado. Como la norma $f(w) = \|w\|$ es continua y coercitiva ($\lim_{\|w\| \rightarrow \infty} f(w) = \infty$), por el Teorema de Weierstrass, f alcanza su mínimo global sobre cualquier subconjunto cerrado y no vacío.

Teorema 3.1.2 (Algoritmo del Perceptrón, Rosenblatt 1958). *Supongamos que el conjunto de datos $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^d \times \{-1, 1\}$ es separable por un subespacio lineal (SPS). Tomamos $\mathcal{W}_1$ y B como en la observación anterior, y definimos $R := \max_{i \in \mathbb{N}_m} \|x_i\|$. Consideremos la siguiente sucesión definida iterativamente comenzando con $w^{(0)} = 0 \in \mathbb{R}^d$:*

En cada paso $k \geq 0$, si existe algún índice $i \in \mathbb{N}_m$ tal que $y_i \langle w^{(k)}, x_i \rangle \leq 0$ (es decir, el dato x_i está mal clasificado por el hiperplano $w^{(k)}$), actualizamos el vector usando ese punto:

$$w^{(k+1)} = w^{(k)} + y_i x_i.$$

Este proceso se detiene en, a lo sumo, $(BR)^2$ pasos y produce un vector $w \in \mathbb{R}^d$ tal que $\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \langle w, x_i \rangle > 0$, es decir, w define un hiperplano que separa $\mathcal{D}$.

Demostración: Tomemos $w^* \in \mathcal{W}_1$ con $\|w^*\| = B$. Analizaremos la evolución de $\langle w^*, w^{(k)} \rangle$ y $\|w^{(k)}\|^2$ tras k pasos del algoritmo.

Denotaremos por (x_{i_j}, y_{i_j}) al dato empleado en la corrección durante el paso j -ésimo. Se tiene por tanto que $w^{(j)} = w^{(j-1)} + y_{i_j} x_{i_j}$ y que $y_{i_j} \langle w^{(j-1)}, x_{i_j} \rangle \leq 0$.

Por un lado, acotamos inferiormente el producto escalar con la solución óptima w^* :

$$\langle w^*, w^{(k)} \rangle = \left\langle w^*, \sum_{j=1}^k y_{i_j} x_{i_j} \right\rangle = \sum_{j=1}^k y_{i_j} \langle w^*, x_{i_j} \rangle.$$

Como $w^* \in \mathcal{W}_1$, por definición separa todos los ejemplos conservando al menos un margen de 1, es decir, $y_{i_j} \langle w^*, x_{i_j} \rangle \geq 1$. En consecuencia:

$$\langle w^*, w^{(k)} \rangle \geq \sum_{j=1}^k 1 = k. \quad (3.1)$$

Por otro lado, acotamos superiormente la norma euclídea del vector iterado. Tenemos que

$$\|w^{(k)}\|^2 = \|w^{(k-1)} + y_{i_k} x_{i_k}\|^2 = \|w^{(k-1)}\|^2 + 2y_{i_k} \langle w^{(k-1)}, x_{i_k} \rangle + \|x_{i_k}\|^2.$$

Sabemos que todos los puntos verifican $\|x\| \leq R$, por lo que $\|x_{i_k}\|^2 \leq R^2$. A su vez, por la condición de selección del punto, $2y_{i_k} \langle w^{(k-1)}, x_{i_k} \rangle \leq 0$. Concluimos entonces que:

$$\|w^{(k)}\|^2 \leq \|w^{(k-1)}\|^2 + R^2.$$

Aplicando esta desigualdad recursivamente desde la condición inicial $w^{(0)} = 0$, obtenemos por inducción trivial que $\|w^{(k)}\|^2 \leq kR^2$.

Finalmente, relacionamos ambos resultados mediante la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\stackrel{(3.1)}{\downarrow} k \leq \langle w^*, w^{(k)} \rangle \stackrel{\text{C-S}}{\downarrow} \|w^*\| \|w^{(k)}\| \leq B\sqrt{kR^2} = BR\sqrt{k}.$$

Partiendo de $k \leq BR\sqrt{k}$ y asumiendo $k > 0$, podemos dividir ambos miembros entre $\sqrt{k}$ para obtener $\sqrt{k} \leq BR$. Elevando la inecuación al cuadrado, el número de iteraciones queda acotado por: $k \leq (BR)^2$.

Puesto que la cantidad de actualizaciones que puede realizar el algoritmo está acotada por $(BR)^2$, el proceso debe detenerse en un número finito de pasos. En ese momento, no existirá i tal que $y_i \langle w^{(k)}, x_i \rangle \leq 0$, luego $w^{(k)}$ define un hiperplano que separa $\mathcal{D}$. ■

Observación 3.1.8 (Interpretación geométrica de la convergencia). La cota máxima de iteraciones del algoritmo, $(BR)^2$, proporciona una intuición clave sobre la dificultad intrínseca del problema de clasificación:

- R representa la dispersión máxima de los datos (el radio de la menor bola centrada en el origen que los contiene).
- Para un clasificador $w \in \mathcal{W}_1$, la distancia euclídea (margen) entre el hiperplano y

los datos es al menos $1/\|w\|$. En consecuencia, el valor mínimo $B = \min \|w\|$ es exactamente el *inverso del margen máximo posible*, es decir, $B = 1/\gamma_{\max}$.

Entonces, el producto $BR = R/\gamma_{\max}$ es un factor de escala invariable que mide la dificultad geométrica de la separación. Notablemente, este resultado establece que la velocidad de convergencia es *completamente independiente* de la dimensión d del espacio.

Observación 3.1.9. Si $\mathcal{D}$ es (SPH) o (SPS), puede existir una familia infinita de clasificadores en $\mathcal{H}_2$ con error empírico nulo. Dado que el objetivo último es minimizar el error de generalización $\mathcal{E}[f]$, es razonable preguntarse cuál de los $f \in \mathcal{H}_2$ generaliza mejor.

En la práctica, como la distribución ρ es desconocida, se estima el error de generalización dividiendo el conjunto de datos en dos subconjuntos disjuntos: $\mathcal{D}_{\text{train}}$ y $\mathcal{D}_{\text{test}}$. El clasificador se entrena minimizando $\mathcal{E}_{\mathcal{D}_{\text{train}}}[f]$, y su calidad se evalúa mediante $\mathcal{E}_{\mathcal{D}_{\text{test}}}[f]$.

Muchos algoritmos de aprendizaje dependen de parámetros externos que no se determinan durante el entrenamiento denominados *hiperparámetros*. Para seleccionarlos sin sesgar la evaluación final, es común subdividir a su vez $\mathcal{D}_{\text{train}}$ en dos: un conjunto de entrenamiento y un conjunto de *validación* sobre el que comparar distintas configuraciones.

3.1.3.2 Maximización del Margen

El Perceptrón garantiza encontrar *algún* hiperplano separador, pero, cuando $\mathcal{D}$ es (SPH), existe en general una familia infinita de ellos. La intuición geométrica sugiere preferir el que quede lo más alejado posible de todos los puntos de entrenamiento: un clasificador con mayor margen es menos sensible a perturbaciones en los datos y, en consecuencia, tiende a generalizar mejor. Esta idea da lugar a las *Support Vector Machines* (SVM).

Fijamos $(w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ con $\|w\| = 1$ y consideramos el hiperplano

$$H_{(w,b)} := \{v \in \mathbb{R}^d : \langle v, w \rangle + b = 0\}.$$

La distancia de un punto $x \in \mathbb{R}^d$ a $H_{(w,b)}$ es

$$\text{dist}(x, H_{(w,b)}) = \min_{v \in H_{(w,b)}} \|x - v\| = |\langle x, w \rangle + b|,$$

donde la última igualdad se deduce de que w es el vector normal unitario a $H_{(w,b)}$.

Definimos los conjuntos de índices $I_1, I_{-1} \subset \{1, \dots, m\}$ como


$$I_1 = \{i \in \mathbb{N}_m : y_i = 1\} \quad \wedge \quad I_{-1} = \{i \in \mathbb{N}_m : y_i = -1\}.$$

Fijada una dirección unitaria w , el **umbral** b que centra el hiperplano $H_{(w,b)}$ correspondiente de manera equidistante a ambas clases viene dado por

$$\beta_{\mathcal{D}}(w) := \frac{1}{2} \left| \text{dist}(\{x_i : i \in I_{-1}\}, H_{(w,0)}) - \text{dist}(\{x_i : i \in I_1\}, H_{(w,0)}) \right|$$

y el **margen** del hiperplano $H_{(w,\beta_{\mathcal{D}}(w))}$, es decir, la distancia común a ambas clases, es

$$\Delta_{\mathcal{D}}(w) := \text{dist}(\{x_i : i \in I_1\}, H_{(w,\beta_{\mathcal{D}}(w))}) = \text{dist}(\{x_i : i \in I_{-1}\}, H_{(w,\beta_{\mathcal{D}}(w))})$$



Ejercicio 3.1.1. Demuestra que, para cada $w \in \mathbb{R}^d$ con $\|w\| = 1$,

$$\beta_{\mathcal{D}}(w) = -\frac{1}{2} \left(\min_{i \in I_1} \langle w, x_i \rangle + \max_{i \in I_{-1}} \langle w, x_i \rangle \right) \quad \wedge \quad \Delta_{\mathcal{D}}(w) = \frac{1}{2} \left(\min_{i \in I_1} \langle w, x_i \rangle - \max_{i \in I_{-1}} \langle w, x_i \rangle \right).$$

Solución: Como $\|w\| = 1$, la distancia de un punto x al hiperplano $H_{(w,b)}$ es $|\langle w, x \rangle + b|$. Denotamos $A := \min_{i \in I_1} \langle w, x_i \rangle$ y $B := \max_{i \in I_{-1}} \langle w, x_i \rangle$.

- (1) Por definición, $\beta_{\mathcal{D}}(w)$ es el único $b \in \mathbb{R}$ que coloca el hiperplano $H_{(w,b)}$ equidistante a ambas clases. Con dicho b , los puntos de I_1 caen en el semiplano positivo y los de I_{-1} en el negativo, de modo que las distancias a ambas clases son

$$\text{dist}(\{x_i : i \in I_1\}, H_{(w,b)}) = \min_{i \in I_1} (\langle w, x_i \rangle + b) = A + b,$$

$$\text{dist}(\{x_i : i \in I_{-1}\}, H_{(w,b)}) = -\max_{i \in I_{-1}} (\langle w, x_i \rangle + b) = -(B + b).$$

Igualándolas: $A + b = -(B + b) \implies 2b = -A - B \implies b = -\frac{A+B}{2}$. Por tanto,

$$\beta_{\mathcal{D}}(w) = -\frac{1}{2} \left(\min_{i \in I_1} \langle w, x_i \rangle + \max_{i \in I_{-1}} \langle w, x_i \rangle \right).$$

- (2) El margen es la distancia común de ambas clases al hiperplano $H_{(w,\beta_{\mathcal{D}}(w))}$:

$$\Delta_{\mathcal{D}}(w) = A + \beta_{\mathcal{D}}(w) = A - \frac{A+B}{2} = \frac{A-B}{2} = \frac{1}{2} \left(\min_{i \in I_1} \langle w, x_i \rangle - \max_{i \in I_{-1}} \langle w, x_i \rangle \right). \quad \blacksquare$$

El objetivo es encontrar la dirección unitaria w que maximice este margen.

Teorema 3.1.3 (Hard-Margin SVM). Sea $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^d \times \{-1, 1\}$ un conjunto de datos (SPH). Entonces:

- (1) Existe un único $w_{\mathcal{D}} \in \mathbb{R}^d$ con $\|w_{\mathcal{D}}\| = 1$ tal que $w_{\mathcal{D}} = \arg \max_{\|w\|=1} \Delta_{\mathcal{D}}(w)$, y el hiperplano $H_{(w_{\mathcal{D}}, \beta_{\mathcal{D}}(w_{\mathcal{D}}))}$ separa $\mathcal{D}$ con margen máximo.
- (2) La única solución $(w^*, \beta_{\mathcal{D}}(w^*))$ del problema de optimización

$$\min_{w \in \mathbb{R}^d} \|w\| \quad \text{sujeto a} \quad \forall i \in \mathbb{N}_m : y_i (\langle w, x_i \rangle + \beta_{\mathcal{D}}(w)) \geq 1 \quad (3.2)$$

$$\text{satisface } w_{\mathcal{D}} = \frac{w^*}{\|w^*\|} \wedge \Delta_{\mathcal{D}}(w_{\mathcal{D}}) = \frac{1}{\|w^*\|}.$$

Demostración:

- (1) Como $\Delta_{\mathcal{D}}$ es continua, por el teorema de Weierstrass alcanza su máximo en la bola cerrada $\overline{B}_1 = \{w \in \mathbb{R}^d : \|w\| \leq 1\}$, que es compacta. Sea $\overline{w} \in \overline{B}_1$ dicho maximizador.

Dado que $\Delta_{\mathcal{D}}(\lambda w) = \lambda \Delta_{\mathcal{D}}(w)$ para todo $\lambda > 0$ (homogeneidad de grado 1), si $\|\overline{w}\| < 1$ y $\Delta_{\mathcal{D}}(\overline{w}) > 0$, entonces

$$\Delta_{\mathcal{D}}\left(\frac{\overline{w}}{\|\overline{w}\|}\right) = \frac{1}{\|\overline{w}\|} \Delta_{\mathcal{D}}(\overline{w}) > \Delta_{\mathcal{D}}(\overline{w}),$$

lo que contradice la maximalidad de $\overline{w}$. Luego $\|\overline{w}\| = 1$.

Para la unicidad, supongamos que existe $w' \in \partial \overline{B}_1$, $w' \neq \overline{w}$, con $\Delta_{\mathcal{D}}(w') = \Delta_{\mathcal{D}}(\overline{w})$. Entonces, para $t \in (0, 1)$, $v_t := tw' + (1-t)\overline{w}$ satisface $\|v_t\| < 1$, y por linealidad:

$$\Delta_{\mathcal{D}}\left(\frac{v_t}{\|v_t\|}\right) = \frac{\Delta_{\mathcal{D}}(v_t)}{\|v_t\|} = \frac{\Delta_{\mathcal{D}}(\overline{w})}{\|v_t\|} > \Delta_{\mathcal{D}}(\overline{w}),$$

lo que de nuevo contradice la maximalidad. Luego el maximizador $\overline{w}$ es único.

- (2) El conjunto factible $\mathcal{F} := \{w \in \mathbb{R}^d : \forall i \in \mathbb{N}_m : y_i (\langle w, x_i \rangle + \beta_{\mathcal{D}}(w)) \geq 1\}$ es no vacío, cerrado y convexo. El argumento es análogo al de la Observación 3.1.7. Como la norma es continua y coercitiva, el mínimo se alcanza en algún punto $w^* \in \mathcal{F}$.

Unicidad de w^* : Supongamos que w_1 y w_2 son dos minimizadores, esto es, $\|w_1\| = \|w_2\| = \min_{w \in \mathcal{F}} \|w\| =: c^*$. Aplicando la identidad del paralelogramo:

$$\left\| \frac{w_1 + w_2}{2} \right\|^2 = \frac{\|w_1\|^2 + \|w_2\|^2}{2} - \left\| \frac{w_1 - w_2}{2} \right\|^2 = (c^*)^2 - \left\| \frac{w_1 - w_2}{2} \right\|^2.$$

Por convexidad de $\mathcal{F}$, el punto $\frac{w_1+w_2}{2}$ es factible, luego $\left\| \frac{w_1+w_2}{2} \right\| \geq c^*$, es decir, $\left\| \frac{w_1+w_2}{2} \right\|^2 \geq (c^*)^2$. Por lo tanto, llegamos a que

$$(c^*)^2 \leq \left\| \frac{w_1+w_2}{2} \right\|^2 = (c^*)^2 - \left\| \frac{w_1-w_2}{2} \right\|^2 \implies \left\| \frac{w_1-w_2}{2} \right\|^2 \leq 0 \implies w_1 = w_2.$$

Sea $\hat{w} := w^*/\|w^*\|$. Dividiendo en $y_i(\langle w^*, x_i \rangle + \beta_{\mathcal{D}}(w^*)) \geq 1$ entre $\|w^*\|$, se obtiene

$$\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \left(\langle \hat{w}, x_i \rangle + \frac{\beta_{\mathcal{D}}(w^*)}{\|w^*\|} \right) \geq \frac{1}{\|w^*\|},$$

lo que implica que $\Delta_{\mathcal{D}}(\hat{w}) \geq 1/\|w^*\|$.

Si $\forall w \in \mathbb{R}^d : \|w\| = 1 : \Delta_{\mathcal{D}}(w) \leq 1/\|w^*\|$, entonces $w_{\mathcal{D}} = \hat{w}$ maximiza $\Delta_{\mathcal{D}}$ y es único por el punto (1). Supongamos por contradicción que existe $w_0 \in \mathbb{R}^d$ tal que $\|w_0\| = 1$ y $\Delta_{\mathcal{D}}(w_0) > 1/\|w^*\|$. Entonces el par $(w_0/\Delta_{\mathcal{D}}(w_0), \beta_{\mathcal{D}}(w_0)/\Delta_{\mathcal{D}}(w_0))$ es factible para (3.2) puesto que $\forall i \in \mathbb{N}_m :$

$$y_i \left(\left\langle \frac{w_0}{\Delta_{\mathcal{D}}(w_0)}, x_i \right\rangle + \frac{\beta_{\mathcal{D}}(w_0)}{\Delta_{\mathcal{D}}(w_0)} \right) = \frac{1}{\Delta_{\mathcal{D}}(w_0)} y_i (\langle w_0, x_i \rangle + \beta_{\mathcal{D}}(w_0)) \geq \frac{\Delta_{\mathcal{D}}(w_0)}{\Delta_{\mathcal{D}}(w_0)} = 1,$$

y tiene norma $1/\Delta_{\mathcal{D}}(w_0) < \|w^*\|$, contradiciendo la optimalidad de w^* . ■

El Teorema 3.1.3 muestra que el problema (3.2) admite una formulación eficiente y es computacionalmente muy tratable. Sin embargo, tiene una limitación fundamental: si $\mathcal{D}$ no es (SPH), el conjunto factible es vacío y el problema carece de solución.

3.1.4 Soft Margin SVM

Para tratar el caso no separable, se introducen *variables de holgura* $\xi_i \geq 0$ que permiten a cada punto violar la restricción de margen en una cantidad ξ_i :

$$y_i (\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1 - \xi_i.$$

La idea es penalizar estas violaciones en el objetivo, dando lugar al problema

$$\min_{\substack{(w,b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \\ \xi \in \mathbb{R}_+^m}} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \xi_i + \lambda \|w\|^2 \right) \quad \text{sujeto a} \quad \forall i \in \mathbb{N}_m : y_i (\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1 - \xi_i, \quad (3.3)$$

donde $\lambda > 0$ es un hiperparámetro que pondera el balance entre el margen y las violaciones.

Dado (w, b) fijo, cada ξ_i aparece en (3.3) con coeficiente positivo $\frac{1}{m}$ en el objetivo y sujeto únicamente a $\xi_i \geq \max\{0, 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + b)\}$ (la restricción $\xi_i \geq 0$ junto con $y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq$


$1 - \xi_i$). Minimizar el objetivo requiere tomar ξ_i lo más pequeño posible, es decir, igual a su cota inferior $\max\{0, 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + b)\}$. Así:

- si el punto x_i está correctamente clasificado *con margen suficiente* ($y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1$), entonces $\xi_i^* = 0$ (no hay penalización);
- si el punto viola el margen o está mal clasificado (es decir, $y_i(\langle w, x_i \rangle + b) < 1$), entonces $\xi_i^* = 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + b) > 0$ mide cuánto falta para satisfacer la restricción.

Sustituyendo, el problema (3.3) es equivalente a minimizar la *pérdida hinge regularizada*:

$$\arg \min_{(w,b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} \mathcal{E}_{\mathcal{D}}^{\text{hinge}}(w, b) + \lambda \|w\|^2, \quad \text{donde } \mathcal{E}_{\mathcal{D}}^{\text{hinge}}(w, b) := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + b)\}.$$

El término *hinge* (“bisagra” en inglés) alude a la forma de la función $t \mapsto \max\{0, 1 - t\}$:



Observación 3.1.10 (La pérdida hinge como sustituto convexo del error 0-1). El objetivo natural del problema de clasificación sería minimizar directamente el error empírico 0-1, es decir, el funcional

$$\mathcal{E}_0(w, b) = \frac{1}{m} |\{i : y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \leq 0\}|,$$

que cuenta la fracción de puntos mal clasificados. Sin embargo, $\mathcal{E}_0$ es discontinua y no convexa: su paisaje de optimización está plagado de mínimos locales, lo que hace que minimizarla sea computacionalmente intratable en general.

La pérdida *hinge* resuelve este problema: la función $t \mapsto \max\{0, 1 - t\}$ es convexa y acota superiormente al indicador de error, pues $\max\{0, 1 - t\} \geq \mathbb{1}_{[t \leq 0]}$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Como el término $\lambda \|w\|^2$ también es convexo, el funcional completo

$$\mathcal{E}_{\mathcal{D}}^{\text{hinge}}(w, b) + \lambda \|w\|^2$$

es *estrictamente convexo* para todo $\lambda > 0$, luego tiene un único mínimo global y puede minimizarse eficientemente mediante el descenso de gradiente.


3.1.5 Support Vector Machines con Núcleo Reprodutor

Las versiones Hard y Soft de SVM construyen su frontera de decisión como un hiperplano en el espacio original $\mathbb{R}^d$: la Hard-SVM requiere que $\mathcal{D}$ sea (SPH), mientras que la Soft-

SVM tolera ciertas violaciones del margen. Sin embargo, existen conjuntos de datos con una estructura no lineal tan pronunciada que ningún hiperplano, con independencia del margen admisible, puede capturarla adecuadamente.

La solución consiste en *mapear* implícitamente los datos a un espacio de mayor dimensión en el que sí sean linealmente separables y aplicar allí las SVM.

Ejemplo 3.1.2. Consideremos $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \times \{-1, 1\}$ donde la clase $+1$ agrupa los puntos próximos al origen y la clase -1 forma una corona circular alrededor de ellos:



Ninguna recta en $\mathbb{R}^2$ puede separar ambas clases: la clase $+1$ queda rodeada por la clase -1 en todas las direcciones. Consideremos la aplicación

$$\phi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \phi(x) = \left(x, \frac{1}{1 + \|x\|^2} \right).$$

La tercera coordenada, $\frac{1}{1 + \|x\|^2}$, es próxima a 1 en un entorno del origen (clase $+1$) y se acerca a 0 a medida que $\|x\|$ crece (clase -1). Por tanto, el conjunto $\phi(\mathcal{D})$ es linealmente separable en $\mathbb{R}^3$: existe un plano que lo separa.

Esta idea motiva las SVM con núcleo: en lugar de construir ϕ explícitamente, se trabaja con un Espacio de Hilbert con Núcleo Reprodutor (RKHS) cuyo núcleo $K: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ codifica implícitamente el producto escalar en el espacio imagen.

Proposición 3.1.4. Sean $X \subset \mathbb{R}^d$ y $f: X \rightarrow \mathbb{R}^N$ continua. Consideramos la aplicación $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}^{d+N}$ dada por $\phi(x) = (x, f(x))$ cuya imagen es el gráfico de f .

Sea $V := \text{span}\{\phi(x) : x \in X\} \subset \mathbb{R}^{d+N}$. Definimos $K^f: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$K^f(x, y) := \langle x, y \rangle_{\mathbb{R}^d} + \langle f(x), f(y) \rangle_{\mathbb{R}^N} = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}},$$

y el espacio de funciones

$$\mathcal{H}_\phi := \{\xi: X \rightarrow \mathbb{R} : \exists w \in V : \forall x \in X : \xi(x) = \xi_w(x) = \langle w, \phi(x) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}}\}.$$

dotado del producto escalar dado por $\langle \xi_{w_1}, \xi_{w_2} \rangle_{\mathcal{H}_\phi} := \langle w_1, w_2 \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}}$.

Entonces K^f es un núcleo de Mercer y $\mathcal{H}_{K^f} = \mathcal{H}_\phi$ es su RKHS.

Demostración:

- (1) K^f es de Mercer. La simetría es inmediata y la continuidad se hereda de la de f .

Para la semidefinición positiva, dados $x_1, \dots, x_n \in X$ y $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{i,j=1}^n c_i c_j K^f(x_i, x_j) = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j \langle \phi(x_i), \phi(x_j) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}} = \left\| \sum_{i=1}^n c_i \phi(x_i) \right\|_{\mathbb{R}^{d+N}}^2 \geq 0.$$

- (2) $\mathcal{H}_\phi$ es un espacio de Hilbert. Ver que $\mathcal{H}_\phi$ es un espacio vectorial se deja como ejercicio.

El producto escalar está bien definido: si $\xi_{w_1} = \xi_{w_2}$, entonces $\langle w_1 - w_2, \phi(x) \rangle = 0$ para todo $x \in X$, de modo que $w_1 - w_2 \perp V$; pero $w_1 - w_2 \in V$, luego $w_1 = w_2$.

Sea $L: V \rightarrow \mathcal{H}_\phi$ la aplicación $Lw := \xi_w$. Por definición, L es sobreyectiva, y la inyectividad acaba de verificarse. Además, L es una isometría:

$$\|Lw\|_{\mathcal{H}_\phi}^2 = \langle \xi_w, \xi_w \rangle_{\mathcal{H}_\phi} = \langle w, w \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}} = \|w\|_{\mathbb{R}^{d+N}}^2.$$

Por tanto, $\mathcal{H}_\phi$ es isométrico al espacio euclídeo V : en particular, es de Hilbert.

- (3) *Propiedad reproductora.* Para cada $x \in X$, la función $K_x^f := K^f(x, \cdot) = L\phi(x) = \xi_{\phi(x)}$ pertenece a $\mathcal{H}_\phi$, pues $\phi(x) \in V$. Para todo $\xi = \xi_w \in \mathcal{H}_\phi$:

$$\langle \xi, K_x^f \rangle_{\mathcal{H}_\phi} = \langle \xi_w, \xi_{\phi(x)} \rangle_{\mathcal{H}_\phi} = \langle w, \phi(x) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}} = \xi_w(x) = \xi(x).$$

Esto es la propiedad reproductora, lo que establece que $\mathcal{H}_\phi = \mathcal{H}_{K^f}$. ■

La Proposición 3.1.4 justifica el siguiente enfoque. Dado un mapa de características $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}^{d+N}$, levantamos el dataset a $\bar{\mathcal{D}} = \{(\phi(x_i), y_i)\}_{i=1}^m$ y aplicamos Soft-SVM en el espacio imagen. Incorporando el bias en w mediante la extensión afín (extendiendo ϕ con una coordenada constante), el problema de Soft-SVM en el espacio levantado consiste en minimizar sobre $w \in \mathbb{R}^{d+N}$:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{D}}^\phi(w) := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i \langle w, \phi(x_i) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}}\} + \lambda \|w\|_{\mathbb{R}^{d+N}}^2.$$

Por la Proposición 3.1.4, la correspondencia $w \mapsto \xi_w$ dada por $\xi_w(x) := \langle w, \phi(x) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}}$ es una isometría entre $V := \text{span}\{\phi(x_i)\}_{i=1}^m$ y $\mathcal{H}_{K^f}$. Bajo esta identificación, $\langle w, \phi(x_i) \rangle = \xi_w(x_i)$ y

$\|w\|^2 = \|\xi_w\|_{\mathcal{H}_{K^f}}^2$, de modo que minimizar $\mathcal{L}_{\mathcal{D}}^\phi(w)$ sobre V es equivalente a minimizar

$$\mathcal{L}_{\mathcal{D}}^K(\xi) := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i \xi(x_i)\} + \lambda \|\xi\|_{\mathcal{H}_{K^f}}^2 \quad (3.4)$$

sobre $\xi \in \mathcal{H}_{K^f}$. La ventaja clave es que los datos x_i solo aparecen a través de los valores del núcleo $K^f(x_i, x_j) = \langle \phi(x_i), \phi(x_j) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}}$, sin necesidad de calcular ϕ explícitamente.

Este procedimiento se generaliza a cualquier núcleo de Mercer $K: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ por una razón algebraica fundamental: la propiedad reproductora establece que $\xi(x) = \langle \xi, K_x \rangle_{\mathcal{H}_K}$ para todo $\xi \in \mathcal{H}_K$, es decir, evaluar ξ en un punto es exactamente tomar un producto escalar contra el elemento $K_x \in \mathcal{H}_K$. El problema de minimización en $\mathcal{H}_K$ es por tanto estructuralmente idéntico a una clasificación lineal en el espacio $\mathcal{H}_K$, con el mapa de características $x \mapsto K_x$. Basta sustituir $\|\cdot\|_{\mathcal{H}_{K^f}}$ por $\|\cdot\|_{\mathcal{H}_K}$ en (3.4):

$$\mathcal{L}_{\mathcal{D}}^K(\xi) := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i \xi(x_i)\} + \lambda \|\xi\|_{\mathcal{H}_K}^2, \quad \xi \in \mathcal{H}_K.$$

El minimizador $\xi^* := \arg \min_{\xi \in \mathcal{H}_K} \mathcal{L}_{\mathcal{D}}^K(\xi)$ induce el clasificador $f = \text{sgn} \circ \xi^*$, que asigna a cada punto x_i la clase según el signo de $\xi^*(x_i)$:

$$i \in I_1 \iff \xi^*(x_i) > 0 \quad \wedge \quad i \in I_{-1} \iff \xi^*(x_i) < 0.$$

Observación 3.1.11. Si $\mathcal{H}_K$ es un *RKHS universal*¹, entonces para cualquier dataset finito $\{x_i\}_{i=1}^m \subset X$ es posible separar perfectamente cualquier etiquetación².

Sin embargo, la convexidad de $\mathcal{L}_K$ garantiza un único mínimo global, pero un RKHS universal tiene dimensión infinita, por lo que minimizar directamente sobre todo $\mathcal{H}_K$ es computacionalmente inabordable.

El obstáculo anterior lo resuelve directamente el Teorema del representante: el funcional $\mathcal{L}_K$ tiene la forma $R_g[f] = E(\{(x_i, y_i, f(x_i))\}) + g(\|f\|_{\mathcal{H}_K})$ con pérdida hinge y $g(t) = \lambda t^2$, que es estrictamente creciente para $\lambda > 0$. Por tanto, cualquier minimizador de $\mathcal{L}_K$ en $\mathcal{H}_K$ pertenece al subespacio de dimensión finita $V_{\mathcal{D}} := \text{span}\{K_{x_i}\}_{i=1}^m$, y el problema de dimensión infinita se reduce a uno de dimensión m . Todo $g \in V_{\mathcal{D}}$ se escribe como $g = \sum_{j=1}^m \alpha_j K_{x_j}$, y la propiedad reproductora da

$$g(x_i) = \sum_{j=1}^m \alpha_j \langle K_{x_j}, K_{x_i} \rangle_{\mathcal{H}_K} = \sum_{j=1}^m \alpha_j K(x_i, x_j) = (M_K \alpha)_i,$$

¹Un ejemplo es el RKHS de la función de base radial (RBF), véase la Proposición 3.1.5

²Esto no quiere decir que el resultado generalice bien, véase el Teorema 3.2.2.

donde $M_K \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es la *matriz de Gram* con $(M_K)_{ij} := K(x_i, x_j)$. Del mismo modo,

$$\|g\|_{\mathcal{H}_K}^2 = \left\langle \sum_i \alpha_i K_{x_i}, \sum_j \alpha_j K_{x_j} \right\rangle_{\mathcal{H}_K} = \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j K(x_i, x_j) = \langle \alpha, M_K \alpha \rangle.$$

Sustituyendo en (3.4), el problema de *Soft Kernel SVM* se reduce a minimizar sobre $\alpha \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathcal{L}(\alpha) := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i (M_K \alpha)_i\} + \lambda \langle \alpha, M_K \alpha \rangle. \quad (3.5)$$

El clasificador resultante es $f: X \rightarrow \{-1, 1\}$ dado por

$$f(x) = \operatorname{sgn} \left(\sum_{j=1}^m \alpha_j^* K(x_j, x) \right), \quad \text{donde } \alpha^* = \arg \min_{\alpha \in \mathbb{R}^m} \mathcal{L}(\alpha).$$

Un RKHS $\mathcal{H}_K$ sobre un espacio métrico compacto X se dice **universal** si es denso en $\mathcal{C}(X)$ con la norma $\|\cdot\|_\infty$. La densidad garantiza que $\mathcal{H}_K$ puede aproximar uniformemente cualquier función continua y, en particular, que puede separar clases con fronteras de forma arbitrariamente compleja. El siguiente resultado cuantifica esta propiedad de separación para cualquier subconjunto denso de $\mathcal{C}(X)$.

Proposición 3.1.5 (Steinwart, Christmann, Prop. 4.54). *Sea X un espacio métrico compacto y sea $V \subset \mathcal{C}(X)$ denso en la norma $\|\cdot\|_\infty$. Entonces, para todo par de compactos disjuntos $A, B \subset X$, existe $f \in V$ tal que*

$$\forall x \in A : f(x) > 0 \quad \wedge \quad \forall x \in B : f(x) < 0.$$

Demostración: Como A y B son compactos disjuntos, el denominador $\operatorname{dist}(x, A) + \operatorname{dist}(x, B)$ es estrictamente positivo para todo $x \in X$. La función

$$g(x) := \frac{\operatorname{dist}(x, B) - \operatorname{dist}(x, A)}{\operatorname{dist}(x, A) + \operatorname{dist}(x, B)}$$

pertenece a $\mathcal{C}(X)$, y satisface $g|_A \equiv 1$ (pues $\operatorname{dist}(x, A) = 0$ para $x \in A$) y $g|_B \equiv -1$.

Como V es denso en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_\infty)$, existe $f \in V$ con $\|f - g\|_\infty < \frac{1}{2}$. Por la desigualdad triangular inversa, para todo $x \in A$:

$$f(x) \geq g(x) - |f(x) - g(x)| > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0,$$

y análogamente para todo $x \in B$:

$$f(x) \leq g(x) + |f(x) - g(x)| < -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0.$$

■

Un ejemplo de RKHS universal es el de la función de base radial (RBF); véase *Steinwart, Christmann, Corollary 4.58*.

3.2 Teorema de No Free Lunch (NFL)

En muchos casos, al resolver un problema de clasificación, podemos sufrir de **overfitting** (sobreajuste): el clasificador que obtenemos a partir de $\mathcal{D}$ es muy bueno para clasificar los datos de $\mathcal{D}$, pero no generaliza bien a nuevos datos.

El overfitting puede ocurrir por varios motivos, como muestran los siguientes ejemplos:

Ejemplos 3.2.1 (de *overfitting*).

- [1] Consideramos un dataset de entreno que contenga imágenes de perros e imágenes de gatos. Un algoritmo de clasificación entrenado en dicho dataset no sería capaz de generalizar a, por ejemplo, imágenes de coches, porque solo ha aprendido a distinguir entre perros y gatos.
- [2] El overfitting también puede ocurrir cuando la **dimensionalidad** del dataset de entreno es mucho menor a la dimensionalidad del espacio. Por ejemplo, si tenemos un dataset de entreno con solo 10 puntos en un espacio de 100 dimensiones, es posible que el clasificador aprenda a clasificar perfectamente esos 10 puntos, pero no generalice bien a nuevos datos debido a la falta de información suficiente para aprender patrones significativos.

Como se define en la Definición 3.1.1, el error de generalización de un clasificador $g: X \rightarrow Y$ es

$$\mathcal{E}[g] = \int_X \mathbb{P}(\{y \neq g(x)\} \mid x) d\rho_X(x).$$

En lo que sigue trabajamos con $Y = \{0, 1\}$ en lugar de $\{-1, 1\}$. Si, en lugar de $Y = \{-1, 1\}$, tenemos $Y = \{0, 1\}$, entonces la función de regresión es

$$f_\rho(x) = \sum_{y \in Y} y \cdot \rho(y \mid x) = \mathbb{P}(\{y = 1\} \mid x).$$

y el clasificador óptimo, llamado **regla de Bayes**, es

$$g^*(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } f_\rho(x) \geq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{si } f_\rho(x) < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Lema 3.2.1. Sea $g: X \rightarrow Y$ un clasificador binario. Entonces $\mathcal{E}[g^*] \leq \mathcal{E}[g]$.

Demostración: Para cada $i \in \{0, 1\}$, denotamos $C_i^g := \{x \in X : g(x) = i\}$. Como $\{C_0^g, C_1^g\}$ es una partición de X , se tiene que $\forall x \in X : \mathbb{1}_{C_0^g}(x) + \mathbb{1}_{C_1^g}(x) = 1$. Calculamos el error condicional de g en x :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{y \neq g(x)\} \mid x) &= 1 - \mathbb{P}(\{y = g(x)\} \mid x) \cdot (\mathbb{1}_{C_0^g}(x) + \mathbb{1}_{C_1^g}(x)) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\{y = 0\} \mid x) \mathbb{1}_{C_0^g}(x) - \mathbb{P}(\{y = 1\} \mid x) \mathbb{1}_{C_1^g}(x) \\ &= 1 - (1 - f_\rho(x)) \mathbb{1}_{C_0^g}(x) - f_\rho(x) \mathbb{1}_{C_1^g}(x). \end{aligned}$$

Sustituyendo $\mathbb{1}_{C_0^g} = 1 - \mathbb{1}_{C_1^g}$ y simplificando:

$$\mathbb{P}(\{y \neq g(x)\} \mid x) = 1 - (2f_\rho(x) - 1) \mathbb{1}_{C_1^g}(x).$$

La misma expresión es válida para g^* , por lo que la diferencia de errores condicionales es

$$\mathbb{P}(\{y \neq g(x)\} \mid x) - \mathbb{P}(\{y \neq g^*(x)\} \mid x) = 2(f_\rho(x) - \tfrac{1}{2}) \left(\mathbb{1}_{C_1^{g^*}}(x) - \mathbb{1}_{C_1^g}(x) \right).$$

Esta expresión es no negativa para todo $x \in X$: por definición de g^* ,

- si $f_\rho(x) \geq \frac{1}{2}$, entonces $g^*(x) = 1$, luego $\mathbb{1}_{C_1^{g^*}}(x) = 1 \geq \mathbb{1}_{C_1^g}(x)$ y $2(f_\rho(x) - \frac{1}{2}) \geq 0$;
- si $f_\rho(x) < \frac{1}{2}$, entonces $g^*(x) = 0$, luego $\mathbb{1}_{C_1^{g^*}}(x) = 0 \leq \mathbb{1}_{C_1^g}(x)$ y $2(f_\rho(x) - \frac{1}{2}) < 0$.

En ambos casos, el producto de los dos factores es ≥ 0 . Integrando respecto a ρ_X :

$$\mathcal{E}[g] - \mathcal{E}[g^*] = 2 \int_X (f_\rho(x) - \tfrac{1}{2}) \left(\mathbb{1}_{C_1^{g^*}}(x) - \mathbb{1}_{C_1^g}(x) \right) d\rho_X(x) \geq 0. \quad \blacksquare$$

Definición 3.2.1. Un **algoritmo de aprendizaje** es una función $A: (X \times Y)^m \rightarrow \mathcal{H}$ que, dado un dataset de entrenamiento $\mathcal{D} \in (X \times Y)^m$, devuelve un clasificador $A[\mathcal{D}]: X \rightarrow Y$.

Hay varios teoremas “No Free Lunch”, que apuntan a decir que no existe un algoritmo bueno para todas las tareas. Aquí demostraremos el siguiente resultado de Devroye de 1982.

Teorema 3.2.2. Sea X un conjunto infinito y sea A un algoritmo de aprendizaje. Entonces, para todo $m \in \mathbb{N}$ y para todo $\varepsilon > 0$, existe una distribución ρ sobre $X \times \{0, 1\}$ tal que

- (1) $\mathcal{E}[g^*] = 0$ (La regla de Bayes clasifica perfectamente).
- (2) $\mathbb{E}[\mathcal{E}[A[\mathcal{D}]]] \geq \frac{1}{2} - \varepsilon$ (El error esperado del clasificador devuelto por el algoritmo es arbitrariamente cercano a $1/2$, es decir, tan malo como un clasificador aleatorio).

Demostración: Como X es infinito, podemos fijar un subconjunto $C = \{c_1, \dots, c_k\} \subset X$ con $k > m$ puntos distintos. Sea $R_k := \{r: C \rightarrow \{0, 1\}\} \cong \{0, 1\}^k$ el conjunto de todas las etiquetaciones posibles de C .

Paso 1: Construcción de las distribuciones. Para cada $r \in R_k$, definimos la distribución ρ_r sobre $C \times \{0, 1\}$ como la uniforme sobre los k pares etiquetados de forma determinista por r :

$$\forall i \in \{1, \dots, k\} : \rho_r(\{(c_i, r(c_i))\}) = \frac{1}{k}.$$

Dado que la etiqueta queda determinada por r (no hay aleatoriedad en y dado x), la función de regresión satisface $f_{\rho_r}(c_i) = r(c_i) \in \{0, 1\}$. Por tanto, la regla de Bayes $g^*(c_i) = r(c_i)$ clasifica perfectamente y $\mathcal{E}_{\rho_r}[g^*] = 0$, verificando la condición (1) del enunciado.

Paso 2: Error esperado del algoritmo para r fijo. Fijado $r \in R_k$, sea

$$S(r) := \mathbb{E}_{\mathcal{D} \sim \rho_r^m} [\mathcal{E}_{\rho_r}[A[\mathcal{D}]]]$$

el error esperado del clasificador que devuelve A al entrenarse con m muestras de ρ_r . Puesto que ρ_r está soportada en m pares $\{(c_i, r(c_i))\}$, un dataset $\mathcal{D} \sim \rho_r^m$ equivale a elegir uniformemente una secuencia $(i_1, \dots, i_m) \in \{1, \dots, k\}^m$, produciendo el dataset

$$\mathcal{D}_r^{(j)} := \{(c_{i_\ell}, r(c_{i_\ell}))\}_{\ell=1}^m, \quad j = (i_1, \dots, i_m) \in \{1, \dots, k\}^m.$$

Desarrollando la esperanza como suma uniforme sobre los k^m datasets posibles, y expandiendo el error de generalización:

$$S(r) = \frac{1}{k^m} \sum_{j=1}^{k^m} \mathcal{E}_{\rho_r}[A[\mathcal{D}_r^{(j)}]] = \frac{1}{k^m} \sum_{j=1}^{k^m} \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \mathbb{1}_{\{A[\mathcal{D}_r^{(j)}](c_i) \neq r(c_i)\}}.$$

Paso 3: Puntos no vistos en el entrenamiento. Para cada dataset $\mathcal{D}_r^{(j)}$, definimos el conjunto de índices *no vistos* en ese dataset:

$$M^{(j)} := \{i \in \{1, \dots, k\} : c_i \notin \{x : (x, y) \in \mathcal{D}_r^{(j)}\}\}.$$

Como $\mathcal{D}_r^{(j)}$ contiene a lo sumo m valores distintos de C y $k > m$, se tiene $|M^{(j)}| \geq k - m > 0$. En particular, restringiendo la suma interior a los índices no vistos:

$$S(r) \geq \frac{1}{k^m} \sum_{j=1}^{k^m} \frac{1}{k} \sum_{i \in M^{(j)}} \mathbb{1}_{\{A[\mathcal{D}_r^{(j)}](c_i) \neq r(c_i)\}}.$$

Paso 4: Promedio sobre todas las etiquetaciones. Como $\max_r S(r) \geq \mathbb{E}_{r \sim \text{unif}(R_k)}[S(r)]$, basta acotar inferiormente la media de $S(r)$. Intercambiando el orden de las sumas y la esperanza:

$$\mathbb{E}_r[S(r)] \geq \frac{1}{k^m} \sum_{j=1}^{k^m} \frac{1}{k} \sum_{i \in M^{(j)}} \mathbb{E}_r \left[\mathbb{1}_{\{A[\mathcal{D}_r^{(j)}](c_i) \neq r(c_i)\}} \right].$$

La clave está en evaluar $\mathbb{E}_r[\mathbb{1}_{\{A[\mathcal{D}_r^{(j)}](c_i) \neq r(c_i)\}}]$ para $i \in M^{(j)}$: como $c_i \notin \mathcal{D}_r^{(j)}$, el dataset $\mathcal{D}_r^{(j)}$ no depende de $r(c_i)$, luego tampoco lo hace $A[\mathcal{D}_r^{(j)}](c_i)$. Siendo $r(c_i)$ uniforme en $\{0, 1\}$ independientemente de $A[\mathcal{D}_r^{(j)}](c_i) \in \{0, 1\}$, la probabilidad de desacuerdo es $\frac{1}{2}$:

$$\forall i \in M^{(j)} : \mathbb{E}_r[\mathbb{1}_{\{A[\mathcal{D}_r^{(j)}](c_i) \neq r(c_i)\}}] = \frac{1}{2}.$$

Paso 5: Conclusión. Sustituyendo y usando $|M^{(j)}| \geq k - m$:

$$\mathbb{E}_r[S(r)] \geq \frac{1}{k^m} \sum_{j=1}^{k^m} \frac{1}{k} \cdot |M^{(j)}| \cdot \frac{1}{2} \geq \frac{1}{k^m} \sum_{j=1}^{k^m} \frac{k - m}{2k} = \frac{k - m}{2k} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{m}{k}\right).$$

Por tanto, $\max_{r \in R_k} S(r) \geq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{m}{k}\right)$. Dado $\varepsilon > 0$, basta elegir $k > \frac{m}{2\varepsilon}$ para obtener

$$\max_{r \in R_k} S(r) \geq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{m}{k}\right) > \frac{1}{2} - \varepsilon.$$

La distribución ρ_r correspondiente al maximizador r satisface simultáneamente las condiciones (1) y (2) del enunciado. ■

Observación 3.2.2. Este resultado, como todos los NFLT, se basa en la posibilidad de que el dataset disponible para el aprendizaje no sea representativo de ρ .

3.3 Descenso del gradiente

3.3.1 Planteamiento del problema

Sea $F: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave. El objetivo es encontrar un mínimo local de F , es decir, un punto $x^* \in \mathbb{R}^p$ tal que $F(x^*) \leq F(x)$ para todo x en una vecindad de x^* . En particular, si F es convexa, entonces cualquier mínimo local es también un mínimo global.

El descenso del gradiente es un método iterativo para aproximar un mínimo local de F . Dado un punto inicial $x_0 \in \mathbb{R}^p$, se generan una secuencia de puntos $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ mediante la regla de actualización

$$\forall k \in \mathbb{N} : x_{k+1} = x_k - \eta \nabla F(x_k),$$

donde $\eta > 0$ es el tamaño del paso o tasa de aprendizaje. La idea es moverse en la dirección opuesta al gradiente de F en el punto actual, ya que este apunta en la dirección de máximo aumento de F .

Prestando atención al desarrollo de Taylor de F alrededor de x_{k+1} , se tiene

$$F(x_k - \eta \nabla F(x_k)) = F(x_k) - \eta \|\nabla F(x_k)\|^2 + \frac{\eta^2}{2} \langle \nabla F(x_k), \text{Hess } F(x_k) \nabla F(x_k) \rangle + \dots$$

donde $\text{Hess } F(x_k)$ es la matriz hessiana de F en x_k . Entonces, si

$$\Lambda := \max \{ \lambda \text{ autovalor de } \text{Hess } F(x) : x \in \mathbb{R}^p \} < \infty,$$

se tiene que $F(x_{k+1}) \approx F(x_k) - \eta \left(1 - \Lambda \frac{\eta}{2}\right) \|\nabla F(x_k)\|^2$ para $\eta < 2/\Lambda$, luego

$$|F(x_{k+1}) - F(x^*)| \leq |F(x_k) - F(x^*)| - \eta \left(1 - \Lambda \frac{\eta}{2}\right) \|\nabla F(x_k)\|^2$$

donde x_* es un mínimo local de F . Esto muestra que $F(x_k)$ converge a $F(x^*)$ y que $\nabla F(x_k) \rightarrow 0$ a medida que $k \rightarrow \infty$. Sin embargo, no nos dice a qué velocidad ocurre esto, ni nos garantiza que x_k converja a un mínimo global.

3.3.2 Descenso del gradiente estocástico

En muchos casos, como en el aprendizaje automático, la función F tiene la forma

$$\forall \theta \in \mathbb{R}^p : \mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathcal{L}_i(\theta), \quad \text{donde } \mathcal{L}_i(\theta) := \ell(y_i, f_\theta(x_i), \theta),$$

$\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m$ es un conjunto de datos de entrenamiento, $f_\theta : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ es un modelo parametrizado por θ , y $\ell : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de pérdida que mide el error del modelo f_θ en la muestra (x_i, y_i) . Por ejemplo,

$$\ell(y, f_\theta(x), \theta) = \|y - f_\theta(x)\|^2 + \|\theta\|^2.$$

En contraposición con el algoritmo de descenso del gradiente, que requiere calcular el gradiente completo $\nabla \mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \nabla \mathcal{L}_i(\theta)$ en cada iteración, el descenso del gradiente estocástico (SGD) actualiza los parámetros utilizando un gradiente estimado a partir de una sola muestra o de un mini-lote de muestras. Es decir, en cada iteración se selecciona aleatoriamente un conjunto de índices $\mathcal{B}_k \subseteq \{1, \dots, m\}$ y se actualiza

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \frac{1}{|\mathcal{B}_k|} \sum_{i \in \mathcal{B}_k} \nabla \mathcal{L}_i(\theta_k).$$

Si $|\mathcal{B}_k| = 1$, entonces $\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla \mathcal{L}_{i_k}(\theta_k)$, donde i_k es un índice seleccionado aleatoriamente.

La propiedad crucial de este método es que la esperanza condicionada del gradiente estimado es igual al gradiente verdadero:

$$\forall k \in \mathbb{N} : \mathbb{E} [\nabla \mathcal{L}_{i_k}(\theta_k) \mid \theta_k] = \sum_{j=1}^m \mathbb{P}(i_k = j) \nabla \mathcal{L}_j(\theta_k) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \nabla \mathcal{L}_j(\theta_k) = \nabla \mathcal{L}(\theta_k).$$

Esto significa que, en promedio, el descenso del gradiente estocástico sigue la dirección de descenso del gradiente verdadero, aunque con ruido debido a la variabilidad de las muestras seleccionadas.

Definición 3.3.1. Sea $\Lambda > 0$ y $\mathcal{L} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^p)$, $\mathcal{L}$ es Λ -suave

$$\iff \forall x, y \in \mathbb{R}^p : \mathcal{L}(y) \leq \mathcal{L}(x) + \langle \nabla \mathcal{L}(x), y - x \rangle + \frac{\Lambda}{2} \|y - x\|^2.$$

Intuitivamente, una función Λ -suave es aquella que no crece más rápido que una cuadrática de curvatura Λ . Esto impide que la función tenga cambios bruscos de pendiente: el gradiente $\nabla \mathcal{L}$ no puede variar demasiado rápido. En particular, esto garantiza que un paso de descenso del gradiente con tasa $\eta \leq 1/\Lambda$ siempre reduce el valor de $\mathcal{L}$.

Ejercicio 3.3.1. Demuestra que si $\mathcal{L} \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^p)$, entonces $\mathcal{L}$ es Λ -suave si y solo si todo autovalor de la matriz hessiana $\text{Hess } \mathcal{L}(x)$ es menor o igual a Λ para todo $x \in \mathbb{R}^p$.

Lema 3.3.1. Sea $\mathcal{L}$ Λ -suave y sea $(\theta_k)_{k=0}^\infty$ la sucesión generada por el descenso del gradiente estocástico. Entonces, para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{E}[\mathcal{L}(\theta_{k+1}) \mid \theta_k] \leq \mathcal{L}(\theta_k) - \eta \|\nabla \mathcal{L}(\theta_k)\|^2.$$

Demostración: Dado que $\mathcal{L}$ es Λ -suave, se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathcal{L}(\theta_{k+1}) \mid \theta_k] &\leq \mathbb{E}\left[\mathcal{L}(\theta_k) + \langle \nabla \mathcal{L}(\theta_k), \theta_{k+1} - \theta_k \rangle + \frac{\Lambda}{2} \|\theta_{k+1} - \theta_k\|^2 \mid \theta_k\right] \\ &= \mathcal{L}(\theta_k) + \langle \nabla \mathcal{L}(\theta_k), -\eta \nabla \mathcal{L}(\theta_k) \rangle + \underbrace{\frac{\Lambda}{2} \eta^2 \mathbb{E}[\|\nabla \mathcal{L}_{i_k}(\theta_k)\|^2 \mid \theta_k]}_{\geq 0} \\ &\leq \mathcal{L}(\theta_k) - \eta \|\nabla \mathcal{L}(\theta_k)\|^2. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 3.3.2. Demuestra que si $\mathcal{L} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^p)$ entonces $\mathcal{L}$ es convexa si y solo si

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^p : \mathcal{L}(y) \leq \mathcal{L}(x) - \langle \nabla \mathcal{L}(x), x - y \rangle.$$

Lema 3.3.2. Sea $\mathcal{L} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^p)$ convexa y sea $(\theta_k)_{k=0}^\infty$ la sucesión generada por el descenso del gradiente estocástico. Supongamos que $\forall k \geq 0 : \mathbb{E}[\|\nabla \mathcal{L}_{i_k}(\theta_k)\|^2 \mid \theta_k] \leq \Sigma$ para alguna constante $\Sigma > 0$, entonces

$$\forall \theta \in \mathbb{R}^p : \mathcal{L}(\theta_k) \leq \mathcal{L}(\theta) + \frac{1}{2\eta} \mathbb{E}[\|\theta_k - \theta\|^2 - \|\theta_{k+1} - \theta\|^2 \mid \theta_k] + \frac{\Sigma}{2\eta}.$$

Demostración: Por convexidad de $\mathcal{L}$ y descenso del gradiente estocástico, se tiene

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\theta_k) &\leq \mathcal{L}(\theta) - \langle \nabla \mathcal{L}(\theta_k), \theta - \theta_k \rangle = \mathcal{L}(\theta) - \left\langle \mathbb{E} \left[\nabla \mathcal{L}_{i_k}(\theta_k) \mid \theta_k \right], \theta - \theta_k \right\rangle \\ &= \mathcal{L}(\theta) + \frac{1}{\eta} \mathbb{E} \left[- \langle \theta_k - \theta_{k+1}, \theta - \theta_k \rangle \mid \theta_k \right]\end{aligned}$$

Por la conocida identidad $-\langle a - b, c - a \rangle = \frac{1}{2} (\|a - c\|^2 - \|b - c\|^2 - \|a - b\|^2)$, se tiene

$$\mathcal{L}(\theta_k) \leq \mathcal{L}(\theta) + \frac{1}{2\eta} \mathbb{E} [\|\theta_k - \theta\|^2 - \|\theta_{k+1} - \theta\|^2 - \|\theta_k - \theta_{k+1}\|^2 \mid \theta_k].$$

Dado que $\|\theta_k - \theta_{k+1}\|^2 = \eta^2 \|\nabla \mathcal{L}_{i_k}(\theta_k)\|^2$ y, por hipótesis, $\mathbb{E} [\|\nabla \mathcal{L}_{i_k}(\theta_k)\|^2 \mid \theta_k] \leq \Sigma$,

$$\mathcal{L}(\theta_k) \leq \mathcal{L}(\theta) + \frac{1}{2\eta} \mathbb{E} [\|\theta_k - \theta\|^2 - \|\theta_{k+1} - \theta\|^2] + \frac{\Sigma}{2\eta}. \quad \blacksquare$$

Teorema 3.3.3. Sea $\mathcal{L} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^p)$ convexa y sea $(\theta_k)_{k=0}^\infty$ la sucesión generada por el descenso del gradiente estocástico. Supongamos que $\forall k \geq 0 : \mathbb{E} [\|\nabla \mathcal{L}_{i_k}(\theta_k)\|^2 \mid \theta_k] \leq \Sigma$ para alguna constante $\Sigma > 0$, entonces

$$\eta \leq \frac{1}{\sqrt{\Sigma T}} \text{ para } T > 0 \implies \mathbb{E} \left[\mathcal{L} \left(\frac{1}{T} \sum_{k=0}^{T-1} \theta_k \right) - \mathcal{L}(\theta^*) \right] \leq \frac{\sqrt{\Sigma}}{2\sqrt{T}} (1 + \|\theta_0 - \theta^*\|^2),$$

donde $\theta^* = \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^p} \mathcal{L}(\theta)$.

Demostración: Aplicando el lema anterior con $\theta = \theta^*$, se tiene

$$\mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{T-1} \mathcal{L}(\theta_k) \right] \leq T \mathcal{L}(\theta^*) + \frac{1}{2\eta} \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{T-1} \|\theta_k - \theta^*\|^2 - \|\theta_{k+1} - \theta^*\|^2 \right] + \frac{\Sigma}{2\eta}$$

Dado que $\sum_{k=0}^{T-1} \|\theta_k - \theta^*\|^2 - \|\theta_{k+1} - \theta^*\|^2$ es una suma telescópica, se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{T-1} \mathcal{L}(\theta_k) \right] &\leq T \mathcal{L}(\theta^*) + \frac{1}{2\eta} \mathbb{E} [\|\theta_0 - \theta^*\|^2 - \|\theta_T - \theta^*\|^2] + \frac{\Sigma}{2\eta} \\ &\leq T \mathcal{L}(\theta^*) + \frac{1}{2\eta} \|\theta_0 - \theta^*\|^2 + \frac{\Sigma}{2\eta}.\end{aligned}$$

Al dividir por T y aplicar convexidad de $\mathcal{L}$, se tiene

$$\frac{1}{T} \sum_{k=0}^{T-1} \mathbb{E} [\mathcal{L}(\theta_k)] - \mathcal{L}(\theta^*) \leq \frac{1}{2\eta T} \|\theta_0 - \theta^*\|^2 + \frac{\Sigma}{2\eta T} = \frac{\sqrt{\Sigma}}{2\sqrt{T}} (1 + \|\theta_0 - \theta^*\|^2). \quad \blacksquare$$

3.4 Clasificación multiclase

Los capítulos anteriores desarrollan la teoría de las SVM para el caso binario: dado un espacio de observaciones $X \subset \mathbb{R}^d$, se busca un clasificador $f: X \rightarrow \{-1, 1\}$ que separe dos clases con margen máximo. Sin embargo, muchos problemas reales exigen distinguir entre $k \geq 3$ categorías simultáneamente: reconocimiento de dígitos escritos a mano ($k = 10$), clasificación de variedades de flores ($k = 3$), identificación de subtipos de tejido tumoral, etc.

Este capítulo extiende la teoría de SVM al caso multiclase y está organizado de la siguiente manera.

- 3.4.1 Planteamiento del problema:** se generaliza el marco de clasificación binaria al caso de k clases, estableciendo las nociones de error, clasificador óptimo de Bayes y clasificadores lineales multiclase.
- 3.4.2 Reducción a clasificación binaria:** se estudian las estrategias *One-vs-Rest* (OvR) y *One-vs-One* (OvO), que resuelven el problema multiclase entrenando múltiples clasificadores binarios del tipo estudiado.
- 3.4.3 Formulación directa: SVM de Crammer–Singer:** se presenta una generalización de la pérdida hinge al caso multiclase que optimiza todos los clasificadores simultáneamente.
- 3.4.4 Extensión con núcleo reproductor:** se aplica el truco del núcleo a los enfoques anteriores mediante el Teorema del Representante ya establecido.
- 3.4.5 Implementación y experimentos:** se ilustra la teoría con los conjuntos de datos Iris y Digits, comparando los distintos enfoques con `sklearn`.

3.4.1 El problema de clasificación con k clases

3.4.1.1 Planteamiento

Fijamos un número de clases $k \geq 2$ y denotamos $\mathbb{N}_k := \{1, \dots, k\}$. El problema de *clasificación multiclase* consiste en asignar a cada punto $x \in X \subset \mathbb{R}^d$ una de las k etiquetas en $\mathbb{N}_k$.

Como en el caso binario, suponemos que los datos se generan a partir de una distribución de probabilidad desconocida ρ sobre $X \times \mathbb{N}_k$: la marginal ρ_X describe cómo se distribuyen las observaciones y las probabilidades condicionales $\rho(i | x)$ codifican la incertidumbre en la etiqueta dado el punto.

Definición 3.4.1 (Clasificación multiclase y error). Una **clasificación** es una función medible $f: X \rightarrow \mathbb{N}_k$. Su **error de clasificación** (generalización de la Definición 3.1.1) es

$$\mathcal{E}[f] := \int_X \mathbb{P}(Y \neq f(x) \mid x) d\rho_X(x) = 1 - \int_X \rho(f(x) \mid x) d\rho_X(x).$$

Dado un conjunto de datos $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times \mathbb{N}_k$, el **error empírico** es

$$\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f] := \frac{1}{m} |\{i \in \mathbb{N}_m : f(x_i) \neq y_i\}|.$$

Observación 3.4.2. La definición de error es formalmente idéntica a la del caso binario: mide la probabilidad de clasificar incorrectamente un punto tomado al azar. Para $k = 2$ ambas definiciones coinciden exactamente.

3.4.1.2 Clasificador óptimo de Bayes

Para $k = 2$, la regla de Bayes es $g^*(x) = \mathbb{1}_{[f_\rho(x) \geq 1/2]}$, donde $f_\rho(x) = \mathbb{P}(Y = 1 \mid x)$ (Section 3.4.1). Para k clases basta generalizar la función de regresión escalar a un vector de probabilidades.

Definición 3.4.3 (Funciones de regresión multiclase). Para cada $i \in \mathbb{N}_k$, la **función de regresión** de la clase i es

$$\eta_i: X \rightarrow [0, 1], \quad \eta_i(x) := \rho(i \mid x) = \mathbb{P}(Y = i \mid x).$$

El vector $\eta(x) := (\eta_1(x), \dots, \eta_k(x))$ toma valores en el simplex estándar $\Delta^{k-1} := \{p \in \mathbb{R}^k : p_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^k p_i = 1\}$.

Proposición 3.4.1 (Regla de Bayes multiclase). *El clasificador que minimiza el error de clasificación entre todos los $f: X \rightarrow \mathbb{N}_k$ es la **regla de Bayes***

$$g^*(x) := \arg \max_{i \in \mathbb{N}_k} \eta_i(x) = \arg \max_{i \in \mathbb{N}_k} \mathbb{P}(Y = i \mid x).$$

En particular, $\mathcal{E}[g^] \leq \mathcal{E}[f]$ para todo $f: X \rightarrow \mathbb{N}_k$.*

Demostración: Fijado $x \in X$, el error condicional de f en x es

$$\mathbb{P}(Y \neq f(x) \mid x) = 1 - \rho(f(x) \mid x) = 1 - \eta_{f(x)}(x).$$

Minimizar punto a punto este error condicional equivale a maximizar $\eta_{f(x)}(x)$ sobre $\mathbb{N}_k$, que es exactamente lo que hace g^* . Dado que el integrando satisface $\mathbb{P}(Y \neq g^*(x) \mid x) \leq \mathbb{P}(Y \neq f(x) \mid x)$ para todo x , integrando respecto a ρ_X se obtiene $\mathcal{E}[g^*] \leq \mathcal{E}[f]$. ■

Observación 3.4.4 (Error de Bayes y ambigüedad). El error mínimo alcanzable, $\mathcal{E}[g^*] = 1 - \int_X \max_i \eta_i(x) d\rho_X(x)$, se llama **error de Bayes** o **error irreducible**. El Teorema de No Free Lunch (Teorema 3.2.2) garantiza que ningún algoritmo puede superar esta cota de forma universal.

3.4.1.3 Clasificadores lineales multiclase

En el caso binario los clasificadores lineales usan un único hiperplano separador (Definición 3.1.4). Para k clases, la generalización natural consiste en asignar a cada clase una función de puntuación lineal y predecir la clase con mayor puntuación.

Definición 3.4.5 (Clasificadores lineales multiclase). Para $k \geq 2$, el espacio de **clasificadores lineales multiclase** es

$$\mathcal{H}_k := \left\{ f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{N}_k : \exists W \in \mathbb{R}^{k \times d}, b \in \mathbb{R}^k : \forall x \in \mathbb{R}^d : f(x) = \arg \max_{i \in \mathbb{N}_k} (\langle w_i, x \rangle + b_i) \right\},$$

donde $w_i \in \mathbb{R}^d$ es la i -ésima fila de W . Las funciones $\xi_i(x) := \langle w_i, x \rangle + b_i$ se denominan **puntuaciones** (*scores*) de la clase i en el punto x .

Observación 3.4.6 (Conexión con el caso binario). Para $k = 2$ con $\mathbb{N}_k = \{-1, 1\}$, todo $f \in \mathcal{H}_2$ de la Definición 3.1.4 admite la representación de la Definición 3.4.5: basta tomar $w_1 = w$, $b_1 = b$, $w_{-1} = -w$ y $b_{-1} = -b$, pues entonces $\xi_1(x) > \xi_{-1}(x) \iff \langle w, x \rangle + b > 0$.

Observación 3.4.7 (Regiones de decisión poliédricas). Las **regiones de decisión** del clasificador $f \in \mathcal{H}_k$ son los conjuntos

$$R_i := \{x \in \mathbb{R}^d : f(x) = i\} = \left\{ x \in \mathbb{R}^d : \forall j \neq i, \langle w_i - w_j, x \rangle + (b_i - b_j) \geq 0 \right\}.$$

Cada R_i es la intersección de $k - 1$ semiespacios cerrados: en particular, es un poliedro convexo. La frontera entre R_i y R_j es el hiperplano

$$H_{ij} := \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w_i - w_j, x \rangle + (b_i - b_j) = 0\},$$

que separa localmente las clases i y j . La partición $\{R_i\}_{i=1}^k$ de $\mathbb{R}^d$ es, por lo tanto, una **teselación poliédrica convexa**, también denominada diagrama de Voronoi lineal.

Ejemplo 3.4.1. El conjunto de datos Iris contiene medidas de los sépalos y pétalos de tres especies de iris ($k = 3$). Reducida la dimensión a $d = 2$ mediante PCA, las tres regiones de decisión de un clasificador lineal $f \in \mathcal{H}_3$ son tres poliedros convexos separados por rectas (véase la Section 3.4.5).

3.4.2 Reducción a clasificación binaria

3.4.2.1 One-vs-Rest (OvR)

La estrategia *One-vs-Rest* (también llamada *One-vs-All*) reduce el problema multiclase a k problemas binarios independientes. Para cada clase $i \in \mathbb{N}_k$, se recodifican las etiquetas como $+1$ para los ejemplos de la clase i y -1 para el resto, y se entrena una SVM binaria sobre el dataset completo.

Definición 3.4.8 (Clasificador OvR). Dado $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times \mathbb{N}_k$, para cada $i \in \mathbb{N}_k$ se define el **dataset binarizado**

$$\mathcal{D}^{(i)} := \{(x_\ell, \sigma_i(y_\ell))\}_{\ell=1}^m, \quad \sigma_i(y) := \begin{cases} +1 & \text{si } y = i, \\ -1 & \text{si } y \neq i. \end{cases}$$

Sea (w_i^*, b_i^*) la solución del problema Soft-SVM (3.3) sobre $\mathcal{D}^{(i)}$, con función de decisión $\xi_i^*(x) := \langle w_i^*, x \rangle + b_i^*$. El **clasificador OvR** es

$$\hat{f}^{\text{OvR}}(x) := \arg \max_{i \in \mathbb{N}_k} \xi_i^*(x).$$

Observación 3.4.9 (OvR como clasificador lineal multiclase). El clasificador $\hat{f}^{\text{OvR}}$ pertenece a $\mathcal{H}_k$ (Definición 3.4.5): basta tomar la matriz de pesos $W \in \mathbb{R}^{k \times d}$ con filas w_i^* y el sesgo $b = (b_1^*, \dots, b_k^*)$. Las regiones de decisión son por tanto poliedros convexos como describe la Observación 3.4.7. Sin embargo, a diferencia del caso binario, los k vectores (w_i^*, b_i^*) se obtienen de optimizaciones *independientes* entre sí.

Observación 3.4.10 (Regiones ambiguas y clases silenciosas). Si $\xi_{i_1}^*(x) > 0$ y $\xi_{i_2}^*(x) > 0$ para dos clases distintas $i_1 \neq i_2$, los dos clasificadores binarios reclaman la misma observación. Análogamente, si $\xi_i^*(x) < 0$ para todo i , ningún clasificador la reivindica. Aunque la regla $\arg \max$ resuelve ambas situaciones por definición, ilustra que las puntuaciones ξ_i^* no están calibradas entre sí: se obtienen de problemas entrenados con proporciones de clases distintas (m_i positivos frente a $m - m_i$ negativos) y, en general, no son comparables en escala.

3.4.2.2 One-vs-One (OvO)

La estrategia *One-vs-One* reduce el problema a $\binom{k}{2}$ problemas binarios, uno por cada par de clases. Cada subproblema se entrena únicamente con los ejemplos de las dos clases involucradas, y la predicción se decide por votación mayoritaria.

Definición 3.4.11 (Clasificador OvO). Para cada par $i \neq j$ en $\mathbb{N}_k$, se define el **dataset reducido al par** (i, j) :

$$\mathcal{D}^{(ij)} := \{(x_s, \tilde{\sigma}_{ij}(y_s)) : s \in I_i \cup I_j\}, \quad \tilde{\sigma}_{ij}(y) := \begin{cases} +1 & \text{si } y = i, \\ -1 & \text{si } y = j, \end{cases}$$

donde $I_i := \{s \in \mathbb{N}_m : y_s = i\}$. Sea $f_{ij}^* : X \rightarrow \{-1, 1\}$ la SVM binaria entrenada sobre $\mathcal{D}^{(ij)}$, interpretando $f_{ij}^*(x) = +1$ como “ x pertenece a la clase i ” (y -1 como “ x pertenece a la clase j ”). El **marcador de votos** de la clase i en el punto x es

$$v_i(x) := \sum_{j \in \mathbb{N}_k \setminus \{i\}} \mathbb{1}_{\{f_{ij}^*(x)=+1\}},$$

y el **clasificador OvO** es

$$\hat{f}^{\text{OvO}}(x) := \arg \max_{i \in \mathbb{N}_k} v_i(x).$$

Observación 3.4.12. El total de votos repartidos en cada punto es $\sum_{i=1}^k v_i(x) = \binom{k}{2}$: cada par $\{i, j\}$ emite exactamente un voto. En caso de empate en $v_i(x)$, la regla $\arg \max$ no está definida de forma única; en la práctica se rompe por las puntuaciones ξ_{ij}^* o por orden lexicográfico.

Observación 3.4.13 (Tamaño de los subproblemas). Cada SVM binaria f_{ij}^* se entrena sobre $m_{ij} := m_i + m_j$ puntos, donde $m_i = |I_i|$. Si las clases están balanceadas ($m_i = m/k$ para todo $i \in \mathbb{N}_k$), entonces $m_{ij} = 2m/k$: cada subproblema es considerablemente más pequeño que el dataset completo. Esto reduce el coste por clasificador a cambio de entrenar $\binom{k}{2}$ en lugar de k clasificadores.

3.4.2.3 Comparación e inconsistencias de las reducciones

	OvR	OvO
Número de clasificadores	k	$\binom{k}{2}$
Tamaño de cada subproblema	m	$m_i + m_j \leq m$
Consistencia de Bayes	no garantizada	garantizada (cond. suaves)
Implementación en <code>sklearn</code>	<code>LinearSVC</code>	<code>SVC</code>

Desde el punto de vista de la consistencia, las dos estrategias difieren de manera fundamental.

Observación 3.4.14 (Inconsistencia de OvR). OvR no es en general consistente con la regla de Bayes. El $\arg \max_i \arg \max_i \xi_i^*(x)$ no coincide necesariamente con $\arg \max_i \eta_i(x)$ porque

las puntuaciones ξ_i^* son soluciones a problemas con distribuciones binarias distintas: el clasificador de la clase i ve una proporción m_i/m de positivos, que varía con i . Así, comparar directamente $\xi_i^*(x)$ con $\xi_j^*(x)$ es comparar valores producidos en escalas distintas.

Intuitivamente, si la clase i es muy frecuente ($m_i \gg m_j$), su SVM binaria aprende un margen mayor y sus scores ξ_i^* pueden dominar sistemáticamente los de clases más pequeñas, independientemente de la probabilidad posterior real.

Proposición 3.4.2 (Consistencia de OvO bajo separabilidad pairwise). *Supongamos que, para cada par $i \neq j$, el clasificador binario f_{ij}^* es consistente, esto es, que converge en probabilidad a*

$$f_{ij}^\rho(x) := \text{sgn}(\eta_i(x) - \eta_j(x))$$

cuando $m \rightarrow \infty$. Entonces el clasificador OvO converge a la regla de Bayes $g^(x) = \arg \max_i \eta_i(x)$.*

Demostración: Sea $i^* := g^*(x) = \arg \max_i \eta_i(x)$. Por definición, $\eta_{i^*}(x) > \eta_j(x)$ para todo $j \neq i^*$ (en el caso genérico sin empates en las probabilidades posteriores). Bajo la hipótesis de consistencia, $f_{i^*j}^\rho(x) = +1$ para todo $j \neq i^*$, luego $v_{i^*}(x) = k - 1$.

Para cualquier otra clase $\ell \neq i^*$, existe al menos i^* tal que $f_{\ell i^*}^\rho(x) = -1$, lo que no suma votos a ℓ . En consecuencia, $v_\ell(x) \leq k - 2 < v_{i^*}(x)$, por lo que $\hat{f}^\rho(x) = i^* = g^*(x)$.

En el límite $m \rightarrow \infty$, la convergencia en probabilidad de cada f_{ij}^* a f_{ij}^ρ implica la convergencia de $\hat{f}^{\text{OvO}}$ a $\hat{f}^\rho = g^*$. ■

3.4.3 Formulación directa: SVM de Crammer–Singer

3.4.3.1 Pérdida hinge multiclase

Las estrategias de reducción (OvR y OvO) heredan automáticamente todas las garantías de la Soft-SVM binaria pero tratan los k subproblemas de forma independiente: los pesos w_i^* no interactúan durante el entrenamiento, lo que puede producir puntuaciones ξ_i^* no calibradas entre sí (véase la Observación 3.4.14).

La formulación de Crammer y Singer **crammer2001** evita este problema optimizando el margen de *todas* las clases simultáneamente. La idea es generalizar la pérdida hinge binaria: en el caso binario, el punto x_i con etiqueta $y_i \in \{-1, 1\}$ es penalizado si la puntuación de su clase verdadera $y_i \langle w, x_i \rangle + b$ cae por debajo de 1. En el caso multiclase, pedimos que

la puntuación de la clase correcta $\xi_{y_i}(x_i)$ supere en al menos 1 a la puntuación de *cualquier* clase competidora.

Definición 3.4.15 (Pérdida hinge multiclase). Dado un clasificador de parámetros $W \in \mathbb{R}^{k \times d}$, $b \in \mathbb{R}^k$, con funciones de puntuación $\xi_i(x) = \langle w_i, x \rangle + b_i$, la **pérdida hinge multiclase** en el ejemplo $(x, y) \in X \times \mathbb{N}_k$ es

$$\ell^{\text{cs}}(W, b; x, y) := \max_{i \in \mathbb{N}_k \setminus \{y\}} \max\{0, 1 + \xi_i(x) - \xi_y(x)\}.$$

Para el conjunto de datos $\mathcal{D} = \{(x_s, y_s)\}_{s=1}^m$, la **pérdida empírica de Crammer–Singer** es

$$\mathcal{E}_{\mathcal{D}}^{\text{cs}}(W, b) := \frac{1}{m} \sum_{s=1}^m \ell^{\text{cs}}(W, b; x_s, y_s) = \frac{1}{m} \sum_{s=1}^m \max_{i \neq y_s} \max\{0, 1 + \xi_i(x_s) - \xi_{y_s}(x_s)\}.$$

Observación 3.4.16 (Conexión con la pérdida hinge binaria). Para $k = 2$ con $\mathbb{N}_k = \{-1, 1\}$ y escogiendo $w_{-1} = -w_1$, $b_{-1} = -b_1$, se tiene $\xi_1(x) - \xi_{-1}(x) = 2(\langle w_1, x \rangle + b_1)$. La única clase competidora de $y = 1$ es $i = -1$, de modo que

$$\ell^{\text{cs}}(W; x, 1) = \max\{0, 1 - 2(\langle w_1, x \rangle + b_1)\},$$

que coincide (salvo el factor 2, absorbible en λ) con la pérdida hinge binaria $\max\{0, 1 - y(\langle w, x \rangle + b)\}$ del ??.

Observación 3.4.17 (Interpretación geométrica del margen). La condición $\xi_{y_s}(x_s) \geq \xi_i(x_s) + 1$ para todo $i \neq y_s$ establece que la puntuación de la clase correcta debe superar a la de cualquier clase incorrecta con un margen de al menos 1. Cuando se viola, la penalización $1 + \xi_i(x_s) - \xi_{y_s}(x_s)$ mide cuánto falta para satisfacer esa separación: si la clase i tiene mayor puntuación que la clase correcta (error de clasificación), la penalización supera 1.

3.4.3.2 Problema de optimización

Añadiendo un término de regularización sobre cada vector de pesos, se obtiene el problema de Crammer–Singer.

Definición 3.4.18 (SVM de Crammer–Singer). El problema de **SVM de Crammer–Singer** es

$$\min_{\substack{W \in \mathbb{R}^{k \times d}, b \in \mathbb{R}^k \\ \xi \in \mathbb{R}_+^{k \times m}}} \left(\frac{1}{m} \sum_{s=1}^m \sum_{i \neq y_s} \xi_{is} + \lambda \sum_{i=1}^k \|w_i\|^2 \right) \quad \text{sujeto a} \quad \forall s \in \mathbb{N}_m, \forall i \neq y_s: \xi_{y_s, s} - \xi_{is} \geq 1 - \xi_{is}^{\text{hol}}, \quad (3.6)$$

donde $\xi_{is}^{\text{hol}} \geq 0$ es la variable de holgura que mide la violación del margen entre la clase i y

la clase correcta y_s en el ejemplo s .

Siguiendo el mismo argumento que para la Soft-SVM binaria (Equation (3.3)), fijados W y b , el valor óptimo de cada variable de holgura es

$$\xi_{is}^{\text{hol},*} = \max\{0, 1 + \xi_i(x_s) - \xi_{y_s}(x_s)\},$$

de modo que el problema (3.6) es equivalente a minimizar el funcional

$$\mathcal{L}^{\text{cs}}(W, b) := \mathcal{E}_{\mathcal{D}}^{\text{cs}}(W, b) + \lambda \sum_{i=1}^k \|w_i\|^2. \quad (3.7)$$

Proposición 3.4.3 (Convexidad). *El funcional $\mathcal{L}^{\text{cs}}(W, b)$ es convexo en (W, b) . Si $\lambda > 0$, es estrictamente convexo y admite un único mínimo global.*

Demostración: La función $t \mapsto \max\{0, 1 + t\}$ es convexa. La cantidad $\xi_i(x_s) - \xi_{y_s}(x_s) = \langle w_i - w_{y_s}, x_s \rangle + (b_i - b_{y_s})$ es lineal en (W, b) , por tanto la composición $\max\{0, 1 + \xi_i(x_s) - \xi_{y_s}(x_s)\}$ es convexa. El max de funciones convexas es convexo y la suma conserva la convexidad, luego $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}^{\text{cs}}$ es convexa. El término $\lambda \sum_i \|w_i\|^2$ es estrictamente convexo para $\lambda > 0$, lo que implica la estricta convexidad de $\mathcal{L}^{\text{cs}}$. ■

Observación 3.4.19 (Vínculo con el caso binario). Para $k = 2$, la pérdida $\mathcal{L}^{\text{cs}}$ coincide (salvo reescalado de λ) con la pérdida hinge regularizada del problema de Soft-SVM binaria (3.3). En ese sentido, la formulación de Crammer–Singer es la extensión más natural y unificada: resuelve un único problema convexo de dimensión $k \times (d + 1)$ en lugar de k problemas independientes de dimensión $d + 1$.

3.4.4 Extensión con núcleo reproductor

3.4.4.1 Kernel trick en el caso multiclase

La formulación de Crammer–Singer en su forma lineal (3.7) exige que las fronteras de decisión sean hiperplanos en $\mathbb{R}^d$. Al igual que en el caso binario (véase la Ejemplo 3.1.2 y la Proposición 3.1.4), es posible que los datos no sean linealmente separables en $\mathbb{R}^d$ pero sí lo sean en un espacio de mayor dimensión definido por un mapa de características $\phi: X \rightarrow \mathcal{H}_K$.

La extensión es directa: en lugar de buscar vectores de pesos $w_i \in \mathbb{R}^d$, se buscan funciones $\xi_i \in \mathcal{H}_K$ en un RKHS con núcleo $K: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$. Cada función de puntuación de la clase i pasa a ser $\xi_i: X \rightarrow \mathbb{R}$ con $\xi_i \in \mathcal{H}_K$, y la pérdida multiclase (3.7) se convierte en el funcional

$$\mathcal{L}_K^{\text{cs}}(\boldsymbol{\xi}) := \frac{1}{m} \sum_{s=1}^m \max_{i \neq y_s} \max \{0, 1 + \xi_i(x_s) - \xi_{y_s}(x_s)\} + \lambda \sum_{i=1}^k \|\xi_i\|_{\mathcal{H}_K}^2, \quad (3.8)$$

donde $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_k) \in \mathcal{H}_K^k$.

Observación 3.4.20. Las k funciones ξ_i se regularizan de forma independiente con el mismo $\lambda > 0$. El clasificador resultante es $f(x) = \arg \max_{i \in \mathbb{N}_k} \xi_i(x)$, que generaliza directamente la regla $\arg \max$ de la Definición 3.4.5 al espacio $\mathcal{H}_K$.

Observación 3.4.21 (Convexidad en el caso kernel). El funcional (3.8) es convexo en $\boldsymbol{\xi}$ por el mismo argumento de la Proposición 3.4.3: cada $\xi_i(x_s) = \langle \xi_i, K_{x_s} \rangle_{\mathcal{H}_K}$ es lineal en ξ_i , la composición con el $\max$ de funciones afines es convexa, y el término $\lambda \|\xi_i\|_{\mathcal{H}_K}^2$ es estrictamente convexo. Como las k funciones están desacopladas en la regularización, el problema separable admite un único mínimo global.

3.4.4.2 Teorema del Representante vectorial

El funcional (3.8) vive sobre $\mathcal{H}_K^k$, un espacio de dimensión infinita. El Teorema 2.2.3 reduce cada ξ_i a un elemento del subespacio de dimensión finita $V_{\mathcal{D}} := \text{span}\{K_{x_s}\}_{s=1}^m$, exactamente igual que en el caso binario (tema3.tex, p. 40).

Proposición 3.4.4 (Teorema del representante multiclase). *Sea K un núcleo de Mercer y $\mathcal{H}_K$ su RKHS. Si $\boldsymbol{\xi}^* = (\xi_1^*, \dots, \xi_k^*)$ minimiza (3.8), entonces para cada $i \in \mathbb{N}_k$ existen coeficientes $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_m^{(i)} \in \mathbb{R}$ tales que*

$$\xi_i^* = \sum_{s=1}^m \alpha_s^{(i)} K_{x_s}, \quad \text{es decir,} \quad \xi_i^*(x) = \sum_{s=1}^m \alpha_s^{(i)} K(x_s, x).$$

Demostración: Fijado $i \in \mathbb{N}_k$, el funcional (3.8) tiene la forma $R_g[\xi_i] = E_i(\{\xi_i(x_s)\}_{s=1}^m) + g(\|\xi_i\|_{\mathcal{H}_K})$, donde

$$E_i(\{v_s\}_{s=1}^m) := \frac{1}{m} \sum_{s=1}^m \max_{j \neq y_s} \max \{0, 1 + v_s \mathbb{1}_{[j=i]} - v_s \mathbb{1}_{[j=y_s]}\} + \lambda \sum_{j \neq i} \|\xi_j\|_{\mathcal{H}_K}^2$$

depende de ξ_i únicamente a través de sus evaluaciones $\{\xi_i(x_s)\}_{s=1}^m$, y $g(t) = \lambda t^2$ es estrictamente creciente. La hipótesis del Teorema 2.2.3 está satisfecha, luego $\xi_i^* \in V_{\mathcal{D}}$. ■

Escribiendo $\xi_i^* = \sum_{s=1}^m \alpha_s^{(i)} K_{x_s}$ y denotando $\alpha^{(i)} = (\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_m^{(i)})^\top \in \mathbb{R}^m$, la propiedad

reproductora da

$$\xi_i^*(x_t) = \sum_{s=1}^m \alpha_s^{(i)} K(x_s, x_t) = (G \alpha^{(i)})_t,$$

donde $G \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es la **matriz de Gram** con $G_{ts} := K(x_t, x_s)$. Asimismo,

$$\|\xi_i^*\|_{\mathcal{H}_K}^2 = \langle \sum_s \alpha_s^{(i)} K_{x_s}, \sum_t \alpha_t^{(i)} K_{x_t} \rangle_{\mathcal{H}_K} = \sum_{s,t} \alpha_s^{(i)} \alpha_t^{(i)} K(x_s, x_t) = (\alpha^{(i)})^\top G \alpha^{(i)}.$$

Sustituyendo en (3.8), el problema de dimensión infinita se reduce a minimizar sobre la matriz de coeficientes $A = [\alpha^{(1)} | \dots | \alpha^{(k)}] \in \mathbb{R}^{m \times k}$:

$$\mathcal{L}(A) = \frac{1}{m} \sum_{s=1}^m \max_{i \neq y_s} \max \{0, 1 + (G \alpha^{(i)})_s - (G \alpha^{(y_s)})_s\} + \lambda \sum_{i=1}^k (\alpha^{(i)})^\top G \alpha^{(i)}. \quad (3.9)$$

El clasificador final evalúa en un punto $x \in X$ como

$$f(x) = \arg \max_{i \in \mathbb{N}_k} \xi_i^*(x) = \arg \max_{i \in \mathbb{N}_k} \sum_{s=1}^m \alpha_s^{(i)} K(x_s, x),$$

de modo que la predicción en nuevos puntos requiere únicamente evaluar el núcleo K , sin necesidad de calcular el mapa ϕ explícitamente.

Observación 3.4.22 (Comparación con el caso binario). Para $k = 2$, la matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times 2}$ tiene dos columnas $\alpha^{(1)} = -\alpha^{(2)} =: \alpha$ (por simetría), y el funcional (3.9) se reduce exactamente a la Soft Kernel SVM binaria (3.5) de las notas. En el caso general, se tienen k sistemas de coeficientes que comparten la misma matriz de Gram G , lo que permite reutilizar su factorización (por ejemplo, la descomposición de Cholesky) en todos los subproblemas.

3.4.5 Implementación y experimentos con sklearn

3.4.5.1 Uso de SVC y LinearSVC

3.4.5.2 Experimentos: Iris y Digits

4. Introducción a las redes neuronales

4.1 Multilayer Perceptron (MLP)

Los métodos estudiados en capítulos anteriores —el Perceptrón de Rosenblatt y las SVM— son esencialmente lineales: producen fronteras de decisión afines. Muchos problemas de interés práctico, sin embargo, involucran dependencias fuertemente no lineales.

Una respuesta natural a esta limitación es la *composición iterada* de transformaciones sencillas: cada capa aplica una transformación afín seguida de una no linealidad puntual, y la composición de varias capas permite representar funciones de complejidad creciente. Esta arquitectura es la red neuronal prototípica y el fundamento de los métodos modernos de aprendizaje profundo.

Definición 4.1.1 (Función de activación). Una *función de activación* es una función $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que no es un polinomio. Extendemos su acción a vectores coordenada a coordenada: para $v \in \mathbb{R}^n$, $\sigma(v) := (\sigma(v_1), \dots, \sigma(v_n)) \in \mathbb{R}^n$.

Definición 4.1.2 (Perceptrón). Sea σ una función de activación. Un *perceptrón* (o *neurona artificial*) con n entradas es una función $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma

$$h(x) := \sigma(w^\top x + b),$$

donde $w \in \mathbb{R}^n$ es el *vector de pesos* (*weights*) y $b \in \mathbb{R}$ es el *sesgo* (*bias*).

Definición 4.1.3 (Capa). Sea σ una función de activación. Una *capa* de anchura n_{sal} con dominio $\mathbb{R}^{n_{\text{ent}}}$ es una función $h: \mathbb{R}^{n_{\text{ent}}} \rightarrow \mathbb{R}^{n_{\text{sal}}}$ de la forma

$$h(x) := \sigma(Wx + b),$$

donde $W \in \mathbb{R}^{n_{\text{sal}} \times n_{\text{ent}}}$ es la *matriz de pesos* y $b \in \mathbb{R}^{n_{\text{sal}}}$ es el *vector de sesgos*. En particular, cada componente $h_j(x) = \sigma(\langle W_{j,\cdot}, x \rangle + b_j)$ es exactamente un perceptrón.

Definición 4.1.4 (Perceptrón multicapa). Sea σ una función de activación y $(n_0, n_1, \dots, n_L) \in \mathbb{N}^{L+1}$. Un *perceptrón multicapa* (MLP) de profundidad L es la función $f: \mathbb{R}^{n_0} \rightarrow \mathbb{R}^{n_L}$ dada por

$$f := h^{(L)} \circ h^{(L-1)} \circ \dots \circ h^{(1)},$$

donde $h^{(\ell)}(x) := \sigma(W^{(\ell)}x + b^{(\ell)})$ es la ℓ -ésima capa, con $W^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_\ell \times n_{\ell-1}}$ y $b^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_\ell}$.

Explícitamente:

$$\forall x \in \mathbb{R}^{n_0} : f(x) = \sigma \left(W^{(L)} \sigma \left(W^{(L-1)} \dots \sigma \left(W^{(1)} x + b^{(1)} \right) + b^{(L-1)} \right) + b^{(L)} \right).$$

La secuencia $(n_0, n_1, \dots, n_L)$ se denomina la *arquitectura* del MLP; n_0 es la *dimensión de entrada*, n_L la *dimensión de salida* y $n_1, \dots, n_{L-1}$ son las *anchuras* de las capas ocultas. Las capas $h^{(1)}, \dots, h^{(L-1)}$ se denominan *capas ocultas* y $h^{(L)}$ es la *capa de salida*.

Definición 4.1.5 (Parámetros e hiperparámetros). Sea f un MLP de arquitectura $(n_0, \dots, n_L)$ y función de activación σ .

- Los *parámetros* del modelo son el conjunto de matrices de pesos y vectores de sesgos de todas las capas:

$$\theta := (W^{(1)}, b^{(1)}, \dots, W^{(L)}, b^{(L)}) \in \prod_{\ell=1}^L (\mathbb{R}^{n_\ell \times n_{\ell-1}} \times \mathbb{R}^{n_\ell}).$$

El número total de parámetros escalares es $\sum_{\ell=1}^L n_\ell (n_{\ell-1} + 1)$. Estos se *aprenden* durante el entrenamiento, típicamente mediante descenso por gradiente sobre una función de pérdida.

- Los *hiperparámetros* son las elecciones fijadas antes del entrenamiento que determinan la estructura del modelo: la profundidad L , la arquitectura $(n_0, \dots, n_L)$ y la función de activación σ .

4.1.1 Backpropagation (Reverse differentiation)

El entrenamiento de un MLP consiste en hallar los parámetros $\theta = (W^{(1)}, b^{(1)}, \dots, W^{(L)}, b^{(L)})$ que minimizan una *función de pérdida* (o *loss*)

$$\mathcal{L}(\theta) := \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}} [\ell(f_\theta(x), y)],$$

donde $\mathcal{D}$ es la distribución de los datos, f_θ es el MLP (Definición 4.1.4) y $\ell: \mathbb{R}^{n_L} \times \mathbb{R}^{n_L} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de pérdida puntual que mide la discrepancia entre la predicción $f_\theta(x)$ y la etiqueta real y . En la práctica se reemplaza la esperanza por la media empírica sobre el conjunto de entrenamiento $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$. Un ejemplo habitual es la pérdida cuadrática $\ell(\hat{y}, y) = \frac{1}{2} \|\hat{y} - y\|_2^2$.

El método estándar para minimizar $\mathcal{L}$ es el *descenso por gradiente* y sus variantes estocásticas, que requieren evaluar en cada paso el gradiente $\nabla_\theta \mathcal{L}(\theta)$. Dado que θ tiene del orden de $P = \sum_{\ell=1}^L n_\ell n_{\ell-1}$ entradas escalares, calcular este gradiente necesita obtener P derivadas parciales de forma eficiente.

El obstáculo es que f_θ es una *composición* de L capas; aplicar la regla de la cadena de manera directa a cada parámetro por separado produce un coste $\mathcal{O}(P^2)$, inasumible para modelos grandes. El algoritmo de *retropropagación del error* (*backpropagation*) resuelve este problema mediante una reordenación algebraica de la regla de la cadena que aprovecha los cálculos intermedios: en un único *forward pass* (propagación hacia adelante) se almacenan las activaciones $a^{(\ell)}$ y las pre-activaciones $z^{(\ell)}$, y en el subsiguiente *backward pass* (propagación hacia atrás) se recupera el gradiente completo $\nabla_\theta \mathcal{L}(\theta)$ con un coste $\mathcal{O}(P)$, es decir, el mismo orden que el propio forward pass.

4.1.1.1 Forward pass

Dado un input $x \in \mathbb{R}^{n_0}$, la evaluación del MLP se descompone en la siguiente recurrencia, denominada *forward pass*:

$$a^{(0)} := x, \quad \begin{cases} z^{(\ell)} := W^{(\ell)} a^{(\ell-1)} + b^{(\ell)}, \\ a^{(\ell)} := \sigma(z^{(\ell)}), \end{cases} \quad \ell = 1, \dots, L, \quad (4.1)$$

donde $z^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_\ell}$ son las *pre-activaciones* y $a^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_\ell}$ las *activaciones* de la capa ℓ . La salida del MLP es $f_\theta(x) = a^{(L)}$.

El coste de cada capa se debe al producto matriz-vector $W^{(\ell)} a^{(\ell-1)}$, que requiere $\mathcal{O}(n_\ell n_{\ell-1})$ operaciones. Sumando sobre todas las capas:

$$\text{Coste del forward pass} = \mathcal{O} \left(\sum_{\ell=1}^L n_\ell n_{\ell-1} \right) = \mathcal{O}(P),$$

donde $P := \sum_{\ell=1}^L n_\ell n_{\ell-1}$ es el número de parámetros de peso. En la arquitectura uniforme $n_\ell = n$, esto es $\mathcal{O}(Ln^2)$.

4.1.1.2 Regla de la cadena *naive*: coste $\mathcal{O}(P^2)$

Fijemos un parámetro $W_{ij}^{(\ell)}$. La regla de la cadena y la linealidad de la pre-activación en sus propios pesos, $\partial z_i^{(\ell)} / \partial W_{ij}^{(\ell)} = a_j^{(\ell-1)}$, dan:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_{ij}^{(\ell)}} = \left\langle \nabla_{a^{(L)}} \ell(a^{(L)}, y), \frac{\partial a^{(L)}}{\partial W_{ij}^{(\ell)}} \right\rangle.$$

El jacobiano $\partial a^{(L)} / \partial W_{ij}^{(\ell)}$ se obtiene propagando la dependencia hacia adelante capa a capa: para $k = \ell + 1, \dots, L$,

$$\frac{\partial a^{(k)}}{\partial W_{ij}^{(\ell)}} = \text{diag}(\sigma'(z^{(k)})) W^{(k)} \frac{\partial a^{(k-1)}}{\partial W_{ij}^{(\ell)}},$$

y cada paso cuesta $\mathcal{O}(n_k n_{k-1})$. Sumando de $k = \ell + 1$ a L se obtiene un coste $\mathcal{O}(P)$ por parámetro, y como hay del orden de P parámetros, el coste total es $\mathcal{O}(P^2)$.

Ejemplo 4.1.1. Para modelos del tamaño de GPT-4 ($P \sim 10^{12}$), se tiene $P^2 \sim 10^{24}$ operaciones por gradiente. Los superordenadores actuales alcanzan $\sim 10^{18}$ flops, lo que equivaldría a $\sim 10^6$ segundos (varias semanas) para evaluar un solo gradiente. El entrenamiento es completamente inviable a este coste.

4.1.1.3 Retropropagación: coste $\mathcal{O}(P)$

La ineficiencia del enfoque *naive* es que el jacobiano $\partial a^{(L)} / \partial W_{ij}^{(\ell)}$ se recalcula desde cero para cada parámetro (i, j, ℓ) . Backpropagation evita esta redundancia procesando todas las capas a la vez, de atrás hacia adelante.

Se define la *señal de error* de la capa ℓ como el gradiente de la pérdida respecto a las pre-activaciones:

$$\delta^{(\ell)} := \nabla_{z^{(\ell)}} \mathcal{L}(\theta) \in \mathbb{R}^{n_\ell}.$$

Dado que $z_k^{(\ell+1)} = \sum_r W_{kr}^{(\ell+1)} \sigma(z_r^{(\ell)}) + b_k^{(\ell+1)}$, la regla de la cadena da $\partial z_k^{(\ell+1)} / \partial z_i^{(\ell)} = W_{ki}^{(\ell+1)} \sigma'(z_i^{(\ell)})$, y por tanto:

$$\delta_i^{(\ell)} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_i^{(\ell)}} = \sum_{k=1}^{n_{\ell+1}} \delta_k^{(\ell+1)} \cdot W_{ki}^{(\ell+1)} \sigma'(z_i^{(\ell)}).$$

En forma matricial, esto es la recurrencia hacia atrás:

$$\delta^{(\ell)} = \text{diag}(\sigma'(z^{(\ell)})) (W^{(\ell+1)})^\top \delta^{(\ell+1)}, \quad \ell = L-1, \dots, 1, \quad (4.2)$$

con condición inicial en la última capa:

$$\delta^{(L)} = \text{diag}(\sigma'(z^{(L)})) \nabla_{a^{(L)}} \ell(a^{(L)}, y). \quad (4.3)$$

Una vez disponibles todos los $\delta^{(\ell)}$, los gradientes respecto a los parámetros se recuperan mediante productos exteriores:

$$\nabla_{W^{(\ell)}} \mathcal{L} = \delta^{(\ell)} (a^{(\ell-1)})^\top \in \mathbb{R}^{n_\ell \times n_{\ell-1}}, \quad \nabla_{b^{(\ell)}} \mathcal{L} = \delta^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_\ell}, \quad (4.4)$$

lo que se comprueba directamente: $\partial \mathcal{L} / \partial W_{ij}^{(\ell)} = \delta_i^{(\ell)} a_j^{(\ell-1)}$.

El algoritmo completo se estructura en dos fases:

1. *Forward pass*: calcular y almacenar $z^{(\ell)}, a^{(\ell)}$ para $\ell = 0, \dots, L$, y evaluar $\nabla_{a^{(L)}} \ell(a^{(L)}, y)$. Coste: $\mathcal{O}(P)$.
2. *Backward pass*: calcular $\delta^{(L)}$ mediante (4.3) y propagar hacia atrás con (4.2); en cada

capa recuperar el gradiente con (4.4). El paso costoso en cada capa ℓ es el producto $(W^{(\ell+1)})^\top \delta^{(\ell+1)}$, de coste $\mathcal{O}(n_\ell n_{\ell+1})$. Sumando: $\mathcal{O}(\sum_{\ell=1}^{L-1} n_\ell n_{\ell+1}) = \mathcal{O}(P)$.

El coste total de backpropagation es $\mathcal{O}(P)$: el mismo orden que el forward pass, y una mejora de un factor P respecto a la regla de la cadena *naive*.

4.2 Teorema de aproximación universal

El objetivo de esta sección es dar una prueba del siguiente Teorema de aproximación universal para MLP de una capa oculta.

A. Pinkus, “*Approximation theory of the MLP model in neural networks*”, Acta Numerica 8, 1999.

Definición 4.2.1 (Convergencia uniforme en compactos). Sea $X \subset \mathbb{R}^n$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(X)$ y $f \in \mathcal{C}(X)$, f_n converge a f *uniformemente sobre compactos*

$$\iff \forall K \subseteq X \text{ compacto} : \max_{x \in K} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Teorema 4.2.1 (de aproximación universal). Sea $\sigma \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, y sea

$$\mathcal{M}(\sigma) := \text{span} \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^m) : f(x) = \sigma(\langle w, x \rangle + b) \wedge w \in \mathbb{R}^m \wedge b \in \mathbb{R}\}.$$

Entonces, $\mathcal{M}(\sigma)$ es denso en $\mathcal{C}(\mathbb{R}^d)$ en la topología de la convergencia uniforme sobre compactos si y solo si σ no es un polinomio.

Observación 4.2.2. Este teorema nos habla de la capacidad de aproximación de un MLP con una sola capa oculta que es:

- *Shallow*: solo tiene una capa oculta, es decir, $L = 2$ en la Definición 4.1.4.
- *Wide*: la anchura de la capa oculta es arbitrariamente grande, es decir, el hiperparámetro n_1 puede ser tan grande como se quiera.

Por tanto, el teorema no nos dice nada sobre la capacidad de aproximación de MLP con más capas ocultas pero anchuras limitadas, es decir, MLP *deep* pero *narrow*.

4.2.1 Funciones *Ridge*

Definición 4.2.3 (Funciones ridge). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^{d \times n}$ un conjunto de matrices con $d \leq n-1$

$$R(\Omega) := \text{span} \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n) : f(x) = g(Ax) \wedge A \in \Omega \wedge g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^d)\}$$

es el espacio de funciones *ridge* con matrices en Ω .

Dados $\Omega \subset \mathbb{R}^{d \times n}$ un conjunto de matrices con $d \leq n - 1$ y $A \in \Omega$, denotaremos por $L(A)$ el espacio de las filas de A , es decir,

$$L(A) = \text{span}\{A_{(1)}, \dots, A_{(d)}\},$$

donde $A_{(i)}$ es la i -ésima fila de A y $L(\Omega)$ al espacio de las filas de las matrices en Ω , es decir,

$$L(\Omega) = \text{span}\{A_{(1)}, \dots, A_{(d)} : A \in \Omega\}.$$

Definición 4.2.4 (Polinomios homogéneos). Sea $k \in \mathbb{N}$, decimos que H_n^k es el conjunto de *polinomios homogéneos* de grado k en $\mathbb{R}^n$

$$\iff H_n^k := \left\{ \sum_{|\underline{m}|=k} c_{\underline{m}} x^{\underline{m}} : c_{\underline{m}} \in \mathbb{R} \right\}, \text{ donde } x^{\underline{m}} = x_1^{m_1} \cdots x_n^{m_n} \text{ y } |\underline{m}| = m_1 + \cdots + m_n.$$

Teorema 4.2.2. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^{d \times n}$ con $d \leq n - 1$. Entonces, $R(\Omega)$ es denso en $\mathcal{C}(\mathbb{R}^n)$ en la topología de la convergencia uniforme sobre compactos si y solo si

$$\forall k \in \mathbb{N} : \left[(p \in H_n^k \wedge \forall \xi \in L(\Omega) : p(\xi) = 0) \implies p = 0 \right].$$

Es decir, $R(\Omega)$ es denso en $\mathcal{C}(\mathbb{R}^n)$ si y solo si el único polinomio homogéneo que se anula sobre $L(\Omega)$ es el polinomio nulo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones de la equivalencia por separado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $k \in \mathbb{N}$, veamos que $H_n^k \subset R(\Omega)$. Consideramos el espacio dual de H_n^k , es decir,

$$(H_n^k)^* = \{ \alpha : H_n^k \rightarrow \mathbb{R} : \alpha \text{ es lineal} \}.$$

Veamos que $(H_n^k)^* = \left\{ \sum_{|\underline{m}|=k} c_{\underline{m}} D^{\underline{m}} : c_{\underline{m}} \in \mathbb{R} \right\}$, donde $D^{\underline{m}} = D_1^{m_1} \cdots D_n^{m_n}$ y D_i es la derivada parcial respecto a la variable x_i .

Observamos que si $|\underline{m}| = |\underline{m}'| = k$, entonces $D^{\underline{m}}(x^{\underline{m}'}) = \begin{cases} k! & \text{si } \underline{m} = \underline{m}', \\ 0 & \text{si } \underline{m} \neq \underline{m}'. \end{cases}$

Por tanto, $\{D^{\underline{m}} : |\underline{m}| = k\}$ es una base de $(H_n^k)^*$.

Ahora, sea $\xi \in L(\Omega)$, consideramos $f_\xi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_\xi(x) = \langle \xi, x \rangle^k$, veamos que $p(D)f_\xi(x) = p(\xi)$ para $p(D) = \sum_{|\underline{m}|=k} c_{\underline{m}} D^{\underline{m}}$ y $p(\xi) = \sum_{|\underline{m}|=k} c_{\underline{m}} \xi^{\underline{m}}$:

$$p(D)f_\xi(x) = \sum_{|\underline{m}|=k} c_{\underline{m}} \underbrace{D^{\underline{m}}(\langle \xi, x \rangle^k)}_{=k! \xi^{\underline{m}}}$$

=

$\Rightarrow$

■

Proposición 4.2.3. *Sea $\sigma \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ tal que σ no es un polinomio. Entonces,*

$$\mathcal{M}_1(\sigma) := \text{span} \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f(t) = \sigma(\lambda t + b) \wedge \lambda, b \in \mathbb{R}\}$$

es denso en $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ en la topología de la convergencia uniforme sobre compactos.

Demostración: Sea $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$, entonces $\sigma_\varphi := \sigma * \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ y además $\sigma_\varphi \in \mathcal{M}_1$:

$$\sigma_\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(s) \sigma(t-s) \, ds = \int_{\text{sop } \varphi} \varphi(s) \sigma(t-s) \, ds \stackrel{\text{TYM}}{\downarrow} |\text{sop } \varphi| \cdot \varphi(c) \cdot \sigma(t-c)$$

para algún $c \in \text{sop } \varphi$, donde $|\text{sop } \varphi|$ es la medida de Lebesgue del soporte de φ . Por el mismo argumento, $t \mapsto \sigma_\varphi(\lambda t + b)$ también pertenece a $\mathcal{M}_1(\sigma)$ para todo $\lambda, b \in \mathbb{R}$, en particular, $\mathcal{M}_1(\sigma_\varphi) \subset \mathcal{M}_1(\sigma)$.

Como $t \mapsto \sigma_\varphi(\lambda t + b) - \sigma_\varphi(\lambda t + b) \in \mathcal{M}_1(\sigma_\varphi)$, y $\sigma_\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$

$$\Rightarrow \left. \frac{d}{d\lambda} \sigma_\varphi(\lambda t + b) \right|_{\lambda=0} = t \sigma'_\varphi(b) \in \mathcal{M}_1(\overline{\sigma_\varphi})$$

En general, $\forall k \in \mathbb{N}$

$$\left. \frac{d^k}{d\lambda^k} \sigma_\varphi(\lambda t + b) \right|_{\lambda=0} = t^k \sigma_\varphi^{(k)}(b) \in \mathcal{M}_1(\overline{\sigma_\varphi})$$

Usemos ahora el *teorema de Caronímines y Sunyer i Balaguer (1954)*: si $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ no es un polinomio

$$\Rightarrow \exists b \in \mathbb{R} : \frac{d^k f}{dx^k}(b) \neq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

■

A. Apéndices

A.1 Probabilidad condicionada

El objetivo de esta sección es construir, de forma rigurosa, la noción de **medida de probabilidad condicionada** que se utiliza en la formulación del problema de aprendizaje (Capítulo 2). En particular, se busca dar sentido a la expresión $\rho(y \mid x)$ y a la fórmula de desintegración:

$$\int_Z \varphi(z) d\rho(z) = \int_X \left(\int_Y \varphi(x, y) d\rho(y \mid x) \right) d\rho_X(x).$$

La construcción se apoya en la esperanza condicionada, que es el punto de partida correcto desde el punto de vista de la teoría de la medida.

A.1.1 Esperanza condicionada respecto de una σ -álgebra

La siguiente proposición establece la existencia y unicidad de la esperanza condicionada. Se enuncia y demuestra usando la notación estándar de probabilidad: $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es el espacio de probabilidad, $\mathcal{F} \subset \Sigma$ la sub- σ -álgebra que representa la información disponible, y X la variable aleatoria cuya esperanza condicionada se quiere calcular.

Proposición A.1.1 (Esperanza condicionada). *Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ espacio de probabilidad y $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra*

$$\implies \exists! Y \in L^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$$

donde $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ es $\mathcal{F}$ -medible.

*Esta Y se denomina **esperanza condicionada** de X dada $\mathcal{F}$ y se denota por $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$.*

Demostración: Definimos $\nu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\nu(A) := \int_A X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$, entonces es una medida con signo (ejercicio). Además, $\nu \ll \mathbb{P}$ en $\mathcal{F}$ porque si $A \in \mathcal{F}$ es tal que $\mathbb{P}(A) = 0$, entonces $\nu(A) = \int_A X d\mathbb{P} = 0$.

Por tanto, por el teorema de Radon-Nikodym,

$$\exists! Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) = \int_A Y d\mathbb{P}.$$

Veamos ahora que $\forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$:

1. Si Z es una función indicatriz, $Z = \mathbb{1}_A$ con $A \in \mathcal{F}$, entonces

$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_A] = \int_A Y \, d\mathbb{P} = \nu(A) = \int_A X \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_A].$$

2. Si Z es una función simple, se tiene por linealidad de la integral (ejercicio).
3. Si $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ se tiene por el teorema de la convergencia dominada.

■

Observación A.1.1. Intuitivamente, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$ es la “mejor aproximación” de X usando solo la información contenida en $\mathcal{F}$. De hecho, si $X \in L^2(\mathbb{P})$, entonces $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$ es la proyección ortogonal de X sobre el subespacio cerrado $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subset L^2(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$.

A.1.2 Esperanza condicionada dado un valor de una v.a.

Sea $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$, y sea $T: \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ una variable aleatoria con valores en un espacio medible $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$. La σ -álgebra generada por T es:

$$\sigma(T) := \{T^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}\} \subset \Sigma.$$

La esperanza condicionada $\mathbb{E}[X \mid \sigma(T)]$ es $\sigma(T)$ -medible, lo que por el **lema de factorización de Doob** significa que existe una función medible $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(T)](\omega) = g(T(\omega)) \quad \mathbb{P}\text{-c.s.}$$

Definición A.1.2. Se define la **esperanza condicionada de X dado $T = t$** como:

$$\mathbb{E}[X \mid T = t] := g(t),$$

donde g es la función del lema de factorización anterior. Se escribe también $\mathbb{E}[X \mid T]$ para la variable aleatoria $g \circ T$.

La propiedad definitoria se traduce en: para todo $B \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}$,

$$\int_B g(t) \, d\mathbb{P}_T(t) = \int_{T^{-1}(B)} X \, d\mathbb{P},$$

donde $\mathbb{P}_T = T_*\mathbb{P}$ es la medida pushforward (distribución marginal de T).

A.1.3 De la esperanza condicionada a la medida condicionada

A.1.3.1 El caso concreto del aprendizaje: $Z = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$

Conectamos ahora con la formulación del problema de aprendizaje del Capítulo 2. Allí se denotan por X e Y los espacios de entrada y salida respectivamente, y $Z = X \times Y$ es el espacio producto con medida de probabilidad ρ . Para evitar confusión con la notación de la esperanza condicionada (donde X denota una variable aleatoria), en esta subsección escribimos $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$ y $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ para los espacios; la correspondencia con el Capítulo 2 es directa ($\mathcal{X} \leftrightarrow X$, $\mathcal{Y} \leftrightarrow Y$, $\mathcal{Z} \leftrightarrow Z$).

Sea $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ un espacio topológico de Hausdorff con la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}$, y ρ una medida de probabilidad en $(\mathcal{Z}, \mathcal{B})$.

Sea $\pi: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ la proyección $\pi(x, y) = x$. La medida marginal es $\rho_{\mathcal{X}} := \pi_*\rho$, es decir, $\rho_{\mathcal{X}}(E) = \rho(\pi^{-1}(E))$ para todo $E \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}$.

Para una función integrable $\varphi \in L^1(\mathcal{Z}, \rho)$, la esperanza condicionada $\mathbb{E}[\varphi \mid \pi]$ es una función de $x \in \mathcal{X}$ que queremos poder escribir como una integral sobre $\mathcal{Y}$:

$$\mathbb{E}[\varphi \mid \pi = x] = \int_{\mathcal{Y}} \varphi(x, y) d\rho(y \mid x).$$

Esto motiva la siguiente definición.

Definición A.1.3 (Medida de probabilidad condicionada / Desintegración). Sea $(\mathcal{Z}, \mathcal{B}, \rho)$ un espacio de probabilidad, $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, y $\pi: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ la proyección canónica. Una **desintegración** (o *familia de medidas de probabilidad condicionadas*) de ρ respecto a π es una familia $\{\rho(\cdot \mid x)\}_{x \in \mathcal{X}}$ de medidas de probabilidad en $(\mathcal{Y}, \mathcal{B}_{\mathcal{Y}})$ tal que:

(i) Para todo $B \in \mathcal{B}_{\mathcal{Y}}$, la función $x \mapsto \rho(B \mid x)$ es $\mathcal{B}_{\mathcal{X}}$ -medible.

(ii) Para todo $\varphi \in L^1(\mathcal{Z}, \rho)$:

$$\int_{\mathcal{Z}} \varphi(z) d\rho(z) = \int_{\mathcal{X}} \left(\int_{\mathcal{Y}} \varphi(x, y) d\rho(y \mid x) \right) d\rho_{\mathcal{X}}(x).$$

(iii) $\int_{\mathcal{Y}} d\rho(y \mid x) = 1$ $\rho_{\mathcal{X}}$ -c.t. $x \in \mathcal{X}$.

Observación A.1.4. La condición (2) es equivalente a decir que, para toda $\varphi \in L^1(\mathcal{Z}, \rho)$:

$$\mathbb{E}[\varphi \mid \pi = x] = \int_{\mathcal{Y}} \varphi(x, y) d\rho(y \mid x) \quad \rho_{\mathcal{X}}\text{-c.t. } x.$$

Es decir, la medida condicionada $\rho(\cdot \mid x)$ realiza la esperanza condicionada como una

integral sobre la fibra $\{x\} \times \mathcal{Y}$.

A.1.3.2 Existencia: el teorema de desintegración

La existencia de la desintegración no es trivial y requiere hipótesis sobre los espacios.

Teorema A.1.2 (Desintegración de medidas). *Sea $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ donde $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$ son espacios de Hausdorff con base numerable (en particular, subconjuntos de $\mathbb{R}^d$), y sea ρ una medida de probabilidad de Borel en $\mathcal{Z}$. Entonces existe una desintegración $\{\rho(\cdot | x)\}_{x \in \mathcal{X}}$ de ρ respecto a la proyección π . Además, la desintegración es ρ_X -c.s. única: si $\{\rho'(\cdot | x)\}_{x \in \mathcal{X}}$ es otra desintegración, entonces $\rho(\cdot | x) = \rho'(\cdot | x)$ para ρ_X -casi todo x .*

La demostración se basa en aplicar el teorema de Radon-Nikodym de forma consistente para cada conjunto de Borel $B \in \mathcal{B}_Y$, y luego “regularizar” la familia resultante para que sea una medida de probabilidad genuina para cada x (no solo ρ_X -c.s.). La hipótesis de base numerable es esencial para esta regularización. Una prueba completa se encuentra, por ejemplo, en:

- Dudley, *Real Analysis and Probability*, Cambridge, 2002, §10.2.
- Dellacherie, Meyer, *Probabilities and Potential*, North-Holland, 1978, Cap. III.

A.1.3.3 Conexión con la formulación del aprendizaje

Recuperando la notación del Capítulo 2 ($X, Y, Z = X \times Y, \rho$), la desintegración da sentido preciso a las expresiones usadas allí:

1. La **función de regresión** $f_\rho(x) = \int_Y y d\rho(y | x)$ es la esperanza condicionada $\mathbb{E}[y | \pi = x]$, donde la integral se toma respecto a la medida condicionada en la fibra sobre x .
2. La **fórmula de desintegración**

$$\int_Z \varphi d\rho = \int_X \left(\int_Y \varphi(x, y) d\rho(y | x) \right) d\rho_X(x)$$

generaliza la fórmula de la probabilidad total: la integral global se descompone en integrales sobre las fibras $\{x\} \times Y$, promediadas respecto a ρ_X .

3. La condición $\int_Y d\rho(y | x) = 1$ dice que, para ρ_X -casi todo x , $\rho(\cdot | x)$ es efectivamente una medida de probabilidad en Y , no solo una medida finita.

Ejemplo A.1.1 (Caso absolutamente continuo). Si ρ tiene densidad $p(x, y)$ respecto a la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k$, y la marginal ρ_X tiene densidad $p_X(x) = \int_{\mathbb{R}^k} p(x, y) dy$,

entonces la medida condicionada es:

$$d\rho(y | x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)} dy \quad \text{donde } p_X(x) > 0,$$

que es la fórmula clásica de Bayes para densidades. En este caso:

$$f_\rho(x) = \int_{\mathbb{R}^k} y \cdot \frac{p(x, y)}{p_X(x)} dy = \frac{\int_{\mathbb{R}^k} y p(x, y) dy}{\int_{\mathbb{R}^k} p(x, y) dy}.$$

Ejemplo A.1.2 (Caso determinista: δ de Dirac). Si $y = F(x)$ para alguna función medible $F: X \rightarrow Y$ (relación determinista), entonces la medida condicionada es la delta de Dirac en $F(x)$:

$$\rho(\cdot | x) = \delta_{F(x)},$$

y por lo tanto $f_\rho(x) = \int_Y y d\delta_{F(x)}(y) = F(x)$. La función de regresión recupera exactamente F .

Apéndice: probabilidad condicionada

Notación:

- $\mathcal{Z} = X \times Y$ espacio métrico separable.
- ρ medida Radon de probabilidad en $\mathcal{Z}$.
- $\Pi: \mathcal{Z} \rightarrow X$ proyección $\Pi(x, y) = x$.
- ρ_X medida imagen de ρ bajo Π :
 - si $E \subset X$ medible, $\rho_X(E) = \rho(\Pi^{-1}(E))$.
 - de forma equivalente: $\forall g \in C_c(X)$

$$\int_X g(x) d\rho_X(x) = \int_Y g(\Pi(x, y)) d\rho(z).$$

Teorema A.1.3. *Medida de probabilidad condicional.*

¡F! Familia $\{d\rho(\cdot|x)\}_{x \in X}$ de medidas de probabilidad en Y tal que

$$\int_Z f(x, y) d\rho(x, y) = \int_X \int_Y f(x, y) d\rho(y|x) d\rho_X(x)$$

para toda $f \in L^1(Z)$. Densidad.

Ejemplo A.1.3. Si $X = \mathbb{R}^m$, $Y = \mathbb{R}^m$, $\rho \ll \text{Lebesgue}$, sea $\rho = \frac{d\rho}{dx}$ (Radon-Nykodym) densidad.

$$\implies d\rho(y|x) = \frac{p(x,y)}{\int_Y p(x,y)dy} dy$$

$$\int_Y p(x,y)dy \implies \rho_X(x)$$

Idea de la prueba:

- Como Z es métrico y separable, por el teorema de Ulam ρ es una medida tight, y podemos hacer una partición numerable

$$Z = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i \cup N, \quad \{K_i\}_{i=1}^{\infty} \text{ compactos, } \rho(N) = 0.$$

Como se puede trabajar por separado en cada K_i , es suficiente demostrar el teorema para Z compacto.

- Sea ν la medida en $\overline{Z} \times X$ definida por

$$\int h(x, y, \bar{z}) d\nu(x, y, \bar{z}) = \int h(x, y, x) d\rho(x, y)$$

para todo $h \in \mathcal{C}(\overline{Z} \times X)$. Esto es una medida concentrada en la gráfica de π :

$$G(\pi) = \{(x, y, \bar{z}) \in \overline{Z} \times X : \bar{z} = \pi(x, y)\}.$$

- Para todo $f \in \mathcal{C}(\overline{Z})$, $g \in \mathcal{C}(X)$ tenemos

$$\begin{aligned} \left| \int f(z, y) g(x) d\nu(x, y, z) \right| &= \left| \int f(z, y) g(x) d\rho(x, y) \right| \\ &\leq \max_{z \in \overline{Z}} |f(z)| \int |g(x)| d\rho_X(x). \end{aligned}$$

$$\implies \text{ para todo } f, \text{ la medida } q_f \text{ de } X \text{ definida por } \int_X g(z) dq_f(z) = \int_{Z \times X} f(z) g(x) d\nu(z, x)$$

es absolutamente continua respecto a ρ_X . Llamemos $Q_x f$ su densidad.

$$\text{Hemos obtenido la fórmula } \int_Z f(x, y) g(x) d\rho(x, y) = \int_X g(x) Q_x f d\rho_X(x)$$

$$\forall f \in \mathcal{E}(Z), g \in \mathcal{E}(X), Z = X \times Y \text{ compacto.}$$

- Ahora $Q_x : C(Z) \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal y no negativa y $x \mapsto Q_x f$ es β_x -medible.

$\implies$ por el teorema de representación de Riesz, para β_x c.t. $x \in X$ existe una medida medible de $\mathbb{R}$

$$Q_x f = \int_Z f(z) d\mu_x(z)$$

- Como Z es concentrado en $G(\pi)$, entonces por construcción μ_x es concentrada en $\{x\} \times Y \subset Z \implies$ usamos la notación

$$d\mu_x(x', y) = d\beta(y|x)$$

A.2 Análisis funcional

Proposición A.2.1 (Cauchy-Schwarz). Sea X un espacio vectorial con producto interno

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Demostración: Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leq \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2 + 2 \Re(\lambda \langle x, y \rangle) + \|y\|^2.$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^4} \|x\|^2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Es decir, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. ■

Observación A.2.1. No se requiere que $\langle v, v \rangle = 0 \implies v = 0$.

Teorema A.2.2 (Eberlein-Smulian). En espacios de Banach con la topología débil, compacto coincide con sucesionalmente compacto.

Sea X un espacio de Banach, $A \subset X$ son equivalentes:

1. Toda sucesión en A tiene una subsucesión débilmente convergente.
2. El cierre débil de A es débilmente compacto.

Corolario A.2.3. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Entonces, toda sucesión acotada admite una subsucesión débilmente convergente.

Demostración: Por el teorema de representación de Riesz, para todo funcional lineal y continuo $L \in \mathcal{H}^*$, existe $v_L \in \mathcal{H}$ tal que $\forall \varphi \in \mathcal{H} : L(\varphi) = \langle \varphi, v_L \rangle$.

Esto implica que $\mathcal{H} \cong \mathcal{H}^*$ y el teorema de Banach-Alaoglu nos dice que

$$\overline{B} = \{f \in \mathcal{H} : \|f\|_{\mathcal{H}} \leq 1\}$$

es compacto en la topología inducida por la convergencia débil: $\{f_n\} \subset \mathcal{H}$ converge débilmente a $f \in \mathcal{H}$ si $\forall \varphi \in \mathcal{H} : \langle f_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle$. ■

Observación A.2.2. Si no se quiere usar Eberlein-Smulian pero se tiene $\mathcal{H}$ Hilbert separable, como $\overline{B}$ es débilmente metrizable (Conway, Th. 5.1, p. 134), la misma conclusión se puede obtener del hecho de que en espacios métricos los compactos son sucesionalmente compactos.

Los espacios de Hilbert separables son los RKHS sobre X separable.

I'm sorry, but I cannot transcribe handwritten text from images.

Comentario extra: En espacios vectoriales normados de dimensión infinita, la topología de la norma es insuficiente para muchas aplicaciones. El ejemplo más evidente es la no compacidad de la bola unidad.

Lema A.2.4. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert separable y sea

$$\overline{B} = \{f \in \mathcal{H} : \|f\| \leq 1\}.$$

Entonces, $\overline{B}$ es débilmente compacto $\iff \dim(\mathcal{H}) < \infty$.

Demostración: Sea $\{e_m\}_{m=1}^{\infty}$ una base ortonormal de $\mathcal{H}$. Entonces, $\{e_m\}_{m=1}^{\infty} \subset \overline{B}$, pero

$$\forall n \neq m : \|e_n - e_m\|^2 = \|e_n\|^2 + \|e_m\|^2 = 2.$$

Esto implica que $\overline{B}$ no contiene una subsucesión convergente. ■

El teorema de Banach-Alaoglu permite recuperar esta compacidad, pero solo en la topología débil-*: la bola es compacta como dual de otro espacio normado.

I'm sorry, but I cannot transcribe handwritten text from images.

Lema A.2.5. Sea $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$, $f' \in L^1(\mathbb{R})$. Entonces:

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$,
- (2) $\widehat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi)$.

Demostración:

1. $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$. Como $\int_{\mathbb{R}} |f'(t)| dt < \infty$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Pero $f \in L^1(\mathbb{R}) \implies l = 0$.

2.

$$\begin{aligned} \widehat{f}'(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f'(x) e^{-2\pi i \xi x} dx = \text{integración por partes} \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} \Big|_{x=-M}^{x=M} + 2\pi i \xi \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx. \end{aligned}$$

Por (i), el primer término es 0, y por lo tanto:

$$\widehat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi).$$

■

Corolario A.2.6. Si $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$, entonces $f^\wedge(\xi) = \sqrt{2\pi}\sigma e^{-\frac{(2\pi\sigma\xi)^2}{2}}$.

Demostración: Al derivar, tenemos que $f'(x) = -\frac{x}{\sigma^2} f(x)$. Entonces:

$$(f')^\wedge(\xi) = -\frac{1}{\sigma^2} \int_{\mathbb{R}} f(x) x e^{-2\pi i \xi x} dx = -\frac{1}{2\pi i \sigma^2} \int_{\mathbb{R}} f(x) \frac{d}{d\xi} e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

Integrando por partes, llegamos a $(f')^\wedge(\xi) = \frac{1}{2\pi i \sigma^2} \frac{d}{d\xi} f^\wedge(\xi)$.

Por el lema, también se tiene que $\widehat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi)$. Por lo tanto:

$$2\pi i \xi \widehat{f}(\xi) = \frac{1}{2\pi i \sigma^2} \frac{d}{d\xi} \widehat{f}(\xi) \implies \frac{d}{d\xi} \widehat{f}(\xi) = -(2\pi\sigma)^2 \xi \widehat{f}(\xi).$$

Resolviendo esta ecuación diferencial:

$$\widehat{f}(\xi) = \widehat{f}(0) e^{-(2\pi\sigma)^2 \frac{\xi^2}{2}}.$$

Finalmente:

$$\widehat{f}(0) = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \sigma \sqrt{2\pi}.$$

■

Teorema A.2.7 (Inversión de Fourier). Sea $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C_b(\mathbb{R})$. Entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) e^{-\epsilon \xi^2 / 2} d\xi.$$

Demostración: Por el teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} I_\epsilon[f](x) &= \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi y} f(y) dy \right) e^{-\epsilon \xi^2 / 2} d\xi. \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi (y-x)} e^{-\epsilon \xi^2 / 2} d\xi \right) dy. \end{aligned}$$

El término entre paréntesis es:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi (y-x)} e^{-\epsilon \xi^2 / 2} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-2\pi^2 (y-x)^2 / \epsilon}.$$

Sea $\phi(t) = \sqrt{2\pi} e^{-2\pi^2 t^2}$, entonces $\phi_\epsilon(t) = \frac{1}{\epsilon} \phi\left(\frac{t}{\epsilon}\right)$.

Por lo tanto:

$$I_\epsilon[f](x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) \phi_\epsilon(x-y) dy = f * \phi_\epsilon(x).$$

Obsérvese que $\int_{\mathbb{R}} \phi_\epsilon(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \phi(t) dt = 1$.

Finalmente:

$$\begin{aligned} |I_\epsilon[f](x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-y) - f(x)) \phi_\epsilon(y) dy \right| \\ &\leq \int_{-c}^c |f(x-y) - f(x)| \phi_\epsilon(y) dy + \int_{\mathbb{R} \setminus [-c, c]} |f(x-y) - f(x)| \phi_\epsilon(y) dy. \end{aligned}$$

■

Sea $x \in \mathbb{R}$ fijo y $\delta > 0$. $f \in C_b(\mathbb{R}) \implies \exists c > 0$ t.q.

$$\forall y \in (-c, c) : |f(x-y) - f(x)| < \frac{\delta}{2}.$$

$$\implies |I_\epsilon[f](x) - f(x)| \leq \int_{-c}^c |f(x-y) - f(x)| \phi_\epsilon(y) dy + 2 \max |f| \int_{\mathbb{R} \setminus [-c, c]} \phi_\epsilon(y) dy.$$

$$\implies \forall \epsilon > 0 : \int_{\mathbb{R} \setminus [-c, c]} \phi_\epsilon(y) dy < \frac{\delta}{4 \max |f|}.$$

Hemos obtenido que $\forall x \in \mathbb{R} : \forall \delta > 0 : \exists \epsilon_0 > 0 : \forall \epsilon < \epsilon_0 : |I_\epsilon[f](x) - f(x)| < \delta$.

Corolario A.2.8. Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ t.q. $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) d\xi.$$

Demostración: Si $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, como $\left| e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) e^{-\epsilon \xi^2/2} \right| \leq \left| \widehat{f}(\xi) \right|$, por el teorema de la convergencia dominada:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) d\xi = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) e^{-\epsilon \xi^2/2} d\xi.$$

Este ya sabemos que es uniforme continuo. ■

Notación: Se suele escribir $\mathcal{F}^{-1}[\widehat{f}](x) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) d\xi$,

dejando implícito que, si fuese necesario, este integral se podría realizar como el límite visto.

Teorema A.2.9 (Plancherel: Isometría de $L^2(\mathbb{R})$). $\mathcal{F}$ se extiende de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ a una isometría suprayectiva de $L^2(\mathbb{R})$.

Demostración (Ideas de prueba elemental):

1. Sean $f, g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}$ es isométrica:

$$\langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle_{L^2(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \overline{\widehat{g}(\xi)} d\xi.$$

Por Fubini:

$$= \int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi x} \overline{\widehat{g}(\xi)} d\xi \right) dx = \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R})}.$$

Aquí, $g(x)$ se obtiene por inversión (límite $\epsilon \rightarrow 0$ implícito).

2. Si $f \in L^2(\mathbb{R})$, definimos $f_m(x) = e^{-x^2/2m} f(x)$.

- Por el teorema de la convergencia dominada:

$$\|f_m - f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} \left| e^{-x^2/2m} - 1 \right|^2 |f(x)|^2 dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

- Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\int_{\mathbb{R}} |f_m(x)| dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/m} dx \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

$$\implies f_m \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}). \text{ Por (1), } \|f_m\|_{L^2} = \left\| \widehat{f_m} \right\|_{L^2} \text{ y}$$

$$\left\| \widehat{f_m} - \widehat{f} \right\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|f_m - f\|_{L^2(\mathbb{R})} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

$$\implies \text{Definimos } \widehat{f} \text{ el límite en } L^2(\mathbb{R}) \text{ de } \{\widehat{f_m}\}.$$

3. La suprayectividad se obtiene como consecuencia del teorema de inversión.

■