

Numerical Analysis Homework 2

131044009 - Hasan MEN

7 March 2017

1 Apply Gaussian and Jaboci's method (50 points)

Program Usage:

\$/solver -i system.txt -m GESP/JCB

1.1 Use Gaussian Elimination with Scaled Partial Pivoting

1.1.1 Question 6.2-1c

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 5 \quad (1)$$

$$-4x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 14 \quad (2)$$

$$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 8 \quad (3)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} A & b \end{array} \right]^{(1)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 5 \\ -4 & 2 & -6 & 14 \\ 2 & 2 & 4 & 8 \end{array} \right]$$

Find Max values for each lines:

$$S_i = \max_{j=1}^n \|a_{ij}\| \quad (4)$$

$$S_1 = \max\{\|2\|, \|-3\|, \|2\|\} = 3 \quad (5)$$

$$S_2 = \max\{\|-4\|, \|2\|, \|-6\|\} = 6 \quad (6)$$

$$S_3 = \max\{\|2\|, \|2\|, \|4\|\} = 3 \quad (7)$$

Now, find scaled partial pivots of first column to check if need interchanges

$$\max_{i=1}^n \left\{ \frac{\|a_{ij}\|}{S_i} \right\} \quad (8)$$

$$\frac{\|a_{11}\|}{S_1} = 0.666667 \quad (9)$$

$$\frac{\|a_{21}\|}{S_2} = 0.666667 \quad (10)$$

$$\frac{\|a_{31}\|}{S_3} = 0.500000 \quad (11)$$

Maximum pivot index=1. There is no row interchange Now calculate m_{21} and m_{31} to reduce rows

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = -2 \quad (12)$$

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = 1 \quad (13)$$

Apply this operations on matrix:

$$E_2 - m_{21} * E_1 \rightarrow E_2 \quad (14)$$

$$E_3 - m_{31} * E_1 \rightarrow E_3 \quad (15)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} A & b \end{array} \right]^{(2)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & -4 & -2 & 24 \\ 0 & 5 & 2 & 3 \end{array} \right]$$

Now, find scaled partial pivots of second column to check if need interchanges

$$\frac{\|a_{22}\|}{S_2} = 0.666667 \quad (16)$$

$$\frac{\|a_{32}\|}{S_3} = 1.250000 \quad (17)$$

Maximum pivot index=3 and pivot=1.25. Change row 3 with 2.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} A & b \end{array} \right]^{(2)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -2 & 24 \end{array} \right]$$

Now calculate m_{32} to reduce row

$$m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = -2 \quad (18)$$

Apply this operations on matrix:

$$E_3 - m_{32} * E_2 - > E_3 \quad (19)$$

$$[A | b]^{(3)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -0.4 & 26.4 \end{array} \right]$$

Solve matrix with backward substitution.

Results:

$$[X] = [109 \quad 27 \quad -66]^t$$

1.1.2 Question 7.3.1-a

$$3x_1 - 1x_2 + 1x_3 = 1 \quad (20)$$

$$3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \quad (21)$$

$$3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4 \quad (22)$$

$$[A | b]^{(1)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 7 & 4 \end{array} \right]$$

Find Max values for each lines:

$$S_i = \max_{i=1}^n \|a_{ij}\| \quad (23)$$

$$S_1 = \max\{\|3\|, \| -1\|, \|1\|\} = 3 \quad (24)$$

$$S_2 = \max\{\|3\|, \|6\|, \|2\|\} = 6 \quad (25)$$

$$S_3 = \max\{\|3\|, \|3\|, \|7\|\} = 7 \quad (26)$$

Now, find scaled partial pivots of first column to check if need interchanges

$$\max_{i=1}^n \left\{ \frac{\|a_{ij}\|}{S_i} \right\} \quad (27)$$

$$\frac{\|a_{11}\|}{S_1} = 1.000000 \quad (28)$$

$$\frac{\|a_{21}\|}{S_2} = 0.500000 \quad (29)$$

$$\frac{\|a_{31}\|}{S_3} = 0.428571 \quad (30)$$

Maximum pivot index=1 and pivot=1.0. There is no row interchange Now calculate m_{21} and m_{31} to reduce rows

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 1 \quad (31)$$

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = 1 \quad (32)$$

Apply this operations on matrix:

$$E_2 - m_{21} * E_1 - > E_2 \quad (33)$$

$$E_3 - m_{31} * E_1 - > E_3 \quad (34)$$

$$[A | b]^{(2)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 6 & 3 \end{array} \right]$$

Now, find scaled partial pivots of second column to check if need interchanges

$$\frac{\|a_{22}\|}{S_2} = 1.166667 \quad (35)$$

$$\frac{\|a_{32}\|}{S_3} = 0.571429 \quad (36)$$

Maximum pivot index=2 and pivot=1.166667. No Row Change

Now calculate m_{32} to reduce row

$$m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = 0.571429 \quad (37)$$

Apply this operations on matrix:

$$E_3 - m_{32} * E_2 - > E_3 \quad (38)$$

$$[A | b]^{(3)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5.429 & 3.571 \end{array} \right]$$

Solve matrix with backward substitution.

Results:

$$[X] = [0.0351 \quad -0.2368 \quad 0.6579]^t$$

1.1.3 Question 7.3.1-b

$$10x_1 - x_2 + 0 = 9 \quad (39)$$

$$-x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 7 \quad (40)$$

$$0 - 2x_2 + 10x_3 = 6 \quad (41)$$

$$[A \mid b]^{(1)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -1 & 0 & 9 \\ -1 & 10 & -2 & 7 \\ 0 & -2 & 10 & 6 \end{array} \right]$$

Find Max values for each lines:

$$S_i = \max_{j=1}^n \|a_{ij}\| \quad (42)$$

$$S_1 = \max\{\|10\|, \|-1\|, \|0\|\} = 10 \quad (43)$$

$$S_2 = \max\{\|-1\|, \|10\|, \|-2\|\} = 10 \quad (44)$$

$$S_3 = \max\{\|0\|, \|-2\|, \|10\|\} = 10 \quad (45)$$

Now, find scaled partial pivots of first column to check if need interchanges

$$\max_{i=1}^n \left\{ \frac{\|a_{ij}\|}{S_i} \right\} \quad (46)$$

$$\frac{\|a_{11}\|}{S_1} = 1.000000 \quad (47)$$

$$\frac{\|a_{21}\|}{S_2} = 0.100000 \quad (48)$$

$$\frac{\|a_{31}\|}{S_3} = 0.000000 \quad (49)$$

Maximum pivot index=1 and pivot=1.0. There is no row interchange.

Now calculate m_{21} and m_{31} to reduce rows

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = -0.1 \quad (50)$$

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = 0 \quad (51)$$

Apply this operations on matrix:

$$E_2 - m_{21} * E_1 \rightarrow E_2 \quad (52)$$

$$E_3 - m_{31} * E_1 \rightarrow E_3 \quad (53)$$

$$[A \mid b]^{(2)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -1 & 0 & 9 \\ 0 & 9.9 & -2 & 7.9 \\ 0 & -2 & 10 & 6 \end{array} \right]$$

Now, find scaled partial pivots of second column to check if need interchanges

$$\frac{\|a_{22}\|}{S_2} = 0.990000 \quad (54)$$

$$\frac{\|a_{32}\|}{S_3} = 0.200000 \quad (55)$$

Maximum pivot index=2 and pivot=0.990000. No Row Change

Now calculate m_{32} to reduce row

$$m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = 0.202020 \quad (56)$$

Apply this operations on matrix:

$$E_3 - m_{32} * E_2 \rightarrow E_3 \quad (57)$$

$$[A \mid b]^{(3)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -1 & 0 & 9 \\ 0 & 9.9 & -2 & 7.9 \\ 0 & 0 & 9.596 & 7.596 \end{array} \right]$$

Solve matrix with backward substitution.

Results:

$$[X] = [0.9958 \quad 0.9579 \quad 0.7916]^t$$

1.2 Use Jacobi's Method

2 Image Registration (50 Points)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

B(x,y)=[1,2],[2,1],[3,1]

F(x',y')=[2,2],[-1,4],[-4,4]

$$A * B = F : \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A * B^1 = F^1 : \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Multiply matrix A and B^1

$$a_{11} + 2a_{12} + a_{13} = 2 \quad (58)$$

$$a_{21} + 2a_{22} + a_{23} = 2 \quad (59)$$

$$A * B^2 = F^2 : \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Multiply matrix A and B^2

$$2a_{11} + a_{12} + a_{13} = -1 \quad (60)$$

$$2a_{21} + a_{22} + a_{23} = 4 \quad (61)$$

$$A * B^3 = F^3 : \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Multiply matrix A and B^3

$$3a_{11} + a_{12} + a_{13} = -4 \quad (62)$$

$$3a_{21} + a_{22} + a_{23} = 4 \quad (63)$$

Combine equation 58, 60 and 62 to find a_{11} , a_{12} and a_{13} unknowns

$$[H \mid h] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & -4 \end{array} \right]$$

Combine equation 59, 61 and 63 to find a_{21} , a_{22} and a_{23} unknowns

$$[G \mid g] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

Step 0. Let's apply gauss elimination to find unknowns for H .

Step 1. Find m_{21} and m_{31} to eliminate 1st column.

$$m_{21} = \frac{H_{21}}{H_{11}} = \frac{2}{1} = 2 \quad (64)$$

$$m_{31} = \frac{H_{31}}{H_{11}} = \frac{3}{1} = 3 \quad (65)$$

$$H_2 - m_{21} * H_1 -> H_2 \quad (66)$$

$$H_3 - m_{31} * H_1 -> H_3 \quad (67)$$

$$[H \mid h]^1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & -5 & -2 & -10 \end{array} \right]$$

Step 2: Pivot=2, eliminate 2nd column

$$m_{32} = \frac{H_{32}}{H_{22}} = \frac{-5}{-3} = 1.6667 \quad (68)$$

$$H_3 - m_{32} * H_2 -> H_3 \quad (69)$$

$$(70)$$

$$[H \mid h]^2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -0.333 & -1.665 \end{array} \right]$$

Step 3: Solve H^2 with backward substitution.

$$h_1 = a_{11} = -3 \quad (71)$$

$$h_2 = a_{12} = 0 \quad (72)$$

$$h_3 = a_{13} = 5 \quad (73)$$

Step 4. Let's apply gauss elimination to find unknowns for G .

Step 5. Find m_{21} and m_{31} to eliminate 1st column.

$$m_{21} = \frac{G_{21}}{G_{11}} = \frac{2}{1} = 2 \quad (74)$$

$$m_{31} = \frac{G_{31}}{G_{11}} = \frac{3}{1} = 3 \quad (75)$$

$$G_2 - m_{21} * G_1 -> G_2 \quad (76)$$

$$G_3 - m_{31} * G_1 -> G_3 \quad (77)$$

$$[G \mid g]^1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & -2 & -2 \end{array} \right]$$

Step 6: Pivot=2, eliminate 2nd column

$$m_{32} = \frac{G_{32}}{G_{22}} = \frac{-5}{-3} = 1.6667 \quad (78)$$

$$G_3 - m_{32} * G_2 \rightarrow G_3 \quad (79)$$

$$(80)$$

$$[G \mid g]^2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.333 & -2 \end{array} \right]$$

Step 7: Solve G^2 with backward substitution.

$$g_1 = a_{21} = 0 \quad (81)$$

$$g_2 = a_{22} = -2 \quad (82)$$

$$g_3 = a_{23} = 6 \quad (83)$$

A matrix is:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lastly, we need to find **inverse of matrix A** (A^{-1}) to transform **F** to **B**.