




МОЯ АДРЕНАЛИНОВАЯ ПЕТЛЯ

Материал к Уроку 2.1

Суть ПППГ — это замкнутый цикл, который вы сами подпитываете своим страхом. Наша задача — увидеть этот цикл, найти точку входа и разорвать круг.

Как работает петля (Теория):



Ключевой факт: Адреналин сгорает в крови за 3-5 минут. Если вы НЕ подбрасываете новые пугающие мысли, паника обязательно утихнет сама. Вы не можете бояться вечно — это физиологически невозможно.

Заполните свою личную петлю:

1. Событие (Триггер)

Что произошло? Какое безобидное изменение запустило цепочку? - Примеры: встал со стула, зашел в торговый центр, поплыла картинка перед глазами, увидел мелькающий свет, повернул голову, кто-то толкнул в толпе.

Мой типичный триггер: _____

2. Мысль (Мгновенная оценка)

Что вы подумали в этот момент? Какая "пугалка" проскочила в голове? - Примеры: "Ну вот, опять!", "Сейчас упаду прямо здесь", "Я умираю", "Мне станет плохо и никто не поможет", "Я схожу с ума", "У меня инсульт".

Моя мысль-триггер №1: _____ **Моя мысль-триггер №2:** _____ **Моя мысль-триггер №3:** _____

3. Реакция тела

Что произошло в теле ПОСЛЕ этой мысли? (Не до, а именно после!) - Примеры: сердце заколотилось, руки стали ледяными, ком в горле, ноги стали ватными, бросило в жар, потемнело в глазах, дыхание стало поверхностным.

Мое тело ответило так: _____

4. Результат (Усиление симптома)

Как физическая реакция повлияла на шаткость/головокружение? - Примеры: из-за адреналина мышцы шеи спазмировались еще сильнее, сосуды сузились, и шаткость реально усилилась. Дыхание стало частым → гипервентиляция → покалывание в пальцах и ощущение "нереальности".

Итог (как усилился симптом): _____

5. Мое действие (Бегство)

Что вы сделали, чтобы "спастись"? - Примеры: убежал домой, сел на пол, позвонил близким в панике, начал гуглить симптомы, выпил таблетку.

Я сделал: _____

 Как РАЗОРВАТЬ петлю:

Где разрываем	Что делаем
На этапе мысли	Ловим её: "Это не факт, это просто мысль. Мозг пугает меня, но я в безопасности".
На этапе адреналина	Позволяем ему прогореть: "Ок, адреналин. Сгорай. У тебя 3-5 минут".
На этапе действия	НЕ убегаем! Остаемся на месте. Каждый побег подтверждает мозгу, что опасность была реальной.

Упражнение на неделю:

В следующий раз, когда "накроет", попробуйте НЕ действовать на автопилоте. Вместо этого: 1. Скажите себе: "О, пошла петля. Я вижу её. Сейчас сгорит адреналин и всё пройдет". 2. Засеките время на телефоне. Убедитесь, что через 3-5 минут паника реально спадает. 3. Запишите это наблюдение. Каждое такое наблюдение — это кирпичик нового "хайвея спокойствия" в мозге.

Курс по ПППГ - Твой путь к стабильности