



Ácido Acetilsalicílico (AAS) 100mg

Clopidogrel 75mg

Dinitrato de isossorbida 5mg (sublingual)

Metoprolol 25mg

Captopril 25mg

Atorvastatina 40mg



Após identificada dor tipo A com IAMCSST:

Morfina (diluir 10mg - 1ml - em 9ml de SF 0,9%) e aplicar 2ml 5/5min * **

É indicada sua administração rotineira em pacientes com saturação de **Oxigênio** < 94%, congestão pulmonar ou na presença de desconforto respiratório.

Nitrato Isossorbida 5mg sublingual, repetir a cada 5min se persistir dor ** ****

AAS 150-325 mg VO mastigado, manter 75-100mg/dia indefinidamente

B-block Metoprolol 25-100mg/dia iniciar dose baixa e manter indefinidamente***

IECA Captopril 25mg

Clopidogrel 300mg (600mg para pacientes que vão fazer CATE e 75mg p/ < 75 anos)

* Novos estudos mostram que há uma inibição dos antiagregante plaquetário inibidor da P2Y12, alternativa é Dipirona 1g 6/6h

** Não deve ser usado em SST de parede inferior

*** Contraindicações: Frequência cardíaca < 60 bpm; pressão sistólica < 100 mmHg; intervalo PR > 0,24 s; BAV de 2o ou 3o graus; asma ou DPOC não compensadas; doença vascular periférica grave; classe Killip ≥ II.

**** Perguntar pelo uso de vasodilatadores para hipertensão pulmonar/disfunção erétil nas últimas 48h (tadalafila)