



## PRESCRIÇÃO MÉDICA

# R<sub>x</sub>

PARA

Enterite viral em pediatria

### Utilizar

- ☐ SIM ☐ NÃO
1. Pedialyte Max® (Uva, Maçã ou Guaraná) ..... 1 frasco (500ml)  
Uso: Ingerir, via oral, \_\_\_\_\_ ml após episódio de vômito/diarreia
- ☐ SIM ☐ NÃO
2. Sulfato de Zinco 4mg/mL ..... 1 frasco  
Uso: Ingerir, via oral, \_\_\_\_\_ ml 1x ao dia, por 10 dias. <6m 10mg/dia >6m 20mg/dia
- ☐ SIM ☐ NÃO
3. Saccharomyces cerevisiae 50mi/ml ..... 1 caixa  
Uso: Ingerir, via oral, 1 flaconete de 5ml 12/12h por 3 dias
- ☐ SIM ☐ NÃO
4. Paracetamol 200mg/mL ..... 1 frasco  
Uso: Ingerir, via oral, \_\_\_\_\_ gotas 6/6h por 3 dias. Máx 4.000mg/5,6 gotas/kg/75 mg/kg/dia
- ☐ SIM ☐ NÃO
5. Dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina 25 + 5mg/ml ... 1 frasco  
Uso: Ingerir, via oral, \_\_\_\_\_ gotas 4/4h, 10min antes das refeições ou se necessário, ou seja, se náusea ou vômito. Max. 320 gotas/400mg/dia
- ☐ SIM ☐ NÃO
6. Prednisolona 3mg/mL ..... 1 frasco  
Uso: Ingerir, via oral, \_\_\_\_\_ ml, pela manhã, por 5 dias
- ☐ SIM ☐ NÃO
7. Hidroxizina 2mg/mL ..... 1 frasco  
Uso: Ingerir, via oral, \_\_\_\_\_ ml, 6/6h por \_\_\_\_\_ dias 1/4ml/kg/dose

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



GOVERNO  
DO TRABALHO  
E DO PROGRESSO