

Lecture 13: May 29th, 2017

Lecturer: Alan Arroyo Guevara

Notes By: Harsh Mistry

13.1 Recurrences

We reduced our counting problems about finding coefficients as

$$[x^n] \frac{2x^2 - 6x + 8}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

Problem 13.1 *Find :*

$$[x^n] \frac{2x^3 - 6x + 8}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

Solution using partial fractions:

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 6x + 8}{x^3 - x^2 - x + 1} &= [x^n] \left(2 + \frac{3}{x+1} - \frac{1}{(x-1)} + \frac{2}{(x-1)^2} \right) \\ &= [x^n] \left(2 + \frac{3}{x-(-1)} - \frac{1}{(x-1)} + \frac{2}{(x-1)^2} \right) \\ &= [x^n] \left(2 + 3 \sum_{m \geq 0} (-x)^m + \sum_{m \geq 0} x^m + 2 \sum_{m \geq 0} \binom{m+2-1}{2-1} x^m \right) \\ &= [x^n] \left(2 + 3 \sum_{m \geq 0} (-1)^m x^m + \sum_{m \geq 0} x^m + 2 \sum_{m \geq 0} (m+1) x^m \right) \\ &= \begin{cases} 2 + 3(-1)^0 + 1 + 2(0+1) & , n = 0 \\ 3(-1)^n + 1 + 2(n+1) & , n \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Problem 13.2 *Use the recurrence method to find :*

$$[x^n] \frac{2x^3 - 6x + 8}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

Solution using recurrence method :

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 6x + 8}{x^3 - x^2 - x + 1} &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots \\ \iff 8 - 6x + 2x^3 &= (1 - x + x^2 + x^3)(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots) \\ \implies a_0 + (a_1 - a_0)x + (a_2 - a_1 - a_0)x^2 &+ (a_3 - a_2 - a_1 + a_0)x^3 + (a_1 - a_3 - a_2 + a_1)x^4 \end{aligned}$$