#### USACO 2018년 1월 대회 Platinum, 2018년 1월 19-22일

## 문제 1. 구조원

입력 파일: lifeguards.in 출력 파일: lifeguards.out

시간 제한: 2 seconds 메모리 제한: 256 megabytes

농부 존은 소들을 위해 수영장을 열어서 수영이 소들을 편안하게 만들어 주고 우유를 더 많이 만드는지를 알아보려고 한다.

안전을 보장하기 위해, 그는 N마리의 소를 구조원으로 고용해서, 각 소가 연속된 시간 구간 동안 일을 하도록 만들었다. 문제를 간단하게 만들기 위해서 수영장은 단위 시간 0에서 단위 시간  $10^9$ 까지 열고, 각시간은 일하는 시작 시간과 끝 시간을 의미하는 두 정수로 나타내어 진다. 예를 들어, t=4 부터 t=7 까지 일하는 구조원은 3 단위 시간 동안 일한다. (여기서, 각 시간은 "점" 임에 유의하여라.)

불행하게도, 농부 존은 K마리의 구조원을 예산을 초과해서 고용해 버렸다. 그가 정확히 K마리의 구조원을 해고하여 수영장을 운영할 수 있는 시간의 최댓값을 구하여라. 여기서 어떤 시간에 수영장을 운영하기 위해서는 적어도 한 마리의 소가 일을 하고 있어야 한다.

### 입력 형식

첫째 줄에는 정수 N과 K가 주어진다.  $(K \le N \le 100,000,1 \le K \le 100)$ . 다음 N개의 줄의 각 줄에는 구조원의 일하는 시작 시간과 끝 시간을 나타내는 0 이상  $10^9$  이하의 두 정수가 주어진다. 모든 시간은 서로 다르다. 서로 다른 구조원의 시간은 겹칠 수 있다.

### 출력 형식

농부 존이 K마리의 구조원을 해고 했을 때, 농부 존이 수영장을 운영할 수 있는 시간의 최댓값을 구하여라.

## 예제

lifeguards.in	lifeguards.out
3 2	12
1 8	
7 15	
2 14	

## 참고 사항

이 예제에서, 농부 존은 1...8과 7...15시간을 담당하는 구조원을 해고해야 한다.

## 문제 2. 황야의 소

입력 파일: atlarge.in 출력 파일: atlarge.out 시간 제한: 4 seconds 메모리 제한: 256 megabytes

궁지에 몰린 베시는 농장이의 지하로 도망갔다. 농장은 N개의  $(2 \le N \le 7 \cdot 10^4)$  외양간으로 되어있고, N-1 개의 농장을 서로 양방향으로 잇는 터널이 있어서, 각 쌍의 외양간을 잇는 유일한 경로가 있다. 단 하나의 터널이 연결되어 있는 외양간을 출구라고 한다. 아침이 밝아오면, 베시는 어떤 외양간으로 나와서 출구로 가려고 노력 할 것이다.

하지만 베시가 어떤 외양간으로 나오는 순간, 위치를 알 수 있게 된다. 그래서 농부들은 출구로 부터 시작해서, 베시를 잡으려고 노력할 것이다. 농부들은 베시와 같은 속도로 움직인다. (한 단위시간 마다, 각 농부는 어떤 외양간에서 다른 외양간으로 갈 수 있다.) 농부들은 베시가 어디있는지 항상 알고 있고, 베시는 농부들이 어디 있는지 항상 알 고 있다. 농부들이 베시를 잡는 순간은 농부 중 하나가 같은 외양간에 있거나, 베시와 같은 터널을 지나던 중에 만난 때 이다. 역으로, 베시는 잡히기 전에 출구 중 하나로 도망치면 된다.

베시는 어떤 외양간으로 나와야 할 지 확실하지 않다. N개의 각 외양간에 베시가 있는 경우에 대해, 농부들을 최적으로 배치 할 때 몇 명이 있어야 베시를 잡을 수 있는지 구하여라.

### 입력 형식

첫째 줄에는 세 정수 N이 주어진다.

다음 N-1개의 줄에는 1 이상 N 이하의 두 정수가 주어진다. 이는 외양간을 잇는 터널을 의미한다.

### 출력 형식

N개의 줄을 출력하여라. i번째 줄은 i번째 외양간에서 베시가 나왔을 때 베시를 잡기 위한 최소의 농부의 수이다.

#### 제하

atlarge.in	atlarge.out
7	3
1 2	1
1 3	3
3 4	3
3 5	3
4 6	1
5 7	1

#### USACO 2018년 1월 대회 Platinum, 2018년 1월 19-22일

# 문제 3. 스프링클러

입력 파일: standingout.in 출력 파일: standingout.out

시간 제한: 2 seconds 메모리 제한: 256 megabytes

농부 존은 자기가 가지고 있는 황야의 일부에 옥수수를 심으려는 계획을 하고 있다. 황야를 조사한 이후에, 농부 존은 이것이 (N-1)(N-1) 격자라는 것을 알아냈다. 남서쪽 끝은 좌표가 (0,0), 북동쪽 끝은 좌표가 (N-1,N-1) 이다.

어떤 정수 좌표에 양방향 스프링클러가 있어서, 한쪽 방향으로는 물, 다른 방향으로는 비료를 뿌린다. (i,j)에 있는 스프링클러는 자기보다 북쪽이면서 동쪽인 부분에 물을, 자기보다 남쪽이면서 서쪽인 부분에 비료를 뿌린다. 엄밀히 말하면,  $N-1 \le x \le i$ 와  $N-1 \le y \le j$ 를 만족하는 모든 (x,y)에 물을,  $0 \le x \le i$ ,  $0 \le y \le j$ 를 만족하는 모든 (x,y)에 비료를 뿌린다.

농부 존은 축에 정수 좌표인 축에 평행한 직사각형에 옥수수를 심고 싶다. 하지만, 옥수수가 자라기 위해서는 모든 직사각형이 물과 비료가 둘 다 뿌려져 있어야 한다. 또한, 직사각형의 넓이는 양수여야 한다. 그래야 농부 존이 옥수수를 심을 수 있다!

농부 존을 도와서 옥수수를 기를 수 있는 넓이가 양수인 직사각형의 갯수를 구하여라. 이 수가 매우 클 수 있으니  $10^9+7$ 로 나눈 나머지를 출력하여라.

### 입력 형식

첫째 줄에는 황야 크기를 나타내는 N  $(1 \le N \le 10^5)$ 이 주어진다. 다음 N개의 각 줄에는 두 정수가 주어진다. 이 수가 i와 j이면  $(0 \le i, j \le N-1)$  이는 스프링클러가 (i,j)에 위치 해 있따는 것을 의미한다.

각 행과 각 열에 스프링클러가 정확히 하나씩 존재하는 것이 보장되어 있다. 즉, 어떤 두 스프링클러도 같은 x좌표를 같지 않으며, 같은 y좌표를 같지 않는다.

### 출력 형식

출력은 정수 하나이다. 물과 비료가 둘 다 뿌려진 넓이가 양수인 직사각형의 갯수를  $10^9+7$ 로 나눈 나머지를 출력하여라.

#### 예제

standingout.in	standingout.out
5	21
0 4	
1 1	
2 2	
3 0	
4 3	