

# VNU-HUS MAT3500: Toán rời rạc

## Lý thuyết đồ thị II

Đường đi ngắn nhất, Đồ thị phẳng, Tô màu đồ thị

Hoàng Anh Đức

Bộ môn Tin học, Khoa Toán-Cơ-Tin học  
Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội  
[hoanganhduc@hus.edu.vn](mailto:hoanganhduc@hus.edu.vn)



# Nội dung



## Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

### Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

### Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

### Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

### Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản


Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

Bảy cây cầu ở Königsberg



Hình: Leonhard Euler  
1707–1783 (Wikipedia)



Hình: Bản đồ Königsberg cũ (Wikipedia)

## Bảy cây cầu ở Königsberg

Tìm một tuyến đường đi qua mỗi cây cầu chính xác một lần và quay lại vị trí xuất phát

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

2

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị


Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản


Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton


Bảy cây cầu ở Königsberg



(a) Bản đồ Königsberg cũ (Wikipedia)



(b) Bản đồ Königsberg cũ đơn giản hóa



(c) Đồ thị tương ứng

## ■ Đồ thị tương ứng:

- Mỗi vùng đất ứng với một đỉnh
- Mỗi cây cầu nối hai vùng đất ứng với một cạnh

## ■ Tìm chu trình đơn trong đồ thị chứa tất cả các cạnh

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

3

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng




# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Euler



Cho đồ thị  $G = (V, E)$ . Một **đường đi/chu trình Euler (Eulerian path/circuit)** trong  $G$  là một đường đi/chu trình đơn có chứa mọi cạnh của  $G$

## Ví dụ 1



- $G_1$  có chu trình Euler,  $G_2$  và  $G_3$  không có
- $G_2$  có đường đi Euler,  $G_3$  không có

## Bài tập 1

Chứng minh rằng nếu  $G = (V, E)$  là một đa đồ thị vô hướng thỏa mãn  $\deg_G(u) \geq 2$  với mọi  $u \in V$  thì  $G$  có một chu trình đơn

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

4 Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Euler



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

### Định lý 1: [Euler 1736]; [Hierholzer and Wiener 1873]

*Một đa đồ thị vô hướng liên thông có một chu trình Euler khi và chỉ khi mỗi đỉnh của đồ thị có bậc chẵn*

## Chứng minh.

( $\Rightarrow$ ) Giả sử một đa đồ thị vô hướng liên thông  $G = (V, E)$  có một chu trình Euler  $e_1, e_2, \dots, e_m$  trong đó  $e_i = x_{i-1}x_i \in E$  với  $1 \leq i \leq m$  và  $x_0 = x_m = u$ .

- Với  $v = x_i$  ( $2 \leq i \leq m-1$ ): chu trình đi vào  $v$  qua  $e_i$  và đi ra qua  $e_{i+1}$
- Với  $u = x_0 = x_m$ : chu trình đi ra  $u$  qua  $e_1$  và trở lại  $u$  qua  $e_m$



5

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Euler




## Chứng minh (tiếp).

( $\Leftarrow$ ) Giả sử mọi đỉnh của  $G$  đều có bậc chẵn. Lặp lại quá trình chọn chu trình sau cho đến khi đã chọn hết các cạnh (**Thuật toán Hierholzer (1873)**)

- Xuất phát từ đỉnh  $x_0 = a$  bất kỳ
- Xây dựng một đường đi đơn bằng cách chọn tùy ý các cạnh  $x_0x_1, x_1x_2, \dots, x_{k-1}x_k$  để thêm vào đường đi cho đến khi không chọn được nữa
- Do bậc của mỗi đỉnh là chẵn, với mỗi đỉnh  $x_i$ , ta luôn có thể đi vào từ cạnh  $x_{i-1}x_i$  và đi ra từ cạnh  $x_ix_{i+1}$ . Do bậc của  $a$  cũng phải là chẵn, cạnh cuối cùng được chọn sẽ có dạng  $ya$
- Bỏ đi các cạnh đã chọn và các đỉnh không kề với các cạnh còn lại

Cuối cùng, ghép các chu trình trên thành một chu trình Euler.  
(Thuật toán chạy trong thời gian  $O(|E|)$ )



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

6

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng


# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Euler



## Ví dụ 2

Tìm chu trình Euler trong đồ thị sau



- Bắt đầu từ  $x_0 = a$ , chọn tùy ý các cạnh  $x_0x_1, x_1x_2, \dots, x_{k-1}x_k, x_k a$ . Ví dụ: **ae, ef, fi, ij, jh, hg, gd, db, ba**
- Bỏ đi các cạnh đã chọn và các đỉnh  $a, j$
- Bắt đầu từ  $x_0 = c$ , chọn tùy ý các cạnh  $x_0x_1, x_1x_2, \dots, x_{l-1}x_l, x_l c$ . Ví dụ: **cb, be, ei, ih, hk, kg, gf, fd, dc**
- Bỏ đi các cạnh đã chọn và các đỉnh cô lập còn lại
- Ghép hai chu trình đã chọn thành một chu trình Euler:
  - **ae, ei, ih, hk, kg, gf, fd, dc, cb, be, ef, fi, ij, jh, hg, gd, db, ba**
  - **ae, ef, fd, dc, cb, be, ei, ih, hk, kg, gf, fi, ij, jh, hg, gd, db, ba**
  - ...

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

7

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng




## Đường đi Euler



Với những giá trị nào của  $n$  thì các đồ thị sau có chu trình Euler?

- (a)  $K_n$  (c)  $W_n$   
 (b)  $C_n$  (d)  $Q_n$

Tìm chu trình Euler trong đồ thị sau



## Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

8

### Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

## Bài toán đường đi ngắn nhất

Đỗ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đề thi phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thi

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Euler



### Định lý 2

Một đa đồ thị vô hướng liên thông  $G$  có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler khi và chỉ khi có đúng hai đỉnh của  $G$  có bậc lẻ.

## Chứng minh.

( $\Rightarrow$ ) Giả sử  $G$  có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler

- Hai đỉnh ở hai đầu mút của đường đi có bậc lẻ
- Các đỉnh còn lại có bậc chẵn

( $\Leftarrow$ ) Giả sử  $G$  có chính xác hai đỉnh bậc lẻ  $u, v$

- Tìm chu trình Euler của đồ thị  $G + uv$
- Xóa cạnh  $uv$  trong chu trình để thu được đường đi Euler trong  $G$

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

9

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng



# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Euler






Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

### Bài tập 4

Hãy xác định xem các đồ thị sau có chu trình/đường đi Euler hay không? Nếu có, hãy tìm một chu trình/đường đi Euler trong đồ thị đó



10

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng


# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Euler



### Bài tập 5

Thuật toán Fleury [Fleury 1883] xây dựng các chu trình Euler bằng cách đầu tiên chọn một đỉnh tùy ý của một đa đồ thị liên thông, và sau đó tạo thành một chu trình bằng cách chọn các cạnh liên tiếp. Một khi một cạnh được chọn, nó sẽ bị loại bỏ. Các cạnh được chọn liên tiếp sao cho mỗi cạnh bắt đầu từ nơi cạnh cuối cùng kết thúc, và sao cho cạnh này không phải là một cạnh cắt trừ khi không có lựa chọn thay thế nào khác. Sử dụng thuật toán Fleury để tìm một chu trình Euler trong đồ thị sau



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

11

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Euler



Tương tự, đối với đồ thị có hướng  $G = (V, E)$ , một **đường đi/chu trình Euler (Eulerian path/circuit)** trong  $G$  là một đường đi/chu trình đơn có hướng chứa mọi cạnh của  $G$

### Định lý 3

*Một đa đồ thị có hướng liên thông mạnh có chu trình Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của đồ thị có bậc vào bằng bậc ra*

- Điều kiện “liên thông mạnh” có thể được thay bằng “liên thông yếu” (**Tại sao?**)

### Định lý 4

*Một đa đồ thị có hướng liên thông yếu có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler khi và chỉ khi có đúng hai đỉnh  $u, v$  của  $G$  sao cho  $\deg^-(u) = \deg^+(u) + 1$  và  $\deg^-(v) = \deg^+(v) - 1$*

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

12 Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị


Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

Trò chơi “Vòng quanh thế giới” (1857)



**Hình:** Sir William Rowan Hamilton 1805-1865 (Wikipedia)



**Hình:** Trò chơi “Vòng quanh thế giới” (Wikipedia)

## Trò chơi “Vòng quanh thế giới”

Mỗi đỉnh trong 20 đỉnh của khối 12 mặt đại diện cho một thành phố. Tìm đường đi xuất phát từ một đỉnh dọc theo các cạnh của khối, ghé thăm mỗi đỉnh còn lại một lần, và quay lại vị trí ban đầu

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

13

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

Trò chơi “Vòng quanh thế giới” (1857)



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski


Tô màu đồ thị

Giới thiệu


Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

14



(a) Trò chơi “Vòng quanh thế giới”  
(Wikipedia)



(b) Đồ thị đẳng cấu với khối 12 mặt  
(Wikipedia)

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

Cho  $G = (V, E)$  là một đồ thị vô hướng gồm  $n \geq 1$  đỉnh


- Một **đường đi Hamilton** trong  $G$  là một đường đi đơn

$x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$  thỏa mãn điều kiện  $V = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$   
và  $x_i \neq x_j$  với  $0 \leq i < j \leq n-1$

- Một **chu trình Hamilton** trong  $G$  là một chu trình đơn


$x_0, x_1, x_{n-1}, x_0$  thỏa mãn điều kiện  $x_0, x_1, x_{n-1}$  là một  
đường đi Hamilton

### Ví dụ 3



Đường đi Hamilton

$x_5, x_0, x_1, x_2, x_3, x_4$



Chu trình Hamilton

$x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_0$

15

69




# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



### Ví dụ 4 (Bài toán quân mã đi tuần (Knight's tour))

**Quân mã (knight)** là một quân cờ có thể di chuyển hai ô theo chiều ngang và một ô theo chiều dọc, hoặc một ô theo chiều ngang và hai ô theo chiều dọc trên bàn cờ. Nghĩa là, một quân mã tại ô  $(x, y)$  có thể di chuyển đến một trong tám ô  $(x \pm 2, y \pm 1)$ ,  $(x \pm 1, y \pm 2)$ , nếu những ô này nằm trên bàn cờ, như được minh họa dưới đây



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

16

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

## Ví dụ 4 (tiếp)

- **Đường đi tuần của quân mã (knight's tour)** là một chuỗi các nước đi hợp lệ của quân mã bắt đầu từ một ô nào đó và thăm mỗi ô đúng một lần  $\Leftrightarrow$  **đường đi Hamilton** trong đồ thị tương ứng
- Đường đi tuần được gọi là **khép kín (reentrant)** nếu có một nước đi hợp lệ đưa quân mã từ ô cuối cùng trở lại ô xuất phát  $\Leftrightarrow$  **chu trình Hamilton** trong đồ thị tương ứng
- Có thể mô hình hóa bằng cách sử dụng đồ thị:
  - Một đỉnh cho mỗi ô trên bàn cờ
  - Một cạnh nối hai đỉnh nếu quân mã có thể di chuyển hợp lệ giữa hai ô tương ứng với các đỉnh đó

17

69

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler


Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị


Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng



(a) Bàn cờ  $5 \times 5$  với một vài bước nhảy của quân mã



(b) Mô hình đồ thị tương ứng

**Hình:** Một số bước đi của quân mã trên bàn cờ  $5 \times 5$  và các cạnh tương ứng trên đồ thị được mô tả. Quân mã xuất phát từ góc dưới cùng bên trái (ô  $(0, 0)$ ). Mũi tên với nét liền (nét đứt) thể hiện quân mã nhảy (không nhảy được) được từ ô ban đầu đến ô kế tiếp

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

## Bài tập 6

- (a) Vẽ đồ thị biểu diễn các nước đi hợp lệ của quân mã trên bàn cờ  $3 \times 3$
- (b) Vẽ đồ thị biểu diễn các nước đi hợp lệ của quân mã trên bàn cờ  $3 \times 4$

## Bài tập 7

Chứng minh rằng đồ thị biểu diễn các nước đi hợp lệ của quân mã trên bàn cờ kích thước  $m \times n$ , với mọi số nguyên dương  $m$  và  $n$ , là đồ thị hai phần

19

69

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng




20

69

- Chưa có một thuật toán trong thời gian đa thức để kiểm tra xem một đồ thị có chu trình Hamilton hay không
- Một số tính chất có thể được sử dụng để chỉ ra một đồ thị không có chu trình Hamilton
  - Đồ thị có chứa đỉnh bậc 1 không có chu trình Hamilton
  - Nếu đỉnh  $v$  của đồ thị  $G$  có bậc 2 thì hai cạnh kề với  $v$  thuộc mọi chu trình Hamilton của  $G$  (nếu có)
  - Một chu trình Hamilton không chứa một chu trình con nào có số đỉnh nhỏ hơn nó

## Bài tập 8

Các đồ thị sau có chu trình/đường đi Hamilton không?



# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

## Bài tập 9

Hãy cho ví dụ về một đồ thị mà chu trình Euler của nó cũng là chu trình Hamilton

## Bài tập 10

Một thông báo chẩn đoán (diagnostic message) có thể được gửi qua mạng máy tính để thực hiện kiểm tra trên tất cả các liên kết và trong tất cả các thiết bị. Loại đường đi nào nên được sử dụng để kiểm tra tất cả các liên kết? Để kiểm tra tất cả các thiết bị?

21

69




# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



### Bài tập 11

Đồ thị nào sau đây có chu trình Hamilton? Tại sao?



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

22

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



### Định lý 5: Định lý Dirac

Nếu  $G = (V, E)$  là một đơn đồ thị vô hướng gồm  $n$  đỉnh ( $n \geq 3$ ) thỏa mãn điều kiện bậc của mỗi đỉnh trong  $G$  lớn hơn hoặc bằng  $n/2$  thì  $G$  có một chu trình Hamilton

## Bài tập 12 ((\*) Chứng minh Định lý Dirac)

- (a) Dễ thấy Định lý đúng với  $n = 3$ . Giả sử  $n \geq 4$
- (b)  $G$  phải liên thông (Tại sao?)
- (c) Gọi  $P = v_0, v_1, \dots, v_k$  là đường đi đơn có độ dài lớn nhất trong  $G$  ( $0 \leq k \leq n - 1$ ).
  - Mọi đỉnh kề với  $v_0$  hoặc  $v_k$  đều phải thuộc  $P$  (Tại sao?)
  - Do  $\deg(v_k) \geq n/2$ , có ít nhất  $n/2$  cạnh phân biệt  $v_i v_{i+1}$  của  $P$  thỏa mãn  $v_i v_k \in E$ . Tương tự, do  $\deg(v_0) \geq n/2$ , có ít nhất  $n/2$  cạnh phân biệt  $v_j v_{j+1}$  của  $P$  thỏa mãn  $v_0 v_{j+1} \in E$
  - Do  $P$  có ít hơn  $n$  cạnh, tồn tại một cạnh  $v_q v_{q+1}$  thỏa mãn đồng thời hai điều kiện trên:  $v_q v_k \in E$  và  $v_0 v_{q+1} \in E$
- (d)  $P$  chứa tất cả các đỉnh của  $G$  (Tại sao?)

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

23

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng



# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

### Định lý 6: Định lý Ore

Nếu  $G = (V, E)$  là một đơn đồ thị vô hướng gồm  $n$  đỉnh ( $n \geq 3$ ) thỏa mãn điều kiện  $\deg(u) + \deg(v) \geq n$  với mọi cặp đỉnh  $u, v$  không kề nhau trong  $G$  thì  $G$  có một chu trình Hamilton

## Bài tập 13

Chứng minh Định lý Dirac (Định lý 5) bằng cách sử dụng Định lý Ore

## Bài tập 14 (★)

Cho  $G = (V_1 \cup V_2, E)$  là một đồ thị hai phần với  $|V_1| = |V_2| = n$  ( $n \geq 2$ ). Chứng minh rằng nếu  $\deg(v) > n/2$  với mọi đỉnh  $v \in V = V_1 \cup V_2$  thì  $G$  có một chu trình Hamilton (**Gợi ý:** Xem lại chứng minh của Định lý Dirac.)

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

24

69

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu





Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

## Bài tập 15

Với mỗi đồ thị sau, hãy xác định

- (i) có thể sử dụng Định lý Dirac để chứng minh đồ thị có chu trình Hamilton không?
- (ii) có thể sử dụng Định lý Ore để chứng minh đồ thị có chu trình Hamilton không?
- (iii) đồ thị có chu trình Hamilton không?



25

69

# Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

## Đường đi Hamilton



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị


Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

## Bài tập 16

Chứng minh rằng đồ thị sau đây không có chu trình Hamilton.  
(**Gợi ý:** Đồ thị đã cho là một đồ thị hai phần)



26

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

27

Đồ thị có trọng số


Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng



**Hình:** Đồ thị có trọng số mô tả giá vé của các chuyến bay giữa một số thành phố ở Mỹ (từ [Rosen 2012], Chương 10)

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

28

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

Cho  $G = (V, E, w)$  là đơn đồ thị có trọng số

- Một đường đi từ  $u$  đến  $v$  qua các cạnh (cung)  $e_1, e_2, \dots, e_n$

có **độ dài (length)**  $c(u, v) = \sum_{i=1}^n w(e_i)$

- **Khoảng cách (distance)** giữa hai đỉnh  $u, v$ , ký hiệu  $d_G(u, v)$ , là chiều dài nhỏ nhất của một đường đi từ  $u$  đến  $v$

## Bài toán đường đi ngắn nhất

- **Input:** Đơn đồ thị vô hướng  $G = (V, E, w)$  trong đó  $V = \{v_0 = a, v_1, \dots, v_n = z\}$ ,  $w : [V]^2 \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$  với  $w(v_i, v_j) = \infty$  nếu  $v_i v_j \notin E$
- **Output:** Khoảng cách  $d_G(a, z)$

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

29

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

- Thuật toán Dijkstra tìm khoảng cách từ *một đỉnh* đến tất cả các đỉnh khác
  - Trọng số dương
- Thuật toán Floyd (hay thuật toán Floyd-Warshall) tìm khoảng cách giữa *mọi cặp đỉnh* trong đồ thị
  - Trọng số có thể âm
  - Đồ thị không có chu trình có tổng trọng số âm

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra




## Bài toán đường đi ngắn nhất

- **Input:** Đơn đồ thị vô hướng  $G = (V, E, w)$  trong đó  $V = \{v_0 = a, v_1, \dots, v_n = z\}$ ,  $w : [V]^2 \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$  với  $w(v_i, v_j) = \infty$  nếu  $v_i v_j \notin E$
- **Output:** Khoảng cách  $d_G(a, z)$

## Thuật toán Dijkstra:

- **Điều kiện:** *Trọng số dương*, nghĩa là  $w(v_i, v_j) > 0$  với mọi  $0 \leq i < j \leq n$  (hay  $w : [V]^2 \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{\infty\}$ )
- **Ý tưởng:** Tìm đường đi ngắn nhất từ  $a$  tới các đỉnh kế tiếp cho đến khi đạt đến  $z$ . Chú ý rằng với các đỉnh  $a, b, c$ , *độ dài đường đi ngắn nhất từ  $a$  đến  $c$  đi qua đỉnh  $b$  sẽ bằng khoảng cách giữa  $a$  và  $b$  cộng với trọng số cạnh nối  $b$  và  $c$*



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

30

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

31

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

*“Làm thế nào để tìm được một con đường ngắn nhất để đi từ Rotterdam đến Groningen, hay nói chung: từ một thành phố đến một thành phố khác? Bằng cách sử dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất, một thuật toán mà tôi đã thiết kế trong khoảng hai mươi phút. Một buổi sáng, tôi đang mua sắm ở Amsterdam cùng với vợ sắp cưới, và khi mệt mỏi, chúng tôi ngồi xuống một quán cà phê để uống một tách cà phê, và tôi chỉ đang nghĩ về việc liệu tôi có thể trả lời được câu hỏi này không, và sau đó tôi đã thiết kế thuật toán tìm đường đi ngắn nhất. Như tôi đã nói, đó là một phát minh chỉ trong có hai mươi phút. Nó được xuất bản vào năm 1959, ba năm sau đó. Bài báo vẫn còn đọc được, và trên thực tế, nó khá hay. Một trong những lý do khiến nó hay đến vậy là vì tôi đã thiết kế nó mà không cần bút và giấy. Sau này tôi mới biết rằng một trong những lợi ích của việc thiết kế mà không cần bút và giấy là bạn gần như buộc phải tránh tất cả những sự phức tạp không cần thiết.”*

— Edsger W. Dijkstra, trong một cuộc phỏng vấn với Philip L. Frana, *Communications of the ACM*, 2001



# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

32

Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

## Thuật toán 1: Thuật toán Dijkstra [Dijkstra 1959]

**Input:** Đơn đồ thị vô hướng  $G = (V, E, w)$  trong đó

$$V = \{v_0 = a, v_1, \dots, v_n = z\}, w : [V]^2 \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{\infty\}$$

với  $w(v_i, v_j) = \infty$  nếu  $v_i v_j \notin E$

**Output:** Khoảng cách  $d_G(a, z)$

```
1  Gán nhãn  $L(a) := 0, L(v_i) := \infty$  với mọi  $v_i \neq a$ 
2   $S := \emptyset$ 
3  while  $z \notin S$  do
4       $u :=$  đỉnh không thuộc  $S$  với  $L(u)$  nhỏ nhất
5       $S := S \cup \{u\}$ 
6      for  $v \notin S$  do
7          if  $L(u) + w(u, v) < L(v)$  then
8               $L(v) := L(u) + w(u, v)$ 
9  return  $L(z)$ 
```

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị


Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

## Ví dụ 5

Sử dụng thuật toán Dijkstra để tìm khoảng cách giữa hai đỉnh  $a$  và  $z$  trong đồ thị sau







33

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

34

Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị



Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

35

Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị



Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

## Bài tập 17

Áp dụng thuật toán Dijkstra để tìm khoảng cách từ  $a$  đến  $z$  trong mỗi đồ thị sau




# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra



## Bài tập 18

Tìm độ dài đường đi ngắn nhất từ  $a$  đến  $z$  trong đồ thị sau bằng thuật toán Dijkstra



## Bài tập 19

Đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của một đồ thị có trọng số  $G = (V, E, w)$  có phải là duy nhất hay không nếu như trọng số của các cạnh là phân biệt, nghĩa là với hai cạnh  $e, f \in E$  bất kỳ thì  $w(e) \neq w(f)$ ?

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

36

Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Dijkstra



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

- **Tính đúng đắn:** [Dijkstra 1959]
- **Độ phức tạp:**  $O(n^2)$ , với  $n = |V|$ 
  - Với cấu trúc dữ liệu “đồng Fibonacci” (Fibonacci Heap), thuật toán Dijkstra có thể được lập trình để chạy trong thời gian  $O(m + n \log n)$ , với  $n = |V|$  và  $m = |E|$
  - Hiệu quả tốt khi chạy với các “đồ thị thưa” (sparse graph) cực lớn (các đồ thị có  $m$  rất nhỏ so với  $n^2$ )
- Thuật toán Dijkstra cũng có thể được lập trình để xuất ra một đường đi ngắn nhất từ  $a$  đến mỗi đỉnh khác trong đồ thị
- Một cách tiếp cận tìm đường đi khác là thuật toán  $A^*$  [Hart, Nilsson, and Raphael 1968], thuật toán này mở rộng và cải tiến thuật toán Dijkstra. Thuật toán  $A^*$  sử dụng heuristic để định hướng việc tìm kiếm, từ đó đạt hiệu năng tốt hơn

37

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd



## Thuật toán Floyd:

### ■ Lịch sử:

- Được phát triển bởi Robert W. Floyd vào năm 1962 [Floyd 1962]
- Tuy nhiên, nó về cơ bản giống với các thuật toán đã được công bố trước đó bởi Bernard Roy vào năm 1959 [Roy 1959] và cũng bởi Stephen Warshall vào năm 1962 [Warshall 1962] để tìm bao đóng bắc cầu (transitive closure) của đồ thị

### ■ Điều kiện:

- Trọng số có thể âm
- *Không có chu trình có tổng trọng số âm*

### ■ Ý tưởng:

- Xét đường đi từ  $v_j$  đến  $v_k$  chỉ qua các đỉnh  $\{v_0, v_1, \dots, v_i\}$
- Nếu đường đi từ  $v_j$  đến  $v_k$  qua  $v_i$  ngắn hơn đường đi hiện tại, ta cập nhật khoảng cách

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra

38

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd



## Thuật toán 2: Thuật toán Floyd [Floyd 1962]

**Input:** Đơn đồ thị vô hướng  $G = (V, E, w)$  trong đó  
 $V = \{v_0 = a, v_1, \dots, v_n = z\}$ ,  $w : [V]^2 \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$  với  
 $w(v_i, v_j) = \infty$  nếu  $v_i v_j \notin E$ , và  $G$  không có chu trình  
có tổng trọng số âm

**Output:** Khoảng cách  $d_G(v_i, v_j)$  với mọi  $0 \leq i < j \leq n$

```
1 for i := 0 to n do
2   for j := 0 to n do
3     d(v_i, v_j) := w(v_i, v_j)
4 for i := 0 to n do
5   for j := 0 to n do
6     for k := 0 to n do
7       if d(v_j, v_i) + d(v_i, v_k) < d(v_j, v_k) then
8         d(v_j, v_k) := d(v_j, v_i) + d(v_i, v_k)
9 return {d(v_i, v_j) | i, j ∈ {0, 1, ..., n}}
```

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

39

69



# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd: Ví dụ



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra


Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng



Hình: Đồ thị ví dụ cho thuật toán Floyd

40

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd: Khởi tạo



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

- Khởi tạo ma trận khoảng cách  $d(v_i, v_j) = w(v_i, v_j)$ :

$d$	$v_0$	$v_1$	$v_2$	$v_3$
$v_0$	0	3	$\infty$	5
$v_1$	3	0	2	4
$v_2$	$\infty$	2	0	1
$v_3$	5	4	1	0

- Các giá trị  $\infty$  cho biết không có cạnh trực tiếp nối hai đỉnh
- Thuật toán sẽ xét lần lượt các đỉnh trung gian  $i$  từ  $v_0$  đến  $v_3$

41

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd: Lặp với  $i = 0$  ( $v_0$ )



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

- Xét  $v_0$  làm đỉnh trung gian, kiểm tra  $d(v_j, v_0) + d(v_0, v_k) < d(v_j, v_k)$ ?
- Không có cải thiện khoảng cách khi xét  $v_0$  làm đỉnh trung gian

$d$	$v_0$	$v_1$	$v_2$	$v_3$
$v_0$	0	3	$\infty$	5
$v_1$	3	0	2	4
$v_2$	$\infty$	2	0	1
$v_3$	5	4	1	0

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd: Lặp với  $i = 1$  ( $v_1$ )



Lý thuyết đồ thị II


Hoàng Anh Đức

- Xét  $v_1$  làm đỉnh trung gian, kiểm tra  $d(v_j, v_1) + d(v_1, v_k) < d(v_j, v_k)$ ?

- Tìm được cải thiện:

$$d(v_0, v_1) + d(v_1, v_2) = 3 + 2 = 5 < \infty = d(v_0, v_2)$$

$d$	$v_0$	$v_1$	$v_2$	$v_3$
$v_0$	0	3	5	5
$v_1$	3	0	2	4
$v_2$	5	2	0	1
$v_3$	5	4	1	0



43

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd: Lặp với  $i = 2$  ( $v_2$ )



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức


- Xét  $v_2$  làm đỉnh trung gian, kiểm tra

$$d(v_j, v_2) + d(v_2, v_k) < d(v_j, v_k)?$$

- Tìm được cải thiện:

$$d(v_1, v_2) + d(v_2, v_3) = 2 + 1 = 3 < d(v_1, v_3) = 4$$

$d$	$v_0$	$v_1$	$v_2$	$v_3$
$v_0$	0	3	5	5
$v_1$	3	0	2	3
$v_2$	5	2	0	1
$v_3$	5	3	1	0



44

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd: Lặp với  $i = 3$  ( $v_3$ )



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

- Xét  $v_3$  làm đỉnh trung gian, kiểm tra  $d(v_j, v_3) + d(v_3, v_k) < d(v_j, v_k)$ ?
- Không có cải thiện khoảng cách khi xét  $v_3$  làm đỉnh trung gian

$d$	$v_0$	$v_1$	$v_2$	$v_3$
$v_0$	0	3	5	5
$v_1$	3	0	2	3
$v_2$	5	2	0	1
$v_3$	5	3	1	0

- Ma trận khoảng cách cuối cùng cho kết quả khoảng cách giữa mọi cặp đỉnh

45

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd: Phân tích



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

- **Tính đúng đắn:** [Floyd 1962]
- **Độ phức tạp:**  $O(n^3)$  với  $n = |V|$
- **Ưu điểm:**
  - Tìm khoảng cách giữa mọi cặp đỉnh
  - Có thể xử lý đồ thị có cạnh trọng số âm (không có chu trình âm)
- **Nhược điểm:**
  - Chậm hơn thuật toán Dijkstra khi chỉ cần tìm đường đi từ một nguồn
- Thuật toán có thể mở rộng để tìm đường đi ngắn nhất (không chỉ khoảng cách)

46

69

# Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán Floyd: Câu hỏi



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và

Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị


Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

## Bài tập 20

Áp dụng thuật toán Floyd để tìm khoảng cách giữa mọi cặp đỉnh trong đồ thị sau:



47

69



# Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

48

Định nghĩa và khái niệm



Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

- Một đồ thị vô hướng được gọi là **đồ thị phẳng (planar graph)** nếu nó có thể được vẽ trên mặt phẳng sao cho không có hai cạnh nào cắt nhau (ở một điểm không phải là đầu mút của cạnh).
- Hình vẽ như thế được gọi là một **biểu diễn phẳng (planar representation)** của đồ thị.

## Ví dụ 6






69

## Ví dụ 7 ( $K_{3,3}$ không là đồ thị phẳng)

Ta chứng minh bằng phản chứng.  
Giả sử  $K_{3,3}$  là đồ thị phẳng.

- Trong bất kỳ biểu diễn phẳng nào của  $K_{3,3}$  ta có  $v_1$  và  $v_2$  đều phải luôn nối với  $v_4$  và  $v_5$ . Các đỉnh này chia mặt phẳng thành hai miền  $R_1$  và  $R_2$ .
- Đỉnh  $v_3$  thuộc  $R_1$  hoặc  $R_2$ .
- Vị trí của  $v_6$ ?



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng


49 Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị


Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

## Bài tập 21


Tìm một biểu diễn phẳng của các đồ thị phẳng sau



$G_1$




$G_2$




$G_3$

## Bài tập 22


Các đồ thị sau có phải đồ thị phẳng không? Nếu đúng, hãy vẽ một biểu diễn phẳng của đồ thị đó



$G_1$



$G_2$



$G_3$

# Đồ thị phẳng

## Công thức Euler




- Biểu diễn phẳng của một đồ thị phẳng  $G = (V, E)$  chia mặt phẳng thành các **miền (region)**, kể cả **miền vô hạn (unbounded region)**
- Hai điểm bất kỳ trong cùng một miền có thể được nối với nhau bằng một nét liền mà không cắt bất kỳ cạnh nào
- **Bậc (degree)** của một miền  $f$ , ký hiệu  $\deg(f)$ , là số cạnh của  $G$  trên biên của  $f$

## Ví dụ 8

Biểu diễn phẳng của  $K_4$

- chia mặt phẳng thành 4 miền  $f_1, f_2, f_3$ , và  $f_4$ ; và
- $\deg(f_1) = \deg(f_2) = \deg(f_3) = \deg(f_4) = 3$



- **Chú ý:**  $\sum_{\text{miền } f \text{ của } G} \deg(f) \leq 2|E|$  (Mỗi cạnh thuộc tối đa hai miền)

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton  
Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất  
Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng  
Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị  
Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

51

69



## Định lý 7: Công thức Euler

Giả sử  $G$  là một đơn đồ thị phẳng và liên thông gồm  $m$  cạnh,  $n$  đỉnh, và  $r$  miền. Ta có  $n - m + r = 2$

## Chứng minh.

- Xây dựng dãy đồ thị  $G_1, G_2, \dots, G_m = G$ 
  - Chọn một cạnh bất kỳ của  $G$  làm  $G_1$
  - $G_i$  được tạo thành từ  $G_{i-1}$  bằng cách thêm một cạnh bất kỳ liên thuộc với một đỉnh của  $G_{i-1}$  ( $i \in \{2, 3, \dots, m\}$ )
  - Gọi  $n_i, m_i, r_i$  lần lượt là số đỉnh, cạnh, và miền của một biểu diễn phẳng của  $G_i$
- Công thức Euler đúng với mọi  $G_i$ 
  - Ta có  $n_1 - m_1 + r_1 = 2 - 1 + 1 = 2$
  - Giả sử công thức Euler đúng với  $G_i$ , tức là  $n_i - m_i + r_i = 2$   
Gọi  $a_{i+1}b_{i+1}$  là cạnh thêm vào  $G_i$  để tạo thành  $G_{i+1}$ . Có hai khả năng:
    - một trong hai đỉnh  $a_{i+1}, b_{i+1}$  không thuộc  $G_{i-1}$
    - cả  $a_{i+1}$  và  $b_{i+1}$  thuộc  $G_{i-1}$

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và

Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

52

69



## Hệ quả 8

*Giả sử  $G$  là một đồ thị phẳng liên thông gồm  $m$  cạnh và  $n$  đỉnh ( $n \geq 3$ ). Khi đó,  $m \leq 3n - 6$ . Thêm vào đó, nếu  $m = 3n - 6$  thì mỗi miền của  $G$  có chính xác 3 cạnh trên biên.*

## Chứng minh.

- Nhận xét rằng mỗi miền của  $G$  có ít nhất 3 cạnh trên biên, do đó 
$$\sum_{\text{miền } f \text{ của } G} \deg(f) \geq 3r.$$
 Mặt khác, ta cũng có

$$\sum_{\text{miền } f \text{ của } G} \deg(f) \leq 2m. \text{ Suy ra } 3r \leq 2m.$$

- Áp dụng công thức Euler, ta có  $2 = n - m + r \leq n - m + 2m/3$ , suy ra  $m \leq 3n - 6$ .



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

53

69



## Bài tập 23

Giả sử  $G$  là một đồ thị đơn phẳng và liên thông gồm 20 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc 3. Một biểu diễn phẳng của  $G$  chia mặt phẳng thành bao nhiêu miền?

## Bài tập 24

Trong số các đồ thị không phẳng sau, đồ thị nào thỏa mãn điều kiện sau: nếu bỏ đi một đỉnh bất kỳ và các cạnh liên thuộc với đỉnh đó thì ta thu được một đồ thị phẳng.

- (a)  $K_5$  (c)  $K_{3,3}$   
(b)  $K_6$  (d)  $K_{3,4}$

## Bài tập 25

Chứng minh  $K_5$  không là đồ thị phẳng

## Bài tập 26

Chứng minh rằng nếu  $G$  là một đơn đồ thị phẳng và liên thông thì  $G$  có một đỉnh có bậc nhỏ hơn hoặc bằng 5

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và

Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản


Tô màu đồ thị phẳng

54


69

- Cho đồ thị  $G$ . Một **phép phân chia (subdivision)** một cạnh  $e$  của  $G$  được thực hiện bằng cách thay thế  $e$  bằng một đường đi đơn
- Hai đồ thị  $G_1$  và  $G_2$  được gọi là **đồng phôi (homeomorphic)** nếu chúng được xây dựng từ cùng một đồ thị thông qua một dãy các phép phân chia


## Ví dụ 9



$G$



$G_1$



$G_2$

### Định lý 9: Định lý Kuratowski

$G$  là đồ thị phẳng khi và chỉ khi nó không chứa bất kỳ đồ thị nào đồng phôi với  $K_5$  hoặc  $K_{3,3}$

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và

Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

55

69





Có thể hình dung định lý Kuratowski một cách sơ lược như sau:

- Chúng ta biết hai đồ thị không phẳng, đó là  $K_{3,3}$  và  $K_5$ . Do đó, đương nhiên bất kỳ đồ thị nào chứa những đồ thị này đều không phải là đồ thị phẳng
- Thực tế, bất kỳ đồ thị nào chứa cấu trúc có hình dạng cơ bản giống như hai đồ thị trên đều không phẳng (liên quan đến các khái niệm phép phân chia (subdivision) và đồng phôi (homeomorphic))
- Hơn nữa, mọi đồ thị không phẳng đều chứa một trong hai “hình dạng xấu” này. Đây là cách duy nhất để một đồ thị trở thành không phẳng

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler

56

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

# Đồ thị phẳng

## Định lý Kuratowski



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd



Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler

Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng



**Hình:** Đồ thị Petersen có chứa một đồ thị con đồng phôi với  $K_{3,3}$  và do đó không phải là đồ thị phẳng

57

69


Hoàng Anh Đức

Đường đi Hamilton

Định lý Kuratowski

## Giới thiệu

Tổ màu đỏ thi phẳng




69

# Tô màu đồ thị

## Giới thiệu



Ghi chép sớm nhất về bài toán tô màu đồ thị có lẽ là vào năm 1852 khi Francis Guthrie (1831–1899), lúc đó là một sinh viên ở Đại học Cao đẳng London (University College London), tô màu một bản đồ các quận của Anh và nhận ra là có lẽ chỉ cần bốn màu để tô màu bản đồ sao cho hai quận liền kề nhau có màu khác nhau



### Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

#### Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

#### Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

#### Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

#### Tô màu đồ thị

59

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

# Tô màu đồ thị

Giới thiệu



- Phỏng đoán của Guthrie được cho là phát biểu đầu tiên của **Định lý bốn màu (Four Color Theorem)**

## Định lý 10: Định lý bốn màu

Với mọi đồ thị phẳng  $G$ , ta luôn có  $\chi(G) \leq 4$

- Năm 1879, Kempe đề xuất một chứng minh cho Định lý bốn màu. Khoảng 10 năm sau đó, Heawood chỉ ra lỗi sai trong chứng minh của Kempe và chỉnh sửa lại chứng minh của Kempe để chỉ ra rằng năm màu là đủ để tô màu bất kỳ đồ thị phẳng nào
- Năm 1976, Kenneth Appel and Wolfgang Haken (Đại học Illinois) [Appel and Haken 1977]; [Appel, Haken, and Koch 1977] chứng minh định lý bốn màu bằng cách giả sử nếu Định lý bốn màu là sai thì sẽ có một phản ví dụ thuộc một trong 1936 loại khác nhau, và chỉ ra rằng không có loại nào dẫn đến phản ví dụ. Các trường hợp này được phân tích cẩn thận nhờ máy tính
- Robertson, Sanders, Seymour, và Thomas [Robertson, Sanders, Seymour, and Thomas 1997] đưa ra một chứng minh đơn giản hơn với 633 loại cần kiểm tra

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

60

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

69

# Tô màu đồ thị

## Một số tính chất cơ bản



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

- Để **chỉ ra**  $\chi(G) = k$  với đồ thị  $G$  nào đó, ta cần:
  - Chỉ ra một cách tô màu các đỉnh của  $G$  bằng  $k$  màu (nghĩa là  $\chi(G) \leq k$ )
  - Chỉ ra rằng không thể dùng ít hơn  $k$  màu để tô màu các đỉnh của  $G$  (nghĩa là  $\chi(G) \geq k$ )
- Một số nhận xét
  - (1) Mọi đồ thị  $G$  gồm  $n$  đỉnh có thể được tô màu bằng  $n$  màu
  - (2)  $\chi(K_n) = n$  (Tại sao?)
  - (3) Ta ký hiệu  $\omega(G)$  là số nguyên dương lớn nhất  $r \geq 1$  thỏa mãn  $K_r$  là đồ thị con của  $G$ . Với mọi đồ thị  $G$ , ta có  $\omega(G) \leq \chi(G)$ . Thông thường,  $\omega(G) \neq \chi(G)$
  - (4)  $\chi(C_n) = 2$  nếu  $n \geq 4$  chẵn và  $\chi(C_n) = 3$  nếu  $n \geq 3$  lẻ (Tại sao?)
  - (5)  $G$  là đồ thị hai phần khi và chỉ khi  $\chi(G) \leq 2$  (Tại sao?)
- Chưa biết có tồn tại hay không một thuật toán chạy trong thời gian đa thức để xác định xem một đồ thị  $G$  có thể được tô màu bằng 3 màu hay không

## Bài tập 27

Tính  $\chi(W_n)$ ,  $\chi(K_{m,n})$ , và  $\chi(Q_n)$

61

69

# Tô màu đồ thị

## Một số tính chất cơ bản



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

## Bài tập 28

Những đồ thị nào có sắc số bằng 1?

## Bài tập 29

Một cách tô màu các cạnh của một đồ thị  $G = (V, E)$  bằng  $k$  màu ( $k$ -edge coloring) là một hàm  $f : E \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$  thỏa mãn điều kiện  $f(e) \neq f(e')$  nếu  $e$  và  $e'$  liên thuộc với cùng một đỉnh. **Sắc số cạnh (edge chromatic number)** của một đồ thị  $G$ , ký hiệu  $\chi'(G)$ , là số màu nhỏ nhất có thể dùng để tô màu các cạnh của  $G$

- Tìm  $\chi'(C_n)$  và  $\chi'(W_n)$  với  $n \geq 3$
- Chứng minh rằng  $\chi'(G) \geq \Delta(G)$ , trong đó  $\Delta(G)$  là bậc lớn nhất của một đỉnh của  $G$

62

69

# Tô màu đồ thị

Một số tính chất cơ bản



Gọi  $\Delta(G)$  là *bậc lớn nhất của các đỉnh của đồ thị  $G$*

## Định lý 11

Cho  $G = (V, E)$  là đơn đồ thị vô hướng có  $n$  đỉnh. Ta có  $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$

## Chứng minh.

Một thuật toán tham lam để tô màu các đỉnh của  $G$  bằng  $\Delta(G) + 1$  màu  $\{1, \dots, \Delta(G) + 1\}$  là như sau:

1. Gán nhãn  $v_1, v_2, \dots, v_n$  cho các đỉnh của  $G$  một cách tùy ý
2. Với  $i$  từ 1 đến  $n$ , tô màu đỉnh  $v_i$  bằng màu nhỏ nhất trong số các màu chưa được tô cho bất kỳ đỉnh nào trong  $N(v_i)$

Ta chứng minh rằng **Bước 2 của thuật toán luôn thực hiện được với  $\Delta(G) + 1$  màu**. Thật vậy, đỉnh  $v_i$  có tối đa  $\Delta(G)$  đỉnh kề với nó, do đó số màu tối đa sử dụng để tô màu các đỉnh trong  $N(v_i)$  là  $\Delta(G)$ , nghĩa là luôn có ít nhất một trong số  $\Delta(G) + 1$  màu không được sử dụng cho bất kỳ đỉnh nào kề với  $v_i$ , và ta có thể tô màu  $v_i$  bằng màu nhỏ nhất trong số các màu này □

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton  
Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất  
Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng  
Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị  
Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

63


69




## Bài tập 30

Sử dụng thuật toán ở Định lý 11 để tô màu các đồ thị sau

(a)



(b)



Trên thực tế, với phần lớn các đồ thị, chỉ cần  $\Delta(G)$  màu là đủ

### Định lý 12: Định lý Brook

Nếu  $G$  không phải là một chu trình độ dài lẻ hoặc một đồ thị đầy đủ thì  $\chi(G) \leq \Delta(G)$

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu

64

Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

69

# Tô màu đồ thị

## Tô màu đồ thị phẳng



### Bổ đề 13

Mọi đơn đồ thị phẳng và liên thông  $G$  gồm  $n$  đỉnh có một cách sắp thứ tự các đỉnh  $v_1, v_2, \dots, v_n$  sao cho mỗi đỉnh kề với tối đa 5 đỉnh đứng trước nó

## Chứng minh.

Ta chứng minh bằng quy nạp theo  $n$ .

- **Bước cơ sở:** Với  $n \leq 6$ , bất kể thứ tự sắp xếp các đỉnh nào đều thỏa mãn Bổ đề
- **Bước quy nạp:**
  - Giả sử Bổ đề đúng với mọi  $6 \leq n \leq k$ , trong đó  $k \geq 6$  là một số nguyên nào đó. Ta chứng minh Bổ đề đúng với  $n = k + 1$ .
  - Thật vậy, giả sử  $G$  là đồ thị bất kỳ gồm  $k + 1$  đỉnh. Từ Bài tập 26, tồn tại một đỉnh  $v$  của  $G$  thỏa mãn  $\deg(v) \leq 5$ .
  - Đồ thị  $G - v$ :
    - có tối đa 5 thành phần liên thông  $G_1, G_2, \dots, G_5$
    - mỗi  $G_i$  có  $n_i \leq k$  đỉnh ( $1 \leq i \leq 5$ )
    - và  $n_1 + \dots + n_5 = k$
  - Từ giả thiết quy nạp, tồn tại một thứ tự  $v_1, \dots, v_k$  các đỉnh của  $G - v$  thỏa mãn Bổ đề.
  - Đặt  $v_{k+1} = v$ , ta có  $v_1, \dots, v_k, v_{k+1}$  là một thứ tự các đỉnh của  $G$  thỏa mãn Bổ đề

### Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

#### Đường đi Euler và Đường đi Hamilton

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

#### Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Floyd

#### Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm

Công thức Euler

Định lý Kuratowski

#### Tô màu đồ thị

Giới thiệu

Một số tính chất cơ bản

Tô màu đồ thị phẳng

65

69

# Tô màu đồ thị

## Tô màu đồ thị phẳng



### Định lý 14

Mọi đồ thị phẳng  $G$  có  $\chi(G) \leq 6$

### Chứng minh.

Ta chỉ ra một cách tô màu đơn đồ thị phẳng và liên thông  $G$  bằng 6 màu

1. Tìm thứ tự các đỉnh  $v_1, v_2, \dots, v_n$  của  $G$  thỏa mãn Bổ đề 13: mỗi đỉnh có tối đa 5 đỉnh kề đứng trước nó
2. Áp dụng thuật toán tham lam ở Định lý 11 với thứ tự đỉnh tìm được ở Bước 1

Chú ý rằng

- Khuyên và cạnh song song (nếu có) không ảnh hưởng gì đến quá trình tô màu
- Nếu đồ thị phẳng đã cho không liên thông, ta có thể áp dụng quá trình tô màu riêng biệt cho từng thành phần liên thông

#### Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

66

69


# Tô màu đồ thị

## Tô màu đồ thị phẳng




### Bài tập 31

Sử dụng thuật toán ở Định lý 14 để tô màu các đồ thị phẳng sau bằng 6 màu  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$



Đồ thị  $G$



Đồ thị  $H$

Nếu có thể, hãy tìm một cách tô màu các đồ thị trên bằng 5 màu hoặc ít hơn

### Bài tập 32

Chứng minh Định lý 14 bằng phương pháp quy nạp

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

67

69

# Tô màu đồ thị

## Tô màu đồ thị phẳng



### Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

## Định lý 15

Mọi đồ thị phẳng  $G$  có  $\chi(G) \leq 5$

## Bài tập 33

Bài tập sau đề xuất một cách chứng minh Định lý 15 bằng phương pháp quy nạp theo số đỉnh  $n$  của  $G$

(a) Ở bước cơ sở, chứng minh Định lý 15 đúng với mọi  $n \leq 5$

(b) Ở bước quy nạp, giả sử Định lý 15 đúng với mọi đồ thị phẳng gồm  $n$  đỉnh, trong đó  $n \geq 5$  là số nguyên nào đó.

Chứng minh Định lý 15 cũng đúng với mọi đồ thị phẳng gồm  $n + 1$  đỉnh. Giả sử  $G$  là đồ thị phẳng với  $n + 1$  đỉnh.

Từ Bài tập 26, tồn tại một đỉnh  $v$  của  $G$  thỏa mãn  $\deg(v) \leq 5$ . Theo giả thiết quy nạp, có một cách tô màu  $\alpha$  các đỉnh của  $G - v$  bằng 5 màu  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

68

69



## Bài tập 33 (tiếp)

(b.1) Nếu  $\deg(v) \leq 4$  hoặc  $\deg(v) = 5$  và các đỉnh kề với  $v$  được tô màu bằng  $\leq 4$  màu, chứng minh rằng các đỉnh của  $G$  có thể được tô màu bằng 5 màu

(b.2) (★) Nếu  $\deg(v) = 5$  và các đỉnh kề với  $v$ , ví dụ  $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$ , được tô màu bằng 5 màu khác nhau, ví dụ như lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, chứng minh rằng các đỉnh của  $G$  có thể được tô màu bằng 5 màu

- Xét đồ thị  $G_{1,3}$  cảm sinh bởi các đỉnh tô màu 1 và 3. Điều gì xảy ra nếu  $v_1$  và  $v_3$  không thuộc cùng một thành phần liên thông của  $G_{1,3}$ ? (**Gợi ý:** Trong trường hợp này, liệu có cách tô màu nào để  $v_1$  và  $v_3$  có cùng màu không?)
- Nếu  $v_1$  và  $v_3$  thuộc cùng một thành phần liên thông của  $G_{1,3}$ , xét đồ thị  $G_{2,4}$  cảm sinh bởi các đỉnh tô màu 2 và 4. Liệu có thể xảy ra trường hợp  $v_2$  và  $v_4$  thuộc cùng một thành phần liên thông của  $G_{2,4}$  không? (**Gợi ý:**  $G$  là đồ thị phẳng)

Đường đi Euler và  
Đường đi Hamilton

Đường đi Euler  
Đường đi Hamilton

Bài toán đường đi  
ngắn nhất

Đồ thị có trọng số  
Thuật toán Dijkstra  
Thuật toán Floyd

Đồ thị phẳng

Định nghĩa và khái niệm  
Công thức Euler  
Định lý Kuratowski

Tô màu đồ thị

Giới thiệu  
Một số tính chất cơ bản  
Tô màu đồ thị phẳng

Part I

Phụ lục

# Nội dung



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton



# Một số lỗi thường gặp



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

## Chú ý

Tham khảo từ tài liệu “Common Mistakes in Discrete Mathematics” ([https://highered.mheducation.com/sites/dl/free/125967651x/1106131/Common\\_Mistakes\\_in\\_Discrete\\_Math.pdf](https://highered.mheducation.com/sites/dl/free/125967651x/1106131/Common_Mistakes_in_Discrete_Math.pdf))

## 2 Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

### (a) Nhầm lẫn giữa định nghĩa đường đi và chu trình Hamilton và Euler

- Hãy nhớ rằng có một phương pháp kiểm tra đơn giản cho đường đi và chu trình Euler, nhưng không có phương pháp kiểm tra đơn giản nào cho đường đi và chu trình Hamilton

### (b) Bỏ qua thực tế rằng việc có một chu trình Euler [Hamilton] hàm ý sự tồn tại của một đường đi Euler [Hamilton]

- Hãy xem xét kỹ các định nghĩa

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

3 Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

## (c) Nhầm lẫn giữa các định lý trong lý thuyết đồ thị với mệnh đề đảo của chúng

- Ví dụ, nếu trong một đồ thị đơn liên thông với  $n \geq 3$  đỉnh, mỗi đỉnh có bậc ít nhất  $n/2$ , thì đồ thị đó có một chu trình Hamilton; nhưng mệnh đề đảo hoặc mệnh đề ngược của phát biểu này không đúng (có nhiều đồ thị có chu trình Hamilton mà trong đó bậc của các đỉnh nhỏ).
- Đây là một ví dụ khác: Nếu một đồ thị đơn liên thông là đồ thị phẳng, thì nó phải thỏa mãn  $e \leq 3v - 6$ , trong đó  $e$  là số cạnh và  $v$  là số đỉnh. Do đó (theo phản đảo), ta biết rằng nếu một đồ thị có quá nhiều cạnh ( $e > 3v - 6$ ), thì nó không thể là đồ thị phẳng. Điều mà chúng ta không thể kết luận là mệnh đề đảo—không phải là một định lý—rằng nếu  $e \leq 3v - 6$ , thì đồ thị đó phải là đồ thị phẳng

## (d) Nhầm tưởng rằng một đồ thị không phẳng chỉ vì nó được vẽ theo cách mà có hai cạnh cắt nhau tại các điểm không phải là đầu mút

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

## 4 Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

- Nếu có thể vẽ lại đồ thị đó mà không có cạnh nào cắt nhau ở các điểm không phải là đầu mút, thì đồ thị đó là đồ thị phẳng
- Ví dụ,  $K_4$  là đồ thị phẳng, mặc dù khi vẽ nó với các đỉnh là đỉnh của một hình vuông và các đoạn thẳng biểu diễn các cạnh gây ra giao điểm ở giữa hình (Hãy vẽ lại nó dưới dạng các đỉnh của một tam giác với một đỉnh nữa ở bên trong)

(e) **Sai lầm khi kết luận rằng một khi đã tìm được cách tô màu đồ thị với  $n$  màu, thì số màu cần dùng của đồ thị đó phải là  $n$**

- Thực tế, điều chúng ta biết trong trường hợp đó chỉ là số màu cần dùng nhiều nhất là  $n$
- Có thể tìm được cách tô màu khác với ít hơn  $n$  màu
- Ví dụ, người ta có thể tô  $C_4$  bằng bốn màu (một màu khác nhau cho mỗi đỉnh), nhưng số màu cần dùng thực sự là 2

(f) **Nhầm tưởng rằng thuật toán tham lam luôn đưa ra giải pháp tối ưu cho một bài toán**

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

## 5 Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

- Mặc dù trong nhiều trường hợp giải thuật tham lam đơn giản có thể tìm ra giải pháp tốt nhất (ví dụ, trong việc tìm kiếm cây khung nhỏ nhất), nhưng thường thì giải thuật tham lam hay thất bại (ví dụ, trong việc tìm cách tô màu đồ thị sử dụng ít màu nhất có thể)

### (g) Không nhận ra rằng việc viết ra một thuật toán không đảm bảo rằng thuật toán đó làm những gì bạn muốn

- Ví dụ, không thể viết một thuật toán tham lam để tô màu đồ thị và sau đó khẳng định mà không có sự chứng minh rằng thuật toán này tìm ra cách tô màu với số lượng màu ít nhất có thể

# Đường đi Euler

Ứng dụng: Ghép các mảnh DNA



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng


6

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

- **Bài toán giải trình tự DNA:** Xác định trình tự nucleotide trong một phân tử DNA
- **Thách thức:** Các thiết bị chỉ đọc được các đoạn ngắn (reads), cần ghép các đoạn này thành chuỗi hoàn chỉnh
- **Phương pháp:** Sử dụng đồ thị de Bruijn và đường đi Euler để tái tạo trình tự ban đầu



**Hình:** Đọc các đoạn mã di truyền ngắn từ chuỗi DNA

# Đường đi Euler

## Đồ thị de Bruijn và $k$ -mers



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton


Tài liệu tham khảo

7

- **$k$ -mer:** Các đoạn con có độ dài  $k$  của chuỗi DNA
- **Đồ thị de Bruijn:**
  - **Đỉnh:** Các  $(k - 1)$ -mers
  - **Cạnh:** Từ  $(k - 1)$ -mer  $u$  đến  $(k - 1)$ -mer  $v$  nếu có  $k$ -mer trong đó  $u$  là tiền tố và  $v$  là hậu tố
  - **Nhãn cạnh:**  $k$ -mer tương ứng

Chuỗi ban đầu: ACTGACT

3-mers: ACT, CTG, TGA, GAC, ACT



**Hình:** Đồ thị de Bruijn cho chuỗi ACTGACT với  $k = 3$

# Đường đi Euler

Tái tạo chuỗi DNA bằng đường đi Euler



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

8

- **Lý thuyết:** Chuỗi DNA ban đầu tương ứng với một đường đi Euler trong đồ thị de Bruijn
- **Phương pháp:**
  - Tạo đồ thị de Bruijn từ tập các  $k$ -mers
  - Tìm đường đi Euler trong đồ thị
  - Tái tạo chuỗi từ đường đi tìm được

DNA gốc (không biết)

Đoạn 1 Đoạn 2 Đoạn 3 Đoạn 4 Đoạn 5 Đoạn 6 Đoạn 7



Đồ thị de Bruijn



DNA tái tạo

**Hình:** Quy trình tái tạo chuỗi DNA sử dụng đồ thị de Bruijn

# Đường đi Euler

Ví dụ minh họa



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

9

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton


Tài liệu tham khảo

## ■ Các đoạn đọc:

- CAGGA
- AGGAG
- GGAGA
- GAGAC

## ■ 3-mers:

- CAG, AGG, GGA
- AGG, GGA, GAG
- GGA, GAG, AGA
- GAG, AGA, GAC



Hình: Đồ thị de Bruijn với  $k = 3$

**Đường đi Euler:**  $CA \rightarrow AG \rightarrow GG \rightarrow GA \rightarrow AG \rightarrow GA \rightarrow AC$

**Chuỗi tái tạo:** CAGGAGAC



# Đường đi Euler

Ưu và nhược điểm của phương pháp



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

10

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

## Ưu điểm:

- Tính toán hiệu quả
- Xử lý được dữ liệu lớn
- Cơ sở toán học chặt chẽ
- Phương pháp thông dụng trong các công cụ lắp ráp trình tự DNA

## Thách thức:

- Xử lý lỗi trong dữ liệu đọc
- Các trình tự lặp lại
- Sự tồn tại của nhiều đường đi Euler khác nhau
- Cần thêm thông tin bổ sung để xác định đường đi chính xác

# Đường đi Euler

Ứng dụng: Bài toán người đưa thư Trung Hoa



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

11

## ■ Bài toán người đưa thư Trung Hoa (Chinese Postman Problem - CPP):

- Đề xuất bởi nhà toán học Trung Quốc Mei-Ko Kwan (Quản Mai Cốc) năm 1962. Tên gọi của bài toán được đề xuất bởi Alan Goldman (Cục Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ)
- Mô hình hóa việc một người đưa thư cần đi qua tất cả các con đường trong khu vực
- Người đưa thư muốn quay lại điểm xuất phát với quãng đường đi ngắn nhất có thể

## ■ Mối liên hệ với đường đi Euler:

- Nếu đồ thị có chu trình Euler: người đưa thư chỉ cần đi mỗi con đường đúng một lần
- Nếu đồ thị không có chu trình Euler: người đưa thư phải đi qua một số con đường nhiều hơn một lần

- **Ứng dụng:** Tối ưu hóa lộ trình giao hàng, thu gom rác thải, bảo trì đường phố, v.v.

# Đường đi Euler

Ứng dụng: Bài toán người đưa thư Trung Hoa



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

12

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

- **Đầu vào:** Đồ thị  $G = (V, E)$  có trọng số (có thể có hướng hoặc vô hướng)
- **Đầu ra:** Chu trình với tổng trọng số nhỏ nhất đi qua mỗi cạnh ít nhất một lần
- **Giải thuật cho đồ thị vô hướng:**
  1. Kiểm tra tính liên thông của đồ thị. Nếu không liên thông, bài toán không có lời giải.
  2. Xác định tập  $O$  các đỉnh bậc lẻ trong đồ thị. ( $|O|$  phải là số chẵn)
  3. Nếu  $|O| = 0$  (không có đỉnh bậc lẻ):
    - Đồ thị đã có chu trình Euler, đây chính là lời giải tối ưu.
  4. Nếu  $|O| > 0$  (có đỉnh bậc lẻ):
    - Với mỗi cặp đỉnh  $u, v \in O$ , tính khoảng cách  $d(u, v)$  giữa chúng
    - Tìm bộ ghép hoàn hảo trọng số nhỏ nhất giữa các đỉnh trong  $O$
    - Thêm các cạnh tương ứng với các đường đi ngắn nhất từ bộ ghép vào đồ thị ban đầu
  5. Tìm chu trình Euler trong đồ thị đã được bổ sung các cạnh và trả lại chu trình đó

# Đường đi Euler

Ví dụ minh họa



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp


Một số ứng dụng

13

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo



Hình: Minh họa Bài toán người đưa thư Trung Hoa (ví dụ từ Wikipedia)

23

# Đường đi Euler

Ví dụ minh họa



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp


Một số ứng dụng

13

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo



Hình: Minh họa Bài toán người đưa thư Trung Hoa (ví dụ từ Wikipedia)

# Đường đi Euler

Ví dụ minh họa



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp


Một số ứng dụng

13

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo



Hình: Minh họa Bài toán người đưa thư Trung Hoa (ví dụ từ Wikipedia)

# Đường đi Euler

Ví dụ minh họa



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

13

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton


Tài liệu tham khảo

Các đỉnh bậc lẻ:  $A, B, C, D$

$$d(A, B) = 4 \quad d(B, C) = 6 \quad d(C, D) = 6$$

$$d(A, C) = 5 \quad d(B, D) = 5$$

$$d(A, D) = 3$$



Chu trình Euler:

$AB-BC-CD-DE-$   
 $EC-CB-BE-EA-$   
 $AD-DA$

Độ dài đường đi: 45

Hình: Minh họa Bài toán người đưa thư Trung Hoa (ví dụ từ Wikipedia)

# Đường đi Euler

Ví dụ minh họa



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

13

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton


Tài liệu tham khảo

Các đỉnh bậc lẻ:  $A, B, C, D$

$$d(A, B) = 4 \quad d(B, C) = 6 \quad d(C, D) = 6$$

$$d(A, C) = 5 \quad d(B, D) = 5$$

$$d(A, D) = 3$$



Chu trình trả lại cuối cùng:

$AB-BC-CD-DE-$   
 $EC-CB-BE-EA-$   
 $AD-DE-EA$

Độ dài đường đi: 45

Hình: Minh họa Bài toán người đưa thư Trung Hoa (ví dụ từ Wikipedia)



# Đường đi Hamilton

Ứng dụng: Bài toán người giao hàng (TSP)



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

14

## ■ Bài toán người giao hàng (Traveling Salesman Problem - TSP):

- Người bán hàng cần thăm  $n$  thành phố, mỗi thành phố đúng một lần, rồi quay về nơi xuất phát
- Mục tiêu: tìm hành trình có tổng chi phí (khoảng cách) nhỏ nhất

## ■ Mối liên hệ với đường đi Hamilton:

- Lời giải tối ưu của TSP chính là một chu trình Hamilton có trọng số nhỏ nhất
- Đồ thị mô hình hóa bài toán là đồ thị đầy đủ có trọng số trên các cạnh

## ■ Bài toán NP-khó: Không có thuật toán đa thức tìm nghiệm tối ưu (trừ khi $P = NP$ )

## ■ Các ứng dụng trong thực tế:

- Tối ưu hóa lộ trình giao hàng
- Lập kế hoạch sản xuất
- Thiết kế mạch điện tử
- Định tuyến phương tiện
- Khoan đục bảng mạch (PCB)
- Quy hoạch tour du lịch
- Thu thập dữ liệu bằng drone

23

# Đường đi Hamilton

Minh họa bài toán TSP



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức


Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo



Chu trình tối ưu:  $A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$   
Tổng chi phí:  $8 + 16 + 14 + 12 + 10 = 60$

Hình: Ví dụ về bài toán TSP với 5 thành phố

# Đường đi Hamilton

Ứng dụng: Mã Gray trong khoa học máy tính



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

16

- **Mã Gray (Gray Code):** Dãy các chuỗi nhị phân có độ dài  $n$  sao cho hai chuỗi liên tiếp chỉ khác nhau một bit
- **Mối liên hệ với đường đi Hamilton:**
  - Các mã Gray  $n$ -bit tương ứng với một đường đi Hamilton trong đồ thị siêu lập phương  $n$  chiều ( $n$ -cube)
  - Mỗi đỉnh là một chuỗi nhị phân độ dài  $n$
  - Hai đỉnh kề nhau khi chuỗi nhị phân khác nhau đúng một bit
- **Ứng dụng trong lập trình và kỹ thuật số:**
  - Mã hóa vòng quay cho bộ mã hóa góc (encoder)
  - Tối thiểu hóa sai số trong chuyển đổi Analog-Digital
  - Tạo mã sửa lỗi và mã Hamming
  - Thuật toán backtracking và giải đệ quy

# Đường đi Hamilton

Tạo mã Gray và đồ thị siêu lập phương




## Mã Gray 3-bit:

- 000 (0)
- 001 (1)
- 011 (3)
- 010 (2)
- 110 (6)
- 111 (7)
- 101 (5)
- 100 (4)
- Quay về 000

## Tạo mã Gray đệ quy:

1. Bắt đầu với 0 và 1 (Mã Gray 1-bit)
2. Xây dựng mã Gray  $n$ -bit từ mã Gray  $(n - 1)$ -bit
  - Sao chép danh sách mã Gray  $(n - 1)$ -bit
  - Thêm 0 vào trước nửa đầu danh sách
  - Thêm 1 vào trước nửa sau danh sách



**Hình:** Khối 3 chiều  $Q_3$ . Các đỉnh là các mã Gray 3-bit. Đường đi Hamilton ứng với các mã Gray 3-bit được đánh dấu bằng mũi tên đỏ

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo

# Đường đi Hamilton

Ứng dụng của mã Gray trong kỹ thuật số



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp


Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton


Tài liệu tham khảo

**Mã Gray**



001 → 011: chỉ 1 bit thay đổi

**Mã nhị phân thông thường**



011 → 100: tất cả 3 bit đều thay đổi

**Ưu điểm của mã Gray:** Chỉ một bit thay đổi giữa các vị trí kề nhau

⇒ Giảm thiểu lỗi đọc khi bộ mã hóa ở vị trí trung gian

**Hình:** So sánh bộ mã hóa vòng quay: Mã Gray (ít lỗi) và mã nhị phân thông thường (nhiều lỗi)

# Đường đi Hamilton

Ứng dụng của mã Gray trong kỹ thuật số



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

Tài liệu tham khảo


19

## Bộ mã hóa vòng quay (rotary encoder):

- Chuyển đổi vị trí của con trỏ thành đầu ra số
- Sử dụng mã Gray để giảm thiểu lỗi khi đọc
- Khi sử dụng mã nhị phân thông thường, nhiều bit có thể thay đổi cùng một lúc

## Ưu điểm của mã Gray:

- Chỉ một bit thay đổi mỗi lần
- Giảm thiểu sai số đọc (glitch)
- Tăng độ tin cậy của hệ thống



Chỉ bit giữa thay đổi!

**Hình:** Bộ mã hóa vòng quay sử dụng mã Gray 3-bit

23

# Tài liệu tham khảo



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp


Một số ứng dụng


Đường đi Euler


Đường đi Hamilton


20

Tài liệu tham khảo

 Lewis, Rhyd M. R. (2021). *Guide to Graph Colouring: Algorithms and Applications*. 2nd. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-81054-2.

 Rosen, Kenneth (2012). *Discrete Mathematics and Its Applications*. 7th. McGraw-Hill.

 Robertson, Neil, Daniel Sanders, Paul Seymour, and Robin Thomas (1997). "The four-colour theorem". In: *Journal of Combinatorial Theory, Series B* 70.1, pp. 2–44. DOI: 10.1006/jctb.1997.1750.

 Appel, Kenneth and Wolfgang Haken (1977). "Every planar map is four colorable. Part I: Discharging". In: *Illinois Journal of Mathematics* 21.3, pp. 429–490. DOI: 10.1215/ijm/1256049011.

# Tài liệu tham khảo (tiếp)



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

21

Tài liệu tham khảo



Appel, Kenneth, Wolfgang Haken, and John Koch (1977). "Every planar map is four colorable. Part II: Reducibility". In: *Illinois Journal of Mathematics* 21.3, pp. 491–567. DOI: 10.1215/ijm/1256049012.



Hart, Peter E., Nils J. Nilsson, and Bertram Raphael (1968). "A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths". In: *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics* 4.2, pp. 100–107. DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136. This paper introduces the A\* search algorithm.



Floyd, Robert W. (1962). "Algorithm 97: Shortest Path". In: *Communications of the ACM* 5.6, p. 345. DOI: 10.1145/367766.368168.



Warshall, Stephen (1962). "A theorem on Boolean matrices". In: *Journal of the ACM* 9.1, pp. 11–12. DOI: 10.1145/321105.321107.



# Tài liệu tham khảo (tiếp)



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

22

Tài liệu tham khảo



Dijkstra, Edsger W. (1959). “A note on two problems in connexion with graphs”. In: *Numerische Mathematik* 1, pp. 269–271. DOI: 10.1007/BF01386390.



Roy, Bernard (1959). “Transitivité et connexité”. In: *C. R. Acad. Sci. Paris* 249, pp. 216–218. (In French.) This paper introduced what later became known as the Roy-Warshall algorithm for transitive closure.



Fleury, M. (1883). “Deux problèmes de géométrie de situation”. In: *Journal de Mathématiques Élémentaires*, pp. 257–261. (In French.) This paper contains Fleury’s algorithm for finding Eulerian paths.

23

# Tài liệu tham khảo (tiếp)



Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Anh Đức

Một số lỗi thường gặp

Một số ứng dụng

Đường đi Euler

Đường đi Hamilton

23

Tài liệu tham khảo



**Hierholzer, Carl and Christian Wiener (1873).** “Über die Möglichkeit, einen Linienzug ohne Wiederholung und ohne Unterbrechung zu umfahren”. In: *Mathematische Annalen* 6.1, pp. 30–32. DOI: 10.1007/BF01442866. (In German.) This paper was published posthumously after Hierholzer’s death and edited by Christian Wiener.



**Euler, Leonhard (1736).** “Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis”. In: *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae* 8, pp. 128–140. URL: <https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/53/>. (In Latin.) English translation in *Scientific American*, 189 (1953), 66–70.