

# VNU-HUS MAT3500: Toán rời rạc

## Các cấu trúc cơ bản Tập hợp, Hàm, Dãy, Tổng

Hoàng Anh Đức

Bộ môn Tin học, Khoa Toán-Cơ-Tin học  
Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội  
[hoanganhduc@hus.edu.vn](mailto:hoanganhduc@hus.edu.vn)



# Nội dung



## Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản  
Các phép toán trên tập hợp  
Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ  
Định nghĩa hàm và một số khái niệm  
Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm  
Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm  
Một số công thức tổng hữu ích

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản  
Các phép toán trên tập hợp  
Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ  
Định nghĩa hàm và một số khái niệm  
Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm  
Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm  
Một số công thức tổng hữu ích

# Tập hợp

## Khái niệm và cách mô tả tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

2

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Một **tập hợp (set)** là một tổng thể không sắp thứ tự các đối tượng phân biệt (gọi là các **phần tử (element)** hoặc **thành viên (member)** của tập hợp)
  - $x \in S$ :  $x$  là phần tử của  $S$
  - $x \notin S$ :  $x$  không là phần tử của  $S$
- Ta thường sử dụng các chữ in hoa  $S, T, U, \dots$  để ký hiệu tập hợp
- Có thể mô tả một tập hợp bằng cách **liệt kê tất cả các phần tử** của tập đó giữa hai dấu ngoặc nhọn “{” và “}”. Trong nhiều trường hợp, có thể **liệt kê thông qua “quy luật đơn giản”**
  - Tập các nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Anh  
 $V = \{a, e, i, o, u\}$
  - Tập các số tự nhiên  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Có thể mô tả một tập hợp thông qua **quy tắc nhận biết**
  - Với vị từ  $P(x)$  bất kỳ trên miền xác định nào đó,  $\{x \mid P(x)\}$  là tập hợp tất cả  $x$  sao cho  $P(x)$  đúng (có thể dùng “:” thay vì “|”)
  - Tập các số tự nhiên chẵn  $E = \{x \mid x = 2k \text{ với } k \in \mathbb{N}\}$

# Tập hợp

Khái niệm và cách mô tả tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

3

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Có thể mô tả một tập hợp thông qua **giản đồ Venn (Venn diagram)**

- **Tập vũ trụ (universal set)  $U$**  gồm tất cả các đối tượng đang xét


Hình chữ nhật

- Tập hợp cần mô tả

Hình tròn hoặc các hình khác

- Phần tử của tập hợp

Điểm



**Hình:** Mô tả tập các nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Anh  $V = \{a, e, i, o, u\}$  bằng giản đồ Venn



#### Tập hợp

4

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

#### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

#### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

#### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- **Tập hợp rỗng (empty set)**, ký hiệu  $\emptyset$ , là tập hợp duy nhất không chứa bất kỳ phần tử nào
- $\emptyset = \{\}$  hoặc  $\emptyset = \{x \mid \mathbf{F}\}$  với  $\mathbf{F}$  là một mệnh đề luôn luôn sai (mâu thuẫn)
- Bất kể miền xác định là gì, **mệnh đề  $\neg \exists x (x \in \emptyset)$  luôn đúng**
- $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ 
  - Tập  $\{\emptyset\}$  không rỗng, vì nó chứa một phần tử—tập hợp rỗng

# Tập hợp

## Tập hợp con và tập hợp bằng nhau




Cho hai tập hợp  $A$  và  $B$ .  $A$  là **tập con (subset)** của  $B$ , ký hiệu  $A \subseteq B$  hoặc  $B \supseteq A$ , khi và chỉ khi mỗi phần tử của tập  $A$  cũng là một phần tử của  $B$

- $(A \subseteq B) \equiv \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$
- $(A \not\subseteq B) \equiv \neg(A \subseteq B)$  ( $A$  **không** là tập con của  $B$ )
- $(A \subset B) \equiv (A \subseteq B) \wedge (B \not\subseteq A)$  ( $A$  là **tập con thực sự (proper subset)** của  $B$ )

## Bài tập 1

Cho  $A = \{1, 2, 3\}$  và  $B = \{1, 3, 5, 7\}$ . Hãy liệt kê tất cả các tập hợp

- (a) là tập con của  $A$
- (b) là tập con thực sự của  $A$
- (c) vừa là tập con của  $A$  vừa là tập con của  $B$
- (d) là tập con của  $A$  nhưng không là tập con của  $B$



Hình: Biểu đồ Venn mô tả  $A \subset B$

### Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

5

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Tập hợp

Tập hợp con và tập hợp bằng nhau



## Ví dụ 1

Ta chứng minh *với mọi tập  $A$ , ta có  $\emptyset \subseteq A$*

- Nghĩa là, ta cần chứng minh  $\forall A \forall x ((x \in \emptyset) \rightarrow (x \in A))$
- Cụ thể, ta cần chỉ ra rằng với tập hợp  $A_0$  và phần tử  $x_0$  thuộc các miền xác định tương ứng, mệnh đề  $(x_0 \in \emptyset) \rightarrow (x_0 \in A_0)$  luôn đúng
- Thật vậy, theo định nghĩa của tập hợp rỗng,  $(x_0 \in \emptyset) = F$ .  
Do đó,  $(x_0 \in \emptyset) \rightarrow (x_0 \in A_0) = T$

## Bài tập 2

Phát biểu sau đúng hay sai?

“Với mọi tập hợp  $A$ , nếu tồn tại tập hợp  $B$  sao cho  $B \subseteq A$ , thì  $A \neq \emptyset$ ”

## Bài tập 3

Chứng minh rằng với mọi tập hợp  $A, B, C$ , nếu  $A \subseteq B$  và  $B \subseteq C$  thì  $A \subseteq C$

## Bài tập 4

Chứng minh rằng với mọi tập hợp  $A$ , ta có  $A \subseteq A$

## Bài tập 5

Liệu có tồn tại các tập hợp  $A$  và  $B$  thỏa mãn  $A \in B$  và  $A \subseteq B$ ?

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

6

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Tập hợp

## Tập hợp con và tập hợp bằng nhau



### Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

#### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

#### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

#### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

#### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

Cho hai tập hợp  $A$  và  $B$ .  $A$  và  $B$  là hai tập **bằng nhau**, ký hiệu  $A = B$ , khi và chỉ khi  $A \subseteq B$  và  $B \subseteq A$

- $(A = B) \equiv (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \equiv \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$
- Tất cả các phần tử trong một tập đều **phân biệt (distinct)**; liệt kê một phần tử nhiều lần là vô nghĩa
  - Nếu  $a = b$  thì  $\{a, b, c\} = \{a, c\} = \{b, c\} = \{a, a, b, c, a, c, c\}$
  - Ta nói rằng tập trên có (nhiều nhất) 2 phần tử
- Các phần tử của một tập hợp **không sắp thứ tự (unordered)**
  - Bất kể  $a, b, c$  là gì,  $\{a, b, c\} = \{a, c, b\} = \{b, a, c\} = \{b, c, a\} = \{c, a, b\} = \{c, b, a\}$



# Tập hợp

## Lực lượng của một tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

8

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- **Lực lượng (cardinality)** của một tập  $A$ , ký hiệu  $|A|$ , là số phần tử khác biệt mà  $A$  có

$$\bullet |\emptyset| = 0; |\{1, 2, 3\}| = 3; |\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}| = 2$$

- Nếu  $|A| \in \mathbb{N}$ , thì ta gọi  $A$  là **tập hữu hạn (finite set)**. Ngược lại,  $A$  là một **tập vô hạn (infinite set)**

- Một số tập vô hạn quan trọng

$$\bullet \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\} \quad \text{Tập số tự nhiên (natural numbers)}$$

$$\bullet \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad \text{Tập số nguyên (integers)}$$

$$\bullet \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, \dots\} \quad \text{Tập số nguyên dương (positive integers)}$$

$$\bullet \mathbb{Q} = \{p/q \mid p, q \in \mathbb{Z}, \text{ và } q \neq 0\} \quad \text{Tập số hữu tỷ (rational numbers)}$$

$$\bullet \mathbb{R} \quad \text{Tập số thực (real numbers)}$$

$$\bullet \mathbb{R}^+ \quad \text{Tập số thực dương (positive real numbers)}$$

$$\bullet \mathbb{C} \quad \text{Tập số phức (complex numbers)}$$

$$\bullet \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

## Bài tập 6

Tìm các tập hợp  $A, B$  thỏa mãn các điều kiện

$$(a) A = \{3, |B|\} \quad \text{và} \quad (b) B = \{1, |A|, |B|\}$$



- **Tập lũy thừa (power set)** của một tập  $A$ , ký hiệu  $\mathcal{P}(A)$ , là tập hợp gồm tất cả các tập con của  $A$

- $\mathcal{P}(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$
- $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

- Nếu  $A$  là tập hữu hạn,  $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ . Do đó ký hiệu  $2^A$  đôi khi cũng được sử dụng để chỉ tập lũy thừa của  $A$

## Bài tập 7

Cho  $A = \{1, 2, 3\}$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- (a)  $2 \in A$       (c)  $2 \in \mathcal{P}(A)$       (e)  $\{2\} \in \mathcal{P}(A)$       (g)  $\{\{2\}\} \in \mathcal{P}(A)$   
(b)  $2 \subseteq A$       (d)  $2 \subseteq \mathcal{P}(A)$       (f)  $\{2\} \subseteq \mathcal{P}(A)$       (h)  $\{\{2\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$

## Bài tập 8

Chứng minh rằng nếu  $A = B$  thì  $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$  với hai tập  $A, B$  bất kỳ. Ngược lại, nếu  $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$  thì  $A$  có bằng  $B$  không?

(Gợi ý:  $A = B \equiv (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \equiv \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$  và nếu  $A \subseteq B$  và  $B \subseteq C$  thì  $A \subseteq C$ )

# Tập hợp

## Tích Đềcắc



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

10

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Với  $n \in \mathbb{N}$ , một **bộ sắp thứ tự  $n$  phần tử (ordered  $n$ -tuples)**  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  là một dãy các phần tử có phần tử thứ nhất là  $a_1$ , phần tử thứ hai là  $a_2, \dots$ , và phần tử thứ  $n$  là  $a_n$ 
  - Một bộ sắp thứ tự 2 phần tử được gọi là một **cặp sắp thứ tự (order pair)**
- Hai bộ  $(a_1, \dots, a_n)$  và  $(b_1, \dots, b_n)$  là **bằng nhau** nếu với mọi  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $a_i = b_i$
- **Chú ý:**  $(1, 2) \neq (2, 1) \neq (2, 1, 1)$  nhưng  $\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{2, 1, 1\}$
- **Tích Đềcắc (Cartesian product)** của hai tập  $A, B$ , ký hiệu  $A \times B$ , là tập tất cả các cặp sắp thứ tự  $(a, b)$  trong đó  $a \in A$  và  $b \in B$ 
  - $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$
  - Chú ý rằng tích Đềcắc **không** có tính chất giao hoán, nghĩa là  $\neg \forall A, B (A \times B = B \times A)$
  - Tổng quát hóa  $A_1 \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}$

# Tập hợp

Tích Đề các



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

## Bài tập 9

Cho  $A = \{1, \{2, 3\}\}$  và  $B = \{4, 5, 6\}$ . Tìm các tập hợp  $A \times A$ ,  $B \times B$ ,  $A \times B$ , và  $B \times A$

## Bài tập 10

Chứng minh rằng  $A \times B = \emptyset$  khi và chỉ khi  $A = \emptyset$  hoặc  $B = \emptyset$

## Bài tập 11

Chứng minh rằng  $A \times B = B \times A$  khi và chỉ khi  $A = \emptyset$  hoặc  $B = \emptyset$  hoặc  $A = B$

11

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt


### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- **Hợp (union)** của hai tập hợp  $A, B$ , ký hiệu  $A \cup B$ , là tập chứa tất cả các phần tử hoặc thuộc  $A$ , hoặc thuộc  $B$ , hoặc thuộc cả hai

- $\forall A, B (A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\})$
- $A \cup B \supseteq A$  và  $A \cup B \supseteq B$
- $\{1, 3, 5\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$



**Hình:** Biểu đồ Venn mô tả  $A \cup B$

- **Giao (intersection)** của hai tập hợp  $A, B$ , ký hiệu  $A \cap B$ , là tập chứa tất cả các phần tử đồng thời thuộc cả  $A$  và  $B$


- $\forall A, B (A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\})$

- $A \cap B \subseteq A$  và  $A \cap B \subseteq B$

- $\{1, 3, 5\} \cap \{2, 3, 4\} = \{3\}$

- Hai tập  $A$  và  $B$  là **rời nhau (disjoint)** nếu  $A \cap B = \emptyset$ .

- $\{1, 3, 5\} \cap \{2, 4, 6\} = \emptyset$



Hình: Biểu đồ Venn mô tả  $A \cap B$

# Tập hợp

## Phép hiệu



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích


- **Hiệu (difference)** của hai tập hợp  $A, B$ , ký hiệu  $A - B$  hoặc  $A \setminus B$ , là tập chứa tất cả các phần tử thuộc  $A$  nhưng không thuộc  $B$

- $\forall A, B (A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\})$


- $\{1, 3, 5\} - \{2, 3, 4\} = \{1, 5\}$

- Khi tập vũ trụ  $U$  được xác định, **phần bù (complement)** của tập  $A$ , ký hiệu  $\overline{A}$ , là tập  $U - A$

- $\forall A (\overline{A} = \{x \mid x \notin A\})$



Hình: Giản đồ Venn mô tả  $A - B$



Hình: Giản đồ Venn mô tả  $\overline{A}$

14

74

# Tập hợp

## Phép hiệu đối xứng



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt


Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- **Hiệu đối xứng (symmetric difference)** của hai tập hợp  $A, B$ , ký hiệu  $A \Delta B$  hoặc  $A \oplus B$ , là tập chứa tất cả các phần tử hoặc thuộc  $A$  hoặc thuộc  $B$  nhưng không thuộc cả  $A$  và  $B$

- $\forall A, B (A \Delta B = \{x \mid x \in A \oplus x \in B\})$
- $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$
- $\{1, 3, 5\} \Delta \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 4, 5\}$



Hình: Biểu đồ Venn mô tả  $A \Delta B$

15

74



# Tập hợp

## Các phép toán trên tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

16

### Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 12

Tìm các tập  $A$  và  $B$ , biết rằng  $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$ ,  
 $B - A = \{2, 10\}$ , và  $A \cap B = \{3, 6, 9\}$

## Bài tập 13

Cho các tập hợp  $A, B$ . Chứng minh

(a)  $A \cap B \subseteq A$  và  $A \cap B \subseteq B$

(b)  $A \subseteq (A \cup B)$

(c)  $A - B \subseteq A$



**Bảng tính thuộc (membership table)** của các phép toán trên tập hợp

$A$	$B$	$A \cup B$	$A \cap B$	$A - B$	$\overline{A}$	$A \Delta B$
1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0

## Bài tập 14

Xây dựng bảng tính thuộc của

- (a)  $A \cup (B \cup C)$  và  $(A \cup B) \cup C$
- (b)  $A \cap (B \cup C)$  và  $(A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (c)  $\overline{A \cup B}$  và  $\overline{A} \cap \overline{B}$

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

17

### Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Tập hợp

## Các hằng đẳng thức tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

18

74

Tên gọi	Đẳng thức
Luật đồng nhất (Identity laws)	$A \cap U = A$ $A \cup \emptyset = A$
Luật nuốt (Domination laws)	$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$
Luật lũy đẳng (Idempotent laws)	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
Luật bù kép (Double complement laws)	$\overline{\overline{A}} = A$
Luật giao hoán (Commutative laws)	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
Luật kết hợp (Associative laws)	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$
Luật phân phối (Distributive laws)	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

# Tập hợp

## Các hằng đẳng thức tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

19

### Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

Tên gọi	Đẳng thức
Luật De Morgan (De Morgan's laws)	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Luật hấp thụ (Absorption laws)	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
Luật bù (Complement laws)	$A \cup \overline{A} = U$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$

Với hai tập  $A, B$  bất kỳ,

### Chứng minh $A = B$

- (1) Chứng minh trực tiếp  $A \subseteq B$  và  $B \subseteq A$
- (2) Chứng minh thông qua định nghĩa tập hợp và các phép biến đổi logic
- (3) Chứng minh bằng bảng tính thuộc

# Tập hợp

## Các hằng đẳng thức tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

## Ví dụ 2 (Dùng định nghĩa)

Chứng minh  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

■  $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$

- Giả sử  $x \in \overline{A \cap B}$ . Theo định nghĩa,  $x \notin A \cap B$ . Do đó, mệnh đề  $\neg(x \in A \wedge x \in B)$  đúng. Áp dụng luật De Morgan,  $\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)$  đúng. Theo định nghĩa, ta có  $x \notin A$  hoặc  $x \notin B$ . Do đó,  $x \in \overline{A}$  hoặc  $x \in \overline{B}$ , suy ra  $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$

■  $\overline{A \cap B} \supseteq \overline{A} \cup \overline{B}$

- Giả sử  $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$ . Theo định nghĩa,  $x \in \overline{A}$  hoặc  $x \in \overline{B}$ . Do đó,  $x \notin A$  hoặc  $x \notin B$ . Như vậy, mệnh đề  $(x \notin A) \vee (x \notin B)$  đúng. Theo định nghĩa,  $\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)$  cũng đúng. Áp dụng luật De Morgan, mệnh đề  $\neg(x \in A \wedge x \in B)$  đúng. Do đó,  $\neg(x \in A \cap B)$  đúng, suy ra  $x \in \overline{A \cap B}$

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

20

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Đãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Tập hợp

## Các hằng đẳng thức tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Ví dụ 3 (Dùng đẳng thức logic đã biết)

Chứng minh  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

$$\begin{aligned}\overline{A \cap B} &= \{x \mid x \notin A \cap B\} \\ &= \{x \mid \neg(x \in A \cap B)\} \\ &= \{x \mid \neg(x \in A \wedge x \in B)\} \\ &= \{x \mid \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)\} \\ &= \{x \mid x \notin A \vee x \notin B\} \\ &= \{x \mid x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B}\} \\ &= \{x \mid x \in \overline{A} \cup \overline{B}\} \\ &= \overline{A} \cup \overline{B}\end{aligned}$$

định nghĩa phần bù

định nghĩa  $\neg$

định nghĩa  $\cap$

luật De Morgan

định nghĩa  $\vee$

định nghĩa phần bù

định nghĩa  $\cup$

mô tả tập hợp

21

74

# Tập hợp

## Các hằng đẳng thức tập hợp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

22

### Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Ví dụ 4 (Dùng bảng tính thuộc)

Chứng minh  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

$A$	$B$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A \cap B$	$\overline{A \cap B}$	$\overline{A} \cup \overline{B}$
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1

# Tập hợp

Các hằng đẳng thức tập hợp



## Bài tập 15

Chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp đã đề cập (sử dụng các phương pháp đã trình bày)

## Bài tập 16

Với các tập  $A, B$  bất kỳ, chứng minh

$$(a) A \cap B = A - (A - B)$$

$$(d) A \Delta A = \emptyset$$

$$(b) A \cup (B - A) = A \cup B$$

$$(e) A \Delta \emptyset = A$$

$$(c) A \cap (B - A) = \emptyset$$

$$(f) A \Delta B = B \Delta A$$

## Bài tập 17

Với các tập  $A, B, C$ , có thể kết luận rằng  $A = B$  nếu

$$(a) A \cup C = B \cup C?$$

$$(b) A \cap C = B \cap C?$$

$$(c) A \cup C = B \cup C \text{ và } A \cap C = B \cap C?$$

## Bài tập 18

Có thể nói gì về các tập  $A, B$  nếu  $A \Delta B = A$ ?

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

23

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích



# Tập hợp

Các hằng đẳng thức tập hợp



## Bài tập 19

Với  $A$  là tập con của một tập vũ trụ  $U$ , chứng minh rằng

(a)  $A \Delta U = \bar{A}$

(b)  $A \Delta \bar{A} = U$

## Bài tập 20

Với hai tập  $A, B$  bất kỳ, chứng minh

(a)  $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$

(b)  $A \Delta B = B \Delta A$

(c)  $(A \Delta B) \Delta B = A$

## Bài tập 21

Chứng minh hoặc tìm phản ví dụ cho các đẳng thức sau

(a)  $A \times (B \cup C) = (A \times C) \cup (B \times C)$

(b)  $A \times (B \cap C) = (A \times C) \cap (B \times C)$

trong đó  $A, B, C$  là các tập bất kỳ

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

24

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Tập hợp

## Tổng quát hóa phép hợp và phép giao



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

25

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt



### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Do các phép hợp và giao thỏa mãn luật giao hoán và luật kết hợp, ta có thể mở rộng các khái niệm này cho dãy  $n$  tập  $A_1, \dots, A_n$  hoặc thậm chí dãy vô hạn các tập.

- Cách nhóm và thứ tự thực hiện không quan trọng
- $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = B \cup (A \cup C) = \dots$
- $A \cap B \cap C = (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = B \cap (A \cap C) = \dots$



Hình: Biểu đồ Venn cho  $A \cup B \cup C$  Hình: Biểu đồ Venn cho  $A \cap B \cap C$

# Tập hợp

## Tổng quát hóa phép hợp và phép giao



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

26

### Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

**Hợp (union)** của một bộ (hữu hạn hoặc vô hạn) các tập hợp là một tập chứa tất cả các phần tử là thành viên của ít nhất một tập trong bộ

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{x \mid \exists i \in \{1, \dots, n\} (x \in A_i)\} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

Tương tự với tập chỉ số  $I$  bất kỳ  $\bigcup_{i \in I} A_i$  hay với vô hạn các

$$\text{tập hợp } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

## Ví dụ 5

Với  $i = 1, 2, \dots$  nếu  $A_i = \{i, i+1, i+2, \dots\}$  thì

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \dots\} = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{Z}^+$$

# Tập hợp

## Tổng quát hóa phép hợp và phép giao



**Giao (intersection)** của một bộ (hữu hạn hoặc vô hạn) các tập hợp là một tập chứa tất cả các phần tử là thành viên của tất cả các tập trong bộ

$$\blacksquare \bigcap_{i=1}^n A_i = \{x \mid \forall i \in \{1, \dots, n\} (x \in A_i)\} = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

■ Tương tự với tập chỉ số  $I$  bất kỳ  $\bigcap_{i \in I} A_i$  hay với vô hạn các

$$\text{tập hợp } \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

## Ví dụ 6

Với  $i = 1, 2, \dots$  nếu  $A_i = \{i, i+1, i+2, \dots\}$  thì

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \dots\} = \{n, n+1, n+2, \dots\} = A_n$$

### Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

#### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

27

#### Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

#### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

#### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

#### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Tập hợp

## Tổng quát hóa phép hợp và phép giao



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

28

### Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 22

Với các tập hợp  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{1, 4, 6, 8\}$ , và  $C = \{5, 7, 9, 10\}$ , tìm  $A \cap B \cap C$  và  $A \cup B \cup C$

## Bài tập 23

Với các tập hợp  $A, B, C$  bất kỳ, chứng minh

$$(a) \overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$$

$$(b) \overline{A \cup B \cup C} = \overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$$

# Tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

## Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

29

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

## Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

## Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

## Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Giả sử **tập vũ trụ  $U$  là hữu hạn** và các phần tử của  $U$  được liệt kê theo **thứ tự**  $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$ . Ta có thể biểu diễn một tập hữu hạn  $A \subseteq U$  dưới dạng một chuỗi nhị phân  $\mathcal{B}(A) = x_1 x_2 \dots x_n$  trong đó  $x_i = 1$  **nếu**  $u_i \in A$  và  $x_i = 0$  **nếu**  $u_i \notin A$ .

- Với  $U = \{1, 2, \dots, 10\}$  ( $u_1 = 1, \dots, u_{10} = 10$ ) và  $A = \{2, 3, 5, 7\}$  thì  $\mathcal{B}(A) = 0110101000$

$U$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathcal{B}(A)$	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0

- Các toán tử tập hợp “ $\cup$ ”, “ $\cap$ ”, và “ $\overline{\phantom{x}}$ ” lần lượt tương ứng với các toán tử logic “ $\vee$ ”, “ $\wedge$ ”, và “ $\neg$ ” thực hiện theo từng bit.

## Bài tập 24




Với  $U = \{1, 2, \dots, 10\}$  ( $u_i = i$ ),  $A_1 = \{2, 3, 5, 7\}$ ,  $A_2 = \{1, 3, 9\}$ , hãy so sánh

- (1)  $\mathcal{B}(A_1 \cup A_2)$  và  $\mathcal{B}(A_1) \vee \mathcal{B}(A_2)$
- (2)  $\mathcal{B}(A_1 \cap A_2)$  và  $\mathcal{B}(A_1) \wedge \mathcal{B}(A_2)$
- (3)  $\mathcal{B}(\overline{A_1})$  và  $\neg \mathcal{B}(A_1)$

- Cho hai tập hợp  $A$  và  $B$ . Một **quan hệ (relation)**  $\mathcal{R}$  giữa  $A$  và  $B$  là một tập con của tích Đề các  $A \times B$ . Ta viết  $a\mathcal{R}b$  nếu  $(a, b) \in \mathcal{R}$ . Trong trường hợp  $A = B$  thì  $\mathcal{R}$  được gọi là một quan hệ trong  $A$

- $A$  là tập các giảng viên.  $B$  là tập các lớp.  $\mathcal{R} \subseteq A \times B$  là quan hệ “phân công giảng viên dạy lớp học”
- $\mathcal{R} = \emptyset$ : không có giảng viên nào dạy bất kỳ lớp nào
- $\mathcal{R} = A \times B$ : mỗi giảng viên dạy tất cả các lớp

- Biểu diễn một quan hệ bằng hình vẽ



Hình: (a) tương tự giản đồ Venn, (b) đồ thị, (c) hệ tọa độ Đề các



## Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

## Hàm

### 31 Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

## Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

## Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Một quan hệ  $\mathcal{R}$  trong  $A$  được gọi là **quan hệ tương đương (equivalence relation)** nếu nó thỏa mãn các điều kiện sau
  - Tính phản xạ (reflexive) Với mọi  $a$  thuộc  $A$ , ta có  $a\mathcal{R}a$
  - Tính đối xứng (symmetric) Với mọi  $a, b$  thuộc  $A$ , nếu ta có  $a\mathcal{R}b$  thì ta cũng có  $b\mathcal{R}a$
  - Tính bắc cầu (transitive) Với mọi  $a, b, c$  thuộc  $A$ , nếu ta có  $a\mathcal{R}b$  và  $b\mathcal{R}c$  thì ta cũng có  $a\mathcal{R}c$

## Bài tập 25

Trong mỗi trường hợp sau,  $\mathcal{R}$  có phải là quan hệ tương đương hay không?

- (1)  $\mathcal{R} = \{(p, q) \mid p \equiv q\}$  với  $p, q$  là các mệnh đề logic
- (2)  $\mathcal{R} = \{(A, B) \mid A \subseteq B\}$  với  $A, B$  là các tập hợp
- (3)  $\mathcal{R} = \{(A, B) \mid A = B\}$  với  $A, B$  là các tập hợp
- (4)  $\mathcal{R} = \{(a, b) \mid b \text{ chia hết cho } a\}$  với  $a, b$  là các số nguyên dương



# Hàm

## Định nghĩa hàm và một số khái niệm



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

32 Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm


Một số công thức tổng hữu ích

- Với hai tập khác rỗng  $A, B$ , một **hàm (function)**  $f$  từ  $A$  đến  $B$ , ký hiệu  $f : A \rightarrow B$ , là một quan hệ giữa  $A$  và  $B$  gán **chính xác một phần tử của  $B$**  cho **mỗi phần tử của  $A$**


(1) Với mọi  $a \in A$ , tồn tại  $b \in B$  sao cho  $(a, b) \in f$

(2) Với  $b_1$  và  $b_2$  thuộc  $B$  sao cho  $(a, b_1) \in f$  và  $(a, b_2) \in f$ , ta có  $b_1 = b_2$

Nếu  $b$  là phần tử duy nhất thuộc  $B$  được gán cho phần tử  $a$  thuộc  $A$  bởi  $f$ , ta viết  $f(a) = b$



Hình: Hàm



Hình: Không phải hàm

# Hàm

Định nghĩa hàm và một số khái niệm




Giả sử  $f$  là một hàm từ  $A$  đến  $B$

- $A$  được gọi là **miền xác định (domain)** của  $f$
- $B$  được gọi là **miền giá trị (codomain)** của  $f$
- Nếu  $f(a) = b$ , ta gọi  $b$  là **ảnh (image)** của  $a$  và  $a$  là một **ngược ảnh (preimage)** của  $b$
- Ta cũng nói rằng  $f$  **ánh xạ**  $A$  đến  $B$

## Ví dụ 7

Với hàm  $f$  cho bởi hình bên

- Tập xác định  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- Tập giá trị  $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- $4 \in B$  là ảnh của cả  $1 \in A$  và  $5 \in A$



Hình:  $f : A \rightarrow B$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

33 Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Hàm

Định nghĩa hàm và một số khái niệm




Giả sử  $f$  là hàm từ  $A$  đến  $B$

- Tập hợp tất cả các ảnh của các phần tử thuộc  $A$  được gọi là **ảnh của  $A$  qua hàm  $f$** , ký hiệu  $f(A)$ 
  - $f(A) \subseteq B$
- Với tập con  $S \subseteq A$ , **ảnh của  $S$  qua hàm  $f$** , ký hiệu  $f(S)$ , là tập tất cả các ảnh của các phần tử thuộc  $S$ 
  - $f(S) = \{t \mid \exists s \in S (t = f(s))\} = \{f(s) \mid s \in S\}$
  - **Chú ý:**  $f(s)$  là một phần tử của  $B$  và  $f(S)$  là một tập con của  $B$

## Ví dụ 8

Với hàm  $f$  cho bởi hình bên

- $f(A) = \{2, 4, 6, 8\}$
- Với  $S = \{1, 2, 5\}$ , ta có  $f(S) = \{4, 6\}$



Hình:  $f : A \rightarrow B$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

34

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Hàm

## Hàm tổng và hàm tích của hai hàm thực



Cho  $f_1$  và  $f_2$  là các hàm từ  $A$  đến  $\mathbb{R}$ . Ta định nghĩa  $f_1 + f_2$  và  $f_1 f_2$  là các hàm từ  $A$  đến  $\mathbb{R}$ , gọi là các **hàm thực (real-valued function)**, như sau. Với mọi  $x \in A$ ,

ký hiệu hàm

$$\begin{aligned}(f_1 + f_2)(x) &= f_1(x) + f_2(x) \\ (f_1 f_2)(x) &= f_1(x) f_2(x)\end{aligned}$$

phép toán trong  $\mathbb{R}$

## Bài tập 26

Hãy kiểm tra lại rằng  $f_1 + f_2$  và  $f_1 f_2$  thực sự là các hàm

## Bài tập 27

Gọi  $F$  là tập hợp tất cả các hàm  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  với tập xác định và tập giá trị là tập các số thực. Các mệnh đề sau là đúng hay sai? Hãy giải thích đáp án của bạn

- (a)  $\forall c \in \mathbb{R} [\exists f \in F (f(0) = c)]$
- (b)  $\exists f \in F [\forall c \in \mathbb{R} (f(0) = c)]$
- (c)  $\exists f \in F [\forall c \in \mathbb{R} (f(c) = 0)]$

### Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

35

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm


Một số công thức tổng hữu ích

- Với các hàm  $g : A \rightarrow B$  và  $f : B \rightarrow C$ , ta có thể định nghĩa **hợp (composition)** của  $f$  và  $g$ , ký hiệu  $f \circ g : A \rightarrow C$ , như sau

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

với mọi  $x \in A$

- Chú ý:**  $f \circ g$  chỉ được định nghĩa khi **tập giá trị của  $g$  là tập con của tập xác định của  $f$**
- Chú ý:** Toán tử “ $\circ$ ” không giao hoán, nghĩa là, **trong hầu hết mọi trường hợp,  $f \circ g \neq g \circ f$**



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

36

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt



Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

74

## Ví dụ 9



## Bài tập 28

Cho  $g : \{a, b, c\} \rightarrow \{a, b, c\}$  với  $g(a) = b$ ,  $g(b) = c$ , và  $g(c) = a$ .

Cho  $f : \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$  với  $f(a) = 3$ ,  $f(b) = 2$ , và  $f(c) = 1$ .

Hãy tìm  $f \circ g$  và  $g \circ f$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

37

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng


Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích


- Hàm  $f : A \rightarrow B$  được gọi là một **đơn ánh (injection)** hay một **hàm một-một (one-to-one function)** khi và chỉ khi  $f(a) = f(b)$  kéo theo  $a = b$  với mọi  $a$  và  $b$  thuộc tập xác định  $A$  của  $f$

■  $\forall a, b (f(a) = f(b) \rightarrow a = b) \equiv \forall a, b (a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b))$

## Ví dụ 10



Hình: Đơn ánh



Hình: Không phải đơn ánh

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

38

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

74



## Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

39

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 29

Hàm  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  trong mỗi trường hợp sau đây có phải là đơn ánh không?

(a)  $f(n) = n - 1$

(c)  $f(n) = n^3$

(b)  $f(n) = n^2 + 1$

(d)  $f(n) = \lceil n/2 \rceil$





Cho  $f : A \rightarrow B$  là một hàm trong đó  $A, B$  là các tập con của  $\mathbb{R}$

- $f$  được gọi là **tăng (increasing)** khi và chỉ khi với mọi  $x, y$  thuộc  $A$  thỏa mãn  $x < y$ , ta luôn có  $f(x) \leq f(y)$ 
  - $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) \leq f(y))$
- $f$  được gọi là **thực sự tăng (strictly increasing)** khi và chỉ khi với mọi  $x, y$  thuộc  $A$  thỏa mãn  $x < y$ , ta luôn có  $f(x) < f(y)$ 
  - $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) < f(y))$
- $f$  được gọi là **giảm (decreasing)** khi và chỉ khi với mọi  $x, y$  thuộc  $A$  thỏa mãn  $x < y$ , ta luôn có  $f(x) \geq f(y)$ 
  - $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) \geq f(y))$
- $f$  được gọi là **thực sự giảm (strictly decreasing)** khi và chỉ khi với mọi  $x, y$  thuộc  $A$  thỏa mãn  $x < y$ , ta luôn có  $f(x) > f(y)$ 
  - $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) > f(y))$

## Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản  
Các phép toán trên tập hợp  
Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ  
Định nghĩa hàm và một số khái niệm

40

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm  
Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm  
Một số công thức tổng hữu ích



## Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

41 Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 30


- (a) Cho ví dụ về một hàm  $f$  là hàm thực sự giảm
- (b) Cho ví dụ về một hàm  $f$  là hàm giảm nhưng không là thực sự giảm
- (c) Chứng minh nếu  $f$  là hàm thực sự tăng hoặc thực sự giảm thì  $f$  là đơn ánh

Hàm  $f : A \rightarrow B$  được gọi là một **toàn ánh (surjection)** khi và chỉ khi với mọi phần tử  $b$  thuộc  $B$  tồn tại một phần tử  $a$  thuộc  $A$  sao cho  $f(a) = b$


■  $\forall b \in B \exists a \in A (f(a) = b)$

■  $f(A) = B$  (ảnh của  $A$  qua  $f$  bằng với tập giá trị  $B$ )

Ví dụ 11



Hình: Toàn ánh



Hình: Không phải toàn ánh

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

42

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

74



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

43

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 31

Hàm  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  trong mỗi trường hợp sau đây có phải là toàn ánh không?

(a)  $f(m, n) = 2m - n$

(c)  $f(m, n) = m + n + 1$

(b)  $f(m, n) = m^2 - n^2$


(d)  $f(m, n) = m^2 - 4$

## Bài tập 32


Chứng minh rằng  $f : A \rightarrow B$  là toàn ánh khi và chỉ khi  $f(A) = B$

Hàm  $f : A \rightarrow B$  được gọi là một **song ánh (bijection)** khi và chỉ khi nó đồng thời là đơn ánh và toàn ánh


## Ví dụ 12




Hình: Song ánh



Hình: Đơn ánh,  
không toàn ánh



Hình: Toàn ánh,  
không đơn ánh



Hình: Không đơn  
ánh, không toàn  
ánh

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

44

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

**Tập hợp**

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

**Hàm**

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

45

Một số hàm và toán tử

**Dãy**

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

**Tổng**

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Chú ý

Với các tập hợp hữu hạn  $A, B$ , ta có  $|A| = |B|$  khi và chỉ khi tồn tại một song ánh  $f : A \rightarrow B$

## Bài tập 33

Hàm  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  trong mỗi trường hợp sau đây có phải là song ánh không?

(a)  $f(x) = -3x + 4$

(b)  $f(x) = -3x^2 + 7$

(c)  $f(x) = (x + 1)/(x + 2)$

(d)  $f(x) = x^5 + 1$

(e)  $f(x) = 2x + 1$


(f)  $f(x) = x^2 + 1$

(g)  $f(x) = x^3$

(h)  $f(x) = (x^2 + 1)/(x^2) + 2$



- Cho  $f : A \rightarrow B$  là một song ánh. **Hàm ngược (inverse function)** của  $f$  là một hàm gán cho mỗi phần tử  $b \in B$  một phần tử duy nhất  $a \in A$  sao cho  $f(a) = b$ . Hàm ngược của  $f$  được ký hiệu là  $f^{-1} : B \rightarrow A$
- Một song ánh còn được gọi là một **hàm khả nghịch (invertible function)**





## Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

## Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

47 Một số hàm và toán tử

## Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

## Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 34

Chứng minh rằng  $f^{-1}$  là một song ánh

## Bài tập 35

Hàm ngược của các hàm sau có tồn tại hay không? Tại sao?

(a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 1$

(b)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$

(c)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$

(d)  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = 2x$




# Hàm

## Hàm đồng nhất



- Cho  $A$  là một tập hợp. **Hàm đồng nhất (identity function)** trên  $A$  là hàm  $\text{id}_A : A \rightarrow A$  trong đó  $\text{id}_A(x) = x$  với mọi  $x \in A$
- $\text{id}_A$  là song ánh với mọi tập  $A$
- Với song ánh  $f : A \rightarrow B$  và hàm ngược của nó  $f^{-1} : B \rightarrow A$

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A$$



**Hình:** Hàm đồng nhất trên  $A$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

**Tập hợp**

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

**Hàm**

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

48

Một số hàm và toán tử

**Dãy**

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

**Tổng**

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

74



## Bài tập 36

Hãy tìm ví dụ một hàm  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  thỏa mãn

- (a)  $f$  là đơn ánh nhưng không là toàn ánh
- (b)  $f$  là toàn ánh nhưng không là đơn ánh
- (c)  $f$  là song ánh và  $f$  khác hàm đồng nhất trên  $\mathbb{N}$
- (d)  $f$  vừa không là đơn ánh vừa không là toàn ánh

## Bài tập 37

Cho các hàm  $g : A \rightarrow B$  và  $f : B \rightarrow C$ . Chứng minh rằng

- (a) Nếu cả  $g$  và  $f$  đều là đơn ánh thì  $f \circ g$  cũng là đơn ánh.
- (b) Nếu cả  $g$  và  $f$  đều là toàn ánh thì  $f \circ g$  cũng là toàn ánh.
- (c) Nếu  $f \circ g$  là toàn ánh thì  $f$  cũng là toàn ánh
- (d) Nếu  $f \circ g$  là đơn ánh thì  $g$  cũng là đơn ánh
- (e) Nếu  $f \circ g$  là song ánh thì  $g$  là toàn ánh khi và chỉ khi  $f$  là đơn ánh

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

49

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích



## Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

## Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

50

Một số hàm và toán tử

## Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

## Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 38

Tìm ví dụ các hàm  $f$  và  $g$  thỏa mãn  $f \circ g$  là song ánh, nhưng  $g$  không phải toàn ánh và  $f$  không phải đơn ánh.

## Bài tập 39

Gọi  $f : A \rightarrow B$  là một hàm với  $A, B$  là các tập hữu hạn thỏa mãn  $|A| = |B|$ . Chứng minh rằng  $f$  là đơn ánh khi và chỉ khi nó là toàn ánh.

# Hàm

## Hàm sàn và hàm trần




Trong toán rời rạc, ta thường dùng hai hàm sau

- **Hàm sàn (floor function)** gán cho số thực  $x$  số nguyên lớn nhất có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng  $x$ . Giá trị của hàm sàn được ký hiệu là  $\lfloor x \rfloor$
- **Hàm trần (ceiling function)** gán cho số thực  $x$  số nguyên nhỏ nhất có giá trị lớn hơn hoặc bằng  $x$ . Giá trị của hàm trần được ký hiệu là  $\lceil x \rceil$
- Nếu  $x \notin \mathbb{Z}$  thì  $\lfloor -x \rfloor \neq -\lfloor x \rfloor$  và  $\lceil -x \rceil \neq -\lceil x \rceil$
- Nếu  $x \in \mathbb{Z}$  thì  $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil = x$

### Ví dụ 13

- $\lfloor 1.5 \rfloor = 1, \lceil 1.5 \rceil = 2$
- $\lfloor -1.5 \rfloor = -2, \lceil -1.5 \rceil = -1$
- $\lfloor -3 \rfloor = -3, \lceil -3 \rceil = -3$



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

#### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

#### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

51 Một số hàm và toán tử

#### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

#### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Hàm

## Hàm sàn và hàm trần



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Bài tập 40

Chứng minh các tính chất sau của hàm trần và hàm sàn, trong đó  $x \in \mathbb{R}$  và  $n \in \mathbb{Z}$

$$(1a) \lfloor x \rfloor = n \text{ khi và chỉ khi } n \leq x < n + 1$$

$$(1b) \lceil x \rceil = n \text{ khi và chỉ khi } n - 1 < x \leq n$$

$$(1c) \lfloor x \rfloor = n \text{ khi và chỉ khi } x - 1 < n \leq x$$

$$(1d) \lceil x \rceil = n \text{ khi và chỉ khi } x \leq n < x + 1$$

$$(2) x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$$

$$(3a) \lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$$

$$(3b) \lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$$

$$(4a) \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$$

$$(4b) \lceil x + n \rceil = \lceil x \rceil + n$$

#### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

#### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

52

Một số hàm và toán tử

#### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

#### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

# Hàm

## Hàm sàn và hàm trần



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

53

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 41

Chứng minh rằng nếu  $n \in \mathbb{N}$  thì  $\lfloor n/2 \rfloor = n/2$  nếu  $n$  chẵn và  $\lfloor n/2 \rfloor = (n-1)/2$  nếu  $n$  lẻ

## Bài tập 42

Chứng minh rằng nếu  $x \in \mathbb{R}$  thì  $\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + 1/2 \rfloor$ . (**Gợi ý:** Khi xét các bài toán liên quan đến hàm sàn, một cách tiếp cận hữu ích là đặt  $x = n + \epsilon$  trong đó  $n = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$  và  $\epsilon$  là một số thực thỏa mãn  $0 \leq \epsilon < 1$ . Tương tự, với hàm trần, có thể đặt  $x = n - \epsilon$ )

# Dãy

## Định nghĩa dãy và một số khái niệm



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

54

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Một **dãy (sequence)**  $\{a_n\}$  được xác định qua một hàm  $f: I \rightarrow A$  trong đó  $I \subseteq \mathbb{Z}$  là **tập các chỉ số (indices)** và  $A$  là tập bất kỳ
  - Thông thường,  $I = \mathbb{N}$  hoặc  $I = \mathbb{Z}^+ = \mathbb{N} - \{0\}$
  - Ví dụ, dãy  $\{a_n\}$  xác định bởi  $f(n) = n^2$  với mọi số nguyên  $n \geq 0$  có các phần tử  $0, 1, 4, 9, 16, \dots$
- Với  $i \in I$ ,  $a_i$  là ảnh của  $i$  qua  $f$ , nghĩa là  $a_i = f(i)$ 
  - Ta gọi  $a_i$  là một **số hạng (term)** của dãy  $\{a_n\}$
  - $i$  là **chỉ số (index)** của  $a_i$
- Đôi khi, thay vì ký hiệu  $\{a_n\}$ , có thể viết **“dãy  $a_1, a_2, \dots$ ”** để chắc chắn rằng tập các chỉ số  $I$  được xác định rõ ràng
- Có thể mô tả một dãy bằng cách liệt kê một vài số hạng đầu tiên hoặc cuối cùng của dãy và sử dụng  $\dots$  cho phần còn lại
  - Ví dụ, có thể mô tả dãy  $\{a_n\}$  ở trên bằng cách viết  $\{a_n\} = 0, 1, 4, 9, 16, 25, \dots$

# Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

55

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 43

Trong mỗi trường hợp sau, tìm các số hạng  $a_0, a_1, \dots, a_5$  của dãy  $\{a_n\}$  nếu

(a)  $a_n = 2^{n-1}$

(b)  $a_n = 1 + (-1)^n$

(c)  $a_n = (n+1)^{n+1}$

(d)  $a_n = 7$

(e)  $a_n = -(-2)^n$

(f)  $a_n = \lfloor n/2 \rfloor$



# Dãy

## Cấp số nhân và cấp số cộng



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

56

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Một **cấp số nhân (geometric progression)** là một dãy có dạng

$$a, ar, ar^2, \dots, ar^n, \dots$$

trong đó **số hạng đầu tiên (initial term)**  $a$  và **công bội (common ratio)**  $r$  là các số thực

- Ví dụ, với  $n = 0, 1, 2, \dots$

- $\{b_n\}$  với  $b_n = (-1)^n$

số hạng đầu tiên 1, công bội  $-1$

- $\{c_n\}$  với  $c_n = 6 \cdot (1/3)^n$

số hạng đầu tiên 6, công bội  $1/3$

- Một **cấp số cộng (arithmetic progression)** là một dãy có dạng

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + nd, \dots$$

trong đó **số hạng đầu tiên (initial term)**  $a$  và **công sai (common difference)**  $d$  là các số thực

- Ví dụ, với  $n = 0, 1, 2, \dots$

- $\{d_n\}$  với  $d_n = -1 + 4n$

số hạng đầu tiên  $-1$ , công sai 4

- $\{e_n\}$  với  $e_n = 7 - 3n$

số hạng đầu tiên 7, công sai  $-3$

# Dãy

## Tìm công thức tường minh của một dãy



### Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

#### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

#### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

#### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

57

Một số dãy đặc biệt

#### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

74

- Cho trước một vài phần tử của dãy
- Yêu cầu tìm
  - một công thức tường minh của các số hạng
  - hoặc một phương thức để liệt kê các phần tử của dãy

## Ví dụ 14

Số tiếp theo trong dãy có thể là bao nhiêu?

- 1, 2, 3, 4, ...
- 1, 3, 5, 7, 9, ...
- 2, 3, 5, 7, 11, ...

## Ví dụ 15

Các số hạng tiếp theo có thể là bao nhiêu?

- 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4
- 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55

# Dãy

## Tìm công thức tường minh của một dãy



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

58

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Một phương pháp hữu ích để tìm công thức tổng quát cho các số hạng của một dãy là *so sánh các số hạng của dãy cần tìm với các số hạng của một dãy đã biết* (ví dụ như cấp số cộng, cấp số nhân, dãy số chính phương, v.v...)

Công thức	Mười số hạng đầu tiên
$n^2$	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ...
$n^3$	1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, ...
$n^4$	1, 16, 81, 256, 625, 1296, 2401, 4096, 6561, 10000, ...
$f_n$	1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...
$2^n$	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ...
$3^n$	3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049, ...
$n!$	1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800, ...

- Bảng Tra Cứu Dãy Số Nguyên Trực Tuyến (The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences - OEIS)  
<https://oeis.org/>

# Dãy

Tìm công thức tường minh của một dãy



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

**Tập hợp**

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

**Hàm**

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

**Dãy**

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

59

Một số dãy đặc biệt

**Tổng**

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Bài tập 44

Với mỗi dãy số nguyên sau, hãy tìm một công thức đơn giản hoặc một cách để tìm các số hạng tiếp theo của dãy. Giả sử công thức bạn tìm ra là đúng, hãy tìm ba số hạng tiếp theo của dãy

(a)  $1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, \dots$

(b)  $1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, \dots$

(c)  $1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, 16, 0, \dots$

(d)  $3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, \dots$

(e)  $15, 8, 1, -6, -13, -20, -27, \dots$

(f)  $3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, 47, \dots$

(g)  $2, 16, 54, 128, 250, 432, 686, \dots$

(h)  $2, 3, 7, 25, 121, 721, 5041, 40321, \dots$

# Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

60

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Cho dãy  $\{a_n\}$ , một số nguyên *giới hạn dưới (lower limit)*  $m$ , và một số nguyên *giới hạn trên (upper limit)*  $n \geq m$ . **Tổng (summation)** của các số hạng  $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$  có thể được viết là

$$a_m + a_{m+1} + \dots + a_n \quad \text{hoặc}$$

$$\sum_{j=m}^n a_j \quad \text{hoặc} \quad \sum_{m \leq j \leq n} a_j$$

- Ở đây,  $j$  được gọi là *chỉ số lấy tổng (index of summation)* và được chọn hoàn toàn tùy ý

$$\sum_{j=m}^n a_j = \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{k=m}^n a_k$$

- Để thuận tiện, ta quy ước  $\sum_{i=m}^n a_i = 0$  với mọi  $m > n$

# Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

61

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Ví dụ 16

Cho dãy  $\{a_n\}$ ,

- Với tập chỉ số  $S$  bất kỳ, tổng các số hạng  $a_i$  với  $i \in S$ :

$$\sum_{i \in S} a_i$$

- Tổng các số hạng lớn hơn hoặc bằng  $a_j$ :

$$\sum_{i=j}^{\infty} a_i = a_j + a_{j+1} + \dots$$

# Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

62

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## Ví dụ 17

Với hàm  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ,

- Với  $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ , tổng các giá trị của hàm  $f$ :

$$\sum_{x \in X} f(x) = f(x_1) + f(x_2) + \dots$$

- Với  $X = \{x \mid P(x)\}$  trong đó  $P(x)$  là vị từ cho trước, tổng các giá trị của hàm  $f$ :

$$\sum_{P(x)} f(x) = f(x_1) + f(x_2) + \dots$$

# Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm



## Ví dụ 18

$$\sum_{j=1}^4 j^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$$

$$\sum_{j=1}^{100} \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{100}$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} 2^j = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots$$

$$\sum_{\substack{(0 \leq x \leq 10) \\ \wedge (x \text{ chẵn})}} x^2 = 0 + 2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + 10^2$$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

63

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích



# Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm



## Bài tập 45

Sử dụng ký hiệu tổng để viết lại các công thức sau

(a)  $2 + 4 + 6 + 8 + \cdots + 2n$

(b)  $1 + 5 + 9 + 13 + \cdots + 425$

(c)  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{50}$

## Bài tập 46

Viết lại các tổng sau dưới dạng công thức dài hơn

(a)  $\sum_{k=1}^{100} (3 + 4k)$

(b)  $\sum_{k=2}^{50} \frac{1}{k^2 - 1}$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

64

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

74

# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

## Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

## Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

## Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

## Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- **Tổng hằng số:** Với hằng số  $c$  bất kỳ,

$$\sum_{n=i}^j c = (j - i + 1) \cdot c$$

- **Phân phối:** Với hằng số  $c$  bất kỳ,

$$\sum_{n=i}^j c f(n) = c \sum_{n=i}^j f(n)$$

- **Giao hoán:**

$$\sum_{n=i}^j (f(n) + g(n)) = \sum_{n=i}^j f(n) + \sum_{n=i}^j g(n)$$

# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

## ■ Đổi chỉ số:

$$\sum_{i=j}^m f(i) = \sum_{k=j+n}^{m+n} f(k-n)$$

■ Ví dụ  $\sum_{i=1}^4 i^2 = \sum_{k=3}^6 (k-2)^2$  (đặt  $k = i + 2$ )

## ■ Tách tổng: Với $j \leq m < k$

$$\sum_{i=j}^k f(i) = \sum_{i=j}^m f(i) + \sum_{i=m+1}^k f(i)$$

## ■ Đảo thứ tự:

$$\sum_{i=0}^k f(i) = \sum_{i=0}^k f(k-i)$$

66

74

# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

- Với  $\{a_n\}$  là cấp số nhân có số hạng đầu tiên  $a$  và công bội  $r$ , tổng của  $n + 1$  số hạng đầu tiên của dãy là

$$S = \sum_{i=0}^n ar^i$$

- Công thức tường minh

$$S = \sum_{i=0}^n ar^i = \begin{cases} \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1} & \text{nếu } r \neq 1 \\ (n + 1)a & \text{nếu } r = 1 \end{cases}$$

$$S = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n$$

$$rS = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n + ar^{n+1}$$

$$rS - S = ar^{n+1} - a$$

67

74

# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



$$rS = r \sum_{i=0}^n ar^i$$

$$= \sum_{i=0}^n ar^{i+1}$$

$$= \sum_{k=1}^{n+1} ar^k$$

$$= \sum_{k=1}^n ar^k + \sum_{k=n+1}^{n+1} ar^k$$

$$= \left( \sum_{k=1}^n ar^k + ar^0 \right) + (ar^{n+1} - ar^0)$$

$$= \sum_{k=0}^n ar^k + (ar^{n+1} - a)$$

$$= S + (ar^{n+1} - a)$$

công thức của  $S$

phân phối

đổi chỉ số,  $k = i + 1$

tách tổng

thêm và bớt  $ar^0 = a$

tách tổng

công thức của  $S$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

68

74

# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



## Ví dụ 19

Tìm công thức tường minh cho tổng  $T = \sum_{i=1}^n i$

$$T = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$$

$$T = n + (n - 1) + (n - 2) + \cdots + 1$$

$$2T = (n + 1) \cdot n$$

## Bài tập 47

Với  $\{a_n\}$  là cấp số cộng có số hạng đầu tiên  $a$  và công sai  $d$ , tổng của  $n + 1$  số hạng đầu tiên của dãy là

$$T = \sum_{i=0}^n (a + id)$$

Hãy tìm công thức tường minh cho  $T$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

69

74


# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



## Ví dụ 20

Phương pháp của Gauss để tính  $\sum_{i=1}^{100} i$



## Bài tập 48

Tìm công thức tường minh cho  $T = \sum_{i=1}^n i$  sử dụng phương pháp

tương tự như ví dụ trên. Có thể áp dụng phương pháp tương tự cho Bài tập 47 không?

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

70

74

# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

## Ví dụ 21

Tìm công thức tường minh của  $T = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$  với  $x$  là số thực thỏa

mãn  $-1 < x < 1$

Ta đã chứng minh

$$\sum_{n=0}^k x^n = \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1}.$$

Do  $-1 < x < 1$ ,  $x^{k+1} \rightarrow 0$  khi  $k \rightarrow \infty$ . Ta có

$$T = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k x^n = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1} = \frac{1}{1 - x}$$

### Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

### Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

### Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

### Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

71

74



# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

## Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

## Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

## Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

## Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

Tổng	Công thức tường minh
$\sum_{k=0}^n ar^k \ (r \neq 0)$	$\frac{ar^{n+1} - a}{r - 1} \ (r \neq 1)$
$\sum_{k=1}^n k$	$\frac{n(n+1)}{2}$
$\sum_{k=1}^n k^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{k=1}^n k^3$	$\frac{n^2(n+1)^2}{4}$
$\sum_{k=0}^{\infty} x^k \ (-1 < x < 1)$	$\frac{1}{1-x}$
$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} \ (-1 < x < 1)$	$\frac{1}{(1-x)^2}$

# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



## Bài tập 49

Tính các tổng sau

(a)  $\sum_{k=100}^{200} k$

(b)  $\sum_{k=99}^{200} k^3$

(c)  $\sum_{10}^{20} k^2(k-3)$

## Bài tập 50

(a) Chứng minh rằng  $\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) = a_n - a_0$ , trong đó

$a_0, a_1, \dots, a_n$  là một dãy gồm các số thực

(b) Sử dụng đẳng thức  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$  và phần (a) để

tính  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

## Bài tập 51

Lấy tổng cả hai vế của đẳng thức  $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$  từ  $k = 1$  đến  $k = n$  và sử dụng Bài tập 50(a) để tìm một công thức tường minh cho  $\sum_{k=1}^n (2k - 1)$  (tổng  $n$  số tự nhiên lẻ đầu tiên)

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

73

74

# Tổng

Một số công thức tổng hữu ích



Ngoài ký hiệu tổng, ta cũng có ký hiệu đặc biệt cho **tích** (*product*). Cho dãy  $\{a_n\}$  và các chỉ số giới hạn dưới  $m$  và giới hạn trên  $n \geq m$ . Tích của các số hạng  $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$  có thể được viết là

$$a_m \cdot a_{m+1} \cdot \dots \cdot a_n \quad \text{hoặc}$$

$$\prod_{j=m}^n a_j \quad \text{hoặc} \quad \prod_{m \leq j \leq n} a_j$$

Để thuận tiện, ta quy ước  $\prod_{i=m}^n a_i = 1$  với mọi  $m > n$

## Bài tập 52

Tính giá trị của các tích sau

$$(a) \prod_{i=0}^{10} i$$

$$(b) \prod_{i=1}^{100} (-1)^i$$

$$(c) \prod_{i=5}^8 i$$

$$(d) \prod_{i=1}^{10} 2$$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Các phép toán trên tập hợp

Biểu diễn tập hợp bằng chuỗi nhị phân

Hàm

Quan hệ

Định nghĩa hàm và một số khái niệm

Một số hàm và toán tử

Dãy

Định nghĩa dãy và một số khái niệm

Một số dãy đặc biệt

Tổng

Ký hiệu tổng và một số khái niệm

Một số công thức tổng hữu ích

74

74

Part I

Phụ lục

# Nội dung



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

Một số lỗi thường gặp

Tập hợp  
Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn  
Định nghĩa  
Tập đếm được và không đếm được

Một số lỗi thường gặp



- Chúng ta đang học một *lý thuyết tập hợp ngây thơ (naive set theory)*
  - Định nghĩa bằng ngôn ngữ tự nhiên, không chặt chẽ về mặt toán học
  - Mô tả các khía cạnh của các tập hợp toán học quen thuộc trong toán rời rạc
  - Bản thân lý thuyết này có chứa các *ngịch lý (paradox)* (= một phát biểu tự phủ định chính nó mặc dù lúc đầu nhìn có vẻ đúng)
- *Nghịch lý Russell* (Đặt theo tên nhà triết học, nhà logic học, nhà toán học người Anh Bertrand Russell (1872–1970))
  - Gọi  $S$  là tập *tất cả các tập hợp không chứa chính nó như là một phần tử*, nghĩa là  $S = \{A \mid A \text{ là một tập hợp và } A \notin A\}$ 
    - Chú ý rằng *theo định nghĩa tập hợp ta đã học, tồn tại một tập hợp chứa chính nó như là một phần tử*. Ví dụ xét *tập  $T$  các tập hợp có chứa ít nhất một phần tử*
  - *Liệu  $S$  có phải là một phần tử của chính nó hay không*, nói cách khác, liệu  $S \in S$ ?

# Lực lượng của tập vô hạn

## Định nghĩa



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

Một số lỗi thường gặp

- **Nhắc lại:** *Lực lượng (cardinality)* của một tập  $A$ , ký hiệu  $|A|$ , là số phần tử khác biệt mà  $A$  có
- Các tập  $A$  và  $B$  *có cùng lực lượng*, ký hiệu  $|A| = |B|$ , khi và chỉ khi tồn tại một *song ánh* từ  $A$  đến  $B$
- Nếu tồn tại một *đơn ánh* từ  $A$  đến  $B$ , ta nói “lực lượng của  $A$  nhỏ hơn hoặc bằng lực lượng của  $B$ ”, và ký hiệu  $|A| \leq |B|$
- Khi  $|A| \leq |B|$  và hai tập  $A, B$  có lực lượng khác nhau, ta nói “lực lượng của  $A$  nhỏ hơn lực lượng của  $B$ ”, và ký hiệu  $|A| < |B|$

## Bài tập 53

Chứng minh rằng  $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$  với mọi tập hợp  $A$ , trong đó  $\mathcal{P}(A)$  là tập tất cả các tập hợp con của  $A$

## Bài tập 54

Tập  $2\mathbb{Z}$  gồm các số nguyên chẵn có cùng lực lượng với tập số nguyên  $\mathbb{Z}$  hay không?

# Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

Một số lỗi thường gặp

## Định lý 1: Định lý Cantor

*Không tồn tại một toàn ánh  $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$  với  $A$  là một tập hợp bất kỳ và  $\mathcal{P}(A)$  là tập tất cả các tập con của  $A$*

## Chứng minh.

Ta chứng minh bằng phương pháp phản chứng

- Giả sử tồn tại toàn ánh  $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$
- Ta định nghĩa tập con  $G \subseteq A$  như sau

$$G := \{x \in A \mid x \notin f(x)\}$$

- Do  $f$  là toàn ánh, tồn tại  $a \in A$  sao cho  $G = f(a)$
- Xét hai trường hợp
  - Nếu  $a \in G$  thì theo định nghĩa của  $G$ , ta có  $a \notin f(a) = G$ . Đây là một mâu thuẫn
  - Nếu  $a \notin G = f(a)$  thì  $a \in f(a)$ . Do đó theo định nghĩa của  $G$ , ta có  $a \in G$ . Đây là một mâu thuẫn

4

17



# Lực lượng của tập vô hạn

Tập đếm được và không đếm được



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

Một số lỗi thường gặp

- Một tập có hữu hạn số phần tử hoặc có cùng lực lượng với tập các số nguyên dương  $\mathbb{Z}^+$  được gọi là **tập đếm được** (*countable set*) và ngược lại thì gọi là **tập không đếm được** (*uncountable set*)
  - Có thể liệt kê các phần tử của tập đếm được theo thứ tự: phần tử thứ 1, phần tử thứ 2, v.v...
- Khi một tập vô hạn  $S$  là tập đếm được, ta ký hiệu lực lượng của  $S$  là  $\aleph_0$  ("aleph null") và viết  $|S| = \aleph_0$

## Ví dụ 22

Tập các số tự nhiên  $\mathbb{N}$  là tập đếm được

0	1	2	3	4	...
↕	↕	↕	↕	↕	
1	2	3	4	5	...

## Ví dụ 23

Tập các số nguyên dương lẻ là tập đếm được

1	2	3	4	5	...
↕	↕	↕	↕	↕	
1	3	5	7	9	...

5

17

# Lực lượng của tập vô hạn

Tập đếm được và không đếm được




## Ví dụ 24

Tập các số nguyên  $\mathbb{Z}$  là tập đếm được

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & \dots \end{array}$$

## Ví dụ 25

Tập các số hữu tỷ dương  $\mathbb{Q}^+ = \{\frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}^+\}$  là tập đếm được



$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \\ \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{2}{1} & \frac{3}{1} & \frac{1}{3} & \dots \end{array}$$

Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

Một số lỗi thường gặp

6

17

# Lực lượng của tập vô hạn

Tập đếm được và không đếm được



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

Một số lỗi thường gặp

Ta chứng minh *tập số thực  $\mathbb{R}$  là tập không đếm được* bằng phương pháp phản chứng sử dụng *lập luận đường chéo của Cantor (Cantor diagonalization argument)*

- Giả sử  $\mathbb{R}$  là tập đếm được. Do mọi tập con của một tập đếm được cũng là một tập đếm được (*tại sao?*), tập các số thực nằm giữa 0 và 1 cũng là tập đếm được
- Sắp thứ tự các số thực giữa 0 và 1:  $r_1, r_2, \dots$

$$r_1 = 0.d_{11}d_{12}d_{13}d_{14}\dots$$

$$r_2 = 0.d_{21}d_{22}d_{23}d_{24}\dots$$

$$r_3 = 0.d_{31}d_{32}d_{33}d_{34}\dots$$

$$r_4 = 0.d_{41}d_{42}d_{43}d_{44}\dots$$

$\vdots$

trong đó  $d_{ij} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

# Lực lượng của tập vô hạn

Tập đếm được và không đếm được



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

Một số lỗi thường gặp

- Xây dựng một số thực  $r = 0.d_1d_2d_3d_4 \dots$  mới trong đó

$$d_i = \begin{cases} 4 & \text{nếu } d_{ii} \neq 4 \\ 5 & \text{nếu } d_{ii} = 4 \end{cases}$$

- $r$  không bằng bất cứ số nào trong các số  $r_1, r_2, \dots$  vì nó luôn khác  $r_i$  ở vị trí thứ  $i$  sau “0.”
- Do đó  $r$  là một số thực giữa 0 và 1 không nằm trong danh sách  $r_1, r_2, \dots$ , do mỗi số thực có một biểu diễn thập phân duy nhất
- Tóm lại, không phải mọi số thực giữa 0 và 1 đều được liệt kê theo thứ tự  $r_1, r_2, \dots$ , và do đó tập các số thực giữa 0 và 1 là tập không đếm được
- Nếu tập con của một tập là không đếm được thì tập đó cũng không đếm được (*tại sao?*), suy ra tập số thực  $\mathbb{R}$  là không đếm được

8

# Một số lỗi thường gặp



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

## Chú ý

Tham khảo từ tài liệu “Common Mistakes in Discrete Mathematics” ([https://highered.mheducation.com/sites/dl/free/125967651x/1106131/Common\\_Mistakes\\_in\\_Discrete\\_Math.pdf](https://highered.mheducation.com/sites/dl/free/125967651x/1106131/Common_Mistakes_in_Discrete_Math.pdf))

9

Một số lỗi thường gặp

### (a) Lấy phần bù của tập hợp không chính xác khi sử dụng sai luật De Morgan

- Chẳng hạn, cho rằng  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- Các phát biểu đúng là  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$  và  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- Đây là một trường hợp của việc giả định rằng mọi toán tử phân phối qua toán tử khác, ở đây là phép bù phân phối qua phép giao (hoặc phép hợp). Sinh viên đôi khi mắc lỗi tương tự trong đại số, chẳng hạn như khẳng định, không chính xác, rằng  $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$  hoặc  $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha + \sin \beta$ .

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

## (b) Sử dụng ký hiệu không chính xác về phần tử và tập con của tập hợp lũy thừa và nhầm lẫn giữa khái niệm “phần tử” và “tập con” khi xử lý tập hợp lũy thừa

- Nếu  $A$  là tập con của  $S$ , thì  $A$  là một phần tử của tập lũy thừa của  $S$
- Ví dụ, nếu  $S = \{p, q, r\}$ , thì  $\{p, r\} \subseteq S$ , nên  $\{p, r\} \in \mathcal{P}(S)$ . Mặt khác,  $\{p, r\} \not\subseteq \mathcal{P}(S)$ , và  $\{p, r\} \notin S$ . Ngoài ra, lưu ý rằng  $\emptyset \notin S$ ,  $\emptyset \in \mathcal{P}(S)$ , và  $\{\emptyset\} \notin \mathcal{P}(S)$

## (c) Viết $\{\emptyset\}$ để biểu diễn tập rỗng

- Một lý do tại sao đây không phải là tập rỗng vì nó có một phần tử trong đó
- Ký hiệu đúng cho tập rỗng là  $\{\}$  hoặc  $\emptyset$ . Tập rỗng là một tập hợp không có phần tử nào

## (d) Bỏ sót dấu ngoặc đơn một cách không chính xác trong các biểu thức liên quan đến giao, hợp và hiệu của tập hợp

10 Một số lỗi thường gặp

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

- Khi không có thứ tự ưu tiên mặc định của các toán tử, một biểu thức như  $A \cap B \cup C$  là không rõ ràng, vì nó có thể có nghĩa là  $(A \cap B) \cup C$  hoặc  $A \cap (B \cup C)$ , và đây không phải là các tập hợp giống nhau. Điều quan trọng là phải đặt dấu ngoặc đơn để người đọc biết bạn muốn biểu đạt điều gì

## (e) Không coi hàm số là một đối tượng ở mức trừu tượng cao hơn so với phần tử, cặp có thứ tự, hoặc tập hợp

- Ký hiệu  $f : A \rightarrow B$  có nghĩa là  $f$  là một quy trình hay một quy tắc phải áp dụng cho *mọi phần tử của  $A$*  và *trong mỗi trường hợp cho ra kết quả trong  $B$* .
- Một hàm không phải là  $A$ , không phải là  $B$ , không phải là phần tử của  $A$  hoặc  $B$ , nó cũng không phải là tác động trên chỉ một phần tử của  $A$ . Ví dụ, nếu  $f$  là hàm số từ  $\{1, 2, 3\}$  đến các số tự nhiên có quy tắc  $f(x) = x^2$ , thì  $f$  là toàn bộ quy trình gán 1 cho 1, 2 cho 4, và 3 cho 9; nó không phải là, ví dụ, chỉ số 9 hoặc chỉ là cặp  $(3, 9)$ .

11 Một số lỗi thường gặp

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

12 Một số lỗi thường gặp

## (f) Nhầm lẫn giữa ý tưởng rằng một hàm phải được định nghĩa rõ ràng với khái niệm một-một

- Một hàm nói chung không cần có tính chất là các phần tử khác nhau của miền xác định được ánh xạ đến các phần tử khác nhau của miền giá trị. Điều mà một hàm số phải thỏa mãn là yêu cầu rằng hai phần tử khác nhau của miền giá trị không thể cùng là ảnh của cùng một phần tử trong miền xác định
- Như vậy  $f(x) = x^2$  là một hàm từ tập hợp số thực đến tập hợp số thực không âm (nó là toàn ánh nhưng không một-một), nhưng  $f(x) = \pm \sqrt{x}$  không phải là một hàm số từ số thực không âm đến số thực

## (g) Tính toán không chính xác các giá trị của hàm sàn (floor) và trần (ceiling), đặc biệt là đối với các giá trị âm

- Hàm sàn luôn làm tròn xuống, và hàm trần luôn làm tròn lên. Vì vậy, ví dụ,  $\lfloor -3.2 \rfloor = -4$ , và  $\lceil -3.2 \rceil = -3$



# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

## (h) Sử dụng ký hiệu hàm sai, đặc biệt là với biến trong phương trình định nghĩa

- Cách viết đúng: Đầu vào nằm vào bên trong dấu ngoặc đơn theo sau tên hàm, và toàn bộ biểu thức sau đó biểu diễn đầu ra
- Ví dụ, nếu  $f(x) = x^2$ , thì việc viết  $f(7) = 49$  là chính xác, và các cách viết không chính xác là  $f = 49$  hoặc  $f = 7$  hoặc  $7 = 49$

## (i) Nhầm lẫn ký hiệu hàm với phép nhân

- Mặc dù việc viết hai biểu thức toán học cạnh nhau, đặc biệt là với dấu ngoặc đơn, thường ám chỉ phép nhân, điều này chắc chắn không áp dụng khi đối tượng đầu tiên là một hàm số
- Ví dụ, nếu một hàm được định nghĩa bởi  $f(x) = x + 10$ , thì  $f(7)$  có nghĩa là “ $f$  của 7” (trong trường hợp này là 17) chứ không phải “ $f$  nhân với 7” (điều này không có ý nghĩa)

## (j) Cho rằng mọi hàm số đều là tuyến tính

13 Một số lỗi thường gặp

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

- Luật phân phối cho các số cho biết rằng  $t(x + y) = t(x) + t(y)$  nếu  $t$ ,  $x$ , và  $y$  là các số và ký hiệu viết liền nhau biểu thị phép nhân. Ví dụ,  $8(2 + 10) = 8 \cdot 2 + 8 \cdot 10$ ; cả hai vế đều bằng 96
- Tuy nhiên, nếu  $t$  là hàm bình phương và  $x$  và  $y$  vẫn là các số, thì  $t(x + y) = t(x) + t(y)$  không đúng; nếu chúng ta lấy  $x = 2$  và  $y = 10$ , thì vế trái là  $(2 + 10)^2 = 12^2 = 144$ , trong khi vế phải là  $2^2 + 10^2 = 4 + 100 = 104$

## (k) Áp dụng không chính xác trực giác về tập hữu hạn cho tập vô hạn

- Ví dụ, nếu một tập hữu hạn  $A$  có thể được đặt vào tương ứng một-một với một tập con thực sự của  $B$ , thì rõ ràng  $|A| < |B|$ . Tuy nhiên, điều này không đúng nếu  $A$  là tập vô hạn

14

Một số lỗi thường gặp

17

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

- Chẳng hạn, xét  $A$  là tập các số tự nhiên chẵn và  $B$  là tập tất cả các số tự nhiên—khi đó  $A$  có thể được đặt vào tương ứng một-một với (thực tế là) một tập con thực sự của  $B$ , nhưng  $A$  cũng có thể được đặt vào tương ứng một-một với toàn bộ  $B$  (ghép cặp  $2n$  với  $n$  cho  $n = 0, 1, 2, \dots$ ), do đó thực tế  $|A| = |B|$

## (l) Không vẽ hình minh họa khi xử lý các quan hệ

- Đồ thị có hướng (digraph) của một quan hệ trên một tập hợp cung cấp một cách tuyệt vời để hình dung những gì đang diễn ra
- Lỗi phổ biến này có thể được tổng quát hóa: Không vẽ hình minh họa khi xử lý bất kỳ đối tượng toán học nào

## (m) Quên xem xét các cặp $(a, b)$ và $(b, a)$ khi kiểm tra tính chất bắc cầu của một quan hệ

- Trong trường hợp này, người ta cần có (hoặc thêm vào)  $(a, a)$  và  $(b, b)$  nữa

15

Một số lỗi thường gặp

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

## (n) Không nhận ra rằng tính đối xứng hoặc tính bắc cầu thường đúng một cách tầm thường (vacuously)

- Ví dụ, quan hệ  $\{(1, 2), (1, 3)\}$  thỏa mãn tính chất bắc cầu, bởi vì phát biểu “nếu  $(a, b)$  và  $(b, c)$  đều thuộc quan hệ thì  $(a, c)$  cũng thuộc quan hệ” đúng một cách tầm thường—tức là, không có cặp nào làm cho giả thiết của mệnh đề điều kiện này đúng

## (o) Giả định không chính xác rằng mọi quan hệ đều có các tính chất mong muốn, như tính đối xứng hoặc tính bắc cầu

- Chắc chắn không phải mọi quan hệ đều là quan hệ tương đương
- Các phần tử có thể không so sánh được với nhau (ví dụ, không đúng rằng  $\{1, 2\} \subseteq \{1, 3\}$  và cũng không đúng rằng  $\{1, 3\} \subseteq \{1, 2\}$ )
- Nếu tôi biết bạn và bạn biết Mary, điều đó không có nghĩa là tôi nhất định biết Mary

16 Một số lỗi thường gặp

# Một số lỗi thường gặp (tiếp)



Các cấu trúc cơ bản

Hoàng Anh Đức

Tập hợp

Nghịch lý

Lực lượng của tập vô hạn

Định nghĩa

Tập đếm được và không đếm được

## (p) Làm cho việc hiểu quan hệ tương đương trở nên phức tạp hơn mức cần thiết

- Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể nghĩ về một quan hệ tương đương như một quan hệ có dạng “hai phần tử có liên hệ với nhau khi và chỉ khi chúng có cùng một điều gì đó”
- Ví dụ, quan hệ tương đương trên tập hợp các số nguyên được cho bởi “ $a$  có liên hệ với  $b$  khi và chỉ khi  $a \equiv b \pmod{7}$ ” có thể được hiểu là “ $a$  và  $b$  có liên hệ khi và chỉ khi chúng có cùng số dư khi chia cho 7”

## (q) Suy nghĩ không đúng rằng một số toán tử phân phối qua các toán tử khác

- Ví dụ, không đúng rằng  $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$  hoặc  $\sqrt{a^2+b^2} = a+b$  hoặc  $a^x + a^y = a^{x+y}$  hoặc  $\log(a+b) = \log a + \log b$

17

Một số lỗi thường gặp

17