산림임업용어사전 — ㄱ (2/2)

← 목차 · 406개 용어 · 군상무육 ~ 끝동부리

군상무육 群狀撫育 · group tending
단목적 무육(Einzelstammpflege)에 대한 말.

No.854 · 산림청 원문

군상산벌작업 群狀傘伐作業 · group-shelterwood method
임분을 작업에 편리한 적절한 모양으로 나누어 구획된 임지의 입목을 예비벌, 하종벌, 후벌 등의 순서로 비교적 짧은 기간 내에 모두 벌채하면서 후계림을 조성하는 작업방법이다.

No.855 · 산림청 원문

군상지 群狀地 · (獨)loch
경신면의 모양과 크기에 대한 말.

No.856 · 산림청 원문

군상택벌작업 群狀擇伐作業 · group-selection method
임분을 작업에 편리한 적절한 모양으로 나누어 구획된 임지의 입목 중에서 성숙목이나 피해목들만 골라서 베어내는 작업방법이다.

No.857 · 산림청 원문

군생분포 群生分布 · clumped distribution
어떤 개체들이 무작위로 나타나는 것은 아니지만 매우 불규칙하게 나타나는 것이다.

No.858 · 산림청 원문

군소도서개발도상국 群小島嶼開發途上國 · SIDS : Small Island Developing States
도서국가연합(AOSIS)의 일부로 개발도상국만으로 이루어져 있다(AOSIS는 저개발국가도 포함되어 있다). 이 그룹은 기후변화에 영향을 받기 쉽다고 알려져 있다. 현재, SIDS와 최저개발국(LDC)은 기후변화협약 도입과 재정, 기술이전, 역량 제고와 CDM에 있어서 특별한 지원을 받는다.

No.859 · 산림청 원문

군유림 郡有林 · county forest
지방자치단체인 군에서 소유하고 있으며, 모범적인 경영에 의해 기본재산으로 조성코자 하는 산림이다. 그러나 군유림의 대부분은 과거 면유림(面有林)으로서 소규모, 분산되어 있으며 관리가 부실한 편이다. 1999년말 현재 군유림은 339,472ha인데, 시업지가 277,666ha이고 시업제한지는 61,806ha이다.

No.860 · 산림청 원문

군집 群集 · community
일정 지역에 살고 있는 서로 상호작용하는 종들의 모임

No.861 · 산림청 원문

군집생태학 群集生態學 · community ecology

1) 군생태학(群生態學, synecology): 집단으로서의 생물을 취급하는 분야로서, 야외의 식물군락이나 동물군집의 조성, 분류, 지리분포, 종간관계, 입지(立地)의 관계, 천이나 군락의 성인(成因), 동태 등을 취급하는 학문. 2) 군락생태학(群落生態學, synecology): 식물군락의 구조, 조직, 분류 등을 연구하는 식물생태학의 한 분야를 말한다. 주로 군집을 구성하고 있는 종 수나 각 종의 개체수, 다양성, 안정성이라는 군집 속성의 추출, 생물종 사이의 상호작용의 해석에 의한 군집구조 결정요인의 해명을 목표로 한다. 또한 각 개체군의 침입과 절멸이라는 군집구조의 시간적 동태의 측면도 취급한다.

No.862 · 산림청 원문

군집연속 群集連續 · community continuity

생물 군집이 연속적으로 분포하는 것이다.

No.863 · 산림청 원문

군총 群叢 · association

종류조성을 같게 하고 수종의 우점종을 가지고 수종의 표징종으로 특징지워진 식물의 집단을 말한다.

No.864 · 산림청 원문

굴거리나무 山黃樹 · (學)Daphniphyllum macropodum

남쪽 해변에 분포하는 상록고목. 잎장타원형. 초질. 과면분백. 길이 10-20cm. 정원수. 잎약용.

No.865 · 산림청 원문

굴광성 屈光性 · phototropism

빛 방향으로 또는 빛 반대방향을 굽어 자라는 성질이다. 줄기와 잎은 일반적으로 양의 굴광성(heliotropism, actinotropism; 향일성)을 나타내고, 뿌리는 굴광성을 갖지 않거나 혹은 음의 굴광성(negative heliotropism; 배일성)을 나타낸다. 고등식물에 있어 빛의 감수부위는 줄기와 뿌리의 첨단에 있고, 잎에서는 엽신(葉身)에 있다. 남향 또는 임연에서 자라는 수목들이 햇빛 쪽을 향하여 왕성한 가지를 발달시키는 현상도 굴광성에 의한 것이다.

No.866 · 산림청 원문

굴림대 轉?杆 · hooklever

전재용기구로서 든든한 막대와 쇠갈구리로 되어 있다.

No.867 · 산림청 원문

굴벌레나방 木?蛾 · oriental carpenter moth

굴레나방과 나비목. 사과, 배, 벚, 감, 호두, 느릅, 버들, 미류, 참나무, 오리나무, 자작, 물푸레나무 등을 가해하고 줄기에 갱도를 뚫는다. 2년에 한번 발생하며 성충은 6-7 月에 나타나 수피사이나 줄기의 아래쪽에 무더기로 알을 낳는다. 똥의 배출공에 접촉성 살충제를 주입한다.

No.868 · 산림청 원문

굴삭기 掘削機 · excavator

굴착기.

No.869 · 산림청 원문

굴습성 屈濕性 · hydrotropism
식물의 뿌리가 상대습도가 높은 쪽으로 굽어 생장하는 성질로서 수분에 대한 굴화성이다. 우산이끼나 고사리 전엽체의 헛뿌리도 습기가 많은 기질 쪽으로 활발하게 자란다. 뿌리에 있어서 뿌리 끝 부분만이 습기에 반응한다.

No.870 · 산림청 원문

굴열성 屈熱性 · thermotropism
기관의 양쪽사이에 온도차이에 의하여 생장의 차이가 일어남으로서 기관이 굽어 자라는 현상. 많은 꽃들이 온도에 따라 꽃잎을 열거나 닫는다. 튤립꽃의 경우 야외에서 야외보다 10℃정도 높은 실내로 옮기면 몇 분내에 꽃잎을 연다. 다시 야외로 옮기면 그 반대로 꽃잎을 닫는다. 화경, 과경, 덩굴손이 굴열성을 나타낸다.

No.871 · 산림청 원문

굴절 屈折 · refraction
매질(진공포함)속을 진행하는 파동이 파장에 비교해서 더 평활한 경계면을 지나 다른 매질속으로 나아갈 때 진행방향이 변화하는 현상.

No.872 · 산림청 원문

굴절계 屈折計 · refractometer
빛에 대한 물체의 굴절율을 측정하는 기계.

No.873 · 산림청 원문

굴지성 屈地性 · geotropism
뿌리가 중력방향으로 굽어 자라는 성질이다. 굴지성을 조절하는 기관이 근관인 것으로 알려져 왔다. 근관을 제거하면 근관이 재생될 때까지 굴지성 굴곡생장을 하지 못한다. 근관의 굴지성 자극은 근관 중앙 세포열에 있는 중력 감응기구(statolith)의 전분체를 함유한 세포에 의하여 감지되는 것으로 설명하는 가설이 있다. 전분체외에도 소포체 및 딕티오솜과 같은 세포기관도 관여하는 경우도 있는 것으로 보고되고 있다. 굴지성의 반응은 결국 생장물질의 상 · 하부 편재에 의하여 굴곡신장이 일어나게 된다. 굴지성 반응은 중력 외에도 파이토크롬을 통한 광선의 자극에 의하여서도 일어난다.

No.874 · 산림청 원문

굴착기 掘鑿機 · excavator
토사와 암석을 굴착하는 건설용 기계로서 가장 많은 것은 '파워셔블'이며 본체에 부착된 붐에 다양한 부속장치를 붙여 다양한 용도로 사용된다. 굴착기의 분류는 굴착방식과 조작방식, 작업구동방식 등에 의해 분류된다. 굴착기에는 이밖에 불도저, 캐리올과 같이 운반을 겸한 것도 있다.

No.875 · 산림청 원문

굴참나무 靑剛柳 · (學)quercus variabilis
전국적으로 분포한다. 수피가 두터운 콜크질이고 잎뒤에 성상모가 밀생한다.

No.876 · 산림청 원문

굴취 掘取 · -
캐내기.

No.877 · 산림청 원문

굴피나무 化香樹 · (學)Platycarya strobilacea
구과상의 과실이 상향한다. 이것이 Pterocarya속(감보풍, 일명 shinasawa gurumi, wing-nut 속, 하향하는 과실)과 구별된다. 호두나무과에 속하는 소향목. 잎은 7~15개의 소엽으로 되어 있다. 화피가 없고 6~7월에 개화한다. 중부이남에 분포한다.

No.878 · 산림청 원문

굴화성 屈化性 · chemotropism
반응을 나타내는 화학물질 쪽으로 굽어 자라는 현상이다. 화학물질로는 당류, 암모늄염, 인산염 등 수용성 물질, 어떤 가스물질 (산소)이 양의 굴화성을 나타내고, 식물 자신의 대사 물질 (유기산, 무기산)은 음의 굴화성을 나타낸다. 화분관이 배주 쪽으로 자라는 원리, 균사가 기주로 침입 · 생장하는 원리, 자식화분이 불임되는 원리 등은 굴화성으로 설명된다.

No.879 · 산림청 원문

굵은골재 굵은骨材 · coarse aggregate
한국공업규격 (KSF 2523)에 의해 10mm 체를 모두 통과하고, 4번체 (체눈의 크기 4.76mm±3)에 무게의 85% 이상이 남는 골재를 말한다. 조골재.

No.880 · 산림청 원문

굼벵이 蛟? · white grub
풍뎅이류의 유충. 대개 황백.

No.881 · 산림청 원문

굼벵이형 유충 蛟?型 幼蟲 · scarabaeiform larva
굼벵이처럼 생긴 유충으로 일반적으로 두꺼운 몸의 형태이며 실린더형이다. 잘 발달된 머리와 앞가슴다리 (thoracic legs)를 가지고 있다.

No.882 · 산림청 원문

굽음 曲 · sweep
입목이 생장중에 바람, 일광등의 원인으로 굽는 현상. 단곡재(one way sweep)와 중곡재(two way sweep, 또는 double sweep)의 구별을 한다. 굽음이나 비틀림(twist)등으로서 제재한 뒤 목재가 휘게 될때 그러한 나무를 일본말로는 '아데재'라고 부른다.

No.883 · 산림청 원문

권 ? · gena
눈밑의 액면 뒤쪽을 말하며 두순과 점하는 곳에 큰턱의 관절면이 잇고 기부에는 큰턱에 있는 관절돌기의 관절와(關節窩)가 있다. 관, 빰.

No.884 · 산림청 원문

권곡 圈谷 · cirque corric
카르. 빙식(glacial erosion)에 의해서 오목하게 된 지형. 둘레는 급준한 암벽으로 된다.

No.885 · 산림청 원문

권동 卷胴 · drum
드럼.

No.886 · 산림청 원문

권상기 卷上機 · winch
윈치.

No.887 · 산림청 원문

권수 卷鬚 · tendril
덩굴손.

No.888 · 산림청 원문

권척 卷尺 · ruler
줄자.

No.889 · 산림청 원문

궤도 軌道 · track
노반위에 도상위에 침목을 두고 궤조를 깔고 그 위에 차량을 주행시키는 설비인데 목재반출을 위한 궤도는 그 규모에 따라 산림철도와 산림궤도로 나눈다. 궤조(래일 rail)의 크기는 길이 1m 당의 무게(kg)로 나타내고 산림철도에서는 10~15kg 의 것이 또 산림궤도에서는 6~10kg의 것이 사용되고 있다.

No.890 · 산림청 원문

궤도교정 軌道較正 · Orbital Correction
위성의 궤도에 따라 동일한 지점임에도 반사율이 다르게 나타나는 영상자료를 같은 궤도상에서 측정한 자료로 표준화시키는 원격탐사자료처리기법

No.891 · 산림청 원문

궤도식 소형임내작업차 軌道式 小形 林內作業車 · track type mini forest operation car
궤도식 소형임내작업차의 특징은 측면적재 방식으로 3.6m이상 장재의 적재가 가능하고, 간이지지대와 덤프장치를 사용하여 상차와 하차 작업이 용이하다. 주행부는 고무재질의 무한궤도식으로 임지답압 및 훼손을 최소화하도록 설계 되었고, 승용 보행 겸용으로 작업원의 피로감을 최소화 할 수 있다.

No.892 · 산림청 원문

궤도운반 軌道運搬 · rail road transportation
노반위에 및 침목을 두고 철제 궤도(rail)를 깔고 그 위에 차량을 주행시키는 집 · 운재설비로서 목재반출을 위한 궤도는 그 규모에 따라 산림철도와 산림궤도로 나뉜다. 궤도(rail)의 규격은 단위 길이당 무게(kg)로 나타내는데 산림철도에서는 10~15 kg/m, 산림궤도용으로는 6~10kg/m인 궤도가 사용된다.

No.893 · 산림청 원문

궤도운재 軌道運材 · railroad transportation
궤도로서 트롤리에 목재를 적재해서 운반하는 방법이다.

No.894 · 산림청 원문

궤쌓기 櫃石工 · coursed masonry
켜쌓기.

No.895 · 산림청 원문

궤양 潰瘍 · canker
종종 수피 표면아래 움푹 들어간 수피 조직의 뚜렷이 한정된 괴사에 의한 특징화된 식물병 증상

No.896 · 산림청 원문

궤양병 潰瘍病 · Bacterial canker
줄기, 잎, 열매의 껍질의 조직이 우므러지면서 죽고 그 주위가 코르크층을 형성하면서 나중에는 껍질이 찢어져서 거칠어지는 식물의 병으로 귤, 탱자 등에 발생한다

No.897 · 산림청 원문

귀납법 歸納法 · inductive method
1) 개개의 사례를 관찰함으로써 이러한 사례들이 포함되는 일반 명제를 확립시키기 위한 추리를 귀납이라고 하며, 귀납에 의한 과학적 연구법을 귀납법이라고 한다. 따라서 귀납법은 구체적인 관찰, 조사, 실험을 통하여 일반적인 정설, 법칙, 또는 진리를 유도하는 방법을 말한다. 2) 귀납적인 추리 방법을 체계적으로 조직화한 것으로서 이와 비슷한 의미로 귀납논리학이라는 용어를 쓰기도 한다. 역사적으로 볼 때 영국의 철학자 · 경제학자인 J.S.밀의 유명한 귀납법 외에도 여러 방법이 연구 · 시도되어 왔다. 그러나 연역적인 추리방법을 조직화한 논리학이 상당히 오래 전부터 큰 진전을 보이고 현재까지 착실히 발전되어 온 데 비하면 귀납법의 연구는 부진한 편이다. 그 이유는 하나의 바른 귀납(성공한 귀납)과 그렇지 않은 귀납을 구별하기가 대단히 어렵기 때문이다. 그러나 확률론을 통계학에 응용함으로써 얻을 수 있는 귀납수속에 대한 연구는 최근 눈부신 발전을 보아 추계학(推計學) 또는 수리통계학(數理統計學)이라는 독립된 학문을 이루었다. 철학에서 추계학과 논리학의 관계를 모색하는 미국의 R. 카르나프의 연구는 귀납논리학에서의 새로운 시도로 주목된다.

No.898 · 산림청 원문

귀납적접근방법 歸納的接近方法 · inductive approach
귀납법.

No.899 · 산림청 원문

귀돌 隅石 · corner stone
돌쌓기 한 지대나 축대 등의 모서리각에 사용하는 돌로 상층과 하층을 각각 격자로 쌓는 것이 일반적이다.

No.900 · 산림청 원문

귀떼 耳芝 · -
갓떼.

No.901 · 산림청 원문

귀릉목(귀룽나무) 九龍木學 · 學 Prunus padus
흰꽃이 5 月에 핀다.

No.902 · 산림청 원문

귀무가설 歸無假說 · null hypothesis
직감에 반대되도록 세워지는 가설로서 직감이 정당하면 이 가설은 기각되어 원래로 돌아가게 된다. 직감이 옳지 않으면 이 가설이 채택된다. Ho 로써 나타낸다. 제로가설이라고도 한다. 대립가설(alternative hypothesis, Ha)의 반대어.

No.903 · 산림청 원문

귀심 歸心 · reduction to center
측량을 실시할 때 지형의 영향으로 인해 관측점과 기계의 중심 또는 시준점과 구하는 점의 중심을 일치시키지 못할 때가 있는데 이때 다른 지점에서 관측점과의 관계위치를 규명한 뒤에 관측점에서의 관측시 값으로 고치는 것을 귀심이라 한다.

No.904 · 산림청 원문

귀화 歸化 · naturalization
자생지에 살던 생물이 인위적 요인에 의해서 다른 지역에 적응하여 생존할 뿐만 아니라 번식하여 자손을 유지할 수 있는 상태로 되는 것을 말한다. 식물일 경우 귀화식물이라고 하고 우리나라에는 망초, 개망초, 달맞이꽃 등이 많이 들어와 있고, 돼지풀, 단풍잎돼지풀 등은 꽃가루가 사람에게 알레르기를 일으킨다. 대부분의 귀화식물은 음지에서 자라지 못하나 최근에 귀화된 서양등골나물은 음지에서도 자라서 숲 속의 다른 식물과의 경쟁이 관심사가 되었다. 외래식물과 혼돈하여 쓰기도 하나 사람의 간섭 없이도 번식할 수 없는 종도 외래식물이 되는 반면 귀화식물은 그렇지 않은 점이 틀리다. 동물의 경우 귀화동물이라고 하는데 배스, 불루길, 찬넬메기, 황소개구리가 우리나라에서는 심각한 귀화동물이다. 특히 곤충의 경우 미국흰불나방이 한 때 가로수에 큰 피해를 미쳤고, 솔잎혹파리는 소나무에 막대한 피해를 미쳤다. 선충의 경우 소나무에 심각한 피해를 주는 재선충이 들어와 있는데 소나무가 한번 감염되면 결국 고사하고 전파속도도 엄청나게 빨라서 사회적인 문제가 되고 있다.

No.905 · 산림청 원문

귀화식물 - · naturalized plant
원래의 생육지에서 지리적으로 떨어진 곳에 어떠한 매개체에 의해 이동되어 스스로 생육하는 식물.

No.906 · 산림청 원문

귀화종 歸化種 · naturalized species
원 자생지가 아닌 곳에 스스로 적응 · 번식하고 있는 종이다.

No.907 · 산림청 원문

규모의 경제 規模의 經濟 · economy of scale
생산요소 투입량의 증대 (생산규모의 확대)에 따른 생산비절약 또는 수익향상의 이익. 이에 관하여는 일반적으로 대량생산의 이익, 대규모 경영의 이익이라는 말이 알려져 있다. 대량생산의 이익이 기업의 생산설비가 일정한 때 발생하는 규모의 경제를 뜻하는 데 비하여, 대규모 경영의 이익은 생산설비의 확대 또는 동일 기업에서 플랜트 수의 증가를 포함한 규모의 경제를 의미한다. 생산비에는 생산량의 증대에 따라, ① 원재료비 · 노무비 같이 정비례적으로 증가하는 비례적 비용, ② 감가상각비 · 지대(地代) · 이자(利子)같은 일정한 고정비용, ③ 감독비같이 불비례적(不比例的)으로 변동하는 불비례적 비용이 있다. 따라서, 생산량이 증대함에 따라 그 단위당 평균비용이 일정한 A, 체감(遞減)하는 B, 어떤 생산량까지는 체감하고 이후 체증(遞增)하는 C에 의하여 구성되므로 B, C의 체증부분이 상쇄(相殺)되는 점까지 평균비용은 저하할 것이다. 이 점을 최적규모라고 하며, 여기에 이르

기까지 대량생산의 이익이 발생하게 된다. 최소한의 최적규모에 도달하고 있는 공장을 복수로 가지고 있는 기업의 경우에는 기업 전체의 평균비용이 공장단위의 평균비용보다 작은 경우가 많다. 그것은 대규모 관리의 이익, 대량판매의 이익, 대량구입의 이익 등에 의하는 것이고 이것을 일반적으로 대규모 경영의 이익이라고 한다.

No.908 · 산림청 원문

규반비 硅礬比 · silica-alumina ratio
규산/알루미나비.

No.909 · 산림청 원문

규사 珪砂 · silica sand
주로 이산화규소의 세립으로 된 모래이고 화강암과 같은 산성암의 풍화로 형성된다.

No.910 · 산림청 원문

규산 珪酸 · silicic acid
(1) 이산화규소(SiO_2)와 각종의 염기로 되어 있는 각종의 규산염이 알려져 있다. (2) 암석학에서는 이산화규소를 규산으로 부르는 일이 많다.

No.911 · 산림청 원문

규산/알루미나비 硅酸/알루미나比 · silica-alumina ratio
암석, 토양, 점토광물의 화학분석을 통한 SiO2와 Al2O3의 함량을 분자비로 나타낸 것이며, 규반비(硅礬比)라고도 한다. 암석, 토양 및 광물이 풍화될 때 일반적으로 Na, Ca, K, Mg, Si, Al, Fe 등의 순서로 제거되는데, 고온다우지역에서 풍화가 진행되면 이 비율은 낮아지고 규산의 용탈이 적은 조건에서는 이 비율이 커진다. 따라서 이 비율은 풍화의 정도를 나타내는 지표가 된다.

No.912 · 산림청 원문

규산2/3산화물비 硅酸 2/3 比 · silica-sesquioxide ratio
토양이나 점토광물 내에 포함된 SiO2와 Al2O3 + Fe2O3의 함량 비율을 나타내는 것이다. 규철반비라고도 한다.

No.913 · 산림청 원문

규산4면체 硅酸四面體 · silica tetrahedron
4개의 산소 원자가 1개의 규소 원자를 둘러싸고 있는 4면체로 규산염광물 구조의 기본 단위이다. 4개의 산소 가운데 동일한 평면위에 놓인 3개의 산소를 저면산소라 하고, 나머지 산소를 정점산소라 한다. 규산4면체는 규산염광물의 기본단위이고 규산4면체의 상호결합방식에 따라 다양한 종류의 규산염광물이 나타난다. 규산4면체는 이웃하는 4면체와 저면산소를 공유하면서 2차원 망상의 4면체판을 형성하고 알루미나8면체와 1:1 또는 2:1의 비율로 결합한다.

No.914 · 산림청 원문

규산나트륨 珪酸 · sodium silicate
보통 규산나트륨이라 하면 메타규산나트륨 Na_2SiO_3을 말한다.

No.915 · 산림청 원문

규산식물 珪酸植物 · silicicolos plants
사토 또는 이탄지와 같이 석회함유량이 매우 적은 곳에 자라는 식물.

No.916 · 산림청 원문

규산염 珪酸鹽 · silicate
규산염은 조암광물로서 지각의 대부분을 점유하고 Al-, Fe-, Ca-, Mg-, Na-, 염이 가장 많다.

No.917 · 산림청 원문

규산염광물 硅酸鹽鑛物 · silicate mineral
규소와 산소를 주성분으로 하는 광물로 지각 구성 광물의 90% 이상을 차지한다. 규산염광물은 규소와 산소의 사면체가 독립된 원자단으로 존재하는지 혹은 정점의 산소 원자를 서로 공유하는지에 따라 6개의 구조군으로 나눌 수 있다.

No.918 · 산림청 원문

규소 硅素 · silicon
토양에서 주로 발견되는 비금속성 원소로 자연상태에서 화합물의 형태로 나타난다. 식물을 구성하는 원소 중의 하나이다.

No.919 · 산림청 원문

규소4면체 硅素四面體 · silicon tetrahedron
규산사면체.

No.920 · 산림청 원문

규암 硅岩 · quartzite
석영 입자를 주성분으로 하는 사암이 높은 압력상태에서 생성된 변성암으로써 절단면이 매끈하다.

No.921 · 산림청 원문

규정 規定 · normal
용액의 농도를 나타내는 단위. N으로 표시. 용액 1 리터 중에 용질을 1g 당량 포함할때 이 용액의 농도를 1규정이라 한다. 1g 당양의 값은 수고 1g 원자와 화합할 수 있는 양이다.

No.922 · 산림청 원문

규제동결 規制凍結 · standstill
원래 GATT상 규제동결은 모든 회원국이 GATT 가입과 동시에 GATT협정에 일치하지 않는 무역제한조치를 도입하지 않아야 한다는 의무를 나타내고 있다. 그러나 1947년 GATT가 설립된 이후로 많은 회원국들은 GATT에 위배되는 무역제한 조치를 취해 왔다. GATT에서 최초로 규제동결에 대한 문제가 논의된 분야는 보조금 분야이다. 즉, GATT체약국은 GATT가입당시 1958년 1월부터 1차산품을 제외한 상품에 대한 보조금을 철폐하기로 약속했다. 그러나 이러한 약속을 지킬 수 없다는 것을 공감한 체약국들은 이러한 보조금 철폐약속을 1957년 11월 30일 개최된 GATT총회에서 연기하기로 결정함과 더불어 1955년 1월에 존재하고 있는 보조금 수준을 넘어서거나 새로운 보조금제도를 도입하지 않는다는 소위 standstill (규제 현수준 동결)을 약속하게 되었다. 이처럼 보조금 분야에서부터 제기된 규제동결은 GATT회원국간 새로운 무역제한조치가 확산되면서 전무역분야로 확대 적용되기 시작했다. 규제동결의 확대적용은 1960년 GATT의 제5차 무역협상인 Dillon라운드 당시 협상지침에 관한 각료선언에서 협상력 강화를 위해서 GATT에 위배되는 관세 및 기타 보호조치의 증가

를 중지하는 것을 협상 전제조건으로 명시함에 따라서 Dillon라운드 협상기간 중 규제동결은 하나의 협상원칙이 되었다. 한편 이러한 규제동결원칙은 GATT 제6차 무역협상인 케네디라운드에서 보다 명확하게 정의되었는데, 케네디라운드 협상계획에 관한 1963년 5월 21일자 각료선언에서 선진국은 개도국의 수출에 반하는 새로운 관세 및 비관세 장벽을 인정할 수 없다고 명시했다. 이러한「보호무역조치의 동결」원칙은 1970년대 최대 다자간 무역협상인 동경라운드에서는 반영되지 못했는데, 이는 대부분의 상품이 이미 관세양허가 이루어졌으며 관세에 의한 규제수단보다는 비관세에 의한 수입규제가 대부분을 이루고 있다는 점이 인식되어 규제동결없이 막바로「수량제한의 철폐」등을 포함한 비관세장벽 제거협상을 개시했기 때문이다. 그러나 동경라운드 협상시 이러한 구상은 계속되는 보호주의 추세로 무위로 돌아가게 되었으며, 1980년대 뉴라운드 협상의 추진과 관련하여 새로운 관점에서 규제동결이 대두되었다. 1982년 GATT 각료선언은 규제동결을 GATT가 취해야 할 중요 행동계획으로 포함하고 있으며, 규제동결을 'GATT협정과 일치하지 않는 조치를 유지하거나 도입하지 않으며 국제무역을 제한 또는 왜곡하는 조치를 피하기 위해 노력하는 의무'로 명확하게 정의하고 있다. 이같은 정의 아래 개도국은 뉴라운드협상의 전제조건으로서 선진국의 약속을 요구하고 있으며, 선진국은 협상의 대상으로서 규제동결원칙의 적용이 선 · 개도국 모두에 형평의 원칙에 맞게 적용되어야 함을 주장하고 있다. 이러한 의견대립 속에서 선 개도국들은 뉴라운드 추진을 위한 고위실무회담(Senior Officials Meeting)과 1986년 1월부터 계속되고 있는「뉴라운드 준비위원회」에서 의견차를 좁히는 노력을 계속하였다. 뉴라운드 준비위원회 의장은 규제동결을 '현상황의 악화를 방지하는 것'으로 폭넓게 정의하고 있다. 한편 1986년 9월말 우루과이에서 개최된 GATT각료회의에서는 신국제무역협상(우루과이라운드)을 개시키로 합의하였으며 동시에 협상기간중 규제동결 및 Rollback이 이행되어야 한다는 약속이 참가국간에 이루어졌으며 이의 감독을 위해 GATT무역협상위원회에 다자간 특별감시기구를 설치키로 합의하였다.

No.923 · 산림청 원문

규제철폐 規制撤廢 · rollback

GATT에서 말하는 규제철폐는 GATT에 위배되는 현존 규제조치를 철폐하거나 GATT에 일치시키는 것을 의미하고 있다. 광의로 해석할 때 규제철폐는 이미 GATT가 성립되면서 시작되었다고 볼 수 있는데, 이는 GATT의 궁극적 목표 중 하나가 관세의 완전철폐에 있으며, 이미 7차례에 걸친 다자간협상에서 관세인하협상이 있어 왔기 때문이다. 반면 협의로 해석할 때는 동경라운드 때부터 규제철폐라는 개념이 도입되었다. 즉, 동경라운드 이전까지 행해진 6차에 걸친 관세인하협상 결과 관세에 의한 장벽은 거의 소멸된 반면, 각종 비관세적인 규제조치가 급격히 늘어났기 때문에 비관세 장벽의 거래가 실질적인 무역 자유화에 기여하게 될 것이라는 인식이 제기되었다. 그 결과 동경라운드 협상에서는 수량제한소그룹(QR-sub-group)이 설치되어 각종 비관세장벽의 철폐협상이 본격화되었기 때문이다. 그러나 동경라운드 협상결과 비관세장벽 분야에서 실질적인 규제철폐는 이루어지지 못했고 80년대 접어들면서 뉴라운드 협상의 필요성과 더불어 82년 GATT각료선언은 GATT위배 조치를 유지하지 않도록 하는 약속을 포함함으로써 규제철폐의 중요성이 새롭게 강조되기 시작했다. 제네바에서 86년 1월부터 7월말까지 진행된 뉴라운드 준비위원회에서 나타난 선 개도국이 보는 규제철폐입장은, 선진국은 규제철폐를 '모든 무역조치를 철폐하거나 GATT 제규정에 일치시키는 것'으로 보고 있으며 선후진국 모두가 실시해야 하는 것으로 보고 있는 반면 개도국은 'GATT에 일치하지 않는 모든 수입제한적 조치의 철폐'를 규제철폐로 간주하면서 선진국만이 실시해야 하며 정해진 시한에 이루어져야 한다는 보다 엄격한 개념의 도입으로 맞서왔다. 일반적으로는 늦어도 UR 협상종료시까지 합의된 시한 내에 GATT와 불일치하는 무역상 제한을 점진적으로 철폐하겠다는 약속을 의미한다.

No.924 · 산림청 원문

규조토 硅藻土 · diatomaceous earth
곤충의 각질에 대하여 강력한 연마력을 가지고 있는 증량제의 종류로, 주성분은 규산이며 불순물로 AI2O3가 약 10%정도 함유되어 있다.

No.925 · 산림청 원문

규준틀 規準틀 · -
겨냥틀.

No.926 · 산림청 원문

규철반비 硅鐵礬比 · silica-sesquioxide ratio
규산2/3산화물비.

No.927 · 산림청 원문

균 菌 · fungi
일반적으로 곰팡이, 균류를 말함. 진핵생물이며, 광합성을 하지 못하는 종속영양생물로 유기물의 분해하여 살아감. 생태계에서 탄소순환과 양분순환의 기능을 함. 버섯도 포함됨.

No.928 · 산림청 원문

균근 菌根 · mycorrhiza, fungus root
1) 식물의 뿌리에 어떤 특정한 균류가 침입하여 곰팡이는 기주식물에게 무기양료와 물을 흡수하여 공급해 주고, 항생물질로 뿌리를 보호해 주는 대신에 기주식물의 뿌리는 곰팡이에게 탄수화물과 아미노산 등을 공급해주는 공생체를 이룬다. 대부분 육상식물(97%)에서 나타나며 무기영양소가 부족하거나 건조지나 북극, 고산지대 등 생육환경이 불량한 곳(건조, 독성물, 고온, 저온)에서 식물들은 균근으로 유리하게 생존한다. 산림토양의 무기양료 중에서 균근이 공급하는 인산과 암모늄태질소는 수목의 생장에 특히 유리하다. 균근의 형태로는 다음 3가지가 있다. ① 외생균근(外生菌根, ectomycorrhizae)은 주로 목본식물(소나무과, 자작나무과, 참나무과, 밤나무과, 버드나무과)과 담자균(basidiomycetes) 또는 자낭균(ascomycetes)이 형성하는데, 곰팡이의 균사가 세포속으로 또한 내피 속으로 들어가지 않고 세포외부에 뿌리 피층까지 자란다. 균사는 뿌리 표면을 두껍게 싸서 균투(菌套, fungal mantle)를 형성한다. 이 때 기주식물의 뿌리털은 자라지 않는다. ② 내생균근(內生菌根, endomycorrhizae)은 균사가 기주식물의피층세포 안쪽으로 침입한다. 내피세포 안쪽으로는 들어가지 않는 것은 외생균근의 경우와 같다. 균사는 뿌리밖의 토양으로 자라지만 균투를 형성하지는 않는다. 뿌리털은 정상적으로 발달한다. 내생균근의 주범위는 초본류, 주요작물(수도작 제외), 쌍자엽식물, 외생균근 목본식물을 제외한 목본식물(과수류 포함)로서 외생균근보다 넓다. 가장 흔한 내생균근은 vesicular-arbuscular mycorrhizae(VAM)이고 난초형균근(orchidaceous mycorrhizae)와 진달래형(ericaceous mycorrhizae)가 있다. VAM은 피층세포간극에 낭상체(vesicle; 소낭)를 형성하여 양분저장기능을 하고, 세포막밖에는 가지모양의 수지상체(arbuscule)을 형성하여 양분교환기능을 한다. ③ 내외생균근(內外生菌根, ectoendomycorrhizae)은 외생균근의 예외적 형태로서 외생균근, 곰팡이의 균사가 세포 안으로 침투하여 자란다. 주로 소나무류의 어린 묘목에서 발견되는데 기주의 방어능력이 부족하기 때문에 생겨나는 현상으로서 자주 관찰되지 않는다. 외부형태는 외생균근과 비슷하다. 2) 토양 내 균류가 고등식물의 뿌리에 침입하여 형성하고 있는 공생관계를 가리킨다. 어원은 라틴어의 균을 나타내는 myco와 그리스어의 뿌리를 나타내는 rhiza가 합하여 된 것이다. 양분과 수분의 흡수에 필요한 표면적을 넓혀주는 역할을 하며, 특히 고등식물에서 질소와 인의 흡수를 촉진시키는데 기

여한다. 많은 식물이 균근을 형성하며, 일부 식물은 균근이 없으면 정상적인 발달을 할 수 없는 경우도 있다.

No.929 · 산림청 원문

균근균 菌根菌 · mycorrhizal fungi
기주식물과 함께 균근을 형성하는 사상균의 일종이다.

No.930 · 산림청 원문

균독소 菌毒素 · mycotoxin
진균류 중에서 자낭균아문이 생산하는 독성물질의 총칭. 오염된 종자, 사료 또는 식품에서 곰팡이가 생성하는 독성물질로서 이들을 섭취한 사람이나 동물에게 병을 일으켜서 죽게 할 수 있다.

No.931 · 산림청 원문

균독소중독증 菌毒素中毒症 · mycotoxicoses
균독소에 의해 발생되는 병이다.

No.932 · 산림청 원문

균류 菌類 · fungi
엽록체를 가지지 않아 광합성을 하지 못하고, 합성된 유기물을 분해하여 생활한다.

No.933 · 산림청 원문

균뿌리 菌뿌리 · mycorrhiza, fungus root
균근.

No.934 · 산림청 원문

균사 菌系 · hypha
균류의 영양체를 구성하는 기본구조. 원통형의 세포가 일렬로 길게 연결된 것이다.

No.935 · 산림청 원문

균사속 菌絲束 · mycelial strand
균류에서 볼 수 있는 비교적 미분화된 균사가 평행으로 모여 형성한 끈 구조의 총칭이다. 균사는 분지하여 가는 측지를 내고, 신장하면서 넓어지며 백색이나 노란색 등을 띤다. 정단분열조직을 갖지 않는다. 영양물질 등은 균사체내를 양방향으로 이동할 수 있다.

No.936 · 산림청 원문

균사융합 菌絲融合 · hyphal anastomosis
균사끼리 융합하여 유전물질이 상호 교환되는 현상으로, 담자균의 경우 일차균사가 균사융합을 하여 이핵성의 이차균사가 된다.

No.937 · 산림청 원문

균사조직 菌絲組織 · plectenchyma
균사가 분지와 결합을 되풀이해서 얽힌 조직. 균류에서는 유관속식물에서 볼 수 있는 복잡한 조직분화는 일어나지 않으나 자낭균아문이나 담자균아문의 자실체, 균사속, 균핵 등을 형성하고 있는 균사사이에는 분화를 볼 수 있다. 대별하면, 섬유균사조직 (prosoplectenchyma)과 이형균사조직

(paraplectenchyma)이 있다. 전자는 방추조직 (prosenchyma)이라고도 하며, 서로 평행한 균사 세포의 하나하나가 비교적 가늘고 길며 양단이 약간 가늘게 되어 있는 것, 후자는 광의로 위유조직 (pseudoplectenchyma)라고도 하며, 각 균사의 세포가 짧고 굵게 변형하여 다각형 또는 유구형으로 된 것이 모여있는 경우를 말한다.

No.938 · 산림청 원문

균사체 菌絲體 · mycelium
균류의 식물체를 구성하는 균사의 양

No.939 · 산림청 원문

균산 菌傘 · pileus
버섯의 갓. 대와 함께 식용으로 되는 부분.

No.940 · 산림청 원문

균심 均深 · -
경심.

No.941 · 산림청 원문

균영 菌瘤 · bacterial gall fungous gall
세균류 또는 사상균류로서 나타나는 병인데 환부가 이상적으로 팽창하는 것. 이 혹을 균영이라 하고 근두암종병(세균이 형성), 소나무혹병(사상균이 형성) 등이 그 예이다.

No.942 · 산림청 원문

균일 분포 均一 分布 · uniform distribution
어떤 개체들이 무작위로 분배되기 보다 규칙적으로 나타나는 것이다.

No.943 · 산림청 원문

균주 菌株 · strain
균 또는 세균을 분리해서 순수배양하고 그것을 계속 배양할 때 그 계통을 균주계통이라 한다.

No.944 · 산림청 원문

균총 菌叢 · colony
콜로니. 고형 배지 위에서 하나의 균이 계속적인 분열로 눈에 보일 정도로 자라있는 무더기를 말한다.

No.945 · 산림청 원문

균핵 菌核 · sclerotium
균사체가 서로 엉켜서 밀착해서 형성된 일종의 조직. 외층은 위유조직으로 되고 외부 환경에 대하여 내구성이 있다. 불완전균류에 있어서는 포자가 전혀 없고 균사와 균핵만을 가지는 것이 있다.

No.946 · 산림청 원문

균형 均衡 · balance
생태계나 자연계가 우리 눈에 보이는 대로 유지되는 것은 어떤 균형을 잡고 있는 성질이 있기 때문이라는 생각에서 균형과 관계하여 많은 용어들이 생겨났다. 안정성도 그 중의 하나인데 연구가 깊어질수록 우리가 생각하는 균형이 아니라 여러 가지 요인과 과정을 달리하는 안정성이 나타난다는 것

이 밝혀졌다. 또한 극상을 향한 균형도 식물군집동태론에 의하여 균형을 잡고 있기 때문에 극상이 있는 것이 아니라 식물군집은 군상으로 끊임없이 변하면서 우리 눈에 거시적으로만 균형이 잡힌 군집으로 보인다는 것이 밝혀져서 지금은 고전적인 용어로 인정되고 있다.

No.947 · 산림청 원문

균형수분경쟁 均衡水分競爭 · equilibrium moisture content
연료가 무한한 시간동안 불변의 온도와 상대적 습도에 노출되었다면 접근하는 실제적 연료수분 경쟁의 가치

No.948 · 산림청 원문

그늘 陰影 · shade
빛이 차단된 조건. 상층 식생과 하층 식생의 관계는 그늘조건으로 관련된다.

No.949 · 산림청 원문

그라나 - · grana
엽록체내에서 관찰되는 밀착된 층상구조.광합성에 관여하는 색소는 이곳에서 빛을 받아들여 광화학반응을 일으켜서 광합성이 일어나게 된다.

No.950 · 산림청 원문

그라인더 - · grinder
제재톱의 날을 세우기 위해서 설치되는 기계. 띠톱(帶鋸 band saw)을 장비하고 있는 큰 제재소에서는 아래층에서 작업할 수 있도록 편리한 시설을 갖추고 있다. 띠톱의날을 세우는 과정을 거밍(gumming)이라고 한다.

No.951 · 산림청 원문

그람분자 gram 分子 · gram molecule
물질의 분자량에 상등한 그람 단위의 질량을 그 물질의 1그람분자 또는 1모르 라고 한다. 예) 산소의 1그람분자는 32.0g 이다.

No.952 · 산림청 원문

그람원자 gram 原子 · gram atom
원소에 있어서 그 원자량에 상등한 그람단위의 질량을 그 원소의 1그람 원자라고 한다. 예. 수소의 1그람원자는 1.008g이다.

No.953 · 산림청 원문

그루터기 根柱 · root stock
근주.

No.954 · 산림청 원문

그리노믹스 - · Greenomics
환경(Green)과 경제(Economics)를 결합한 단어로, 환경을 파괴하지 않으면서 성장을 이뤄가는 친환경 경제 개발 전략을 의미한다.

No.955 · 산림청 원문

그리스 - · grease
기계의 윤활유로 쓰인다.

No.956 · 산림청 원문

그린GNP - · green GNP
GNP(국민총생산) 대신에, 환경상「부」의 증가나 감소를 포함한 진정한 경제적 복지의 크기를 나타내는 것으로서 검토되고 있는 새로운 지표이다. 통상 사용하고 있는 GNP는 시장에서 가격이 있는 재화의 생산이나 소비에 의해 창출되는 가치의 증가나 감소를 나타낸 것이지만, 산림이나 물 등 환경자원의 증가나 소모의 정도를 나타낼 수 없다. 따라서 GNP를 지표로 정책이 운영되면 금적적인 복지는 증가한 것과 같이 보이더라도 환경상의 복지를 부가한 전체적인 복지는 감소하는 경우가 발생한다. 이와 같은 불합리성을 피할 수 있도록 Green GNP를 만드는 작업은, 현재 국제적으로는 경제개발협력기구(OECD)에서 추진중이다.

No.957 · 산림청 원문

그린라운드 - · green round, GR
GATT 체제하에서의 각종 '라운드'가 무역자유화를 촉진하기 위한 무역협상을 지칭한다면 그린라운드, 즉 환경문제 다자간 협상은 WTO 체제하에서 무역과 관련된 문제로써 환경문제를 논의하고 이를 무역규범에 반영시키기 위한 다자간 협상을 의미한다. 환언하면, 무역 환경 협상은 국제무역규범상에 적절한 규율(discipline)을 설정함으로서 환경보전을 위해 시행되는 무역조치 및 환경조치를 허용하되 이들 조치가 합당한 목적을 넘어서 보호주의적으로 남용되는 것을 억제할 수 있는 방안을 모색하는 작업이라고 할 수 있다. 환경규제를 무역장벽으로 연결시키는 유형의 사례는 1990년 10월 개정된 미국의 대기정화법이 대표적인 것이다. 결국 그린라운드 체계성립 이후엔 수입국가의 환경기준을 지킬 만큼 생산기술이나 설비를 대폭 개량해야만 한다. 각 국은 나름대로 환경적 경제적 여건을 보유하고 있으며, 각 국이 환경보전을 이유로 시행하는 무역제한조치는 제품의 국제경쟁력에 영향을 미치며, 따라서 환경보전과 보호주의 견제를 동시에 달성할 수 있는 적절한 규율이 무엇인가에 대하여 각 국은 상이한 입장을 보유하고 있으며, 이에 따라 무역 환경협상이 전개되고 있다.

No.958 · 산림청 원문

그린룸 - · Green Room
GATT 본부에 있는 소회의실(방의 벽지색깔이 엷은 녹색이어서 명명). 그린룸 회의라고 하면 보통 각 국의 협상수석대표를 1인으로 하여 중요안건을 다루는 회의이며 정치적 판단을 요하는 의제에 대한 최종토론 및 결정의 성격을 갖고 있다. GR회의는 대체로 각료급 · 고위급 · 실무급 등으로 구분할 수 있는데 정치적 타협과 결정을 요하는 기본원칙에 대해서는 각료급이나 고위관리급 GR회의가, 기술적 검토사항 및 이의 결정을 요하는 사항에 대해서는 실무급 GR회의가 열린다. GR 회의 참가국은 주요국가로 한정되며 사무총장의 초청형식으로 이루어지며 보통 GR의 좌석수에 따라 20여개국 정도의 초청대상국가가 결정되나 이는 유동적이다. 한 국가의 참가인원은 1+1(대표와 보좌관 각 1명)로 한정되나 사안의 중대성에 따라 1+2가 되기도 한다.

No.959 · 산림청 원문

그린벨트 - · green belt
개발제한구역.

No.960 · 산림청 원문

그린플루언서 - · Greenfluencer
'녹색과 환경'을 뜻하는 Green과 '영향력을 가진 사람'이란 뜻인 Influencer를 합친 신조어로, 기업과 상품이 얼마나 친환경적인지에 관심을 갖고, 친환경 브랜드를 주변에 소개하면서 새로운 시장 트랜드를 이끄는 소비자로 통용

No.961 · 산림청 원문

그물맥(망상맥) 網狀脈 · netted vein
잎맥이 잎 몸의 중앙 아래에서 위로 이어지는 큰 맥인 주맥과 여기에서 갈라지는 측맥으로 발달한 잎맥으로 대부분의 쌍떡잎식물 잎들이 이에 속한다. 특히 주맥과 측맥이 깃털모양으로 발달한 맥을 우상맥, 단풍나무처럼 손바닥 모양으로 갈라져 발달한 것을 장상맥, 주맥이 3개로 발달해 보이는 것을 삼출맥 등으로 구분하여 부르기도 한다.

No.962 · 산림청 원문

그을음 높이 煤煙高 · scorch height
불 때문에 나무줄기가 그을리거나 가지가 타서 그을음이 생기게 되는 평균 높이를 말한다.

No.963 · 산림청 원문

그을음병 煤病 · sooty mold
대개는 잎 표면에 흑색의 균사가 만연해서 그을음상의 막을 형성한 것처럼 보이는 병의 총칭. 낙엽송, 소나무류, 동백나무 등에 잘 발생한다.

No.964 · 산림청 원문

극대 極帶 · polar zone
한 대.

No.965 · 산림청 원문

극림 棘林 · horn forest
가시가 많은 숲으로 생육기간보다 건조기가 더 긴 지역에 발달한다. 건조한 기후 때문에 수고가 낮고 낙엽이 지지만, 잎은 퇴화하여 굵고 또한 클로로필을 갖는 가지나 줄기를 갖는 숲으로 이루어진다. 사바나와 사막의 중간지역에 출현하는데, 같은 생활형을 갖는 건생식물이 섞여 있는 경우가 많다.

No.966 · 산림청 원문

극상 極相 · climax
1) 동물이 외계의 영향을 받아 변화하여 안정적인 생태적 조건에 도달한 상태이다. 2) 주어진 환경조건 하에서 천이에 의하여 군집조성이 점차 변화하여 그 지역의 환경조건에서 장기간 안정을 지속하는 상태로 최고 단계까지 천이하여 평형을 이룬 상태임. 극상의 생태계에서는 연간 투입된 에너지와 산출에너지가 같다. 특히 식물군락에 주목하여 말하는 경우가 많다. 동일한 기후조건과 토양조건이라면 동일한 극상군락으로 수렴한다고 믿어지고 있다. 토양 혹은 생물적 조건, 그리고 인위적 조건에 의해서 그 지역의 적합한 극상과는 다른 군락이 안정적으로 지속하는 경우가 있는데, 이를 전극상, 후극상, 방해극상, 아극상 등으로 구분한다.

No.967 · 산림청 원문

극상군락 極相群落 · climax vegetation
극상에 달한 안정된 식물군락을 말한다.

No.968 · 산림청 원문

극상군집 極相群集 · climax community
극상의 식물군을 이루는 군락을 극상군락, 산림을 극상림 또는 산림극상이라고 한다. 우리나라처럼 적습, 적온이면 보통 극상군락은 키 큰 산림이고 저온, 건조 때문에 숲이 성립할 수 없는 곳이나 해안, 고층습원 등에서는 황원이나 초원 극상군집이 된다.

No.969 · 산림청 원문

극성 極性 · polarity
세포, 조직 또는 기관이 형태적, 생리적 방향성을 갖는다. 배발생 시작단계에서 극성이 감지된다. 난(egg)과 접합자(zygote)는 그 함유물과 배열이 극성화되어 있다. 즉 핵은 식물체의 정단부로 발달한 위치에 액포는 하단부로 발달한 위치에 있다. 세포 분열시 새로이 형성되는 세포벽을 중심으로 불균등한 딸세포가 형성되고 이것은 그 후에 발생되는 기관의 형태에 영향을 미친다. 한 표피세포에서 분열 된 후 한 세포는 뿌리털 표피세포로 다른 한 세포는 보통 표피세포로 분열된다. 기공세포의 분열로 이와 같다. 버드나무가지를 절단하여 습한 조건에 매달아 놓고 새로운 조직이 분화 될 때 원래의 위치대로(가지를 바로 놓건, 거꾸로 놓건) 정단부위에서는 줄기가, 근단부위에서는 뿌리가 나오는 것은 극성의 좋은 예이다. 이것은 가지가 이미 갖고 있는 극성이 비록 가지를 짧게 잘라도 유지되고 있다는 것을 의미한다. 또한 접목시에 접수의 위치를 원래의 극성대로 접목할 때 좋은 결과를 얻을 수 있다.

No.970 · 산림청 원문

극인 極印 · marking hammer
벌채목 또는 목재에 찍는 검사용 도장.

No.971 · 산림청 원문

극인타기 極印打記 · -
쇠도장찍기.

No.972 · 산림청 원문

극지식물 極地植物 · arctic plant
1) 고위도 한대지방이나 고도가 높은 고산지역에 자라는 식물이다. 저온기간이 길고 바람의 피해가 많아 일반적으로 키가 낮고 잎이 작은 초본이다. 관목형 나무들이 이끼류나 지의류와 함께 자란다. 수목으로는 왜성인 버드나무류, 자작나무류, 향나무류가 있고 다년생초본류로는 Gentiana, Saxifraga, Draba, Androsace, Primula, Dhyteuma, Campannula, Minuartia, Senecio, Papaver 속 등이 있다. 2) 지질시대에 북극의 주변에 적응한 식물을 말하는데, 기후대로서 한지의 산림한계선 보다 위도가 더 높은 지역에 생육하고 있다. 이 곳은 생육기간이 짧고, 저온이므로 성장은 느리고, 키가 낮은 초본식물이나 관목이 이끼류, 지의류와 함께 자란다. 일반적으로 잎이 작고 꽃은 안토시아닌에 의해 홍색을 띠는 것이 많다. 백두산에서 자라는 담자리꽃나무 등이 극지식물에 속한다.

No.973 · 산림청 원문

극피동물 棘皮動物 · echinodern
극피동물 문에 속하는 동물이다. 불가사리, 성게, 해삼 등이 여기에 속한다.

No.974 · 산림청 원문

극한인자 極限因子 · limiting factor

1) 여러 가지 인자에 의하여 영향을 받는 생리적 과정은 가장 제한이 되는 인자에 의하여 가장 큰 영향을 받는다. 2) 최소량의 법칙에서 생물현상(주로 생리과정)에 관계되는 여러 가지 요인 중에 어떤 인자가 그 현상의 성질이나 크기, 속도 등을 제한하는 주요인이 되고 다른 인자는 다소 증감하더라도 거의 영향을 받지 않는 요인을 말한다. 리비히의 최소량의 법칙에서 기원한 용어이다. 제한인자.

No.975 · 산림청 원문

극핵 極核 · polar nucleus

속씨식물은 난모세포가 3회의 유사분열을 거듭하여 7개의 세포에 8개 핵을 가지고 있는 배낭을 형성하는데 배낭 중앙에 2개의 극핵이 위치한다. 화분관이 배낭에 들어가기 전후에 2개의 극핵이 2n으로 합체되고 화분관을 통해 들어온 정핵(n)과 중복 수정되어 3n의 핵이 된 후, 분열을 계속하면 다세포의 배유모세포 세포군이 배유가 된다. 참조: 중복수정, 배유.

No.976 · 산림청 원문

극형 戟形 · hastate

식물의 기관에서 그 모양을 나타내는 말로써 잎의 아래쪽이 양쪽으로 귀처럼 뾰족하게 돌출하여 마치 창끝처럼 생긴 모양이다. 고마리, 메꽃의 잎에서 볼 수 있는 형태. 창모양.

No.977 · 산림청 원문

근 根 · root

식물에서 수분 및 양분 흡수 기능, 지지 기능, 양분 저장 기능을 담당하는 지하 공간의 기관, 각각의 기능을 담당하고 세근, 뿌리털, 측근, 주근, 유조직 등의 분화가 일어난다. 참조: 뿌리, 주근, 측근, 세근.

No.978 · 산림청 원문

근경 根莖 · rhizomes

땅속에 있는 줄기를 뜻하는데 대개 지표면을 따라 수평적으로 발육한다. 아래쪽으로 뿌리를 내고 위쪽으로 잎과 지하경(aerial shoot)을 낸다. 예. 대나무, 즉 줄기의 특수형태로서 보기에는 뿌리처럼 보이는 것.

No.979 · 산림청 원문

근계 根系 · root system

식물 지하부에 뿌리가 형성하는 공간적 구조계이다. 기능적으로는 지지, 양분 및 수분흡수, 양분저장의 역할을 담당한다. 수직적 주근의 발달이 뚜렷한 주 근계, 수종과 지형 및 토양, 수분조건에 따라 주근 보다 수평적 측근의 발달이 뚜렷한 측근계, 다수의 가는 뿌리가 군집으로 뻗어 내려가고 수염뿌리계(수근계) 등 다양하다. 근계는 토양의 유효수분과 통기성과 관련하여 사막 또는 습지에서 내건성 또는 내습성과 관련이 깊다.

No.980 · 산림청 원문

근계경합 根系競合 · root competition

나무가 땅 속에 있는 수분과 양료를 서로 쟁탈하는 일.

No.981 · 산림청 원문

근고공 根固工 · foot protection work
밑막이.

No.982 · 산림청 원문

근관 根冠 · root-cap
뿌리골무. 뿌리의 정단분열조직을 보호하고 뿌리가 토양 속으로 자라는 것을 돕는 정단분열조직의 외측에서 증식되는 유세포들로서 흔히 전분을 갖고 있다. 근관 주위에는 항상 펙틴 물질로 구성된 점액물질이 쌓여 있다. 최외곽세포는 토양 속으로 이탈된다. 수경재배를 할 때는 근관이 발달하지 않을 수 있다. 근관은 정단분열조직을 보호하는 기능 외에도 근관세포 전분립이 중력을 감지하여 뿌리의 굴지성을 나타내는 기능도 가지고 있다. 뿌리 끝이 외생균근의 균투속에 쌓여 있을 때 근관은 균투속에서 계속 발달하며 최외곽 부위의 근관세포는 균투속에서 분해된다.

No.983 · 산림청 원문

근관접 根冠接 · crown grafting
줄기와 뿌리조직이 만나는 전이부분(root-stem transition region 즉 crown)에 접목하는 것. 이 근관접에는 설접, 공접, 할접 등이 적용될 수 있다.

No.984 · 산림청 원문

근괴 根塊 · Ball of earth
식물의 뿌리가 천연적으로 붙잡고 있는 흙의 분량 또는 범위이다.

No.985 · 산림청 원문

근교계 近交系 · inbreed line
근친계라고도 하며, 근친교배가 반복되어 대다수 유전자에서 동형접합의 상태인 계통이다. 육종의 목적으로 인위적으로 유도하기도 하며 완성된 근교계는 모든 유전자에서 동형접합인 순계(pure line)가 된다.

No.986 · 산림청 원문

근교계수 近交係數 · inbreeding coefficient
근친교배에 의해 동형접합체가 증가하는 정도를 나타내는 계수를 말한다. 개체에 대해서는 임의로 취해진 유전자형이 계통적으로 동일한 대립유전자의 동형접합체(autozygote)일 확률로, 집단에 대해서는 근친교배가 일어난 후에 증가하는 동형접합체의 상대적인 비율로 정의된다.

No.987 · 산림청 원문

근교약세 近交弱勢 · inbreeding depression
타식(他殖)을 주로 하는 생물집단에서 근친교배(近親交配)의 결과로 크기 · 내성(耐性) · 다산성 (多産性) 등 생물체의 적응력(fitness)과 활력(vigor)이 저하되는 현상이다. 근교약세는 열성유해유전자(劣性有害遺傳子)가 발현되는 동형접합체의 증가 및 잡종강세와 관계된 유전자의 상실 때문인데, 약세의 정도는 종류나 계통에 따라 매우 다르다. 자식약세.

No.988 · 산림청 원문

근권 根圈 · rhizosphere
1) 국소적인 의미의 근권은 뿌리둘레에 2~3mm범위의 토양이다. 다른 토양 부분보다 미생물이 더 많고, 토양의 구조 및 화학적 성분도 다르다. 식물의 뿌리가 양분 및 수분흡수를 하는데 크게 영향

을 준다. 더 큰 규모의 근권은 식물의 근계 전체가 포함하는 토양이다. 보통 50cm 깊이의 토양에 90% 이상의 뿌리가 존재한다. 2) 식물의 뿌리가 직접 접촉하게 되는 토양의 일정한 범위를 가리키며, 이 범위에서는 미생물의 종류, 수, 그리고 활동상태가 밖과는 판이하게 다르다.

No.989 · 산림청 원문

근극 根極 · distal end
근관이 있는 끝쪽.

No.990 · 산림청 원문

근단분열조직 根端分裂組織 · root apical meristem
뿌리끝의 정단분열조직

No.991 · 산림청 원문

근두암종병 根頭癌腫病 · crown gall
밤나무, 호두, 버드나무, 포플러 등에 피해가 많다. 보통 지면에 가까운 줄기 및 뿌리 연결부가 감염된다. 환부의 세포가 이상분열 해서 팽대하여 혹과 같이 된다. 접목표에 있어서는 접착부에 흔히 발생한다. 접밀을 칠하는 것이 좋다.

No.992 · 산림청 원문

근류 根瘤 · root nodule, root tubercle
근류균이 공생하는 뿌리혹모양의 부분.

No.993 · 산림청 원문

근류균 根瘤菌 · root nodule bacteria
뿌리혹박테리아.

No.994 · 산림청 원문

근린공원 近隣公園 · neighbourhood park
공원의 위치와 이용자의 관계로서 붙여진 이름인데 목적으로 말하면 휴양공원(recreation park)의 뜻을 가지고 있다.

No.995 · 산림청 원문

근맹아 根萌芽 · root sprout
뿌리움. 뿌리조직에서 나온 움돋이.

No.996 · 산림청 원문

근모 根毛 · roothair
뿌리털. 뿌리의 표피세포에서 기원한 단세포로서 수분과 양분을 흡수하는역할을 한다.

No.997 · 산림청 원문

근부 根腐 · root rot
뿌리썩음.

No.998 · 산림청 원문

근부 根部 · root
뿌리.

No.999 · 산림청 원문

근삽 根揷 · root cutting
뿌리를 적절한 길이로 잘라 보습재료에 묻어 완전한 식물체로 키워내는 무성번식법이다. 뿌리꽂이.

No.1000 · 산림청 원문

근상균사다발 根狀菌絲束 · rhizomorph
특정 곰팡이 종의 균사가 치밀하게 모여 만든 지름 약 1~3mm 되는 검은 끈 모양의 균사다발로 식물의 뿌리처럼 분지하며 자람. 이것의 균사내부 조직은 수분 통도가 용이하도록 격막이 없어진 것도 있음. 뽕나무버섯균에서 매우 뚜렷함.

No.1001 · 산림청 원문

근상균사속 近狀菌絲束 · rhizomorph
분화한 균사조직으로 이루어진 실모양이나 끈모양의 구조물이다. 외층은 소형이며 후벽인 세포의 이형균사조직(異形菌絲組織)이고 백색 혹은 갈~흑색으로 착색된 치밀한 피층을 형성하고 안쪽은 대형의 긴 박벽세포(薄壁細胞)의 섬유균사조직이다.

No.1002 · 산림청 원문

근압 根壓 · root pressure
식물이 증산작용이 일어나지 않을 때 뿌리세포의 삼투압에 의하여 토양수분을 능동적으로 흡수함으로서 뿌리 내에 수압이 형성된다. 봄철 잎이 나기 전 · 후에 또는 겨울철에 지상부 줄기나 가지를 자르면 수액이 삼출되어 압력을 형성하는 것으로서 근압을 확인할 수 있다. 근압에 의한 수액 삼출현상이 잘 관찰되는 수종은 자작나무(자작나무류), 포도나무 등이 있다. 근압은 0.1MPa 정도의 수액이 상승하는 압력으로서, 높은 나무가지까지 수액을 상승시키는 원리를 설명 할 수는 없다. 근압은 CO2가 수간의 세포간극에 축적되어 압력이 증가함으로서 형성되는 수간압(stem pressure)과 다르다. 사탕단풍나무, 야자나무, 아가베(Agave)나무 등의 줄기에 상처를 주었을 때 수액이 나오는 현상은 수간압에 의한 것이다.

No.1003 · 산림청 원문

근압설 根壓設 · root pressure
식물의 도관에 근압이 형성되는 원리에 대한 이론적 설명. 뿌리 세포의 삼투압이 무기양분의 능동적 흡수에 의하여 형성되므로 뿌리압이 형성된다는 가설이다.

No.1004 · 산림청 원문

근원경 根元徑 · diameter at root
근원직경.

No.1005 · 산림청 원문

근원기 根原基 · root primordium
원근기.

No.1006 · 산림청 원문

근원부 根源部 · root collar
뿌리와 줄기가 만나는 지면 가까이의 수간 밑부분을 칭한다.

No.1007 · 산림청 원문

근원직경 根元直徑 · diameter at root collar; diameter at butt end
일반적으로 산림조사에서 직경을 측정할 때 입목의 흉고부위(지상 1.2m)의 직경을 이용하지만, 수고가 1.2m에 미치지 못하는 어린 나무의 경우에는 흉고직경의 측정이 불가능하므로 뿌리와 가장 가까운 부분의 직경을 측정하는데, 이때 뿌리와 가장 가까운 지표부위의 직경을 근원직경이라고 한다. 근원경.

No.1008 · 산림청 원문

근자연하천공법 近自然河川工法 · near natural river construction
치수공사에 있어서 하천이 본래 갖고 있는 생물의 양호한 생육환경을 고려하면서 하천을 보전하는 공법

No.1009 · 산림청 원문

근장 根長 · root length
뿌리의 길이. 보통 주근 또는 측근의 길이이다.

No.1010 · 산림청 원문

근장재 根張材 · swelled butt
뿌리 부위가 굵은 나무를 말한다.

No.1011 · 산림청 원문

근적 根跡 · root trace
줄기에 난 부정근에 줄기부터 분지되어 들어온 유관속.

No.1012 · 산림청 원문

근주 根株 · stump, root stock
수목의 뿌리목 이하의 부분이며, 흔히 벌채 후 남겨진 줄기부분을 포함하여 그루터기라 한다.

No.1013 · 산림청 원문

근주고 根株高 · stump height
벌근고.

No.1014 · 산림청 원문

근주맹아 根株萌芽 · stoolshoot rootsucker
근관 부근에서 나온 움돋이. 간맹아(幹萌芽, stool-shoot), 근맹아(根萌芽, root-sucker)라고도 한다.

No.1015 · 산림청 원문

근주재 根株材 · stump wood
벌목 후 임지에 남은 그루터기 부분의 나무를 뜻한다.

No.1016 · 산림청 원문

근주재적 根株材積 · stump volume
벌채점이하의 지상에 남겨진 부위의 재적을 말한다. 따라서 근주재적을 계산하기 위해서는 지상 0.1m의 직경을 측정하여 후버식으로 계산할 수도 있고 또한 근주직경과 근원직경을 측정하여 스말리안식으로 계산할 수도 있다. 하지만 근주재적은 이용가치가 적기 때문에 보통 목측에 의하여 측정하기도 하는데, 경우에 따라서는 벌채점이하의 뿌리목과 뿌리의 재적 합계 모두를 근주재적으로 취급하기도 한다. 벌근제적.

No.1017 · 산림청 원문

근주직경 根株直徑 · stump diameter
나무의 벌채는 보통 지상 0.2m를 벌채점으로 한다. 이와 같이 벌채 후 남겨진 부위를 근주(stump)라고 하는데, 벌채점인 지상 0.2m 부위의 직경을 근주직경이라고 한다.

No.1018 · 산림청 원문

근주형수 根株形數 · stump form factor
형수를 계산할 때 근주재적을 원주체체적과 비교하여 만든 형수이다.

No.1019 · 산림청 원문

근지공 根止工 · toe protection of lower bank
비탈멈춤공사.

No.1020 · 산림청 원문

근출엽 根出葉 · radical leaf
로제트(rosette)과 같음. 절간이 단축되고 잎이 수평으로 난 것.

No.1021 · 산림청 원문

근친계 近親系 · inbred line
근교계.

No.1022 · 산림청 원문

근친교배 近親交配 · incest breeding
어버이와 자식, 형제자매 등 혈연이 매우 가까운 근친간에 이루어지는 교배 동계교배(同系交配)의 하나로서, 목표로 하는 형질(A)에 관하여 동형접합체(AA)의 출현율을 높여 집단 내의 형질을 균등화하는 것을 주목적으로 한다.

No.1023 · 산림청 원문

근형 根形 · rhizomorph
균사체의 두꺼운 섬유는 함께 꼬인 균사의 섬유 그리고 뿌리와 비슷한 것으로 이루어져 있다. 뿌리와 닮아 있고 같이 꼬여진 균사의 가닥으로 구성 하고 있는 균사체의 두꺼운 가닥

No.1024 · 산림청 원문

글레이화작용 灰色化作用 · gleization
강수량이 많은 평지에서 지속적으로 침수되어 세균의 활성도가 낮고 유기물의 분해가 느려 두꺼운 유기물층이 형성되고 여기서 유기산이 방출되어 토양 중의 철과 반응하여 환원됨으로써 암회색, 청회색을 띠는 현상.

No.1025 · 산림청 원문

글렌이글스 행동계획 行動計劃 · Gleneagles Plan of Action
2005년 글렌이글스에서 개최된 G8 회의에서 제출한 법안으로 기후변화, 청정에너지와 지속가능한 개발을 다루고 있다. 에너지효율 증가, 수송과정에서의 배출 감소, 청정 연소와 재생가능한 에너지 개발 등을 위한 R&D 를 지원한다. G*은 이런목적 달성을 위해 IEA 및 다른 국제기구와 협력하고 있다.

No.1026 · 산림청 원문

글루코만난 - · glucomannan
mannose와 glucose가 축합하여 형성된 다당류의 일종으로 침엽수재 hemicellulose의 주체를 이루는 mannan이다. 전헤미셀룰로오스 중의 60~70%를 차지하고 있으나 묽은 알칼리로 추출되지 않는다. 이전에는 분석법이 미비하여 활엽수재에는 없다고 알려졌지만 분석법이 개량됨에 따라 명확히 정량되도록 했다. 그러나 그 양은 침엽수재가 보통 20%이상 있는 것에 반해 활엽수재는 3~5%로 적다.

No.1027 · 산림청 원문

글루코시드 - · glucoside
(1) 넓은 의미로는 배당체(글루코시드)와 같은 뜻. (2) 좁은 의미로는 글루코오스를 당성분으로 하는 배당체.

No.1028 · 산림청 원문

글루코오스 - · glucose
D-glucose 를 포도당이라 한다. 단 맛이 있는 과실 중에 다량 존재한다.

No.1029 · 산림청 원문

글루쿠로노자일란 - · glucuronoxylan
xylose 골격에 methyl glucuronic acid가 단일가지로 결합하고 있는 다당류로서, 활엽수재 헤미셀룰로오스의 주체를 이루고 있고, 활엽수 xylan이라고도 불려짐. 활엽수재 전헤미셀룰로오스 중의 80~90%를 차지하고 있다. 활엽수재에 2~5% 함유되어 있는 acethyl기는 이것으로부터 유래되고 있다.

No.1030 · 산림청 원문

글루타믹산 - · glutamic acid
HOOC. $CH_2CH_2CHNH_2$. COOH α-amino 산의 하나.

No.1031 · 산림청 원문

글루타민 - · glutamine
α-amino 산의 종류이고 글루타믹산과 암모니움 이온으로 부터 생성된다. 各種植物 種子 단백질의 구성원이다.

No.1032 · 산림청 원문

글리세롤 - · glycerol
글리세린과 같음.

No.1033 · 산림청 원문

글리세리드 - · glyceride
글리세린의 지방산 에스테르의 총칭. 대개 물에 녹지 않고, 유기용매에 녹는 중성의 물질.

No.1034 · 산림청 원문

글리세린 - · glycerol glycerine
3가 알콜의 하나. 일명 글리세롤. 무색, 점질, 단맛이 있고 수분을 흡수하는 성질이 있는 액체.

No.1035 · 산림청 원문

글리세린산 - · glyceric acid
무색. 점질인 액체.

No.1036 · 산림청 원문

글리세린알데히드 - · glyceric aldehyde
3개의 탄소로 구성된 당의 일종.

No.1037 · 산림청 원문

글리세린알콜수 - · glycerinalcoholwater
단단한 식물재료의 연화에 이용.

No.1038 · 산림청 원문

글리신 - · glycine
일명 글리코콜 아미노초산. H_2N. CH_2COOH. 가장 간단한 α-amino 산의 하나. 무색의 단사정계(單斜晶系)의 결정. 융점 232°C. 물에 녹고. 알콜과 에테르는 녹지않고, 단맛 있음.

No.1039 · 산림청 원문

글리코겐 - · glycogen
동물체내에 넓게 분포하는 다당류. 저장물질로서 식물계에 분포하는 전분과 흡사하여 동물전분이라고도 한다.

No.1040 · 산림청 원문

글리코콜 - · glycocoll
글리신(glycine)과 같은 말이다.

No.1041 · 산림청 원문

글리콜 - · glycol
(1) 에치렌 글리코콜의 약칭. (2) 2가 알콜의 총칭.

No.1042 · 산림청 원문

글리콜알데히드 - · glycolic aldehyde
알데히드 알콜의 가장 간단한 것.

No.1043 · 산림청 원문

긁는 것 剉 · rasping
소모를 위한 조각을 얻기 위해 그들의 입틀로 잎 표면을 갈거나 문지르는 곤충의 먹는 형태

No.1044 · 산림청 원문

금기돌 禁忌石 · avoidable masonry
돌쌓기를 할 때는 돌의 배치에 특히 주의하여 다섯에움 이상 일곱에움 이하(보통 여섯에움)가 되도록 해야 하는데, 이에 어긋나는 돌쌓기가 되면 돌의 접촉부가 맞지 않거나 힘을 받지 못하는 불안정한 돌이 나타나게 되는데 이를 금기돌이라 하며 불량한 돌쌓기의 원인이 된다. 금기돌에는 배치형태에 따라 넷붙임(四接), 셋붙임(三接), 넷에움(四圍), 뜬돌(浮石), 거울돌(鏡石), 떨어진돌(離石), 꼬치쌓기(串築), 선돌(縦一字), 누운돌(横一字), 이마대기(額接), 포갠돌(重疊石), 뾰족돌(尖石), 새입붙이기(鳥口築) 등이 있다.

No.1045 · 산림청 원문

금기석 禁忌石 · avoidable masonry
금기돌.

No.1046 · 산림청 원문

금로매 金露梅 · (獨)strauchiges fingerkraut
장미과(Rosaceae)에 속하는 낙엽소교목. 꽃은 밝은 황색. 과실은 난형이고 긴털이 소생 한다. 꽃이 흰 것을 백로매라 한다. 관상용.

No.1047 · 산림청 원문

금벌 禁伐 · prohibition of harvesting
수목의 벌채를 금하는 일이나 정책이다.

No.1048 · 산림청 원문

금비 金肥 · chemical fertillizer
화학비료.

No.1049 · 산림청 원문

금산 禁山 · forest reserve
조선시대 도시주변의 풍치보존과 국가에서 필요로 하는 임산물을 확보하기 위하여 일반백성의 벌채활동은 금지한 산림이다.

No.1050 · 산림청 원문

금속압력계 金屬壓力計 · metallic manometer
탄성압력계 중 금속의 탄성을 이용한 것.

No.1051 · 산림청 원문

금송 金松 · umbrella pine
잎이 선형이고 가지끝에 윤생하는 일본산 수종. Taxodiaceae 에 속한다.

No.1052 · 산림청 원문

금송계 禁松契 · pine tree protection association
조선후기에 도벌 · 남벌이 성행하고, 권세가들의 개인적인 산림점유현상이 늘어가자 일반서민들이 자기마을 주변의 소나무림을 보호함으로써 필요한 목재수요를 확보할 목적으로 조직한 자치조직이다. ⇒ 송계, 식림계.

No.1053 · 산림청 원문

금송정책 禁松政策 · prohibitive policy on harvesting the pine
조선조때 국가는 산림천택 가운데서 특정한 용도를 위해서 일반 국민의 산림이용을 제한하는 구역을 설정하였다. 국가가 가장 먼저 일반인의 산림 이용을 제한하기 시작한 곳은 도성 내외의 산이었다. 도성 내외의 산은 서울의 경관, 기맥의 보호, 하천의 사태방지 등을 위해 이용을 규제하였다. 소나무의 작벌이 금지되고, 토석의 채취는 물론 경작도 금지되었다. 이들 산은 이용을 금한다는 의미에서 금산(禁山)이라고 불렀다. 한편, 금산의 송목을 벤 자의 처벌규정을 마련하였고 금산의 범위가 확대된 이후에도 별도로 '도성내외송목금벌사목'(都城內外松木禁伐事目)을 만들어 이들 산을 보호하였다. 도성 내외의 산 다음으로 국가가 인민의 이용을 제한했던 곳은 수변, 연해, 섬 지역의 소나무가 자라는 곳이었다. 조선국가가 만들어지고 도읍을 서울로 정하고 나자 엄청난 재목이 필요하였다. 궁성과 정부기관의 건물, 서울의 민가 건물을 조성하기 위한 목재, 병선(兵船), 참선(站船), 조선(漕船) 등 선박건조를 위한 목재 수요가 많아진 것이다. 특히 송목은 조가조선소용최긴(造家造船所用最緊)라 하여 고려말부터 그 관리의 필요가 제기되었다. 태종대에 벌써 소나무가 거의 다했다는 말이 나오기 시작하여 소나무를 지속적으로 확보하기 위해서 '송목가득성장지산'을 '금화금벌'하도록 하고 수령이 이를 감독하도록 하는 조치가 취해졌다. 이에『경제육전』에도 '송목금벌법'이 실리게 되었다. 세종대에는 '금벌을 강화하기 위해 송목이 있는 곳은 산직을 정하여 지키고 일반민이 집을 짓는데는 송목을 사용치 못하게 하자'는 의견도 나왔다.

No.1054 · 산림청 원문

금원수확표 金員收穫表 · money-yield table
목재수확량을 금액으로 표시한 수확표이다.

No.1055 · 산림청 원문

금지보조금 禁止補助金 · prohibited subsidy
WTO보조금 및 상계조치협정 부속서에 예시된 바와 같이 수출성과, 수입대체에 따라 공여되는 보조금을 말하며, 금지보조금이 공여되는 경우 수입국은 수출국과 협의를 거친 이후 DSB (분쟁해결기구)에 문제를 제기할 수 있고, 수출국은 DSB의 결정에 따라 보조금을 철회해야 하며, 피해국은 수출국의 불이행시 적절한 대응조치를 취할 수 있는 권리를 갖게 된다. 금지보조금이 존재하는 경우에는 국내산업에 끼친 피해를 입증하지 않고도 금지보조금의 존재 자체만으로 구제절차 적용이 가능하다. 수입국과 수출국의 협의가 30일 이내 완료되지 않을 경우 DSB에 문제제기가 가능하며, 패널은 90일 이내에 결정을 해야 한다 (조치가능 보조금의 경우는 각각 60일과 120일임).

No.1056 · 산림청 원문

금지행위 열거방식 禁止行爲 列擧方式 · negative system
금지행위 열거방식은 당해 토지구획내에서 금지되는 토지이용행위를 열거함으로써 일부 제한된 행위이외에는 대부분의 행위가 허용되는 토지구획 관리방식이다.

No.1057 · 산림청 원문

급경사지붕괴대책사업 急傾斜地崩壞對策事業 · slope failure prevention works
붕괴위험지역에 인접한 지역으로부터의 토석류 유출 및 산사태 등으로 붕괴위험지역에 피해가 우려되는 때 그 인접한 지역에 대한 피해방지 사업

No.1058 · 산림청 원문

급경사지붕괴위험개소 急傾斜地崩壞危險個所 · dangerous slopes of failure
붕괴, 낙석 등으로 국민의 생명과 재산의 피해가 우려되는 급경사지와 그 주변의 지점

No.1059 · 산림청 원문

급경사지붕괴위험구역 急傾斜地崩壞危險區域 · dangerous area of slope failure
"재해예방에 관한 법률"에 따라 급경사지는 택지 · 도로 · 철도 및 공원시설 등에 부속된 자연 비탈면, 인공 비탈면(옹벽 및 축대 등을 포함)과 이와 접한 산지이다. 붕괴위험지역은 붕괴 · 낙석 등으로 국민의 생명과 재산의 피해가 우려되는 급경사지와 그 주변토지로서 안전점검을 실시하여 재해위험도평가와 주민의견 수렴절차를 거쳐 지정 · 고시된 지역이다.

No.1060 · 산림청 원문

급성피해 急性被害 · acute injury
고농도의 대기오염물질이 단시간 동안 식물에 피해를 입히는 것을 말하며, 일반적으로 연반(煙斑)이라고 하는 반점이 대소모양으로 나타난다.

No.1061 · 산림청 원문

기 基 · radical
화학변화로는 분해되지 않고 한 분자로 부터 다른 分子에 이동할 수 있는 원자의 집단. 예. 메칠기 - CH_3, 아미노기 - NH_2, 수산기 - OH, 아세칠基 - CH_3CO등이들 가운데 이온이 될 수 있는 것을 라디클(radicle)이라 한다. 보통 기를 R로써, 또 금속성기(양성기) 를 M으로, 산기(음성기)를 X로 나타내는 일이 많다.

No.1062 · 산림청 원문

기계 器械 · instrument
실험측정 그 밖의 실용상 일정 목적을 위해서 만들어진 도구. 구조가 간단한 것을 기구라 한다.

No.1063 · 산림청 원문

기계 機械 · machine
동력원으로부터 동력을 공급 받아 이것을 각 구성부분에 나누어 일을 할 수 있는 구조물.

No.1064 · 산림청 원문

기계가동시간 機械稼動時間 · -
기계운전시간.

No.1065 · 산림청 원문

기계고 器械高 · instrument height, IH
평균해수면에서 측량기계의 시준선에 이르는 수직거리를 말하는데, 때로는 지표면에서 측량기계의 시준선까지 수직거리를 말하기도 한다. 기계고는 보통 I.H. 또는 IH로 표시한다. 시준고.

No.1066 · 산림청 원문

기계비 機械費 · machine cost
기계비는 기계를 운용하는데 소요되는 경비로서 계산방법은 경영분석방법에 따라 차이가 있을 수 있으나 감가상각비, 기계구입에 따른 투자액에 대한 자본이자, 각종 보험 및 세금, 연료비, 윤활유비용, 수리유지비, 차량에 있어서 타이어, 기계톱의 체인 등 정기적인 소모품 등이 포함된다.

No.1067 · 산림청 원문

기계용재 機械用材 · wood used in machinery
기계를 설치하는 대에 사용되는 목재. 편백, 소나무, 느티나무, 가시나무, 동백나무, 삼나무등.

No.1068 · 산림청 원문

기계운전시간 機械運轉時間 · machine running time
1일 8 또는 9시간의 정해진 근무시간(shift time, scheduled machine hour)동안의 기계운전시간은 크게 순작업시간(productive machine hour, PMH)과 일반작업시간(non-productive hour)으로 구분할 수 있다. 순작업시간은 다시 고정시간과 변동시간으로 구분하고 일반작업시간은 장비의 수리, 대기 등으로 인한 장비 지체시간(delay) 등으로 구분하기도 한다. 기계가동시간.

No.1069 · 산림청 원문

기계적간벌 機械的間伐 · mechanical (geometric) thinning
간벌할 때 수형급이나 수관급을 고려하지 않고 나무들 간의 거리만을 고려한 간벌의 한 방법이다.

No.1070 · 산림청 원문

기계적분석 機械的分析 · mechanical analysis
입경분석.

No.1071 · 산림청 원문

기계톱 機械鋸 · chain saw
절단장치를 이용하여 목재를 자르는데 사용하는 동력식 작업기계로 동력원에 따라 내연기관식, 전기 모우터식, 압축공기 또는 유압구동식 기계톱이 있다. 일반적으로 널리 사용되는 형태는 1인용 기계톱으로 고성능 공냉식 2 행정 가솔린 엔진으로 구동된다. 임업에서 가장 널리 사용되고 보편화된 작업기계로 안내판(guide bar) 주위를 고속으로 주행하는 체인에 부착된 절삭 톱날에 의하여 목재를 절단하는 톱으로서 벌목 · 조재 및 가지자르기 작업은 물론 저목장이나 제재공장에서 원목자르기에 이르기까지 널리 사용된다. 체인톱의 구조는 크게 원동기부분, 동력전달 부분, 톱체인부분으로 구분되며 엔진의 출력 및 중량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분된다. 그 중 가장 널리 사용되는 중형 체인톱의 경우 엔진배기량이 50~70㎤로서 출력은 2.2~3.3 kW 범위이다. 체인톱, 체인쏘.

No.1072 · 산림청 원문

기계펄프 機械紙漿 · mechanical pulp
목재 혹은 칩을 그대로 혹은 열처리 후 기계적으로 처리하여 제조한 펄프. 방법으로 GP법, RGP법, Masonite법, Asplund법 등이 있다. 제지 혹은 섬유판용으로 사용된다.

No.1073 · 산림청 원문

기계효율 機械效率 · mechanical efficiency
기계에 수용된 입력 에너지(input)와 기계가 외부로 한 일(output)과의 비율로 기계효율은 항상 1보다 작으며 엔진에서의 열발생, 마찰, 진동, 소음 등으로의 손실, 기계내부에서의 동력전달 과정에서의 마찰 등으로 인한 손실, 작업시간중의 대기시간, 부대작업 등에 의한 에너지 손실이 있어 50% 이하인 경우가 많다.

No.1074 · 산림청 원문

기공 氣孔 · stoma
고등육상식물의 잎 또는 줄기, 과실 표피세포 중에서 특수하게 분화한 공변세포 사이에 열려진 세포간극이다. 뿌리에는 기공이 없다. 공변세포 주위에는 부세포(조세포)가 2~4개 있는 경우가 있으며 이러한 세포들을 통틀어 기공장치(stomatal apparatus)라고 한다. 기공내부 쪽으로는 넓은 세포간극(호흡강)이 있다. 기공은 잎뒷면 (갯솜조직쪽)에 더 많다. 목본식물의 기공의 길이는 17~56 ㎛이며 기공빈도는 엽면적 1㎟당 100~600개 정도이다. 기공의 총면적은 잎의 총 엽면적의 1%보다 작다. 습지식물의 기공은 잎표피보다 돌출되어 있는 경우가 있고, 침엽수 또는 건지식물의 기공은 함입되어 있다. 기공의 개폐작용은 공변세포의 삽투압과 팽압에 의하여 조절된다. (공변세포) 호흡강을 형성하는 주변의 엽육세포의 수분은 액체상태이며 호흡강 내부의 수분은 증기상태이다. 호흡강의 증기압과 기공 밖의 외부증기압차와 기공의 개폐정도(기공저항)에 따라 수분 증산량이 결정된다. 탄산가스, 산소의 이동도 이와 같다. 줄기는 줄기의 코르크조직이 분화되기 전까지 기공을 통하여 가스교환을 하고, 그 이후에는 피목(皮目, lenticel)을 통하여 이루어진다. 최초의 피목은 대체로 기공 밑에서 발달한다. 참조: 공변세포.

No.1075 · 산림청 원문

기공감염 氣孔感染 · stomata infection
기공을 통하여 침입하는 병원균에 의한 감염이다.

No.1076 · 산림청 원문

기공저항 氣孔抵抗 · stomatal resistance
기공을 통한 수분 또는 탄산가스의 이동에 대한 저항(sec/㎝)이다.

No.1077 · 산림청 원문

기공증산 氣孔蒸散 · stomatal transpiration
기공을 통하여 일어나는 증산. 기공이 열려 있을 때 전체 증산량의 80~98%는 기공을 통하여 일어난다. 기공개폐에 의하여 기공 증산량이 조절된다.

No.1078 · 산림청 원문

기관 氣管 · trachea
절지동물 유기관류(有氣管類)와 유조동물(有爪動物)의 호흡기관. 기관은 기관소지로 갈라진다. 가지의 종말부분은 가늘고 긴 상피세포인 기관종단세포만으로 이루어지며 키틴질의 내막이 없고 가스

교환의 장소가 된다. 기관의 외계로의 개구가 기문(氣門)이며, 호흡운동을 통해 공기는 기문을 거쳐 들어가고 기관소지의 벽을 통해서 가스교환이 이루어진다.

No.1079 · 산림청 원문

기관 器官 · organ
생물개체에서 특정한 기능을 작용하는 형태적으로 독립된 부분.

No.1080 · 산림청 원문

기관낭 氣管囊 · tracheal air sac
기낭.

No.1081 · 산림청 원문

기관배양 器官培養 · organ culture
원시기관을 배양하여 완전하게 혹은 부분적으로 다시 분화되거나 또는 구조와 기능을 유지할 수 있도록 하는 배양방법. 식물의 경우 기본적인 기관으로 뿌리, 줄기, 잎, 꽃, 열매를 들 수 있으나 실질적으로 기관배양의 목적은 이들의 완전한 발육에 초점을 맞추기보다는 증식가능하고 재분화 여력이 있는 세포나 조직을 분리해내는데 그 목적이 있는 경우가 많다. 조직배양과는 의미상으로는 다르나 실질적으로는 배양목적이 조직배양과 구분하기 어려운 경우가 많다. 그 이유는 조직이란 정의가 식물과 동물이 같지 않다는데 있다. 정의에 의하면 조직은 같은 종류의 세포로 이루어져야 하는데 식물의 대부분의 조직이 한 종류의 세포형으로 이루어지지 않았기 때문이다. 따라서 식물에서는 기관배양이란 뿌리 끝(root tip), 정아(apical bud)부분, 액아(axillary bud), 화아원기(flower primordium) 등을 배양하는 것을 의미하며 조직배양과 이점에서 구분되지 않는다

No.1082 · 산림청 원문

기관재분화 器官再分化 · organ redifferentiation
정상조직이 새로운 형성층(cambium)을 만들면서 조직형태가 없어졌다가 다시 활발하게 분열하는 형성층에서 새로운 기관이 발생되는 현상. 캘러스에서 화아, 잎, 줄기, 뿌리가 발생하는 것이 이러한 현상들이다. 이러한 재분화과정은 반드시 탈분화(dedifferentiation) 과정을 거친 후에 나타나는데 탈분화란 정상적인 조직이나 기관이 캘러스 등의 형태로 변형되어 원래 세포의 모양, 기능 등을 상실한 상태를 의미한다.

No.1083 · 산림청 원문

기관지 氣管支 · tracheoles
호흡관과 기관에서 가느다란 말단 부문

No.1084 · 산림청 원문

기균사체 氣菌絲體 · aerial mycelium
기주표면에 붙어 공기와 접하고 있는 균사체

No.1085 · 산림청 원문

기근 氣根 · aerial root
지상의 줄기 부위에서 나오는 뿌리.

No.1086 · 산림청 원문

기낭 氣囊 · tracheal air sac
곤충에서 기관의 주간에 확대하여 형성된 대형의 낭상기관(囊狀器官). 공기를 저장하고 체중을 가볍게 하는 기능을 갖는다. 기관낭(氣管囊)

No.1087 · 산림청 원문

기는줄기 匍匐莖 · creeper, creeping stem, prostrate stem, stolon
땅위를 기면서 자라는 줄기를 말한다. 줄기의 중간의 마디에서 뿌리가 내리면서 새로운 개체로 크기도 한다. 포복경.

No.1088 · 산림청 원문

기능성유전체학 技能性遺傳體學 · functional genomics
DNA chip(혹은 microarray) 등의 기술을 이용하여 서로 상호관계를 가지고 발현되는 모든 유전자들을 동시에 연구하는 방법이다.

No.1089 · 산림청 원문

기단 氣團 · air mass
수평방향으로 거의 균일한 성질을 갖는 커다란 공기의 덩어리를 말한다. 성질이 거의 같은 대륙이나 해양에 대기가 장기간 머물러 있을 때, 공기 덩어리의 온도, 습도의 수직 분포가 지표면의 물리적 성질에 조화를 이루게 된다. 발원지에 따라 대륙성 기단과 해양성 기단으로 구별하며 위도에 따라 구분하기도 한다. 또 건조의 정도에 따라 건조기단, 습윤기단으로 구분하기도 한다. 우리나라의 기상에 영향을 주는 기단으로는 한랭 건조한 대륙성의 시베리아기단, 한랭 습윤한 해양성의 오호츠크해기단, 가을과 봄에 이동성 고기압을 가지고 중국대륙에서 동진해 오는 온난 건조한 대륙성의 양쯔강기단, 온난 건조한 해양성의 북태평양기단, 그리고 여름, 겨울 모두 북위 20도 이남의 해양에서 발원하여 극히 고온 다습한 적도기단(태풍으로 온다)이 있다.

No.1090 · 산림청 원문

기대불일치이론 期待不一致理論 · expectation disconfirmation theory
방문객의 기대와 성과간의 불일치에 의해 만족 또는 불만족이 발생한다는 것으로, 성과가 기대보다 높으면 긍정적 불일치에 의해 만족이 발생하고, 낮으면 부정적 불일치에 의해 불만족이 발생한다고 보는 이론.

No.1091 · 산림청 원문

기대치 期待値 · expected value
하나의 임의변량(random variable)은 모집단 내에서 하나의 평균치(average value)를 지니고 있다는 통계적으로 매우 중요한 특성을 갖는다. 이와 같이 임의변량이 모집단 내에서 갖는 평균치를 그 변량의 기대치라고 하며 E(X)로 표시한다.

No.1092 · 산림청 원문

기둥 柱 · column
집을 구축할 때 세우는 목재 또는 석재로 된 기둥.

No.1093 · 산림청 원문

기둥보 구조 柱梁構造 · Post & Beam structure
건축물을 짓기 위한 건축물의 방법으로 경량구조와 함께 가장 많이 쓰이는 목구조 중 하나이다. 주택을 지지하고 있는 기둥과 기둥 사이를 연결하는 보로 이루어져 있으며, 특히 기둥과 보를 연결시키는 접합부분을 요철 모양으로 다듬어 맞물리게 되고, 연결철물로 더욱더 단단히 고정시켜 건축의 뼈대를 이루고 있다.

No.1094 · 산림청 원문

기러기류 雁類 · geese
대형의 물새류로 고니와 오리의 중간 정도의 새이다. 몸이 크고 긴 목과 짧은 다리가 특징이며, 몸이 회갈색인 종류가 많고 암수는 같은 색이다. 식물성 먹이를 주로 먹으며, 가을에서 겨울 무렵에는 큰 무리를 지어 생활하는데 생활 단위는 가족 군을 기본으로 한다. 일정한 대열로 무리를 지어 소리를 내며 나는데 지상에 있을 때에도 소리를 낸다. 날 때는 긴 목을 앞으로 쭉 펴고 천천히 직선으로 난다. 쇠기러기, 큰기러기 등이 이에 속한다.

No.1095 · 산림청 원문

기류 氣流 · air current
바람과 같다.

No.1096 · 산림청 원문

기름새 - · 學 Eccoilopus cotulifer
들과 산에 나는 다년생 풀. 키는 약 1.5m. 목초로 이용되며, 중부 이남에 분포.

No.1097 · 산림청 원문

기말축적 期末蓄積 · ending inventory
생장량 계산 등을 위하여 같은 임분에 대하여 전, 후 두 번의 축적 조사를 할 경우 뒤에 조사된 임분의 축적. 종축적 (終蓄積)이라고도 한다. V2 = V1 + Z - N 단, V2: 기말축적, V1: 원축적, Z: 생장량, N: 벌채량.

No.1098 · 산림청 원문

기망가 期望價 · expectation value
장차 발생할 것으로 기대되는 수익의 합계이다. 넓은 뜻으로 환원가(수익가, 수익환원가)의 일종이다. 산림으로부터 장래 얻어질 수 있다고 기대되는 순수익의 현재가에 있어서 그 순수익이 매년이 아니고 일정 기간마다 영원히 계속 얻어질 때 그것을 기망가라 하고, 해마다 동일한 수입이 얻어질 때를 원원가라 해서 구별한다.

No.1099 · 산림청 원문

기망가비교절충법 期望價比較折衷法 · expectation value allotment method
산림 평가법 중 매매사례가격을 평가 대상지의 기망가와 기준 매매사례지의 기망가의 비율로서 수정하여 평가하는 방법이다. B'=B×Bu'/Bu B': 평가액, B: 기준지의 매매사례가, Bu': 평가대상지의 임지기망가, Bu: 기준매매사례지의 임지기망가.

No.1100 · 산림청 원문

기면 基面 · reference place
기준면.

No.1101 · 산림청 원문

기문 氣門 · spiracle, pore stigma
곤충이나 그 밖의 기관호흡을 하는 무척추동물의 체표에 있는 호흡문. 기문은 개폐작용을 통한 호흡의 조절, 수분증산이나 먼지류에 대한 조절작용 등을 위하여 특유한 개폐구조를 갖고 있다. 원시적인 곤충을 제외한 많은 곤충에서는 개구부의 주변은 돌출하여 덮개(peritreme)가 되고, 이것에 표피의 함입에 의해 생긴 강소(腔所), 즉 전방(前房, 기문실이라고도 한다, atrium)이 계속되고, 기관은 전방에 의해 열린다. 전방 내면에는 큐티클성의 털이나 작은 돌기를 갖는 것이 많다. 전방의 입구 또는 기관 개구부에는 주걱모양의 돌기로 이루어지는 개폐장치(開閉裝置)가 있고 개구근(開口筋) 또는 개구, 폐구 양근의 활동에 의해 기문의 개폐를 한다. 기문은 흉부와 복부의 측판에 있은 것이 보통이나 실제로 그 위치는 변이가 많다. 후배자 발육기의 기문수는 전흉과 중흉사이와 중흉과 후흉사이에 각각 1쌍씩과 복부의 8개 환절에 각각 1쌍씩 10쌍이 있으나 종에 따라 그 수에 차이가 있다. 기문의 수와 위치에 따라 완전기문기관계(完全氣門氣管系 holopneustic respiratory system), 불완전기문기관계(不完全氣門氣管系, hemipneustic respiratory system), 무기문기관계(無氣門氣管系, apneustic respiratory system)로 분류한다.

No.1102 · 산림청 원문

기반시설 基盤施設 · basic facility
어떤 일의 발전에 기초가 되는 시설이다.

No.1103 · 산림청 원문

기복률 起伏率 · Relief ratio
유역의 전체적인 험준한 정도를 나타내는 비율.

No.1104 · 산림청 원문

기본도 基本圖 · base map
경영대상 산림의 경계, 행정구역, 산림구획, 표고, 등고선 등을 표시한 지도이다.

No.1105 · 산림청 원문

기본분열조직 基本分裂組織 · ground meristem
전분열조직의 하나.

No.1106 · 산림청 원문

기본수 基本數 · basic number base number
반수의 염색체 구성이 형태적으로 또는 생리적으로 보아 그 이하의 군으로 나누어지지 않을 때 이 수를 말 한다. 핵형분석에 의해서 근연종간의 염색체를 비교해서도 결정되나, 기본수는 게놈을 구성하는 염색체수와도 일치할 것이므로 게놈분석이 더 정확하다.

No.1107 · 산림청 원문

기본장비도 基本裝備度 · basic equipment degree
자본액 중에서 유동자본을 공제한 교정자본을 종사자로 나눈 값이다. 기본 장비도=고정자본/종사자

No.1108 · 산림청 원문

기본조직계 基本組織系 · fundamental tissue system
표피계와 유관속 계를 제외한 모든 부분을 말한다.

No.1109 · 산림청 원문

기본종 基本種 · elementary species
deVries가 돌연변이에 의해서 생겼다고 믿어지는 기본적 분류단위에 이름 붙인 것. 린네의 종보다는 실제적으로는 하급이다.

No.1110 · 산림청 원문

기본집단 基本集團 · base population
임목육종을 위한 수단이 강구될 기본이 되는 집단. 한 수종의 수형목 선발이 행해질 때 대상수종의 천연 또는 인공임분 전체가 기본집단으로 간주될 수 있지만 구체적인 육종계획, 특히 장기계획에 의한 육종에서는 육종재료를 기능이 상이한 몇 가지 집단으로 구분할 필요가 있다. 이 경우 기본집단이란 흔히 전 세대에 이미 선발된 수많은 개체와 그들 간의 교배를 통해 얻어진 후대를 포함한 유전검정 집단을 의미한다.

No.1111 · 산림청 원문

기비 基肥 · basal fertilizer
낙엽후의 늦은 가을부터 다음해 봄 신엽이 나오기 전인 춘기에 사용하는 비료로서 시비위치에 따라 전층, 심층, 표층, 표면 시비등이 있다

No.1112 · 산림청 원문

기상 氣相 · gaseous phase
토양을 구성하는 물리적인 형태를 고상, 액상, 기상 등으로 구분할 때 기체 상태로 존재하는 부분을 가리키며, 부피의 비율로 고상이 약 50% 정도를 차지하고 나머지는 기상과 액상이다.

No.1113 · 산림청 원문

기상 氣相 · weather
온도, 건습, 바람, 운량(구름의 양) 등에 관계되는 공기의 상태를 말한다.

No.1114 · 산림청 원문

기상관측 氣相觀測 · meteorological observation
기압, 기온, 습도, 바람, 강수량, 증발량, 일조, 안개, 서리, 결빙 등의 현상을 관측하는 일.

No.1115 · 산림청 원문

기상재해 氣象災害 · meteorological damage
기상이 원인이 되어 발생하는 재해.

No.1116 · 산림청 원문

기생 基生 · basal
줄기가 뚜렷하게 없는 상태의 식물에서 잎이 지면과 가까운 부분에 모여 난 상태를 말한다. 민들레와 같은 속이 이에 해당되며 정확하게는 어긋나게 달리는 것이나 그 마디사이가 극도로 짧아서 마치 밑 부분에 모여 방석처럼 퍼져 달리는 모양. 식물의 이러한 상태를 로제트형(rosett)이라고 한다.

No.1117 · 산림청 원문

기생 寄生 · parasitism
기생체가 기주로부터 영양원을 탈취하는 현상. 보통은 공생에 의하여 기생자가 이익을 받는 편리공생의 한 형태. 조작이나 간접효과를 포함시킨 숙주-기생자 상호관점에서 생태학적인 연구가 이루어지는 외에, 예전부터 기생충학, 식물병리학 등 응용적인 연구의 대상이 되었다. 주로 영양적인 면에서 다루지만 기생자가 기주의 체내 또는 체표를 서식장소로 한다는 공간적인 관계에 중점을 두고 정의되는 경우도 있다. 기생이 일어나는 단계에서 숙주를 떠나서 생활이 완전히 불가능한 경우를 절대기생(絶對寄生), 기생생활과 자유생활이나 부생생활 모두가 가능한 경우를 조건적기생(條件的寄生)이라고 한다. 동일기주에서 생활사를 완성할 수 있는 동종기생(autoecism), 생활사를 완성하기 위해 2종 이상의 기주를 필요로 하는 이종기생(heteroecism)으로 구분한다. 기생성(寄生性)

No.1118 · 산림청 원문

기생균 寄生菌 · parasite
다른 생물체로부터 영양원을 탈취하여 살아가는 균류이다.

No.1119 · 산림청 원문

기생근 寄生根 · parasitic root
기생식물에서 발달하는 숙주로부터 영양원을 얻기 위한 특수한 뿌리로, 기주의 조직 내로 뚫고 들어가서 목부나 사부 등 통도조직에 접속한다.

No.1120 · 산림청 원문

기생병 寄生病 · parasitic disease
기생균이나 바이러스 등 기생성 병원체에 의해 발생되는 병.

No.1121 · 산림청 원문

기생성분화 寄生性分化 · specialization of parasitism
형태적으로 동일한 균이 어떤 식물에서는 병을 일으키나 다른 식물에서는 그렇지 못한 현상.

No.1122 · 산림청 원문

기생식물 寄生植物 · parasitic plant
기생생활을 영위하는 식물의 총칭으로 특히 기생생활에 적응된 특별한 분화를 보이는 유관속 식물이다. 예: 새삼, 겨우살이, 더부살이 등.

No.1123 · 산림청 원문

기생연쇄 寄生連鎖 · parasite chain
1차기생자-2차기생자-3차기생자로 이어지는 연쇄.

No.1124 · 산림청 원문

기생자 寄生者 · parasite
다른 생물체의 내외에서 생활하며 영양원을 탈취하는 생물체, 기생체와 동의어로 쓰인다.

No.1125 · 산림청 원문

기생체 寄生體 · parasite
숙주먹이의 모두 혹은 부분을 빼앗고 다른 종의 또다른 유기체 안에나 그 시기의 부분 혹은 전체에서 자라는 유기체

No.1126 · 산림청 원문

기선 基線 · base line
삼각측량의 경우 모든 변을 실측하지 않고 일부만을 실측하게 되는데 이 때 실측하는 변을 기선이라 한다. 이 기선은 기선을 통하여 나머지 측점의 위치를 규명하는 본기선(本基線)과 이를 검사하는 검기선(檢基線)으로 구분된다. 또한 사진측정시에는 서로 인접한 사진의 영점을 연결하는 선을 말한다.

No.1127 · 산림청 원문

기설정의제 旣設定議題 · Built-in Agenda, BIA
국제협상을 준비하는 단계에서는 협상당사국간의 협상 의제에 대한 논의를 하게 되는 바, 기설의제는 이러한 논의의 필요 없이 협상시 당연히 포함되는 의제이다. New Round 협상을 예로 들면 WTO 농산물협정과 GATS 협정에서는 2000년을 전후하여 추가협상을 추진토록 협정문에서 명시하고 있으므로 New Round 협상의 BIA중에는 농산물, 서비스부문이 포함되는 것이다.

No.1128 · 산림청 원문

기성근원기 旣成根原基 · preformed root initials"
줄기 속에 있는 근원기는 더 이상 발달하지 않으나 절단하여 삽목 할 경우 정상적인 뿌리로 발달한다. 기성근원기가 없는 수종을 삽목했을 때 삽수단면에 발달한 상처유합조직으로부터 부정근이 발생하여 뿌리로 발달한다. 대체로 기성원근기가 있는 수종은 삽목활착율이 높다. 자연상태에서도 습한 조건에 있는 나무 줄기가 기근 (氣根; 공중뿌리)을 발달시키는데 기성원근기에서 유래한 것이다. 버드나무의 기근은 보통 크게 자라지 않는다. 망그로브나무의 줄기 기근은 계속 생장하여 지지 및 흡수 기능을 하는 뿌리로 발달한다.

No.1129 · 산림청 원문

기성원근기 旣成原根基 · preformed root initials
어떤 식물은 줄기가 발달하는 도중에 이미 근기를 그 안에 가지고 있어서 우리가삽수를 마련할 때 벌써 줄기 안에 뿌리의 원기가 있다. 이것을 기성원근기라고 한다. 버드나무는 그 例의 하나.

No.1130 · 산림청 원문

기수배수체 奇數倍數體 · anisoploid
삼 오, 칠 체등을 말한다.

No.1131 · 산림청 원문

기술 技術 · technology
기술이란 인간생활과 자연과의 사이에서 전자의 발전과 향상을 위하여 활용할 수단을 제공하는 것이라고 할 수 있다. 이러한 목적에 대한 올바른 수단을 제공하는 방편을 주관적 의미에서의 기술이라고 하며, 그 올바른 방법 및 보조수반의 총체가 객관적 의미에서 기술이라고 한다. 이러한 점에서 기술이란 객관적 법칙성의 의식적 작용이라고도 할 수 있다. 그것을 위하여 자연과학이 광범하게 이용되고 응용된다.

No.1132 · 산림청 원문

기술개발 技術開發 · technology development
기술개발은 산업기술의 연구 및 그 성과를 이용하여 재료 · 제품 또는 장치시스템 및 공정 등 생산에 적용할 수 있는 새로운 방법을 찾아내는 활동을 말하며, 시범제작 및 공업화 중간시험의 과정까지를 포함한다.

No.1133 · 산림청 원문

기술개발투자 技術開發投資 · technology development investment
기술수준을 높이기 위해서 정부나 기업 등이 지출하는 연구이나 개발을 말한다. 장래이익을 가져다 줄 가능성이 있으므로 투자라고 생각할 수 있다. 그 효과는 당장은 기대하기 어려운 불확실한 투자이나 기술혁신 과정에서 다른 경쟁기업에 뒤지지 않기 위해서라도 경시할 수 없는 투자영역이다

No.1134 · 산림청 원문

기술이전 技術移轉 · technology transfer
축적된 고도의 기술을 다른 쪽에 이행함으로써 이루어지는 기술개발로서 기업이나 지역 간에 이루어지는 국내 기술이전도 포함되나, 일반적으로는 국제적 이전을 가리킨다. 이전되는 기술은 중간생산물, 기계설비, 인적 능력, 생산유통체계, 마케팅 시스템 등 그 형태가 다양하다. 이전방법도 라이센싱 협정, 특허의 사용 허가, 경영계약 및 컨설팅 서비스 등의 기술계약에 그치지 않고, 오늘날에는 그 기능까지도 포함하는 일괄이전이 특징이며, 다국적기업의 직접투자에 의한 이전도 있다. 기술이전은 생산성 향상을 위한 기술개발의 한 수단이므로, 개발도상국의 경제발전에 있어서 중요한 전략의 하나라고 할 수 있다.

No.1135 · 산림청 원문

기술이전 전문가 그룹 - · Expert Group on Technology Transfer, EGTT
교토의정서 제 4.5조의 이행 강화의 목적으로 COP-7에서 결성되었다. 의정서 하에서 기술 이전 활동을 용이하게 하고 발전시키는 방법들을 분석하고 확인하는 방식이다. EGTT의 명령은 COP-12에서 검토되었다. 기술 이전을 장려하기 위한 미래의 방법의 합의되지 않아 EGTT의 활동기간이 일년 더 늘어났다.

No.1136 · 산림청 원문

기술이전 정보센터 - · Technology Transfer Information Clearing House, TT Clear
UNFCCC 사무국에 의해 설립된 인터넷 기반의 기술이전을 위한 정보센터로 환경적으로 안전한 기술들의 개발, 이전과 그에 대한 접근을 향상시키는 것을 목적으로 한다.

No.1137 · 산림청 원문

기술통계학 記術統計學 · descriptive statistics
대량관찰을 전제로 하고 관찰된 자료 집단의 특질을 기술하는 것을 목적으로 한다. 과거 통계학의 내용은 주로 이것이었다.

No.1138 · 산림청 원문

기술혁신 技術革新 · technological innovation
기술의 발전과 그것이 경제적인 채산성에 맞음으로써 경제에 도입되어 일어나는 경제구조의 개편을 말한다. 기술혁신이란 말은 J.A.슘페터가 사용한 Neuerung(innovation)의 역어로 쓰이고 있다. 슘페터는 이 말을 기술의 발전뿐만 아니라 새로운 시장의 개척, 상품공급 방식의 변경 등 경제에 충격

을 주어 변동을 야기시키고 이것에 의해 동태적(動態的) 이윤을 발생시키는 모든 계기를 뜻하는 것으로 풀이하였다.

No.1139 · 산림청 원문

기술협력 技術協力 · technical cooperation
국내외 기업간 상호협력 또는 생산기술의 교환 및 제공을 통해 기업의 경쟁력을 높이기 위한 기업생존 방법이다.

No.1140 · 산림청 원문

기술협력/기술이전 技術協力/技術移轉 · Technology Cooperation/Technology Transfer
경제적 발전을 위한 적합한 기술 시스템을 선택하고 적용하기 위한 지역 · 국가 · 세계적 파트너와 구조적으로 상호작용하는 것을 말하며, 기계와 소프트웨어(경영지원, 훈련)의 두 가지 측면 모두 다루고 있다.

No.1141 · 산림청 원문

기슭막이 保岸工 · revetment
하천이나 계류에서 유수의 침식으로부터 둑비탈을 보호하거나 계안의 횡침식을 방지하고 산각을 고정하기 위한 공법 또는 공작물을 말한다. 사용하는 재료에 따라 돌붙임 기슭막이, 콘크리트 기슭막이, 돌망태 기슭막이 등과 활물(活物) 재료를 이용한 바자얽기 기슭막이 등이 있다. 세로침식(縱浸蝕)에 의해 가로침식이 일어나는 경우는 기슭막이의 기초가 세굴될 염려가 있으므로 바닥막이를 함께 시공하는 것이 바람직하다.

No.1142 · 산림청 원문

기슭매기 - · revetment
기슭막이.

No.1143 · 산림청 원문

기암 基岩 · bedrock
지표면에 있거나 토양과 퇴적물 밑의 일정한 깊이에 있는 단단한 암석을 가리킨다.

No.1144 · 산림청 원문

기압 氣壓 · atomospheric pressure air
해발 0.0m 에서는 1㎠에 평균 760mm의 수은주에 해당하는 얍력을 받는데 이것을 1기압이라고 한다. 수은의 비중이 13.595이므로 1기압은 76 ×13.595 = 1033.22g/㎠≒1Kg/㎠의 압력이다.

No.1145 · 산림청 원문

기압계 氣壓計 · barometer
수은기압계, 금속기압계 등이 있다.

No.1146 · 산림청 원문

기압수준측량 氣壓水準測量 · barometrical surveying
대기량은 해발고에 따라 줄어든다. 수은주 10mm의 기압차가 약 120m의 고저차에 해당 된다. 이 원리로써 기압계를 사용해서 두 지점간의 기압을 측정해서 그 고저차를 계산하는 간접적 측량 방법. 기압계에는 수은기압계와 아네로이드(aneroid)기압계가 있다.

No.1147 · 산림청 원문

기업림 企業林 · company forest
임업을 산업적으로 발전시키기 위하여 택하는 임업정책의 하나로써 대규모 조림투자가 가능한 임업 관련기업이 경영토록 하는 산림을 말한다.

No.1148 · 산림청 원문

기업할인율 企業割引率 · corporate discount rate
기업 할인율 (Corporate Discount Rate)은 개인기업이 투자사업의 수익성을 평가할 때 사용되는 이자율로 이는 위험도 및 제세공과금을 감안한 수준으로 결정된다. 예를 들어, 개인기업이 당기순이익의 50%를 법인세로 지불해야 하는 경우는 소득공제 전 수익은 소득공제 후 수익의 2배가 되어야만 개인기업이 기대하는 수익을 회수할 수 있다. 만약 1,000원을 투자해서 100원의 수익을 회수하고자 할 때 법인세로 100원을 지불해야 한다면 총수익은 200원이 되어야만 100원의 수익을 회수할 수 있다. 즉 위험도가 전혀 없는 정부채권의 수익률이 10%인 경우 개인기업은 위험도에 따른 회수율을 감안하여야 하며 이 회수율이 5%라고 가정하면 최소한 15% 수익률을 보장하여야 한다. 따라서 개인기업에 대한 총회수율은 수익률 15%와 법인세를 15%로 가정할 때 30%가 보장되어야만 대상투자사업을 시행할 수 있게 된다.

No.1149 · 산림청 원문

기업형식 企業形式 · form of enterprise
대규모임업, 소규모임업, 공기업과 사기업, 단독기업과 공동기업, 자영임업과 차지임업 등이 있다.

No.1150 · 산림청 원문

기업회계 企業會計 · business accounting
영리를 목적으로 하는 기업의 재정상태와 경영성적을 보고하는 자료이다. 재정상태는 재산계산으로, 경영성적은 손익계산으로 얻는다. 경제활동 결과 얻어진 이익을 계산적으로 확정하기 위하여 추상화된 화폐가치량도 기록하고 복식부기한다.

No.1151 · 산림청 원문

기온 氣溫 · air temperature
대기의 온도이다.

No.1152 · 산림청 원문

기울기 句配 · slope
기울기, 구배, 경사는 모두 같은 말로서 양이나 정도가 많고, 높은 곳부터 적고, 낮은 곳으로 기울어지는 것을 말하는데, 물리학적인 용어에서 출발했으나 생태적인 속성에서도 중요하게 다룬다. 생태학에서는 기울기라고 하면 생태경사를 말한다.

No.1153 · 산림청 원문

기원의 중심 起源의 中心 · center of origin
어떤 고차 분류군이 최초로 출현하였다고 추정되는 지구상의 특정한 지역으로 보통 그 분류군에 속하는 종이 가장 다양화되어 있는 지역, 가장 파생적인 종의 서식지역, 반대로 가장 조상적인 종의 서식지 등 여러 가지를 보고 추정하지만 어느 기준도 높은 신뢰성이 확보되지 않아 현생종의 정보에만 의존하는 추정은 때로는 위험하다.

No.1154 · 산림청 원문

기원중심 - · Centre of origin
식물종이 순화 또는 야생의 상태로 차별되는 특성이 최초로 발현된 지리적 영역을 의미

No.1155 · 산림청 원문

기재 基材 · Base material
베이스재 혹은 모재라고도 함. 특히 콘크리트에 있어서 시멘트를 말함.

No.1156 · 산림청 원문

기저면적 基底面積 · basal area
흉고단면적과 같은 의미로, 가슴높이(1.3m)에서 측정된 수목 줄기의 직경으로 계산한 단면적이다. 단위면적당 수목의 기저면적은 지상부 수관의 넓이와 상관관계가 높다.

No.1157 · 산림청 원문

기저유출 基底流出 · base flow
하천 수로를 통한 총 유출을 구성하는 요소 가운데서 시간적으로 유출이 지연된 중간유출과 지하수 유출을 합친 것을 말하며 직접유출과 구분된다. 무강우기간이 어느 정도 계속된 하천유량은 기저유출량으로만 이루어진다. 수문곡선 (hydrograph) 상에서 직접유출과 기저유출을 분리하는 일은 수문곡선의 해석을 위한 첫 단계로서, 유역의 정확한 범위, 지하 대수층의 지질, 투수능, 통수능력 등 유역의 특성을 정확히 파악할 필요가 있으나 지하수 감수곡선법 또는 수평직선 분리법 등의 간략법이 사용되고 있다.

No.1158 · 산림청 원문

기절 基節 · coxa
곤충을 다리를 구성하는 한부분으로서 측판기의 아래 끝에 있는 기절돌기와 관절되어 잇는 다리의 제1절로 흔히 흠이 있어 두 개로 보이는 수가 많은데 이때 뒤의 것을 부기절 (副基節, meron)이라 한다. ⇒ 자루마디.

No.1159 · 산림청 원문

기점 基点 · datum
기준점.

No.1160 · 산림청 원문

기존적 방어 存的防禦 · constititive defence
생물체가 기존의 구조적 특성 및 생화학적 물질에 의하여 특정 병해의 감염을 방어하는 현상

No.1161 · 산림청 원문

기주범위 寄主範圍 · host range
기생체가 가해할 수 있는 식물체의 종류이다.

No.1162 · 산림청 원문

기주의 저항성 寄主 抵抗性 · host resistance
기주생물이 병이나 해충의 피해를 줄일 수 있는 유전적 형질로서 내성, 비선호성, 항생성을 포함한다.

No.1163 · 산림청 원문

기주제거 寄主除去 · host removal
병의 확산이나 진전 등을 방지하기 위하여 병이 발병하였거나, 병원체를 지녔다고 의심되는 식물체를 제거하거나 소각하는 행위이다. 이종기생성균에 의한 수목병 발생지에서 경제적으로 가치가 낮은 기주를 제거하거나, 중간기주의 식재 및 반입을 금지시키는 방법이다. 예: 잣나무털녹병 방제를 위한 송이풀의 제거, 배나무붉은별무늬병 방제를 위한 배나무 집단 식재지의 향나무류 반입 및 식재 금지행위 (나주시 등).

No.1164 · 산림청 원문

기준 基準 · Criterion
산림경영의 원칙이 준수되었는지 여부를 판단하는 수단

No.1165 · 산림청 원문

기준년도 基準年度 · historical base year
감축목표 설정시 이용되는 특정연도를 지칭한다. 선진국의 경우 1990년을 기준년도로 사용한다. 단, 교토의정서가 제안하는 세가지 산업가스-수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFC), 육불화황(SG6): 이 세가지는 자연계에 존재하지 않고 인공적으로만 만들어진다.-에 대해서는 1995년을 기준년도로 선택할수 있다.

No.1166 · 산림청 원문

기준면 基準面 · datum level
한 점의 높이란 보통 임의의 수평면을 기준으로 하여 이 수평면에서 어느 점까지의 수직거리를 말하는데, 이때 이 임의의 수평면을 기준면이라 한다.

No.1167 · 산림청 원문

기준배출량 基準排出量 · Baseline
당사국의 배출량 추이(Trends)를 의미한다. 기준배출량은 경제 성장률, 에너지 사용 증가율, 그리고 에너지 효율개선 및 에너지 절약 등의 요인에 의해 증가, 감소 혹은 일정한 추세를 보인다. 특히 공동이행(JI), 청정개발체제(CDM) 프로젝트 수행결과가 추가적인 점을 증명하기 위해 프로젝트 이행 이전의 기준 배출량이 결정되어야 한다.

No.1168 · 산림청 원문

기준선 基準線 · base line
삼각측량에서 그 길이를 실측하는 변으로서, 이후 이루어질 측량의 기준이 되는 선을 의미한다.

No.1169 · 산림청 원문

기준세율 基準稅率 · base rate
관세인하의 기준이 되는 세율로서 「1994 GATT에 대한 마라케쉬의정서」2조는 원칙상 동 기준세율로부터 5회에 걸친 균등인하방식으로 최종 양허세율 (Bound rate)에 도달하도록 규정하고 있다. 따라서, 자국이 관세양허표상 별도 표시가 없는 경우 일반 공산품 세율은 1995. 1. 1 첫 인하가 개시되어 1999. 1. 1 최종 양허세율이 적용된다.

No.1170 · 산림청 원문

기준임령 基準林齡 · reference age
임지가 가지고 있는 잠재적인 생산능력인 지위를 판정하는 방법 중의 하나는 지위지수에 의한 방법이다. 이 지위지수를 사용하여 지위를 사정할 때 우리나라와 미국 등은 특정한 임령에서의 우세목과 준우세목의 평균수고를 사용하여 지위지수를 표시한다. 여기서 지위를 판정하는 기준인 특정한 임령을 기준임령이라고 하며, 우리나라의 경우에는 20년 혹은 30년을 기준임령으로 삼고 있으며, 미국의 경우에는 인공림은 25년 그리고 천연림은 50년을 기준임령으로 정하고 있다.

No.1171 · 산림청 원문

기준점 基準點 · control point
측량의 기준이 되는 점으로, 삼각점과 수준점이 대표적이다.

No.1172 · 산림청 원문

기준총보조총액 측정치 基準總補助總額 測定値 · base total AMS
WTO 농업협정상 기준기간동안(1986~1988) 제공된 총감축대상보조액으로 국내보조 감축의 기준이 되고 있다. 우리나라의 경우 1989~1991기준으로 계산된 base total AMS는 17,186억원이다.

No.1173 · 산림청 원문

기준표본 基準標本 · type specimen
분류학적 학명이 붙여진 실제 표본으로, 그 종의 명명과 분류의 기준이 되는 표본이다. 신종을 찾아내었을 때에는 명명규약에 따라 학명을 부여하고 라틴어 기재문을 작성한 후, 기준표본을 설정하여 발표해야 하며 이때 기준표본의 소재지와 소장기관을 별도 명시하도록 되어 있다. 이러한 기준표본은 이후 그 분류군을 연구하는데 기준이 되므로 매우 중요한 표본이며 표본관등에서는 이를 매우 중요하게 특별 보관하게 된다. 기준표본가운데 명명자가 학명부여와 원전에 지정한 오직 1장의 표본을 정기준표본(正基準標本, holotype)이라 하고 정기준표본과 함께 중복하여 여러 장 채집한 표본은 동기준표본(同基準標本, isotype), 정기준표본이 분실 또는 파손시 동기준표본에서 대신 선정한 표본을 선정기준표본(lectotype), 명명자가 정기준표본 1장을 선정하지 않고 여러 개의 표본을 인용할 경우 동가기준표본(同價基準標本, syntype), 명명당시 표본이 없을 경우 새로 설정한 표본은 신기준표본(新基準標本, neotype)이라고 부른다. 모식표본.

No.1174 · 산림청 원문

기지 忌地 · soil sickness
1) 동일한 식물을 같은 토양에서 반복적으로 재배할 때 생장이 감소하는 현상이다. 2) 한가지 작물을 연작했을 때 토양이 유독 물질의 집적이나 병 · 해충의 만연으로 작물의 생육에 불리하게 악화된 상태로 토양 유효 비료 성분의 소모, 토양 중의 염류 축적, 토양의 물리성 악화, 잡초의 번성 등도 기지의 원인이다. 인삼재배, 오리나무, 아까시나무 양묘시에 주의를 요한다.

No.1175 · 산림청 원문

기지 基地 · Base
기점이 되는 근거지.

No.1176 · 산림청 원문

기지 基芝 · footing sod
바닥떼.

No.1177 · 산림청 원문

기질 基質 · substrate
효소촉매반응의 반응 물질. 효소는 이 기질에 부착되어 기질을 다른 형태로 바꾸어 놓는다. 대사회로의 경우 전구체가 기질이 되는 경우가 많다. 리그닌 합성대사회로의 예를 들면 coniferyl alcohol은 peroxidase의 기질이 되는데 이 효소는 coniferyl alcohol에 작용하여 lignin으로 바꾸어 놓는다.

No.1178 · 산림청 원문

기질포텐셜 基質포텐셜 · matric potential
매트릭포텐셜. 어떤 물질의 기질자체가 가진 모세공극으로 수분이 흡수되는 에너지량으로 음(-)의 값이다. 버섯재배용 톱밥의 경우 수분함량이 62%이면 메트릭포텐셜은 –10 kPa, 64%이면 0.0 kPa이 된다.

No.1179 · 산림청 원문

기초공용재 基礎工用材 · basal construction material
건물, 교량, 제방 등을 건설할 때 지형공사를 한다. 이 공사에 사용되는 목재를 말한다. 낙엽송, 소나무, 느티나무, 편백, 삼나무, 밤나무 등.

No.1180 · 산림청 원문

기초대사율 基礎代謝率 · basal metabolic rate
생명 유지에 필요한 최소한의 에너지 소모율로써, 전체 몸무게 중에서 지방의 무게를 뺀 무게와 비례한다.

No.1181 · 산림청 원문

기초말뚝 基礎杭 · foundation pillar
여러 개의 말뚝을 무리 지어 촘촘히 박아 건물이나 시설물의 기초공사를 하는 공법

No.1182 · 산림청 원문

기초원주 基礎圓柱 · comparison cylinder
비교원주.

No.1183 · 산림청 원문

기초지반지지력 基礎地盤支持力 · bearing capacity of foundation ground
기초 바닥이 시설물의 하중을 감내하는 힘.

No.1184 · 산림청 원문

기층 基層 · substratum
토양단면에 있어서의 C 층을 의미한다.

No.1185 · 산림청 원문

기층 基層 · base of road
표층을 지지하고 교통에 의한 하중 및 충격을 분산, 경감하여 이것을 노반에 전달하는 역할을 하는 층으로 표층과 노반의 사이에 포설된다. 참조: 노체

No.1186 · 산림청 원문

기타 산림 유형 其他 山林 類型 · Other forest types
인공림이나 천연림의 기준에 맞지 않는 그 밖의 다른 임상의 유형

No.1187 · 산림청 원문

기타임지 其他林地 · other wooded land
현장에서 성숙했을 때 수고가 5m 에 도달할 수 있는 나무의 수관이 5~10%를 점유하고 있거나, 현장에서 성숙했을 때에도 수고가 5m에 도달할 수 없는 나무의 수관이 10% 이상을 점유하고 있는 곳, 또한 관목이 10% 이상을 점유하고 있는 곳을 말한다.

No.1188 · 산림청 원문

기판 旗瓣 · flag standard
콩과 식물 꽃의 화관을 구성하는 다섯 개의 꽃잎 중 가장 바깥쪽에 있는 가장 큰 꽃잎.

No.1189 · 산림청 원문

기포관 氣泡管 · bubble tube
측량기구의 수준장치에 붙어 있는 관. 수평을 잡는데 쓰임.

No.1190 · 산림청 원문

기피제 忌避劑 · repellent
곤충의 행동중 화학물질에 대한 반응을 주화성(走化性, chemotaxis)이라고 하는데 그 물질에 향하는 반응을 양성주화성, 기피하는 주성을 음성주화성이라고 하는데 전자를 이용하는 것이 유인제(誘引劑), 후자를 이용하는 것이 기피제이다. 이러한 기피제는 해충이 작물이나 인축에 접근하는 것을 방지하는데 사용하는 것으로 naphthalene, dimethyl phthalate 등이 있다.

No.1191 · 산림청 원문

기형학 畸型學 · teratology
기형을 연구하는 생물학의 한 분야.

No.1192 · 산림청 원문

기화 氣化 · vaporization
어떤 물질이 액체로 부터 기체로 되는 현상.

No.1193 · 산림청 원문

기회비용 機會費用 · opportunity cost
1) 어떤 재화를 한 용도에 사용함으로써 다른 용도에 사용하지 못해서 상실한 편익 - 어떤 활동을 함으로써 포기해야 하는 다른 활동의 가치이다. 2) 여러 가능성 중 하나를 선택했을 때 그 선택으로 인해 포기해야하는 가치로 표시한 비용이다. 일반적으로 일정량의 생산요소로 동시에 A와 B의 두 가지 재화를 생산하는 경우 A재를 추가로 몇 단위 생산하려면 B재의 생산단위를 어느 정도 희생해야 되며 이 한계점에서 대체되는 비용을 기회비용이라 한다. ⇒ 대치비용(代置費用), 이전비용(移轉費用).

No.1194 · 산림청 원문

기후 氣候 · climate

지구상의 어느 장소에서 1년을 주기로 매년 반복되는 대기의 종합상태를 말한다. 고전적인 연구에서는 평균치로만 나타내었지만 최근의 기후학에서는 그 변동폭, 내용에 대한 해석과 고찰이 이루어진다. 기상 요소별 기후 값은 30년 평균치를 쓰며 매 10년마다 그 값을 갱신한다. 기후요인은 생물의 환경을 형성하는 기후적인 여러 가지 요소로서 온도요인(절대값, 변화의 형과 폭), 수분요인(강수량, 강우형, 습도), 광요인 (조명도, 일조시간), 대기요인(산소 및 탄산가스의 농도, 바람) 등으로 이루어진다. 지구상의 위도에 의한 기후대, 또는 고도에 의한 구분은 어느 것이나 기후에 관계하고 있다. 더욱이 해양과 대륙의 영향에 의한 해양성 기후 및 대륙성 기후와 같은 대기후, 좀 더 작은 한정된 지역을 지배하는 국지기후, 군락의 내부 등과 같은 극히 작은 장소의 미기상의 구별도 있다. 지구상 군계의 분포 등은 대기후에, 생물계절은 국지기후에, 군락이나 작물의 생산은 미기상에 주로 대응된다.

No.1195 · 산림청 원문

기후 변화 취약식물종 적응 氣候變化脆弱植物種適應 · -

기후변화 취약식물종 적응은 자생지 일정지역을 조사구역으로 설정, 각 조사구에 기상장비를 설치하여 생육지의 미세환경(온도,습도,풍향,풍속,강우량,일사량,토양수분 등), 개화 개엽 결실 시기 등 식물생육상황을 모니터링하고 식물종을 조사 수집 자생지와 유사한 환경의 피난처(보존원)를 조성하여 현지 내외 보전 복원 및 적응시험 연구 등 체계적으로 추진하는 것

No.1196 · 산림청 원문

기후놀이터 - · -

어린이들에게 에너지 절약과 함께 태양광 · 바람 · 자신의 활동이 에너지로 활용될 수 있다는 사실을 가르쳐주기 위한 '교육용 테마놀이터'이다.

No.1197 · 산림청 원문

기후대 氣候帶 · climatic zone

지구상의 기후분포를 대체로 위도에 거의 평행한 대상(帶狀)의 지구를 등질적인 기후지역으로 나눈 구분이다. 기후대는 지구상의 열수지(熱收支) 특성을 반영한다. 거의 위도에 따라서 고위도로부터 한대, 온대, 열대로 대별하고 한대는 다시 협의의 한대와 아한대, 온대는 한온대, 냉온대, 난온대, 열대는 아열대와 협의의 열대로 세분한다. 난온대와 아열대는 때로는 같은 말로 쓰일 때도 있고, Troll처럼 난온대, 아열대로 표현하기도 한다. 습윤한 동아시아에서는 열대에서 한온대까지는 숲이 되고, 아한대는 숲과 툰드라와의 이행부인 수풀툰드라와 낮은 나무가 섞인 툰드라가 된다. 한 대는 툰드라이며 생활대는 기후대에 대응하는 생물분포대이다.

No.1198 · 산림청 원문

기후도 氣候圖 · climatograph

각 지점의 기후를 그림으로 나타내기 위하여 만든 것으로 강수량을 막대기, 기온을 곡선으로 표시한 봉곡선그래프, 기온의 연변화 곡선만을 사용하여 1년 간의 계절변화를 잘 나타내는 서모그래프, 그리고 종 축에 기온, 횡축에 강수량을 나타내는 클라이모그래프 등이 있다. 이 클라이모그래프는 매달의 평균 기온과 평균 강수량을 조표에 기입하여 연결하면 그 지방의 기후형과 특성을 간단히 알기 쉽기 때문에 학술적으로 널리 사용되고 있다.

No.1199 · 산림청 원문

기후변화 氣候變化 · Climate Change
사람의 활동으로 인하여 온실가스의 농도가 변함으로써 상당 기간 관찰되어 온 자연적인 기후변동에 추가적으로 일어나는 기후체계의 변화를 말한다.

No.1200 · 산림청 원문

기후변화에 관한 정부간 협의체 - · Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC
1988년 세계기상기구(WMO)와 유엔 환경계회(UNEP)에 의해 설립되었다. IPCC의 목표는 인위적인 기후변화에 관련된 과학적, 기술적 사실에 대한 평가를 제공하고 사회, 경제적 영향을 예측, 전망하는 것이다. 현재 IPCC는 세계의 우수한 전문과학자들과 평가자, 권위자들로 구성되어 있다. 60개국의 기후변화 전문가들과 환경, 사회, 경제학자들은 기후 변화와 그 영향에 대한 과학적 이해를 위해 정기 보고서를 준비한다. 3개의 실무 그룹으로 구성되어 있고 매년 한 번씩 열리는 본회의에서 패널들이 모여 IPCC 보고서를 검토하고 이후의 실무 그룹의 연구방향을 계획해 나간다. 또한 IPCC는 기상학과 관련한 연구를 진행하고 기후변화 협약의 부속기구에 과학 자문의 역할을 한다. 현재 제4차 IPCC 보고서(2007)가 발표되었다.

No.1201 · 산림청 원문

기후변화협약 氣候變化協約 · Framework Convention on Climate Change
1) 1992년 브리질 리우데자네이로에서 열린 유엔환경개발회의 (UNCED)에서 채택된 협약으로 기후변화를 최소화시키기 위해 증가추세에 있는 온실가스의 대기 중 농도를 안정시키는 것을 궁극적인 목표로 삼고 있는데, 이산화탄소를 고정시키는 산림의 역할을 중시하고 있다. 기본 원칙의 골자는 다음과 같다. ① 각 국은 세계 기후를 보호할 의무가 있고 능력에 따라 차등적 책임을 지며 선진국은 선도적 역할을 해야 한다. ② 기후변화에 취약한 개발도상국 등 특수국가의 입장을 충분히 고려한다. ③ 기후변화의 원인과 악영향을 감소시키는 사전 조치를 취하고 비용을 분담한다. ④ 개발도상국이나 저개발국의 지속 가능한 성장을 위하여 개발권역을 설정한다. ⑤ 기후변화의 방지를 위한 조치가 국가간 무역에서 불공정한 차별이나 부당한 제한을 가하는 수단으로 이용되어서는 안 된다. 이 협약은 이산화탄소의 배출량을 줄이는 것이 핵심내용이다. 이것은 에너지 소비를 줄이는 것을 의미하고 결국 개발과 성장을 억제하는 결과를 가져오기 때문에 선진국과 개발도상국의 이해가 크게 엇갈려 있다. 2) 산업화과정에서 발생되는 이산화탄소, 메탄, 이산화질소 등 온실가스의 배출증가로 지구기온이 상승하고, 이는 이상기후 · 해수면상승 · 인체건강 등 생태계와 경제 · 사회면에 심각한 변화를 유발하는 바, 이를 범지구적 차원에서 방지하기 위하여 기후체계가 위험한 인위적 간섭을 받지 않는 수준으로 대기 중 온실가스(CO2, CH4, N2O, HFCs, CFCs, SF6 등) 농도의 안정화를 달성하고, 생태계가 자연적으로 기후변화에 적응하고 식량생산이 위협받지 않으며 경제개발이 지속가능한 방식으로 진행되도록 하기 위하여 국제적으로 노력할 것을 규정한 것이다. 1992. 5월 협약을 채택하였으며, 1998. 10월 현재 175개국 가입하였고, 우리나라는 1993. 12월에 가입했다. 1997. 12월 기후변화협약 부속 교토의정서를 채택하였는 바, 선진 38개국의 온실가스에 대한 2000년 이후의 감축목표 설정 및 이행방안을 합의했다(2008~2012년간 1990년 대비 평균 5.2% 감축). 우리나라는 현재 개발도상국으로 분류되어 온실가스 감축의무 부담은 지지 않고 있다. 그러나 기후변화협약에선 감축노력에 대해서만 선언적으로 합의했고, 구체적 실천방안은 1997년 교토의정서에서 합의되었다. 참조: 교토의정서.

No.1202 · 산림청 원문

기후순응 氣候順應 · acclimatization
생물이 생존할 수 있는 기후는 생물종류에 따라 다르고 각종 생물에 알맞은 기후가 있으나 그 기후가 다소변하여도 새로운 기후에 적응하는 성질이 있다. 이것을 기후 순응이라 한다.

No.1203 · 산림청 원문

기후인자 氣候因子 · climatic factor
기후요소의 지리적 분포를 지배하는 원인을 말한다. 주요한 기후인자로는 위도, 해발고도, 물과 땅의 분포, 지형, 해류, 바다와 떨어진 정도, 식생, 피복 등을 들 수 있는데, 이와 같은 기후인자의 결합에 의하여 각종 기후형이 나타난다.

No.1204 · 산림청 원문

기후적극상 氣候的極相 · climatic climax
기온이나 강우량과 같은 기후 조건에 의하여 이룬 극상을 말한다. 온대 또는 열대 우림, 한대 침엽수림 등이다.

No.1205 · 산림청 원문

기후적인자 氣候的因子 · climatic factors
기온, 강수, 바람, 일장 등 기후에 관련되는 인자.

No.1206 · 산림청 원문

기후적최적 氣候的最適 · climatic optimum
충적세 기간중 대략 5000 ~ 7000년 전 지구의 온도가 2~4도 높았던 기간.

No.1207 · 산림청 원문

기후적품종 氣候的品種 · climatic race
기후인자로써 분화된 품종.

No.1208 · 산림청 원문

기후품종 氣候品種 · climatic race
식물이 자연계에 적응하면서 기후적 차이에 의해 다른 종과 구별되는 특징을 갖는 품종을 말한다. 종 차원의 구별은 아니나, 국지기후의 차이에 유발되는 경우가 많다. 예를 들면 같은 종이라도 섬 지방에 생육하고 있는 개체의 잎이 더 큰 경우가 많은데 이는 해양으로부터 습기가 유입되어 건조에 대응할 필요가 없기 때문인 것으로 보인다.

No.1209 · 산림청 원문

기후학 氣候學 · climatology
지구상의 어느 지역에 있어서 1년을 주기로 하여 반복하는 대기의 상태를 기후라고 하고 이를 연구하는 과학을 기후학이라고 한다. 광의의 지구 과학 중 대기 과학의 한 분과이기 때문에 기상학과 관계가 깊으나, 생태계를 둘러싼 자연 환경의 한 요소를 구명하는 학문이기 때문에 지리학의 한 부문으로도 취급된다.

No.1210 · 산림청 원문

긴급수입제한조치 緊急輸入制限措置 · Safeguard Measures
SG세이프가드 제도의 의의는 GATT 이념에 부합되는 공정무역관행에 의한 수입일지라도 동 수입증가로 인해 수입국의 국내산업이 심각한 피해를 입거나 입을 우려가 있을 경우, 동 수입을 일시적으로 제한하여 국내경쟁산업으로 하여금 조정기회를 갖도록 하는데 있다. 보존조항, 도피조항(Escape clause), 면책조항 이라고도 하며 공정무역관행에 의한 수입을 제한하는 것이므로 반덤핑 상계관세

등 불공정무역규제제도 보다 발동요건이 까다롭고 보상 및 보복조치가 규정되어 있다. 선진 수입국들은 종전 GATT체제하에서는 세이프가드 조항의 요건이 까다로와 동 조치 사용을 기피하고 수출자율규제(VER), 시장질서유지협정(OMA) 등 양자차원에서의 자의적 선별적인 수입제한 조치를 선호하였다. 이런 조치들은 GATT 체제밖에서 행해지는 것으로 회색조 (Grey area measures)라고 불리우며 세이프가드의 실효성을 위협하였다. 따라서 세이프가드의 실효성을 제고하고, 회색조치를 GATT 규범안으로 흡수하는 문제가 70년대부터 주요 쟁점으로 부각되어 동경라운드(1973~1979)시 본격적인 협상을 하였으나 협상타결에 실패하였으나 UR협상에서는 SG조치의 발동을 쉽게 하는 대신 회색조치를 철폐토록 함으로써 그동안 선진국으로부터 VER, OMA 등의 규제를 많이 받아온 우리나라로서는 회색조치로 부터 벗어날 수 있는 유일한 점이 있으나 반면, 선별적인 SG 조치에 의한 규제는 증가될 것으로 전망된다. 그러나 SG조치는 엄격한 기준과 절차에 따라야 하고 3년 동안만 보복이 면제될 수 있는 등의 제한이 있기 때문에 회색조치에 비해서는 남용이 어려울 것이다. 본 협정은 GATT 1994 제19조 이외의 조항에는 적용되지 않으며(섬유, 농산물, 서비스 등), 섬유류는 TSG(Transitional safeguard)를 다자간 섬유협정(MFA)이 GATT 1994로 복귀하는 과도기동안 미복귀된 품목에 한해 적용되며, 농산물은 일반관세로 전환한 농산물 중 이행계획서에 SSG로 표시된 품목에 SSG(Special safeguard) 적용토록 한다. 서비스분야는 Emergency safeguard를 적용하고 있으며 무차별 원칙에 기초한 SG 조치에 관한 다자간 협상은 WTO협정 발효일로부터 3년 내에 완료되어야 한다.

No.1211 · 산림청 원문

긴박 緊縛 · wiring, strangulation
철사나 끈으로 나무 줄기나 가지를 묶어 체관을 통한 수액의 아래로의 이동을 방해하는 것이다.

No.1212 · 산림청 원문

긴장삭 緊張索 · -
꼬리줄.

No.1213 · 산림청 원문

길갱이 - · 學 Pennisetum alopecuro
산야에 자생하는 다년생 초류. 높이 약 70cm. 가을에 이삭이 나오는데 흑자색의 원주형이고 긴 털이 밀생한다. 전국적으로 분포한다. 수크렁.

No.1214 · 산림청 원문

길드 組合 · guild
유사한 먹이자원을 동일한 방식으로 이용하는 종들의 모임이다.

No.1215 · 산림청 원문

길섶 路肩 · shoulder of road
길어깨.

No.1216 · 산림청 원문

길어깨 路肩 · shoulder of road
차도에 접속되어 차도의 구조부를 보호하기 위한 목적으로 설치된 부분이다. 또한 길어깨는 차량 주행시의 여유, 시거 확보, 보행자의 통행, 대피 등 여러 가지 목적으로 이용된다. 일반적으로 임도의 길어깨나비는 최소한 0.25m이상으로 해야 하며, 되도록 0.5m 이상이 되어야 한다. 임도시설규정

에서는 0.5m 내외로 하고, 임지조건상 부득이한 경우에는 부임도(지선임도)에서 0.25m까지 할 수 있도록 규정하고 있다. 노견, 길섶, 갓길.

No.1217 · 산림청 원문

길잃은새 迷鳥 · vagrant
태풍 등으로 말미암아 다른 새들의 무리에 들어가는 등 본래의 이동 경로나 분포역으로부터 떨어져 찾아온 새. 알바트로스, 캐나다기러기, 쇠재두루미 등이 있다.

No.1218 · 산림청 원문

길항작용 拮抗作用 · antagonism
일반적으로 식물의 생육배지에서 어떤 양분이 증가되면 그 양분의 식물체내로의 흡수는 증가하나 반대로 다른 양료의 흡수가 줄어드는 때가 있다. 이 경우 이 양자 사이에는 길항작용이 있다.

No.1219 · 산림청 원문

김의털 - · 學 Festuca ovina
산지의 소나무 수풀 밑에서 흔히 볼 수 있는 다년생 풀로서 높이 30~50cm. 사방사업에 쓰인다. 중부이남에 분포.

No.1220 · 산림청 원문

깃대종 旗杆種 · flagship species
1993년 국제연합환경계획(UNEP)이 발표한 '생물다양성 국가 연구에 관한 가이드라인'에서 제시한 개념이다. 생태계의 여러 종 가운데 사람들이 중요하다고 인식해 보호할 필요가 있다고 생각하는 생물종을 통틀어 일컫는다. 이와 달리 생태계의 여러 종 가운데 한 종의 멸종이 다른 모든 종의 종다양성 유지에 결정적 역할을 하는 종을 핵심종(keystone species)이라고 한다. 즉 생태계의 종다양성을 유지하는 데 필수 불가결한 종으로, 불곰 · 수달 · 해달 · 코끼리 · 캐나다기러기 등이 이에 해당한다. 깃대종과 구분되는 점은, 깃대종이 한 지역의 생태계를 대표하는 상징종이기는 하지만 이 종이 없어진다고 해서 생태계가 파괴되지는 않는다. 반면 불곰과 같은 핵심종은 그들이 잡아 먹는 동물의 밀도를 적정 수준으로 유지시켜 다른 먹이 동물들의 서식처를 제공함으로써 군집을 구성하는 종다양성을 유지시키는 역할을 하기 때문에 이 종이 없어지는 것은 곧 생태계의 균형이 깨진다는 것을 의미한다.

No.1221 · 산림청 원문

깃모양겹잎 羽狀複葉 · pinnate compound leaf
우상복엽.

No.1222 · 산림청 원문

깃조각 羽片 · pinna
우편.

No.1223 · 산림청 원문

깃축 羽軸 · feather axis
조류의 깃털에서 깃털을 지지하는 축이다.

No.1224 · 산림청 원문

깃털갈이 換羽 · moult
깃털이 빠지고 새로운 깃털이 나는 것. 가을에는 거의 대부분의 새들이 깃털 갈이를 하지만 봄의 깃털 갈이를 하는 새들도 종종 볼 수 있다. 봄에 하는 새의 경우에는 몸의 일부만 깃털 갈이를 하는 것이 있으며, 몸 색깔의 변화는 깃털 갈이에 의한 것이 많지만 깃털의 가장자리가 닳기 때문인 경우도 있다.

No.1225 · 산림청 원문

까마귀밥 여름나무 中國藪山査 · 學 Ribes fasciculatum var. chinense
전국에 분포하는 낙엽관목이다. 잎은 원형이고 3-5열. 잎 뒤에 밀모. 장과가 9 月에 붉게 익는다.

No.1226 · 산림청 원문

깍지벌레류 介殼蟲 · scale inserts
반시목(Hemiptera) 의 깍지벌레科(coccoidea) 에 속한다.

No.1227 · 산림청 원문

깜부기 - · smut
종자나 혹 속에 곰팡이의 균사나 포자들이 가득 들어있는 알갱이이다.

No.1228 · 산림청 원문

깜부기병 黑穗病 · smut
담자균류의 흑수균목(黑穗菌目, ustilaginales)에 속하는 병. 이 병에 걸리면 환부에 까만색의 가루 같은 포자가 만들어 진다. 보리, 옥수수, 대나무에도 생긴다.

No.1229 · 산림청 원문

꺽꽂이 揷木 · cutting
어미나무의 일부 영양조직을 잘라내어 보습재료에 묻어서 발근, 발아 완전한 개체로 키워내는 무성번식의 한 방법이다. 이용하는 부위에 따라 녹지삽, 휴면지삽, 아삽, 근삽 등으로 나눈다.

No.1230 · 산림청 원문

꺽꽂이순 揷穗 · slip
삽목을 하기 위하여 어미나무에서 채취된 영양조직을 말한다. 삽수.

No.1231 · 산림청 원문

꺽꽂이 揷木 · cutting
삽목. 꺽꽂이 하면 모수의 형질이 그대로 유지될 수 있고, 종자결실이 잘 안되는식물의 증식방법으로도 이용된다.

No.1232 · 산림청 원문

꺽쇠연결 꺽쇠連結 · clamp connection
담자균류에서 일차균사끼리 체세포접합으로 발생한 2핵성 이차균사의 세포에서 볼 수 있는 특수한 구조로균사가 세포분열과 핵분열 한후 한개의 핵이 옆의 세포로 이동하는 통로이다. 꺽쇠형성.

No.1233 · 산림청 원문

껍질눈 皮目 · lenticel
피목.

No.1234 · 산림청 원문

꼬리겨우살이 寄生木 · 學 Loranthus tanakae
상록관목으로서 참나무, 밤나무, 벚나무 등에 기생한다. Loranthus yadoriki(참나무겨우살이):상록관목으로서 구실잣밤나무,동백나무,후박나무,참나무,녹나무 등에 기생한다. Loranthaceae(겨우살이과)기생식물은 전세계적으로 약2,500여 종에 달하며 모두 쌍자엽식물에 속한다. 수목에 기생하는 종류로는 겨우살이과에 속하는 겨우살이류가 중요한데 이것은 기주식물의 가지에 기생하여 그 조직 속에 기생근을 형성함으로써 영양을 흡수해서 생활한다.

No.1235 · 산림청 원문

꼬리기둥 先柱 · back column
뒷기둥.

No.1236 · 산림청 원문

꼬리마디 尾節 · telson
마지막 복부절의 뒤쪽 부분으로 몸의 뒤쪽부분의 체절이 아닌 부분 (nonmetameric portion)이다.

No.1237 · 산림청 원문

꼬리줄 未索 · tail line
가공삭도의 길이가 길고 다지간(多支間)인 경우에는 예인줄이 자중으로 지면에 처지고, 이로 인하여 짐을 실은 반송기(loaded carriage)가 하부 원목승강대에 도달하지 못하는 경우도 있다. 이 때에 하부 원목승강대에 설치한 시브를 조절한 후 짐이 실린 반송기와 빈 반송기를 연결하는 와이어로프를 부착하여 반송기 이동이 용이하도록 하는데 이와 같은 와이어로프를 꼬리줄이라 한다. 긴장삭, 미삭.

No.1238 · 산림청 원문

꼬리화서 柔夷花序 · ament
화서 축이 가늘고 화피가 없거나 작은 단성화가 밀집하여 달려 늘어지는 혹은 바로 서서 달리는 꽃차례. 소귀나무과, 참나무과, 자작나무과, 호두나무과, 버드나무과 등에서 볼 수 있다. 피자식물 중에서 원시적인 분류군에서 나타나는 특징이다. 유이화서(柔夷花序), 미상화서(尾狀花序).

No.1239 · 산림청 원문

꼬부랑버들 龍柳 · Salix matsudana
특히 어린 가지의 굴곡이 심하다. 용버들.

No.1240 · 산림청 원문

꼬투리 莢果 · pod
협과.

No.1241 · 산림청 원문

꽃 花 · flower
종자식물의 유성생식을 위한 기관으로서 줄기에 해당하는 화축과 잎에 해당하는 화엽으로 되어 있다.

No.1242 · 산림청 원문

꽃가루 花粉 · pollen
화분.

No.1243 · 산림청 원문

꽃개오동 白桐 · western catalpa
수형이 피라밋드 모양이고 잎 뒤에 털이 밀생하는데 꽃의 직경이 약 6cm 삭과의 길이가 20~45cm. 내한성이 강하고 목재는 토공용재로 우수하다. 잎에는 향기가 없다.

No.1244 · 산림청 원문

꽃개회나무 花野丁香 · syringa wolfii schn
진한 적자색의 꽃이 7~8 月에 핀다.

No.1245 · 산림청 원문

꽃누르미 押花 · pressed flower
꽃의 수분을 제거하여 눌러서 말린 평면적 장식의 꽃 예술을 의미한다.

No.1246 · 산림청 원문

꽃눈 花芽 · flower bud
자라서 꽃 또는 꽃차례가 될 싹이다. 일반적으로 꽃눈은 잎눈에 비하여 굵고 둥근 경향이 있으나 절대적인 특징은 아니다. 화아.

No.1247 · 산림청 원문

꽃받침 ? · calyx
꽃의 가장 바깥쪽에 달리는 보호기관. 어릴 때 꽃잎을 비롯한 꽃의 중요기관을 싸고 있다. 꽃받침잎(악편, sepal)으로 이루어지며 꽃잎과 함께 화피를 형성한다. 주로 녹색이지만 색소를 가지는 경우도 있고 백합과나 미나리아재비과 식물처럼 꽃잎과 따로 구분되지 않고 회피로 통칭하기도 한다. 꽃받침잎이 서로 붙어 있는 것을 합편악, 꽃받침잎의 밑부분이 떨어져 있는 것을 이편악이라고 구분하기도 한다. 국화과 식물에서 나타나는 관모(冠毛)는 꽃받침잎의 변형이다. 악.

No.1248 · 산림청 원문

꽃실 雄蘂 · filament
수술.

No.1249 · 산림청 원문

꽃자루 花梗 · peduncle
꽃 또는 꽃차례가 달리는 자루. 꽃이 과실로 성숙할 경우 과경(果梗)이 되며, 꽃차례의 경우 작은 꽃들이 달리는 자루는 작은꽃자루 또는 소화경(pedicel)이라고 부른다. 화경, 화병.

No.1250 · 산림청 원문

꽃차례 花序 · inflorescence
화서. 꽃의 배열상태. 식물에 따라 꽃차례의 종류는 매우 다양하며 산형과의 경우처럼 꽃차례가 그 분류군의 중요한 분류학적 형질이 되기도 하고 배열상태가 복합적이어서 꽃차례의 종류를 구분해

내기 어려운 경우도 있다. 크게 2가지로 구분하는데 정점 즉 축의 위쪽 끝에서부터 아래를 향해 꽃이 피어 내려오는 경우를 유한화서(有限花序, determinate inflorescence), 반대로 아래에서 위로 피어 올라가는 경우를 무한화서(無限花序, indeterminate inflorescence)로 구분한다. 꽃차례가 줄기에서 갈라지는 부분에 달리는 잎과 같은 부분을 총포(總苞), 작은꽃자루 아래 달리는 작은 잎과 같은 것을 포엽(苞葉)이라고 부른다. 꽃차례에는 자루 끝에 꽃이 하나씩 달리는 단정화서를 비롯하여 길이가 유사한 작은꽃자루에 긴원추상으로 꽃이 달리는 총상화서, 총상화서가 다시 원추형으로 모여 달리는 원추화서, 작은꽃자루가 거의 없이 달리는 수상화서, 우산살처럼 길이가 같은 작은꽃자루에 달리는 산형화서, 아래로 갈수록 작은꽃자루의 길이가 길어지므로 꽃차례 끝이 편편한 산방화서, 자루없이 밀생한 꽃이 머리모양으로 모여 달리는 두상화서 등 다양한 종류가 있다.

No.1251 · 산림청 원문

꽃턱 花托 · receptacle
화탁.

No.1252 · 산림청 원문

꽝꽝나무 鈍齒冬青 · 學 Ilex crenata
감탕나무과. 변산반도 이남에 자라는 상록성으로 검은 열매가 맺는다. 회양목 비슷한 상록활엽수이다.

No.1253 · 산림청 원문

꾸지나무 構樹 · 學 Broussonetia papyrifera
뽕나무과. 암수딴그루이며. 잎자루가 길고, 잎의 양면에 털이 있는 점이 닥나무와 다르다.

No.1254 · 산림청 원문

꾸지뽕나무 ?桑 · 學 Cudrania tricuspidata
뽕나무과. 암수딴그루, 가지에 가시가 있는 점이 뽕나무나 꾸지나무와 다른 점이다.

No.1255 · 산림청 원문

끌어내기 打出 · dragging
벌목된 나무를 동력으로 끌어내는 방법.

No.1256 · 산림청 원문

끝눈 - · terminal bud
정아.

No.1257 · 산림청 원문

끝눈우성 끝눈優性, 頂芽優性 · apical dominance
끝눈이 곁눈보다 보다 잘 발육하는 현상이다.

No.1258 · 산림청 원문

끝동부리 末口 · Top end
말구. 통나무의 위쪽 직경이 작은 쪽으로 통나무 재적 산출의 기준이 되는 부분.

No.1259 · 산림청 원문