산림임업용어사전 — ㄴ

← 목차 · 214개 용어 · 나그네새 ~ 늦서리

나그네새 旅鳥, 通過鳥 · assage migrant
우리나라 북쪽에서 번식하고 우리나라 남쪽에서 겨울을 나는 새로서 우리나라는 봄과 가을에 북상 또는 남하하느라고 거쳐간다. 도요나 물떼새 류가 대표적이다.

No.1260 · 산림청 원문

나란히맥 平行脈 · parallel vein
잎의 맥은 잎 몸의 중앙 아래에서 위로 이어지는 큰 맥을 주맥, 여기에서 갈라지는 맥을 측맥이라고 하는데, 측맥이 발달하지 않고 여러 개의 잎맥이 주맥과 나란히 수평으로 발달한 형태이다. 보통 맥간에는 잎몸은 가로지르는 가느다란 유관속에 의해 연결된다. 주로 외떡잎식물에서 나타나는 특징이나 쌍떡잎식물에서도 층층나무속(Cornus) 또는 질경이속(Plantago) 식물 등에서 볼 수 있다. 나란히맥들은 주로 잎 끝에서 하나로 모아지지만 비비추속 식물처럼 끝까지 여러 개의 유관속을 유지하는 종류도 있다.

No.1261 · 산림청 원문

나명 裸名 · bare name
기재문이 없이 또는 규정을 따르지 않고 발표한 신종의 이름이다. 나명은 정명이 될 수 없다.

No.1262 · 산림청 원문

나묘 裸苗 · Bare rooted seedling
흙분이 부착되지 않게 뿌리를 노출시켜 굴취한 묘목.

No.1263 · 산림청 원문

나무갗 木質 · wood texture
목재를 구성하는 세포의 성질, 크기, 분포상태에 따라 나타나는 나무의 살갗. 거친나무갗, 고운나무갗으로 구분.

No.1264 · 산림청 원문

나무결 木紋 · wood grain
목재의 구성세포의 배열상태가 재면에 나타난 상태를 말하며, 목리라고도 함. 통직목리 및 교주목리가 있다.

No.1265 · 산림청 원문

나무껍질 樹皮 · bark
수피. 나무줄기의 가장 바깥쪽 조직. 줄기의 코르크 형성층과 같이 죽거나 벗겨진다. 줄기가 부피생장을 하면서 함께 갈라지기 시작한다. 갈리지는 모양, 부착하고 있는 기간 등이 수종에 따라 개체에 따라 차이가 있는데 소나무나 밤나무는 주로 비늘 조각처럼 갈라지고 삼나무나 향나무는 가늘고 길게 벗겨진다. 또 껍질 아래에 있는 코르크층이 위로 뚫고 나와 무늬를 만드는데 이를 피목(皮目, lenticel)이라 하며 통기작용을 하고 나무의 종류에 따라 중요한 식별 인자가 되기도 한다. 예를 들면 은사시나무는 다이야몬드형 피목을 하지고 있으며 벚나무류는 옆으로 길게 트는 모양을 한다.

No.1266 · 산림청 원문

나무높이 樹高 · tree height
수고.

No.1267 · 산림청 원문

나무모양 樹形 · tree form
수형나무 전체의 모양을 말한다.

No.1268 · 산림청 원문

나무미끄럼 길 목수라 木修羅, 木滑路 · log chute
암석이 많거나 산지가 험한 벌채작업지에서는 통나무로 활로(滑路)를 만들어서 원목을 미끄러뜨려 활주시키는 집재용 통길을 나무미끄럼 길이라고 한다. 지름 10~25cm, 길이 3~6m의 통나무를 6~10개로 반원형 단면의 통나무도랑을 만들어 그 위에서 원목이 미끄러지도록 한다. 목수라의 도랑 나비는 대체로 1.2m 정도, 깊이는 0.3m 정도로 만들며 보통 지면에 접하여 수라를 만들지만 지형에 따라서는 발판을 만들어 그 위를 건너가게 만들기도 한다. 일반적인 목수라는 통나무만을 사용한 협의의 나무미끄럼 길과 두꺼운 판재을 이용하는 판수라, 여기에 물을 흘려보내는 물수라(wet slide), 통수 (flume) 등이 있다.

No.1269 · 산림청 원문

나무베기 伐採 · cutting
서 있는 수목의 지상부를 베어 넘어뜨리는 것을 벌도(伐倒)라고 하며, 벌목한 수목의 가지를 자르고(limbing; 枝打), 박피(peeling; 剝皮), 목재의 용도에 적합한 길이로 자르는 조재(wood conversion, bucking; 造材) · 측정(measuring) · 가지자르기 · 초두목자르기(topping) 등이 포함되기도 한다. 나무베기는 산지에서 이루어지며 수목의 지상부를 벌목용 기계 및 기구를 사용하여 베어 넘기는 작업으로서 위험을 수반하는 작업이므로, 작업원의 안전과 목재의 손상 방지, 벌목작업과 연계하여 이루어지는 후속작업인 집 · 운재작업에 대해서도 고려해야 한다. 대부분 기계톱에 의하여 이루어지지만 최근에는 펠러번처, 하베스터에 의한 기계화 벌목작업도 행해지고 있다.

No.1270 · 산림청 원문

나무벤땅 伐採跡地 · cut-over area
임목을 벌채한 후에 벌채목을 집재하여 반출한 임지로서 조림지 정리작업을 거쳐 조림을 실시할 예정인 임지를 일컫는다.

No.1271 · 산림청 원문

나무실어내기 木材搬出 · hauling of wood
벌목하여 집재한 원목을 운반차량에 적재하여 임내의 토장이나 임도변에서 임외로 운송하는 것을 뜻하나 경우에 따라서는 포워더 등의 장비를 이용하여 집재작업과 병행하여 벌채장소로부터 임도나 토장까지 이루어지는 운반작업을 의미한다.

No.1272 · 산림청 원문

나무심기 植栽工 · tree planting
황폐된 산지비탈면이나 각종 훼손지에 직접 묘목을 식재하여 식생 · 숲을 조성 · 녹화하는 녹화공종이다. 사방지 녹화식재수종은 척악임지에서도 생장이 왕성하며 뿌리의 자람이 좋아서 토양의 긴박

력이 커야하고 건조, 한해(寒害), 병충해 등에 적응성이 커야한다. 또한 묘목의 대량 생산이 잘 되어 생산비가 적게 들며, 생장이후에 갱신이 용이하고, 뿌리에 근류박테리아 등이 있어 토양개량 효과가 있어야 한다. 입목이 가급적 경제가치가 높으며 피음(被陰)에도 잘 견디는 수종이 좋다. 우리나라에서 식재되고 있는 사방조림수종으로는 리기다소나무, 아까시나무, 해송, 물(산)오리나무, 물갬나무, 사방오리나무(남부), 자작나무, 싸리, 참싸리 등이 주로 사용되며, 상수리나무, 졸참나무, 쪽제비싸리, 보리장나무(남부) 등이 식재된다.

No.1273 · 산림청 원문

나무아래심기 樹下植栽 · under planting
수하식재.

No.1274 · 산림청 원문

나반 羅盤 · compass
컴퍼스.

No.1275 · 산림청 원문

나비넓힘 擴輻 · widening of road
자동차가 곡선부를 주행하는 경우 앞바퀴(전륜)와 뒷바퀴(후륜) 사이에 내륜차가 생겨 후륜이 전륜보다 안쪽을 주행하게 되므로 이에 대한 공간을 확보하기 위해 곡선부의 나비를 넓히는 것이다.

No.1276 · 산림청 원문

나비모양꽃부리 蝶形花冠 · papilionaceous corolla
접형화관.

No.1277 · 산림청 원문

나아 裸芽 · naked bud
눈은 겨울동안 어린 싹을 보호하기 위해서 비늘조각이나 털 같은 것(芽鱗)으로 덥혀 있어서 추위로부터 보호를 받게 되는데 이러한 보호 기관이 없는 눈을 말한다. 주로 겨울 추위가 따로 없는 열대지방이나 아열대지방에서 자라는 나무에서 주로 볼 수 있다.

No.1278 · 산림청 원문

나용 裸? · exarate pupae
곤충의 번데기형으로 부속지가 몸에서 떨어져 있으며 촉각, 날개, 다리는 경화하지 않고 있으며, 피부전체의 경화의 정도가 낮으며 건조나 일광조사에 견딜 수 없다. 대부분 흙속에 있거나 튼튼한 집이나 고치 속에 있다. 벼룩목, 부채벌레목, 대부분의 딱정벌레목과 벌목, 파리목의 일부에서 그 예를 볼 수 있다.

No.1279 · 산림청 원문

나이테 年輪 · annual ring
목본식물 줄기(드물게 뿌리) 에서 매년 유관속형성층의 활동으로 생기는 2차물관부의 생장층. 줄기의 횡절단면으로 관찰되며 식물의 나이를 알 수 있다.

No.1280 · 산림청 원문

나이테측정기 生長椎 · increment borer
생장추.

No.1281 · 산림청 원문

나일로이드체 나일로이드體 · neiloid
임목의 형상 중에 하나로 수간의 표면이 나일로이드 형태를 보이는 임목의 형상을 나일로이드체라고 한다. 이 나일로이드체는 포물선체와는 반대로 수간축과 수직으로 만나는 평면인 수간곡선이 양쪽 단면을 중심으로 약간 안쪽으로 휜 곡선 형태를 보이고 있으며, 많은 경우에 근주 바로 위의 수간형태가 나일로이드체를 나타낸다.

No.1282 · 산림청 원문

나자식물 裸子植物 · gymnosperm
겉씨식물.

No.1283 · 산림청 원문

나전칠기 螺鈿漆器 · lacquer ware inlaid with mother-of-pearl
옻칠공예의 한 종류로 나무나 금속의 소재에 옻칠을 하면서 얇게 잘라낸 조개껍질로 여러 가지 문양을 오려붙이고 마감칠을 한 옻칠공예 기법 또는 옻칠공예품을 총칭한다.

No.1284 · 산림청 원문

나지 裸地 · bareland
나무나 풀이 없는 맨땅.

No.1285 · 산림청 원문

나침반 羅針盤 · compass
컴퍼스.

No.1286 · 산림청 원문

나침의 羅針儀 · compass
컴퍼스.

No.1287 · 산림청 원문

낙뢰 落雷 · lightning
7~8월경에 가장 많이 발생한다.수목은 전기의 양도체이다.수목이 낙뢰를 받으면 수분이 많은 형성층과 목부를 통하여 전기가 흐른다.

No.1288 · 산림청 원문

낙석 落石 · rock fall
호우 또는 융설시에 산 위나 벼랑 따위에서 사면 기슭으로 떨어지는 돌.

No.1289 · 산림청 원문

낙석방지공법 落石防止工法 · falling stone control works
급경사 및 절개비탈면 상에 붕괴 · 붕락의 위험이 있는 암괴(岩塊)를 처리하기 위하여 시공되는 공법.

No.1290 · 산림청 원문

낙석방지망덮기 落石防止網覆工 · falling stone netting works
낙석발생원에서 전석(轉石)이나 암괴등을 철사망이나 합성섬유제망, 비닐제망 등으로 덮어서 낙석이 되어도 비탈면과 낙석방지망 사이를 따라서 미끄러져 구르도록 하거나 또는 부석(浮石)을 눌러주어 굴러내리지 않도록 하기 위하여 계획 · 시공하는 암반안정공사, 보호공사이다.

No.1291 · 산림청 원문

낙석저지책세우기 落石沮止柵工 · falling stone prevention fencing works
낙석발생원의 하부에 콘크리트 흙막이 공사와 병용하여 강철재 낙석저지책을 세워서 낙석을 차단시키는 공법.

No.1292 · 산림청 원문

낙엽 落葉 · leaf litter, litter
1) 잎이 말라 줄기나 가지에서 임지로 떨어진 잎들을 말한다. 2) 넓은 의미로는 살아있는 식물체에 붙어있지 아니한 죽은 식물체의 일부를 가리키며, 좁은 의미로는 산림토양에 도달한 죽은 잎만을 의미한다.

No.1293 · 산림청 원문

낙엽광엽수림대 落葉廣葉樹林帶 · deciduous forest region
낙엽활엽수림대.

No.1294 · 산림청 원문

낙엽낙지 落葉落枝 · litter
1) 식물체에서 떨어진 낙엽과 가지를 말하며, 경우에 따라서는 지하부의 뿌리를 포함하기도 한다. 2) 휴면기에 임목으로부터 지표면에 떨어진 잎이나 줄기를 말한다.

No.1295 · 산림청 원문

낙엽낙지층 落葉落枝層 · litter layer
떨어진 잎이나 가지가 지표면위에 쌓여 층(layer)을 이루는 것을 말한다. ⇒ 낙엽층.

No.1296 · 산림청 원문

낙엽산 落葉酸 · abscisic acid
에브시식산.

No.1297 · 산림청 원문

낙엽성 落葉性 · deciduous
1) 식물의 생활사 중에서 모든 성엽(成葉)이 탈락하는 시기를 갖는 성질을 말하는데, 개체가 고사하는 과정에서 낙엽하는 경우는 포함되지 않는다. 특히 넓은 잎을 가진 나무가 낙엽성인 것은 낙엽활엽수, 바늘잎을 가진 나무가 낙엽성인 것은 낙엽침엽수라 부른다. 2) 식물의 생활사 중에서 모든 잎이 떨어지는 시기를 갖는 특성을 말한다. 식물체가 죽는 과정에서 잎이 모두 떨어지는 경우는 포함되지 않으므로 주로 나무에 대해 쓰는 용어이다. 겨울, 건조 등 생육조건이 나쁜 시기에 낙엽이 지고 잎이 없이 지내는 나무를 낙엽수(deciduous tree), 이와 반대로 항시 녹색의 잎을 가

지고 있는 나무를 상록수라고 부른다. 일부 철쭉류처럼 낙엽기에도 일부의 푸른 잎이 남아 있는 것을 반낙엽성 이라고 부르기도 한다.

No.1298 · 산림청 원문

낙엽수 落葉樹 · deciduous tree
상록수와 반대로 1년 내에 성엽이 전부 고사하고 휴면상태로 들어가는 시기를 갖는 나무를 말한다. 낙엽수는 보통 기후적으로 온대에 압도적으로 많으며 여름에 무성하고 겨울에 잎이 떨어지기 때문에 하록(夏綠)과 거의 같은 뜻으로 사용되지만, 열대, 아열대에서 건기에 잎이 떨어지는 것 즉 우록(雨綠)도 포함된다.

No.1299 · 산림청 원문

낙엽채취 落葉採取 · removal of forest litters
1) 산림토양에 축적된 유기물을 채취하는 행위로 토양의 물리, 화학, 생물적 성질을 악화시키는 원인이 된다. 2) 임지에 떨어진 낙엽을 어떤 목적을 위하여 모아 두는 것을 말한다.

No.1300 · 산림청 원문

낙엽층 落葉層 · litter layer
1) 낙엽 등의 유기물이 신선하거나 일부가 변질된 상태로 있지만 원조직을 후안으로 볼 수 있는 지표면 가장 위 부분의 유기물 층을 말한다. 2) 산림토양의 가장 위 부분에 있는 유기물 가운데서 형태나 색깔 등이 식물체에서 떨어질 때와 비교하여 크게 변하지 않은 상태의 층을 가리킨다. 흔히 L층으로 표시하기도 한다.

No.1301 · 산림청 원문

낙엽활엽수림대 落葉闊葉樹林帶 · deciduous broad-leaved forest zone
낙엽광엽수림대겨울에 잎을 떨어뜨리는 넓은 잎이 달리는 수종으로 구성된 산림대로 기후로는 냉온대에 속하고, 수직분포에서는 산지대에 극상림으로 성립한다. 그러나 낙엽은 건조에 의한 것과 온도에 의한 것이 있다. 수목을 잎이 생존하는 기간의 길고 짧음으로 구별하는 경우, 1년 이내에 고사하는 잎을 가지며 그 결과로서 성엽(成葉) 전부를 잃고 휴면상태로 들어가는 시기가 있는 수목으로 낙엽수라 하고 상록수와 반대이다. 낙엽수는 보통 기후적으로 온대에 압도적으로 많으며 여름에 무성하고 겨울에 잎이 떨어지기 때문에 하록(夏綠)과 거의 같은 뜻으로 사용되지만, 열대~아열대에서 건기에 잎이 떨어지는 것 즉 우록(雨綠)도 있다. 그런데 단풍나무의 경우에서와 같이 고사한 잎이 반드시 떨어진다고 할 수 없으며, 죽은 잎이 달린 채로 겨울을 나는 것도 있다. 한편, 상록수의 잎도 몇 년씩이나 죽지 않는 것이 아니고, 소나무의 경우 2~3년마다, 잣나무의 경우 3~4년마다 교대하지만 계속해서 새로운 잎이 다시 나기 때문에 낙엽현상이 현저하게 보이는 것은 아니다. 그러나 소나무와 잣나무의 경우 역시 가을에 많은 양의 낙엽이 지고 봄에도 상당한 낙엽이 있다. 잎갈나무를 제외하면 대부분의 침엽수는 상록수이다.

No.1302 · 산림청 원문

낙지 落枝 · branch fall
임목의 가지가 고사하여 떨어지는 것.

No.1303 · 산림청 원문

낙차 落差 · head drop
높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어지는 물의 높낮이 차이.

No.1304 · 산림청 원문

낙차공 落差工 · drop works
하천이나 수로의 바닥면에 경사를 완만하게 하고, 물의 흐름과 물길을 안정화시키기 위하여 구조물을 설치하는 공사.

No.1305 · 산림청 원문

난기 卵期 · egg period
낳은 알이 부화 될 때까지의 기간을 말한다. 난기는 곤충의 종류 및 환경에 따라 다르며, 파리같은 것은 2~3일로 아주 짧으며, 이화명나방, 복숭아순나방 등은 1주일 정도이며 다른 것은 10일 정도로 부화하는 것이 많다. 그러나 텐트나방의 경우는 난기가 약 9개월 정도이며 말매미의 난은 300여일 되는 것도 있다.

No.1306 · 산림청 원문

난대 暖帶 · warm temperate zone
우리나라에서 북위 35°이남, 해안에서는 35°30′이남이고, 연평균 기온이 14℃ 이상 되는 곳을 말하는데, 주로 남해안을 따라 좁은 지방에 펼쳐지며 남해연안의 섬 및 제주도의 저지대에 해당한다. 바닷가를 따라 동해안에서는 북위 36°까지, 서해안에서는 약 35°까지 올라온다. 수직적으로는 제주도에서는 약 600m 이하, 완도에서는 150m 이하에 해당한다. 한랭지수는 -10℃ 이하이다.

No.1307 · 산림청 원문

난대림 暖帶林 · warm temperate forest
난대 지역에서 자라는 숲을 말하는데, 우리나라에서는 난대가 먼저 규정되고 난대림이 규정된 것이 아니라 임경빈 등에 의해 난대림이 먼저 규정되었고 임양재가 기후를 평가하여 난대를 규정하고 난대림과 일치된다고 보고하였다. 난대림에는 가시나무, 붉가시나무, 구실잣밤나무, 모밀잣밤나무, 후박나무, 녹나무, 참식나무 등 상록활엽수가 자라는데, 해송과 소나무가 상당부분 점유하고 있다. 대체로 이 해송과 소나무림은 인위적 훼손의 결과로 보여지나 일부 학자들은 다른 의견을 나타내고 있다.

No.1308 · 산림청 원문

난대림대 暖帶林帶 · warm temperate forest zone
난대에 분포하는 산림대를 일컫는 말

No.1309 · 산림청 원문

난대수층 難帶水層 · aquiclude
암석 또는 퇴적물 지층이 물로 포화되어 있으나 거의 투수되지 않는 지층을 가리키는 것으로 대부분 점토로 구성된 지층이고 극히 적은 양의 지하수를 유출시킨다.

No.1310 · 산림청 원문

난류 亂流 · turbulent flow
레이놀즈 수가 어떤 값 (개수로에서는 600~2,000 정도의 범위) 보다도 큰 물의 흐름으로, 물 입자가 상하좌우로 불규칙하게 흩어지면서 진행하는 흐름이다. 층류에 비해 관성력 (慣性力)에 대한 점성력 (粘性力)이 상대적으로 작은 흐름이다. 참조 : 층류.

No.1311 · 산림청 원문

난세포 卵細胞 · egg cell
피자식물의 배우자체 에서 주공쪽으로 위치하고, 난기구에서 가장 큰 세포이며 난자라고도 한다.

No.1312 · 산림청 원문

난소소관 卵巢小管 · ovariole
난소를 구성하고 있는 긴 관상의 기관으로 안에는 발생중의 난자가 일렬로 되어 있으며, 난소소관벽은 얇고 투명한 막으로 되어 있으며 안쪽에는 세포로 된 층이 있다. 단사(端絲, terminal filament), 난원세포대(卵原細胞帶, germarium), 난황소(卵黃巢, vitellarium)의 3부분으로 구분된다. 난소소관은 영양세포의 유무와 그 위치관계에 따라 무영양실형(無營養室型, panoistic type), 교호영양실형(交互營養室型, polytrophic type), 단영양실형(端營養室型, acrotrophic type)으로 구분한다.

No.1313 · 산림청 원문

난수표 亂數表 · table of random numbers
0에서 9까지의 숫자를 무작위로 배열한 숫자표. 임의추출을 하는 경우, 또는 등간격 추출의 추출번호를 정하는 경우 등에 사용된다. 대부분의 숫자표는 사용하기 쉽도록 숫자를 2자리 또는 4자리씩 끊어서 배열하고 있다. 난수표를 사용할 때에는 적당한 방법으로 첫 숫자를 선택하고 가로 세로 또는 비스듬히 어느 방향을 정하여 차례로 숫자를 배열한다. 이때 고의로 숫자를 빼놓든가 편리한 대로 숫자를 선택해서는 안 된다. 1에서 6까지 숫자의 난수(亂數)를 만들 때에는 주사위를 던져서 만들어도 되고 또 0~9의 난수를 만들 때에는 20면체 주사위를 이용해도 된다. 이밖에 룰렛을 돌려 얻은 수를 차례로 기록할 수도 있다. 전자계산기로 난수를 만드는 가장 흔한 방법은 큰 수에 큰 수를 곱하여 적당한 수로 나눈 나머지를 취하는데 이것을 의사(擬似)난수라 한다.

No.1314 · 산림청 원문

난포자 卵胞子 · oospore
난균류에 있어 크기와 모양이 서로 다른 배우자낭(sporangium)을 통하여 형성하는 접합자이다.

No.1315 · 산림청 원문

난형 卵形 · ovate
달걀형식물의 기관에서 그 모양을 나타내는 말로써 길이와 폭의 비가 2:1 ~ 3:2 정도 되며 중간보다 아래쪽이 보다 넓은 상태의 모양을 말한다. 식물의 잎이나 꽃잎, 열매의 형태 등을 나타낼 쓰이는 용어. 위 끝이 좀 더 뾰족한 달걀과 같은 모양임. 이와는 반대로 목련의 잎처럼 위쪽이 보다 넓은 모양을 도란형(倒卵形, obovate)이라고 함.

No.1316 · 산림청 원문

날개 편 길이 翼長 · wing-span
조류에 있어서 날개를 펼쳤을 때, 날개의 한 쪽 끝에서 다른 쪽 날개 끝가지의 길이를 말한다.

No.1317 · 산림청 원문

날개맥 翅脈 · venation
곤충의 날개에 있는 맥. 날개를 지탱하는 역할을 함.

No.1318 · 산림청 원문

날개수제 翼水堤 · vane spur
자연형 하천 안정화 공법 중의 하나로서 물의 흐름을 조절하여 하천의 종침식을 방지하기 위하여 하천의 바깥쪽에서 중심을 향해 날개모양으로 설치하는 구조물이다.

No.1319 · 산림청 원문

남극 南極 · South Pole
남위 90°의 지점을 말하며 남위 66°33′의 지역을 남극권이라고 한다. 북극지방이 바다로 덮인 데 반해 남극 지방은 1,310㎢의 넓은 육지로 이루어졌으므로 남극대륙이라고 부른다. 남극은 여름에도 빙점 이상으로 기온이 높아지는 일이 없어 일년내 두꺼운 얼음으로 덮여 있고, 식물은 거의 생육할 수 없다. 동물로는 팽귄이 살고 있으며 여름에 갈매기 종류가 찾아들 뿐이다.

No.1320 · 산림청 원문

남미공동시장 南美共同市場 · MERCOSUR
남아메리카지역에서의 자유무역과 관세동맹을 목표로 결정된 경제블록이다. 1980년대 브라질과 아르헨티나의 양국 경제협력 프로그램을 시발로 하여 1991년 인접국인 우루과이와 파라과이를 포함한 아순시온협약이 체결됨으로서 제도적 골격을 마련한 남미공동시장은 4년동안의 준비기간을 거쳐 1995년 1월 1일부로 정식 발효되었다. 남미공동시장은 비회원국들에 대한 대외공동관세(TEC)제도를 채택함으로서 경제통합의 단계 가운데 관세동맹의 형태를 취하고 있다. 대외공동관세는 최고 20%까지 11단계로 나누어 적용되며 회원국의 경제사정에 따라 일부 예외품목 규정을 두고 있다. 이들 예외품목은 2001년까지 동일한 대외공동관세를 목표로 하고 있다. 역내 국가들간의 교역에서는 회원국 총 생산품의 약 90%는 경제블록 내에서 무관세로 거래되며 각 회원국의 경제적 특수성을 고려, 일부 품목에 대해서는 차별된 관세 부과를 허용하였다. 이들 예외품목에 대한 차별관세는 협상일정에 따라 점진적으로 인하하여 2000년까지 모든 생산품들의 역내 무관세 거래를 목표로 하고 있다. 남미공동시장의 정식 회원국은 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이 4개국이며 칠레와 볼리비아가 자유무역지대 수준에서 준 회원국으로 참가하고 있으며 페루, 에쿠아도르, 콜롬비아, 베네주엘라와 남미 자유무역지대 결성을 위한 협상이 진행되고 있다. 예외적으로는 1995년 유럽연합(EU)과 경제블록간의 협력 합의가 서명되었다. 남미 공동시장의 총인구는 2억7백만 명이며, 역내순생산(GDP) 총액은 8,598억불, 회원국 일인당 평균 국민소득은 4,139불이다. 아순시온협약 이후 지속적인 역내관세의 인하와 회원국들의 성공적인 인플레 안정으로 역내교역량은 1990년 약 40억불 수준에서 1995년 145억불로 3배 이상 증가하였다.

No.1321 · 산림청 원문

남양재 南洋材 · south sea timber
일반적으로 동남아시아 지역(인도네시아, 말레이시아, PNG, 필리핀, 부르네이, 솔로몬제도 등)에서 생산되는 목재의 총칭이다.

No.1322 · 산림청 원문

남조류 藍藻類 · blue-green algae
식물분류계 중의 1문으로, 단위막으로 둘러싸인 핵 및 엽록체가 없는 조류. 체제상 단세포단계에서 겨우 사상체제에 멈추며, 사상체제에서도 원형질이동이 없고, 유성생식을 하지 않는 3가지의 원시적인 특징이므로 인해 세균과 비등한 1군을 형성하여 남색세균이라고도 한다.

No.1323 · 산림청 원문

남조식물 藍藻植物 · blue green algae
식물계의 1문으로, 핵막으로 싸인 핵 및 엽록체를 갖지 않은 조류를 말한다. 단세포 단계에서 겨우 사상체제에 멈추며 후자에서도 진정한 원형질 연락이 없고, 유성생식을 하지 않는다는 점에서 세균과 비슷하기 때문에 남색세균이라고도 불린다. 분포역이 넓기 때문에 사막과 물 속 등 지구 전역에 살고 있고, 광합성을 하여 산소를 발생할 뿐만 아니라 때로 독소를 방출하기도 하여 환경문제와 관련하여 중요한 분류군이다.

No.1324 · 산림청 원문

납막 蠟膜 · cere
조류에 있어서 윗부리의 기부를 덮고 있는 부드럽고 불룩한 부분. 매, 수리류, 멧비둘기류 등에 있다.

No.1325 · 산림청 원문

낭과 囊果 · utricle
열매의 한 종류로써 작은 주머니가 부풀어져 베개 모양을 하고 있는 열매이다. 새우나무의 열매가 대표적이다.

No.1326 · 산림청 원문

낭퇴 囊堆 · sorus
양치식물에서 잎의 뒷면 또는 잎 가장자리의 생식상(生殖床) 위에 군생하는 포자낭을 뜻하며 포자낭군이라고도 한다.

No.1327 · 산림청 원문

낮은바닥막이 帶工 · stream bed works
계간사방공사의 가로공작물의 하나로, 바닥막이에 낙차가 없는 형태를 가리킨다. 주된 설치목적은 황폐한 계천 바닥의 세굴침식을 방지, 억제하여, 현재의 계상을 고정시킴으로써 계상물매를 유지하는 것이다. 낮은 바닥막이의 댐마루는 보통 현 계상면 위로 돌출하지 않는 것이 특징이며, 이것이 일반 바닥막이와 다른 점이다. 주로 콘크리트나 돌을 사용한 낮은 바닥막이를 시공하는 것이 보통이다.

No.1328 · 산림청 원문

내각법 內角法 · interior angle methodn
변으로 이루어진 다각형에서 서로 접하는 두 측선이 이루는 내각을 측정하는 방법을 말하는 것으로, 이때 내각의 합은 90o×(2n-4)가 되고, 허용오차는 평지의 경우 1~0.5(분), 산악지에서는 1.5(분)이다.

No.1329 · 산림청 원문

내건농법 耐乾農法 · dry farming
휴한기에 비가 올 때마다 심경하여 빗물을 지하에 저장하고 작기에는 잘 다져서 지하수의 모관상승을 도웁고, 토양으로부터 증발을 줄인다.

No.1330 · 산림청 원문

내건성 耐乾性 · drought resistance
식물의 내건성은 원형질의 건조를 회피하는 능력(drought resistance; 건조저항성), 원형질의 건조를 피해를 받지 않고 견딜 수 있는 능력(drought tolerance; 건조인내성)으로 나눌 수 있는 데 식물에 따라 그 두 가지 능력을 다르게 갖고 있다. 전자의 경우 심근성 뿌리로 깊은 땅속의 수분을 흡수

하거나(예: 야자나무, 유칼리나무, 소나무), 체내에 저수조직을 갖고 있거나(예: 선인장, 소나무), 두터운 각피층과 다량의 왁스, 낮은 T/R율로 수분소비를 감소시키는 등의 원리로 건조한 환경조건을 살아남는다. 후자의 경우 이끼류, 지의류, 고사리류, 건조종자나 포자 등에서 볼 수 있는 성질로서 원형질이 건조한 상태에서 견디다가 수분을 흡수하면 즉시 생리적 활동을 재개할 수 있다. 사막지대의 Acasia류나 Creosote류 등도 건조인내성이 높다. 건조인내성 식물들은 극심한 건조조건에서 살아남는 장점이 있는 반면에 건조저항성 식물들은 어느 정도의 건조한 조건에서 생장을 할 수 있는 장점을 갖고 있다.

No.1331 · 산림청 원문

내건성 생물 耐乾性 生物 · drought endurer
마른 상태에서 피해를 입지 않고 견딜 수 있는 생물. 건조한 상태에서 견디다가 수분을 흡수하면 즉시 생리적 활동을 재개 할 수 있다.

No.1332 · 산림청 원문

내국민대우 內國民待遇 · national treatment
GATT에서 규정된 여러 가지 의무 가운데서 각 가맹국의 국내정책과 가장 직접적으로 충돌의 가능성을 갖고 있는 것이 제3조에 집약되어 있는 내국민대우(National treatment)에 관한 의무이다. GATT상의 "내국민대우"란 각 국은 조세 및 정부규제 등에 있어 수입품을 국내제품과 똑같이 취급해야 한다는 의무를 말하는 것으로서 모든 수입품을 공평하게 취급하되 국내제품은 유리하게 취급될 수도 있는 최혜국대우원칙에 비해 훨씬 넓은 개념이라 할 수 있다. MFN원칙하에서는 A국은 X국과 Y국의 상품을 동일하게 취급하기만 하면 되는데 비해 내국민대우 의무는 A국으로 하여금 X국과 Y국의 상품을 자국생산품과 동일하게 취급해야 할 것을 요구하고 있다. 만약 수입품에 대한 차별적인 내국세가 부과된다면 이는 관세에 버금가는 보호주의적 도구가 될 수 있다. 마찬가지로 여러 가지 형태의 정부규제도 국내제품을 보호하고 수입품을 시장에서 몰아내는데 있어 관세보다 더욱 유용하게 사용될 수 있다. 흔한 예로서 수입품에 대해 특별한 상표표시방법이나 포장을 요구한다든지 건강규정을 적용하는 등의 행정적규제가 수입을 제한할 목적으로 이용되고 있다. 따라서 내국민대우의무는 가맹국정부의 조치에 직접적으로 영향을 주기 때문에 다른 GATT의무에 비해 내국정치문제와 쉽게 마찰을 일으키는 경우가 많으며 그래서 내국민대우의무에 위배되는 사례가 자주 발견되고 있다. 한편 GATT 초안작성과정에서는 내국민대우에 관한 조항을 GATT에 도입하는 문제에 있어 특히 그 적용범위에 대해 상당한 논란이 있었다. 일부 협상대표들은 GATT의 내국민대우 의무는 양허표에 명기된 상품에만 국한하여 적용할 것을 요구하였다. 그러나 당시 대부분의 협상대표들은 내국민대우조항의 목적은 양허표의 보호뿐 아니라 내국세나 각종 정부규제가 보호무역의 수단으로 사용되는 것을 막기 위한데 있는 것으로 생각하고 있었기 때문에 상기의 일부 주장은 받아들여지지 않았다. 1947년 10월에 채택된 GATT협정문의 내국민대우조항은 1948년 하바나 회의에서 전면 개정함에 따라 수정되었으며, 1948년 가을의 제네바회의에서 GATT 체약국들은 하바나회의에서 수정된 ITO헌장 안의 어떤 부분이 GATT에 포함되어야 할 것인가에 대해 논의하였는데 여기에서 새로운 내국민대우규정을 그대로 GATT에(제3조) 도입하기로 결정하고 이를 GATT수정의정서에 포함시킴으로서 같은 해 12월부터 이를 시행하였다.

No.1333 · 산림청 원문

내동성 耐凍性 · frost tolerance
빙점이하의 온도에 있는 생물이 세포외 동결 또는 기관 외 동결을 일으켜 세포내 동결이 일어나지 않아서 빙점이하의 온도에도 견디어내며 생존할 수 있는 성질을 진성내동성이라고 한다. 탈수된 세포질은 내건성을 갖고 있어서 생존할 수 있다. 동결회피성과 더불어 생물의 내한성 메커니즘의 하나

이다. 세포 밖에 얼음이 생성되면 얼음표면이 증기압이 세포내의 증기압보다 낮아지기 때문에 세포는 탈수로 수축하고, 세포 밖의 얼음은 더욱 커지게 된다. 내한성이 발달한 식물세포에서는 종종 세포벽과 세포막 사이에 얼음이 생겨서 동결원형질분리를 일으키지만 피해를 받지 않는다. 일반적으로 세포막의 물 투과성이 높은 식물일수록 내동성도 높다. 탈수된 세포의 삼투압은 높아져서 빙점이 내려가기 때문에 세포 내에 얼음이 생기지 않게 된다. 내동성이 낮은 식물은 세포의 물이 밖으로 나와 어는 비율이 적고(감자에서는 약 50%), 내동성이 큰 식물에서는 그 비율이 크다(밀에서는 약 90%). 월동생물에서 어떤 원형질적 조건이 갖추어져서 체내에 동해방어물질(예: 글리세롤)이 축적되면 내동성은 더욱 높아진다. 동결회피형 내동성의 또 다른 예로서 아직까지 완전히 밝혀지지 않은 저온과 냉각원리가 있다. 온대활엽수의 목부유조직은 두꺼운 세포벽을 갖은 세포질의 수분이 완전히 탈수되지 않아, 삼투압이 낮은 상태에서 저온과 냉각의 원리로 -30℃~-45℃에서 액체의 물로 존재하여 세포가 살아남는다. 이 이하의 온도에서는 세포 내 동결이 일어나 세포가 죽게 된다. ⇒ 내한성.

No.1334 · 산림청 원문

내륙분지 內陸盆地 · inland basin
대륙의 내부에 위치하고 있어 바다와 수계가 이어지지 않은 분지이다. 내륙분지는 생성원인에 따라, 또 위치하는 위도와 고도에 따라 그 규모의 크기가 다르고 성질도 다양하다. 내륙분지는 또 내륙유역으로도 되어 있어 지표류가 없는 무하수 유역과 영구적 또는 간헐적으로 물이 흐르는 내하수 유역이 있다.

No.1335 · 산림청 원문

내륙사막 內陸砂漠 · interior desert
대륙내부에 위치하는 사막으로 대륙내부에는 겨울철에 강한 고기압이 발달하기 때문에 한랭 건조화되고 여름철에는 반대로 고온이 되고 저기압이 발달한다. 아시아 대륙 내부의 경우 남에서 동에 걸쳐서는 큰 산맥이 계절풍의 습기를 막아버리고, 북에서의 바람은 북극의 찬 물이나 어름의 영향으로 습기가 적은 채로 남하하여 온도가 높아짐에 다라 포화수증기량이 커지므로 강수의 가능성은 점점 적어진다. 또 대서양에서 넘어온 기단은 볼가를 넘으면 대기 습기가 적어진다. 따라서 대륙 내부에는 연중 건조하여 사막이 형성된다.

No.1336 · 산림청 원문

내막 內膜 · intine
내벽화분립의 외벽(exting; 표벽) 내측의 얇은 막이다. 발아공의 부분은 외막이 없이 내막만이 있다.

No.1337 · 산림청 원문

내배유 內胚乳 · endosperm
배유.종자식물의 배낭 속에서 영양분을 저장하였다가, 배의 발생에 필요한 영양분을 공급하는 조직이다. 내유(內乳)라고도 하며, 벼나 밤 따위의 먹는 부분이다.

No.1338 · 산림청 원문

내벽 內壁 · intine
내막.

No.1339 · 산림청 원문

내병성 耐病性 · disease tolerance
식물체가 병원체에 의해 감염되었을 때 좋은 생산성을 유지할 수 있는 식물체의 능력. 이러한 내병성은 특별한 기주식물의 유전적 능력에 의해 나타난다. 병원체가 기주식물에 침입해 증식하지만, 식물체는 병원체의 작용을 불활성화 시키거나 보상 등의 작용으로 생산성을 나타낸다. 내병성을 갖는 식물체는 병원체에 대해 감수성이지만 병원체에 의해 고사하지 않고 적은 피해만을 나타낸다.

No.1340 · 산림청 원문

내부결합강도 內部結合强度 · internal bond strength
종이 및 판지의 Z방향 인장강도. 시험편의 양면을 각각 25mm×25mm의 스테인레스판에 양면 접착테이프로 붙여, 인장강도 시험기에 의해 박리시켜, 하중을 측정한다.

No.1341 · 산림청 원문

내부기생체 內部寄生體 · endoparasites
기주식물 내로 침입하여 양분을 탈취하는 기생자.

No.1342 · 산림청 원문

내부비용 內部費用 · internal cost
내부비용은 사업수행 주체가 지불하거나 부담하는 비용으로 사업수행에 소요되는 인적 및 물적 자원비용의 지출과 사업수행과 관련하여 부담하는 기타의 희생이나 손실이 여기에 포함된다.

No.1343 · 산림청 원문

내부사이징 - · internal sizing
양지의 제조 공정에서, 잉크나 액체가 번지지 않도록하기 위해 펄프에 콜로이드(colloid) 물질을 가해서 종이 섬유의 표면이나 사이를 덮는 것을 말함.

No.1344 · 산림청 원문

내부수익율 內部收益率 · internal rate of return
내부투자수익률.

No.1345 · 산림청 원문

내부투자수익률 內部投資收益率 · internal rate of return
내부투자수익률이란 순편익이 0이 되는 할인율을 말한다. 다른 말로 표현하면, 편익흐름의 현재가치의 합이 비용흐름의 현재가치의 합과 같아지도록 할인하는 이자율을 일컫는다.

No.1346 · 산림청 원문

내부포식기생자 內部捕食寄生者 · endoparasitoid
포식기생충이 기주의 체내에서 영양분을 섭취하며 생육하는 것을 말한다.

No.1347 · 산림청 원문

내부화 內部化 · internalization
경제주체의 의사결정과정에서 사적 편익, 비용 뿐만 아니라 사회적 편익, 비용이 변수로 포함되도록 하는 것이다.

No.1348 · 산림청 원문

내부화정책 內部化政策 · internalization policy
경제주체의 의사결정과정에서 사적 편익, 비용만을 고려하고 사회적 편익, 비용을 고려하지 않음으로서 발생하는 외부효과를 제거하여 자원배분의 합리화를 기하고자하는 정책이다.

No.1349 · 산림청 원문

내생균근 內生菌根 · endomycorrhiza
균사가 기주식물의 세포 내부로 침투하는 것으로 균사가 뿌리의 피층세포 안으로 침투하여 자란다. 그러나 균사의 생장은 피층세포에만 국한되고 내피 안쪽으로는 들어가지 않는데, 이것은 일반 병원균이 뿌리 한 가운데의 통도조직까지 침입하는 것과 차이가 있는 점이다. 관련되는 곰팡이는 접합자균에 속하는 균이며 가장 일반적인 것이 Glomus, scutellospora이고, 외생균근을 형성하는 일부 수종을 제외한 모든 목본식물과 초본류이다.

No.1350 · 산림청 원문

내생변수 內生變數 · endogenous variable
어떤 경제현상을 설명하는 모형을 구성하는 변수중 모형내부에서 결정되는 변수. 모형 외부에서 결정되는 외생변수에 대응하는 말이다.

No.1351 · 산림청 원문

내생포자 內生胞子 · endospore
포자낭 안에 형성되는 포자의 총칭. 외생포자와 대비된다.

No.1352 · 산림청 원문

내성 耐性 · tolerance
죽거나 심한 피해 또는 작물의 손실 없이 병해의 영향을 견디는 식물체의 능력, 또한 식용가능한 식물체 부위의 법률로 정해진 독성물질의 잔류허용량.

No.1353 · 산림청 원문

내셔널트러스트운동 國民信託運動 · National Trust Movement
시민들의 자발적인 헌금과 자산기부를 통해 보존가치가 있는 자연 및 문화자산을 확보한 후 이를 시민의 주도하에 영구히 보전하고 관리하는 새로운 시민환경운동이다. 내셔널 트러스트 운동은 1895년 영국에서 시작되었으며 무분별한 개발로부터 귀중한 자연자원이나 역사적 환경을 시민의 단결된 힘으로 지켜왔다. 시민들의 자발적인 기증이나 모금을 통해, 보존가치가 높은 자연 및 문화유산지역의 토지나 시설을 인수 또는 신탁받아, 이를 영구보존하는 운동이다. 현재 영국토지의 1.5%, 해안지역의 17%나 소유하고 있으며, 회원이 250만명, 연간 예산이 3천억원 이상이다. 미국, 일본, 뉴질랜드 등 24개 선진국에도 도입된 세계적인 운동으로 자리잡아가고 있다. 우리나라에서도 무등산 공유화 운동, 태백산 변전소 땅 한평 사기 운동 등 내셔널트러스트 성격의 시민운동들이 진행되고 있다. (www.ntrust.or.kr). ⇒ 자연신탁국민운동.

No.1354 · 산림청 원문

내수면 內水面 · inland water
주로 하천, 호소와 저수지로 점유된 면적을 말한다.

No.1355 · 산림청 원문

내시류 內翅類 · Endopterygota
충기간 중에 날개가 외부에 나타나지 않는 곤충의 총칭, 완전변태류가 해당되며, 풀잠자리목, 딱정벌레목, 부채벌레목, 밑들이목, 날도래목, 나비목, 파리목, 벼룩목, 벌목 등이다.

No.1356 · 산림청 원문

내심벽 內心壁 · corewall
흙으로 쌓아 만드는 사방댐의 경우 댐의 중앙부에 내심벽을 새워 침윤선을 낮추어 사방댐 본체가 세굴되는 것을 막는다.

No.1357 · 산림청 원문

내업 內業 · office work
외업의 결과를 갖고 실내에서 하는 작업으로 일반적으로 실내에서 하는 측량작업의 총칭이다. 야장에 기록된 내용의 계산, 오차의 검사와 제도, 도화 등이 포함된다.

No.1358 · 산림청 원문

내염성 耐鹽性 · salt tolerance
내염성은 식물이 염분이 높은 환경에서 생육 또는 생존할 수 있는 능력이다. 내염성은 크게 염회피성 내염성과 진성내염성으로 나눌 수 있다. 염회피성 내염성 식물은 1) 체내염을 수동적으로 배출하거나, 2) 능동적으로 배출하거나, 3)체내로 유입되는 염분의 농도를 희석시킴으로서 체내염분 농도를 낮게 하여 염해를 피한다. 진성내염성 식물들은 고농도의 체내염분을 축적한 상태에서 생장 또는 생존 할 수 있는 능력인데 이온축적 또는 유기산축적으로 삼투압을 조절하거나 양분결핍내성이나 독성내성 또는 세포막강화의 방법으로 진성내성을 발달시킨다. 진성내염성 식물들은 체내 염분을 능동적으로 배출시킬 수 있는 염회피능력도 동시에 갖고 있을 수 있다.

No.1359 · 산림청 원문

내외생균근 內外生菌根 · ecto-endomycorrhiza
외생균근의 변칙적인 형태이며, 외생균근 곰팡이의 균사가 세포 안에 침투하여 자라는 형태를 뜻하고 소나무류의 어린 묘목에서 주로 발견된다. 외부형태는 외생균근과 유사하다.

No.1360 · 산림청 원문

내용년수 耐用年數 · useful life
유형고정자산의 경제적인 사용가능 연수이다.

No.1361 · 산림청 원문

내음성 耐陰性 · shade tolerance
식물이 광도가 낮은 조건(피음조건)에서 생육할 수 있는 능력이다. 내음성이 강한 수종은 상층임분이 우거진 임상에서 살 수 있다. 내음성 수종을 음수라고 하는데 음수의 유묘는 성숙한 모수림 임상에서 자랄 수 있으므로 동일수종으로 갱신이 가능하여 급격한 산림교란이 없을 경우 극성상림을 이룬다. 이와 반대로 양수는 양수림 임상에서 갱신이 되지 않으므로 음수수종이 침입하여 자라면 결국 음수림으로 식생천이가 이루어진다. 음수와 양수 모두 유묘의 내음성이 크다. 내음성의 광합성과 호흡의 원리는 광보상점(광합성량과 호흡량이 같아 순광합성량이 0인 광도)이 낮고, 호흡량이 적고 빛에 대한 기공의 개폐반응이 빨라서 짧은 시간의 빛(편광)을 이용할 수 있고, 광합성물질 분배가 그늘조건에서 견디기에 유리하게 이루어지고 있기 때문이다. 음수의 광포화점(광도가 증가되어도 순광

합성량이 증가하지 않는 광도)은 양수보다 낮아, 광도가 높은 조건에서는 음수가 양수보다 생장율이 낮다. 참조: 양수, 음수.

No.1362 · 산림청 원문

내음성식물 耐陰性 植物 · shade tolerant plant
그늘에서 견디는 능력이 큰 식물. 광보상점이 낮고 짧은 시간동안 광도가 높은 빛에 대하여 기공의 열개반응이 빠르다. 수목으로서 전나무, 솔송나무, 너도밤나무, 사탕단풍나무, 초본류로는 맥문동이 있다.

No.1363 · 산림청 원문

내적휴면성 內的休眠性 · internal dormancy
종자가 적절한 발아조건임에도 발아하지 않는 것이 종자내부에 그 원인이 있는 경우. 내적휴면성은 배의 미숙이라든가 종자내부에 발아억제물질을 다량 함유하고 있는 등으로 알려져 있다.

No.1364 · 산림청 원문

내절강도 耐折强度 · folding endurance
시험편을 일정한 장력하에 접거나 접어 굽히는 경우 종이가 저항하는 극한 강도.

No.1365 · 산림청 원문

내충성 耐蟲性 · insect resistance
숙주의 해충에 견디는 능력. 대부분의 식물은 한 두 종의 해충에 대해서 만을 제외하고는 대부분 다른 곤충들에 대해서는 저항성을 보인다. 이러한 숙주식물의 내충성이 해충을 널리 퍼뜨리는 것을 막아왔다고 할 수 있다. 솔잎혹파리, 밤나무 혹벌 등에서 발견되는 것처럼 외래종의 곤충이 특정 식물을 몰살시키는 예는 같은 향토식물들이 자생지의 해충에는 잘 적응해왔음을 나타낸다. 유전적으로 식물이 특정 해충에 대해서 저항성을 나타내는 이유는 어느 정도는 알려져 있다. 가장 잘 알려져 있는 것으로 렉틴(lectin), 단백질 분해효소 억제제(proteinase inhibitor) 등 식물의 상처 반응 물질을 들 수 있는데 이 물질들은 해충의 소화를 방해하여 고사시키기도 한다.

No.1366 · 산림청 원문

내풍성 耐風性 · wind resistance
수목이 강한 바람에 견디며 생장할 수 있는 능력이다. 수목은 크기가 크기 때문에 강한 바람(태풍, 해풍)에 의하여 풍도, 풍절, 고사 등의 피해를 입는다. 심근성뿌리, 작은 수관, 짧고 굵은 가지, 작은 잎 등은 내풍성 형질이다. 우리나라 고산지에서 나타나는 수목한계선은 주로 바람의 피해에 의한 것이다. 고산지의 눈잣나무는 풍충지에서 누워 자람으로서 풍해를 최소화한다. 눈잣나무는 땅에 접촉한 가지에서 새로운 뿌리를 내며 무성번식하기도 한다. 해안지방에 자라는 해송은 심근성 뿌리를 갖고 있는데 해풍에 견딜 수 있는 내풍성과 내염성이 있는 수종이다.

No.1367 · 산림청 원문

내피 內皮 · endodermis
고등식물에서 피층조직의 가장 안쪽에 있는 피층세포층이다. 뿌리에는 뚜렷한 내피조직이 발달한다. 뿌리에는 내피세포와 내피세포 사이 중앙부에 목질화 및 코르크화 된 띠 모양의 카스파리안대가 발달하여 세포 밖 공간(세포간극)으로 수분 또는 양분의 측면 이동이 불가능하다. 뿌리에서 수분이나 무기양분이 내피 조직층을 통과하려면 반드시 내피세포의 세포질을 지나야 한다. 양치류에서는

줄기, 뿌리, 잎에서 보통 내피세포가 관찰된다. 종자식물의 줄기나 잎에는 뿌리와 달리 내피세포가 드물다. 소나무 잎의 유관속과 전이조직은 내피조직으로 둘러싸여 있다.

No.1368 · 산림청 원문

내한성 耐寒性 · cold resistance
식물이 추위에 견디며 생존할 수 있는 능력으로서 0℃ 이상의 온도에서 일어나는 피해(냉해)에 대한 내성을 내냉성(耐冷性, chilling resistance), 0℃ 이하의 온도에서 주로 세포내 동결과 관련되어 일어나는 피해에 대한 내성을 내동성(耐凍性, freezing resistance)이라고 한다. 열대식물에서는 내냉성이 문제가 되고, 온대 및 한대식물에서는 내동성이 문제가 된다. 저온상태에서 일어나는 물질대사 과정의 장애나 세포막의 기능장애, 엽록체와 미토콘드리아 기능장애를 극복하기 위하여 내냉성 식물들은 불포화지방산 증가와 산화방지와 가용성 단백질 생성을 통해 냉해를 예방한다. 겨울동안에 -196℃에서 생존할 만큼 내한성이 강한 식물(예: 버드나무)도 여름 생장기 동안에는 내한성이 발달되지 않아 -5~0℃의 온도에서 동해를 입는다. 내한성의 발달은 생장기가 끝난 후 단일조건과 저온(2단계, 3단계)에 의하여 점진적으로 유발된다. 내한성을 유발하는 과정에서 지질 및 단백질의 대사, 아미노산 및 당류대사가 변화하여 결과적으로 세포막의 구성성분, 효소, 단백질, 당류가 변화한다. 내동성의 원리는 크게 동결회피형 내한성과 진성내동성(세포의 동결내성)으로 나뉜다. 동결회피형 내동성의 원리는 크게 둘로 나뉜다. 세포의 삼투압 증가에 의한 빙점강하 또는 세포벽과 세포막의 결빙방지에 의한 저온과 냉각(deep supercooling)으로 저온상태에 세포가 세포내 물을 액체상태를 유지하여 살아남는다. 온대활엽수에서 한겨울에 내동성이 가장 약한 부위는 재부유조직인데 저온과 냉각원리로 영하 40~47℃까지 견딘다. 진성내동성의 원리는 세포외 결빙에 의하여 세포내 수분이 모두 탈수되어 세포내 결빙이 일어나지 않고 탈수된 세포질은 내건성이 발달되어 있어서 -196℃의 저온상태에서도 살아남는다. 세포질은 해빙과 더불어 다시 수분을 흡수하고 대사활동은 시작된다. 온대활엽수의 수피, 동아, 온대활엽수 중 내동성이 아주 강한 버드나무, 흰말채나무의 재부유조직과 그 외 조직, 침엽수의 침엽, 수피, 동아, 재부유조직은 진성내동성의 원리로 -196~-50℃ 저온에서 살아남는다. 식물의 내한성은 많은 경우 식물의 분포지를 제한한다. 자생지의 식물은 대부분 오랫동안 극심한 이상저온을 적응해 왔기 때문에 동해가 적지만 자생지를 옮겼을 경우 동해가 많다. 계절에 따라 내한성이 단계적으로 발달하기 때문에 제1단계 내한성 발달을 유발하는 광주기조건(단일조건)이 자생지와 일치하지 않는 경우 내한성 발달이 늦어져 동해를 받을 수 있다.

No.1369 · 산림청 원문

내화성 耐火性 · fire resistance
나무가 여러 가지 특성으로 인하여 불에 강한 성질을 지니는 것을 말하며 수목의 내화력은 잎 및 수피의 두께 · 성분 · 조직 등 여러 인자가 관계된다.

No.1370 · 산림청 원문

내화수 耐火樹 · fire resistance tree
불에 잘 타지 않고 견디는 나무를 말하며 아왜나무, 동백나무, 졸참나무, 황벽나무 등을 말한다.

No.1371 · 산림청 원문

내화점토 耐火粘土 · fire clay
알루미늄과 규소 등을 주성분으로 하여 고온에서 견디는 점토.

No.1372 · 산림청 원문

냄새비늘 - · androconium
발향린.

No.1373 · 산림청 원문

냉섬 冷島 · cool island
도시지역이 일사에너지를 저장하여 다른지역에 비해 더 뜨거운 반면, 도시내에 있는 녹지, 도시숲 등은 개발지역에 비해 시원한 대기를 유지하여 인근의 도시열섬현상을 완화시켜 주는 기능을 수행하게 됨. 이때 도시지역에서 다른지역보다 시원하게 유지되는 녹지 및 도시숲을 냉섬이라고 함.

No.1374 · 산림청 원문

냉해 冷害 · cold weather damage
열대 또는 난대식물이 0℃이상의 저온에 의하여 받는 피해로서 0℃ 이상의 세포동결에 의하여 나타나는 동해(凍害)와 구별된다. 저온저장과일(예: 바나나, 레몬)이나 야채(예: 오이)에서 표면상해가 일어나 2차적으로 병해충의 피해를 받는다. 벼에서는 영양생장 및 생식생장(화분발육, 수정)이 저해를 받는다. 냉해의 원리는 저온조건에서 세포막의 투과성 저하로 인한 용질유출, 기능저하, 마이토콘드리아나 엽록체의 기능저하로 인한 호흡장애 및 영양결핍, 독성물질생성, 단백질의 분해, 생화학적 붕괴(ATP 감소 등) 등 1차적 피해가 일어나며 2차적으로는 수분스트레스 및 산소결핍 등의 피해가 일어난다. 식물의 내냉성은 지방산의 불포화도 증가와 산화방지, 가용성 단백질의 증가를 통해 저온에서 세포막의 기능을 원활하게 하는 것이다.

No.1375 · 산림청 원문

넌센스돌연변이 - · nonsense mutation
대응할 수 있는 아미노산이 없는 코돈으로의 돌연변이. 보통 폴리펩타이드의 합성이 중단되며 단백질의 특성도 변하게 된다. UAG, UAA, UAA의 세 종류가 있다.

No.1376 · 산림청 원문

넓적다리마디 腿節 · femur
퇴절. 곤충류의 넓적다리마디를 일컫는다.

No.1377 · 산림청 원문

넓적다발심기 平把植 · flat-bundle planting
묶은 모양을 편평하게 하여 모래땅에 사초를 심는 사방공종.

No.1378 · 산림청 원문

네거티브방식 否定的方式 · negative listings
GATS의 서비스교역에서 시장접근과 내국민대우가 일반적의무가 아닌 양허협상대상이다. 따라서 각 국의 양허표에 등재하는 서비스는 분야의 선정은 포지티브방식과 네거티브 방식이 있다. 네거티브 방식이란 양허표에 등재하는 분야에 있어서 모든 제한조치가 기재되어야 하며 기재된 사항 이외의 새로운 조치나 기재된 조치의 강화는 할 수 없도록 구속하는 것이다. 즉 GATT에 있어서 양허한 세율이상의 관세를 부과할 수 없는 것과 마찬가지이다.

No.1379 · 산림청 원문

노견 路肩 · road shoulder
길어깨 또는 갓길.

No.1380 · 산림청 원문

노균병 露菌病 · downy mildew
조균의 일종에 의한 것으로 본엽이 5~6매 쯤 나올 때에 아래잎부터 발병하여 처음에닌 잎이 누렇고 작은 반점이 생겨 이것이 차차 커져서 가장자리는 잎맥에 포위되어 다각형으로 되는 병.

No.1381 · 산림청 원문

노던블랏 - · Northern blot
한 유전체 안에서 특정 RNA 염기서열이 만들어지는지 그리고 그 크기가 어느 정도인지 탐색하는 기술. RNA를 생물체에서 분리한 후 이를 agarose gel에서 전기영동하고 이 RNA 조각을 filter paper 등으로 옮겨서 고정시킨 후 방사성 동위원소 등의 표지가 부착된 탐침 (probe)으로 혼성화시켜 문제의 염기서열이 있는 RNA를 탐지하는 방법. DNA를 탐지하는 Southern을 빗대서 농담으로 Northern이라는 별명이 실명으로 고정된 경우이다.

No.1382 · 산림청 원문

노동과학 勞動科學 · science of labor
인간의 노동이 최적의 상태에서 이루어질 수 있도록 노동과 관련된 여러 조건에 대해 연구하는 학문으로서 노동능력을 제한하는 신체적 조건, 노동 환경 등의 각 조건을 생리 · 심리 · 위생 등의 관점에서 연구하는 학문분야로서 인간공학 연구분야의 일부분을 구성한다.

No.1383 · 산림청 원문

노동력 勞動力 · labor power
토지, 자본과 함께 3대 생산요소의 하나. 생산을 목적으로 보수를 기대하면서 행하여지고 인간의 육체적, 정신적 활동을 말한다.

No.1384 · 산림청 원문

노동력부족 勞動力不足 · labor shortage
생산에 있어 토지, 자본에 비하여 상대적으로 노동력이 부족한 상태이다.

No.1385 · 산림청 원문

노동생산성 勞動生産性 · labor productivity
1) 노동생산성은 노동투하 단위시간당 창출한 부가가치액으로서(임업부가가치액/임업노동투하시간)으로 구할 수 있다. 자본생산성은 생산을 위해 투자한 자본액 1단위당 산출되는 부가가치액으로서(임업부가가치액/임업자본액)으로 구할 수 있다. 여기에서 임업자본액은 고정자본액을 의미하며, 기계와 건물 등의 감가상각비가 여기에 해당된다. 토지생산성은 일정한 토지면적당 산출되는 부가가치액으로서(임업부가가치액/토지면적)으로 구할 수 있다. 2) 노동의 능률을 뜻하며 노동결과 산출한 생산량과 생산에 투입된 노동량과의 비로 표시할 수 있다. 노동량은 생산에 투하된 총 노동시간으로 측정하고 생산량은 중량, 재적, 면적, 본수, 길이 등으로 표시하며 시간의 단위는 시간, 일, 월, 년 등이다.

No.1386 · 산림청 원문

노동안전 勞動安全 · industrial safety
노동중 발생하는 사고의 결과인 산업재해로부터 생명과 재산상의 손실로부터 보호하는 것을 산업안전이라고 한다.

No.1387 · 산림청 원문

노동재해 勞動災害 · industrial accident
근로자가 업무에 관계된 건설물, 설비, 원자재, 가스, 증기, 소음, 분진 등에 의하여 작업 또는 기타 업무에 기인하여 사망 또는 부상, 질병이환 등을 노동재해라고 한다. 노동재해는 다시 재해통계적 기준에 의하여 사망, 중상, 경상으로 구분한다. 또한 상해정도별로 사망, 영구 전노동 불가능, 영구 일부 노동불가능, 일시 전노동 불가능 등으로 나뉘며 우리나라의 경우 이러한구분은 신체장애등급에 의하여 분류된다.

No.1388 · 산림청 원문

노령림 老齡林 · over-matured forest
벌기에 달해 입목의 평균재적, 성장량이 떨어지는 산림. 보통성장이 빠른 수종에서는 50년까지를 장령림, 그 이상을 노령림이라고 하나 성장이 느린 수종에 있어서는 80년까지를 장령림, 그 이상을 노령림으로 분류하기도 한다.

No.1389 · 산림청 원문

노면 路面 · road surface
차량의 하중을 직접 받는 도로의 표면부분으로 임도의 노면은 주로 노상 위에 있는 토질계의 노반이 표층의 역할을 한다. 임도의 경우 일반적으로 자갈길(사리도) 또는 쇄석도로 시공한다. 임도시설규정에서는 시공시에 노면정지가 완료된 후 일반적으로 진동롤러(자체중량 6ton 이상)로 4회 이상 진압하도록 규정하고 있다. 또, 차도의 노면은 고속도로와 포장도로와의 연결진입구간 및 기타 특별한 입지조건을 제외하고는 원칙적으로 자갈을 깐다고 규정하고 있다.

No.1390 · 산림청 원문

노무비 勞務費 · labor cost
인건비.

No.1391 · 산림청 원문

노반 路盤 · roadbed
도로의 기층과 노상의 중간에 위치한 층이다. 참조: 노체.

No.1392 · 산림청 원문

노상 路床 · subgrade
도로의 최하층에 위치한 본체로서 포장층에서 아래로 대략 1m의 두께를 말한다. 노상은 다른 층에 비하여 작은 응력(應力)밖에 받지 않으므로 노상재료로써 특별히 부적당한 재료가 아니면 현장 재료를 이용한다.

No.1393 · 산림청 원문

노숙림 老熟林 · old growth forest
인위적인 교란을 받은 적이 없는 극상림을 의미한다. 그러나 몇가지 조건이 일반 극상림과 다르다. Thomas 등(1988)은 ① 종조성, ② 살아 있는 나무, 선 채로 죽은 나무, 죽어서 넘어져 있는 나무의 크기와 밀도, ③ 최소 면적이 중요하다고 하였다. Hunter(1990)에 의하면 노숙림이 될 기준을 숲의 나이와 숲이 받았던 교란으로 나누어서 제시하였다. 먼저 숲의 나이는 ① 종조성이 비교적 안정된 상태로 될 만한 세월을 지나왔고, ② 평균연년순생장(average net annual growth)이 거의 없

을 정도의 나이에 도달하였는가, ③ 천이가 진행될 만큼 심각한 자연교란의 주기보다 훨씬 더 오래 되었는가, ④ 우세목이 그 수종이나 그 입지에서 기대되는 평균수명에 도달하였는가, ⑤ 숲의 현재의 연년생장율(current annual growth rate)이 그 숲의 생존기간의 평균연년생장율(the life time average annual growth rate)아래로 떨어지고 있는가, 그리고 교란 기준으로는 ① 벌채된 적이 없는가, ② 사람들이 다른 용도로 사용한 적이 없는가를 들었다. 이렇게 노숙림에 대한 논란이 많은 것은 생물다양성을 보전하는데 경영림에서는 볼 수 없는 기능을 발휘하기 때문이다. 특히 인간을 멀리하는 종이나, 서식조건이 까다로운 올빼미류의 보전에 대해서 지구적인 논란이 일고 있다. 그러나 우리가 모르는 매우 많은 종에게 긴요한 서식처로 보인다.

No.1394 · 산림청 원문

노임 勞賃 · wages
노동에 대한 보수.

No.1395 · 산림청 원문

노천매장법 露天埋藏法 · stratification
1) 임업연구원에서 개발된 잣나무 종자의 저장을 겸한 발아촉진법이다. 흔히 다른 수목종자의 발아촉진법으로 이용된다. 2) 종자를 하루동안 맑은 물에 담궜다가 종자의 1~3배 가량의 젖은 모래와 혼합하여 땅속에 묻어두는 방법이다. 묻는 방법은 두께 2~3cm의 판자로 깊이 30~40cm의 상자를 만들고 상자의 상하는 철망을 붙여 설치류의 피해를 예방하도록 한다.

No.1396 · 산림청 원문

노체 路體 · road body
도로의 전체 층을 통틀어 부르는 말로 노상, 노면, 기층, 표층으로 구성되어 있는 것이 일반적이고, 각 층을 다시 세분하는 경우도 있다.

No.1397 · 산림청 원문

노취 鋸齒形 · notch
바닷가 절벽에 오랜 시간 바닷물이 스며들어 깊고 좁게 형성된 침식지형.

No.1398 · 산림청 원문

노형 老形 · senile form
나무가 성숙한 후에 나타나는 노숙형 또는 성숙형 형태. 유묘기의 유형(幼形), 즉 유성(幼性) 또는 유묘성(幼苗性) 형태와 대비된다. 은행나무, 잎갈나무, 사과나무, 배나무 등의 단지(短枝)는 성숙한 나무에서 나타나는 가지와 눈의 노형이다.

No.1399 · 산림청 원문

노화 老化 · aging, senile change
노화의 원인과 과정은 대상 생물, 조직, 기관의 수준에 따라 다르게 해석된다. 1) 잎의 단풍이 드는 노화과정은 유전자의 정보발현에 의하여 나타나는 현상이다. 잎의 노화는 cytokinin처리에 의하여 어느 정도 지연될 수 있다. 잎에 cytokinin이 처리된 부분의 조직은 주위에서 영양분을 끌어들일 수 있어 노화가 예방된다. 또한 cytokinin은 액포막의 기능을 활성화하여 액포 내 단백질 분해효소가 세포질로 들어와 엽록체와 미토콘드리아의 단백질과 지방산을 가수분해하는 것을 막아준다. 2) 과실의 성숙은 식물호르몬 ethylene에 의하여 촉진되고 저장조건에서는 CO2에 의하여 지연된다. 3) 수목의 수명은 수종에 따라 아주 다르다. 수목의 노화의 원인으로서 생식생장이 크게 영향한다. 일년

생식물에서 꽃이나 열매를 제거함으로서 노화가 지연된다. 대나무가 꽃을 피우고 난 후에 죽는 현상도 노화에 미치는 개화의 효과를 보여주는 좋은 예이다. 수목에 있어서도 영양기관으로 갈 영양분, 물, 무기양분, 호르몬 등이 생식기관으로 이동함으로서 영양기관의 노화가 촉진된다. 수목의 수명이 증가함에 따라 수관의 크기에 비하여 수간의 체적이 커지고 비광합성 표면적에 대한 광합성 표면적도 점차 감소하면서 호흡양분에 비하여 생성되는 광합성 양분의 비율도 점차 낮아지고 새로이 형성되는 목부조직이 점차 얇아진다. 수목이 크게 자람으로서 줄기와 뿌리 사이의 양분이동 거리가 증가하거나 눈의 수와 가지가 많아짐으로서 생겨나는 조직간의 양분경쟁도 노화와 관련이 있다. 노화가 진행되고 있는 나무는 병균의 침입이 용이하고 병해는 노화를 촉진한다. 심재부후균에 강한 성질은 수명이 긴 나무의 특징 중의 하나이다. 노화로 수세가 약화된 나무가지를 어린 묘목에 접목하면 수세가 회복되는 것은 노화증상이 분열조직의 노화로 인한 것이라기보다는 불충분한 영양에 의한 것이라는 것을 보여주는 예이다.

No.1400 · 산림청 원문

녹는 점 融點 · melting point
약호(略號) mp. 압력 1atm 하에서의 녹는점을 그 물질의 녹는점이라고 한다.

No.1401 · 산림청 원문

녹병 銹病 · rust
담자균류 녹병균목에 속하는 곰팡이에 의하여 식물의 잎이나 줄기에 오렌지색이나 적갈색 얼룩이 나타나는 병.

No.1402 · 산림청 원문

녹병정자 銹病精子 · spermatia
녹병정자기내에 형성되는 포자이다.

No.1403 · 산림청 원문

녹병정자기 銹病精子器 · spermagonium
일부 담자균류에서 정자와 수정균사를 지닌 포자형성체이다.

No.1404 · 산림청 원문

녹병포자 銹病胞子 · pycniospore
녹병정자 (spermatia).

No.1405 · 산림청 원문

녹병포자기 銹病胞子器 · pycnium
녹병정자기 (spermagonium).

No.1406 · 산림청 원문

녹비 綠肥 · green manure
순수한 유기물만을 이용한 비료로, 토양 개량을 위하여 녹색인 상태로 토양에 공급하는 식물 유기물을 가리킨다. 자운영, 클로버류, 알팔파 등의 콩과식물과 옥수수, 메밀 등의 비콩과식물, 야생활엽수의 잎, 해초 등의 생체 또는 건조물을 사용할 수 있다.

No.1407 · 산림청 원문

녹색건축 綠色建築 · green building
사람들에게 건강하고 쾌적하며 안전한 거주와 활동공간, 사업공간을 제공하는 동시에 에너지의 고효율적인 이용을 실현하고 환경에 가장 작은 한도의 영향을 미치는 건축물을 말한다.

No.1408 · 산림청 원문

녹색경영 綠色經營 · green management
기업이 경영활동에서 자원과 에너지를 절약하고 효율적으로 이용하며 온실가스 배출 및 환경오염의 발생을 최소화하면서 사회적, 윤리적 책임을 다하는 경영을 말한다.

No.1409 · 산림청 원문

녹색관광 綠色觀光 · Green tourism
농촌의 자연과 문화를 즐기는 관광으로, 농가시설을 제공하고 지역 특산물을 개발하며 농가체험 등의 프로그램을 시행함으로써 농업외 소득을 증대시키는 농촌관광의 한 형태.

No.1410 · 산림청 원문

녹색기술 綠色技術 · green technology
온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회 · 경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다.

No.1411 · 산림청 원문

녹색복권 綠色福券 · Green Lottery
산림환경기능 증진을 위한 재원조성을 위하여 복권을 발행, 그 수익금으로 녹색자금을 조성하는 한편, 산림의 환경기능에 무임승차하려는 일반국민들에게 복권판매를 통하여 산림사업에 투자참여를 유도하려는데 목적을 두고 있다(산림법 106조). 이를 위해 복권발행을 위한 법률안인 산림법 중 개정법률안이 1998년 12월 통과됨에 따라 상당기간 복권발행 준비를 거쳐 1999년 9월 복권발매에 들어갔다. 녹색자금의 용도(산림법 107조)는 ① 맑은 물 공급을 위한 산림환경 개선사업 지원, ② 공해방지를 위한 생활환경림 조성사업 지원, ③ 산림내 야생동식물 및 생태계 보호사업 지원, ④ 기타 산림의 환경기능증진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업 등이다. 이 사업을 위하여 정부는 보조 · 융자 또는 투자도 할 수 있도록 하고 있다. 복권발행은 산림조합중앙회에서 종류 · 조건 · 금액 및 방법을 정하여 산림청장의 승인을 받아 발행토록 하고 있다(산림법 106조).

No.1412 · 산림청 원문

녹색산업 綠色産業 · green industry
경제 · 금융 · 건설 · 교통물류 · 농림수산 · 관광 등 경제활동 전반에 걸쳐 에너지와 자원의 효율을 높이고 환경을 개선할 수 있는 재화(財貨)의 생산 및 서비스의 제공 등을 통하여 저탄소 녹색성장을 이루기 위한 모든 산업을 말한다.

No.1413 · 산림청 원문

녹색생활 綠色生活 · green life
기후변화의 심각성을 인식하고 일상생활에서 에너지를 절약하여 온실가스와 오염물질의 발생을 최소화하는 생활을 말한다.

No.1414 · 산림청 원문

녹색성장 綠色成長 · green growth
에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 기후변화와 환경훼손을 줄이고 청정에너지와 녹색기술의 연구개발을 통하여 새로운 성장동력을 확보하며 새로운 일자리를 창출해 나가는 등 경제와 환경이 조화를 이루는 성장을 말한다.

No.1415 · 산림청 원문

녹색성장위원회 綠色成長委員會 · Presidential Committee on Green growth
국가의 저탄소 녹색성장과 관련된 주요 정책 및 계획과 그 이행에 관한 사항을 심의하기 위하여 대통령 소속으로 녹색성장위원회를 둔다. 위원회는 위원장 2명을 포함한 50명 이내의 위원으로 구성한다. 위원회의 위원장은 국무총리와 위원 중에서 대통령이 지명하는 사람이 된다. 위원회의 위원은 기획재정부장관, 교육과학기술부장관, 지식경제부장관, 환경부장관, 국토해양부장관 등 대통령령으로 정하는 공무원이고, 기후변화, 에너지 · 자원, 녹색기술 · 녹색산업, 지속가능발전 분야 등 저탄소 녹색성장에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 대통령이 위촉하는 사람으로 구성한다. 위원회는 저탄소 녹색성장 정책의 기본방향, 녹색성장국가전략의 수립 · 변경 · 시행, 기후변화대응 기본계획, 에너지기본계획 및 지속가능발전 기본계획, 저탄소 녹색성장 추진의 목표 관리, 점검, 실태조사 및 평가, 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체의 저탄소 녹색성장과 관련된 정책 조정 및 지원, 저탄소 녹색성장과 관련된 법제도, 저탄소 녹색성장을 위한 재원의 배분방향 및 효율적 사용, 저탄소 녹색성장과 관련된 국제협상 · 국제협력, 교육 · 홍보, 인력양성 및 기반구축, 저탄소 녹색성장과 관련된 기업 등의 고충조사, 처리, 시정권고 또는 의견표명 등을 심의한다.

No.1416 · 산림청 원문

녹색제품 綠色製品 · green prodcuts
에너지 · 자원의 투입과 온실가스 및 오염물질의 발생을 최소화하는 제품을 말한다.

No.1417 · 산림청 원문

녹색콩풍뎅이 - · 學 Popillia quadriguttata
퉁뎅이과이다. 한국, 일본, 중국, 대만, 베트남지역에 분포하며 콩과식물, 과수류 등의 활엽수에 피해를 준다. 성충은 콩과식물이나 과수류의 잎을 가해하고 유층은 묘목과 잔디 뿌리를 식해한다. 왜콩풍뎅이.

No.1418 · 산림청 원문

녹색혁명 綠色革命 · green revolution
개발도상국의 식량생산력의 급속한 증대 또는 이를 위한 농업상의 여러 개혁을 일컫는 말로서 개발도상국의 경제발전에 있어서의 첫째 문제는 식량생산력의 발전에 의한 식량자급이었다. 개발도상국은 제2차 세계대전 후 인구의 폭발적인 증가로 심각한 식량문제에 봉착하였고, 이는 경제발전과 공업화에 최대의 장애가 되었다. 그런데 1960년대 후반에 이르러 같은 면적에서 재래종의 배 이상을 수확할 수 있는 쌀과 밀의 신품종이 필리핀과 멕시코에서 개발되었고, 이의 보급으로 아시아 여러 나라에서는 비약적인 농업증산을 가져와 식량자급을 달성하게 되었다. 이 신품종에 의한 개발도상국의 급속한 식량증산을 '녹색혁명'이라 부르게 되었다. 이 신품종의 보급에는 수리시설 · 화학비료 · 농약투하 등이 뒤따라야 하는 어려움이 있었으나 녹색혁명은 지속적인 발전을 하였다. 한국에서는 자원민족주의와 더불어 대두한 '식량무기화'의 새로운 물결 속에서 식량자급의 숙원달성을 위하여 마닐라시(市)교외에 본부를 둔 국제벼연구소(IRRI)에서 개발한 '기적의 볍씨(miracle rice) IR 8'을 들여와 연구를 거듭한 결과, 한국 실정에 맞는 통일벼 계통의 신품종 육성에 성공, 1974년이래

이의 보급에 주력함으로써 미곡증산에 다대한 실적을 올렸다. 그러나 미질(米質)이 좋지 않고 밥맛이 나빠서 1980년도 장려품종에서 탈락하여 근래에는 거의 심지 않고 있다.

No.1419 · 산림청 원문

녹지 綠地 · green area
각종 공원 · 광장 · 묘지 · 운동장 · 호소(湖沼) · 하천 · 해변 등이 있으며, 이에 준하는 것으로서 학교운동장 · 사원경내 · 주택단지내의 유원지 등이 있다. 녹지는 기능에 따라 각종 공해와 자연재해 등을 방지하기 위하여 설치하는 완충(緩衝)녹지와 자연환경을 보전하고 개선하여 도시경관을 향상시키기 위하여 설치하는 경관녹지로 구분한다. 공공녹지의 설치목적과 효과는 자연보호 · 화재방지 · 공해방지 · 환경과 경관의 향상 등 사회적 · 교육적인 복지면에서의 효과와, 위락지로서 시민의 정서를 함양하고, 경관을 향상시키는 동시에 경제상의 이익 등을 도모하는 데 있다. 더욱이 복잡한 현대 도시사회에서 도시의 기능 및 환경개선을 위한 공공녹지의 중요성은 크게 강조되고 있다.

No.1420 · 산림청 원문

녹지대 綠地帶 · green belt
녹지는 도시의 자연환경을 보전하거나 개선하고, 공해나 재해를 방지하여 양호한 도시경관의 향상을 도모하기 위하여 도시계획법 제12조(도시계획의 결정)의 규정에 의하여 결정된 것을 말한다. 녹지의 입안, 설치 및 관리는 관할시장이나 군수가 하며 결정권자는 시 · 도지사이다. 특정원인에 의해 설치될 경우에는 원인자 부담으로 전부 또는 일부를 설치하도록 되어 있다. 녹지의 종류는 경관녹지와 완충녹지가 있다. 경관녹지는 도시의 자연적 환경을 보전하거나 이를 개선함으로써 도시경관을 향상하기 위하여 설치하는 녹지를 말한다. 완충녹지는 수질오염 · 대기 오염 · 소음 · 진동 등 공해의 발생원이 되는 곳 또는 가스폭발, 유출 등 재해가 생겨날 우려가 있는 지역과 주거지역이나 상업지역 등을 분리시킬 목적으로 두 지역사이에 설치하는 녹지대를 말한다. 서로 기능상의 마찰을 일으킬 수 있는 지역사이에 설치된다. 즉 도로나 철도 주변 주거지대 등, 상호 토지 이용의 혼란방지 등의 공공 재해를 줄이고 푸른 녹지 보전을 목적으로 하는 녹지를 말한다. 녹지의 규모는 너비 100m 이상이 바람직한데, 그 이상의 대규모 완충지대일 경우 그 안에 공원, 운동장 등의 공공시설을 설치하여 혼합용도로 이용하기도 한다. 자연환경보전법상의 완충지역은 자연생태계 보전지역에 연속되는 보전지역 밖에 일정한 지역으로써 당해지역 밖의 자연환경에 대한 자연적 파괴와 훼손이 해당 보전지역에 미치는 환경상의 영향을 완화시키거나 같은 지역에 서식하는 생물의 이동 및 보전에 대비한 예비공간이다.

No.1421 · 산림청 원문

녹지삽목 綠枝揷木 · greenwood cuttings
일부 삽목으로 증식이 어려운 목본 식물들의 경우 조직의 경화가 덜 된 어린 가지를 이용할 경우 뿌리가 잘 발생하는 성질을 이용한 삽목방법. 녹지삽목은 수경삽목으로 할 수도 있다. ⇒ 풋가지꽂이.

No.1422 · 산림청 원문

녹지자연도 綠地自然度 · degree of green natuality
일정한 토지의 자연성을 나타낸 지표로서 식물의 식생과 토지이용현황에 따른 녹지공간상태를 등급화한 그림.

No.1423 · 산림청 원문

녹지지역 綠地地域 · green area
도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 공해방지 보건위생 등 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위해서, 또는 보안상 도시개발을 제한한 지역을 말한다. 녹지지역은 다시 생산녹지지역과 자연녹지지역으로 나누어진다. 생산녹지지역은 농업, 임업, 목축업지구 등이 포함된 녹지지역으로 농림목축업과 같은 재배 및 생산활동이 가능한 지역이며 자연녹지지역은 자연환경 보전지구로 생산녹지지역에서 허용되는 재배 및 생산사업마저도 제한되는 지역이다.

No.1424 · 산림청 원문

녹지활용계약 綠地活用契約 · green practical use contract
관할 시장 군수가 도시민이 이용할 수 있는 공원녹지를 확충하기 위하여 필요한 경우에는 도시지역 안의 식생 또는 임상(林床)이 양호한 토지의 소유자와 해당 토지를 일반 도시민에게 제공하는 것을 조건으로 해당 토지의 식생 또는 임상의 유지 · 보존 및 이용에 필요한 지원을 하는 것을 내용으로 하는 체결하는 계약을 의미하며, 도시공원민녹지 등에 관한 법률에서 정하고 있음.

No.1425 · 산림청 원문

녹포자 銹胞子 · aeciospore
녹포자기에 의하여 만들어진 홀씨로서, 단세포이고 구형 내지 난형이며, 녹포자기내에서 연쇄상으로 형성한다. 녹포자가 발아되면 2핵(n+n)균사가 형성되고, 이 균사에서 여름포자와 겨울포자가 형성된다.

No.1426 · 산림청 원문

녹화계약 綠化契約 · tree-planting contract
도시공원및녹지등에관한법률에 의하여 시장 또는 군수가 도시녹화를 위하여 필요한 경우에는 도시지역 안의 일정지역의 토지소유자 또는 거주자와 수림대 등의 보호, 해당지역이 면적대비 식생비율의 증가, 해당지역을 대표하는 식생의 증대 등을 목적으로 묘목의 제공 등 당해 조치에 필요한 지원을 하는 것을 내용으로 체결하는 계약.

No.1427 · 산림청 원문

녹화기반재 綠化基盤材 · base material for greenification
식물의 생육기반이 되는 토양공간, 즉 녹화기반의 형성에 관여하는 배양토, 토양개량자재, 비료, 배수자재, 보수제 등을 총칭해서 녹화기반재라 한다.

No.1428 · 산림청 원문

논리적행위이론 論理的行爲理論 · theory of reasoned action
인간의 행동의 대부분은 행위자의 의지에 의해 통제되며, 사람은 주어진 상황 하에서 특정행동에 대한 의도를 형성하는데, 이것은 태도요인과 주관적 규범요인에 의해 결정되며, 형성된 행동의도는 실제행동에 영향을 준다는 이론이다.

No.1429 · 산림청 원문

논병아리류 - · grebes
판족을 가진 작은 물새이다. 대부분의 종이 여름에는 머리에 눈에 띄는 장식우를 갖고 있다. 물에 있을 때 꼬리는 보이지 않으며, 목은 통상 직립되어 있다. 위험에 처했을 때 날기보다는 잠수를 잘한다. 잘 날지 못하며, 날기 전에 수면을 오래 달린다. 암수가 유사한 형태이다. 뿔논병아리, 귀뿔논병아리, 검은목논병아리, 논병아리 등이 이에 속한다.

No.1430 · 산림청 원문

농가임업 農家林業 · farm forestry
목재를 생산하기 위한 것이라기보다는 조상의 묘를 모시거나 연료 · 퇴비원료 · 농용재 등을 얻기 위한 목적으로 산림을 보유하고 경영하는 임업.

No.1431 · 산림청 원문

농부권 - · Farmers' right
지역의 토착공동체와 농부가 특별히 유전자원의 기원과 다양성 중심지에서 유전자원을 보존하고 개량하며 이를 이용할 수 있도록 과거, 현재에 공헌하거나 미래에도 그 기여가 예측되어 인정할 수 있어 유전자원의 보존과 지속 적 이용 및 그로부터 발생하는 이익공유에 참여할 수 있는 권리

No.1432 · 산림청 원문

농액처리법 濃液處理法 · concentrated solution dip method
발근제 (發根濟)를 500~10,000ppm의 높은 농도로 알콜에 녹이고 삽수를 약 5초간 이 용액에 담구었다가 발근상에 꽂는 방법이다.

No.1433 · 산림청 원문

농약비 農藥費 · agricultural medicines cost
농약비란 분석품목의 생산을 위하여 병충해 예방 및 방제에 사용한 살충제, 살균제, 제초제, 전착제, 생장촉진제, 생장억제제, 토양살충제, 착색제, 목초액 등 약제의 구입을 위해 사용한 일체의 비용을 말한다. 공동방제를 위한 제 부담금(공동종자소독, 공동병충해방제) 모두를 포함한다. 가뭄이나 수해로 인한 복구비는 농약비에 계산하지 않고, 각각 독립비목에 계산한다. 농약비는 투입시점에서 당시 시가로 평가한다. 단, 농약을 구입할 때 든 부대비용을 합하여 계산한다. 예를 들어 목초액처럼 자기집에서 만들어 사용한 약제나 재료의 값은 투입 당시 시가로 하고 시가가 없을 경우 비용가로 계산한다. 농약의 사용량은 분석 품목에 사용한 수량만을 계산한다.

No.1434 · 산림청 원문

농어촌관광 農漁村觀光 · farming and fishing villages tourism
농어촌의 쾌적한 자연환경과 농어촌특산물 등을 활용하여 농림어업 전시관, 자연학습관, 지역특산물 판매, 체육휴양시설 등을 갖추고 이를 이용하거나 숙박, 음식 등을 제공하는 관광활동이다. 관광학적 개념으로 협의로는 농업을 대상으로 하는 관광활동이고, 광의로는 농어촌지역에서 이루어지는 관광활동이다. 농어촌지역에서 환경보전과 연계한 농어민의 재정자립구축을 위해 행하여지는 모든 관광활동을 가리킨다고 할 수 있다.

No.1435 · 산림청 원문

농어촌민박 農漁村民泊 · farming and fishing villages a home-stay
농어촌 주택을 이용하여 이용객 편의와 농어가 소득증대를 목적으로 숙박, 취사시설 등을 제공하는 것이다.

No.1436 · 산림청 원문

농어촌정비법 農漁村整備法 · farming and fishing villages a set (a thing) in good condition law

농수산업생산기반, 농어촌생활환경과 농어촌휴양자원 및 한계농지 등을 종합적 · 체계적으로 정비 · 개발하여 농수산업의 경쟁력 향상과 농어촌생활환경개선을 촉진함으로써 현대적인 농어촌 건설과 국가의 균형발전에 이바지함을 목적으로 하는 법이다.

No.1437 · 산림청 원문

농어촌휴양단지 農漁村休養段地 · farming and fishing villages a recreation center

농어촌의 쾌적한 자연환경과 농어촌 특산물 등을 활용하여 농림어업전시관, 학습관, 지역특산물판매, 체육, 휴양시설 등을 갖추고 이를 이용하게 하거나 숙박시설 (취사시설을 갖춘 농원여관업포함), 음식 등을 제공하는 곳이다.

No.1438 · 산림청 원문

농업곤충학 農業昆蟲學 · agricultural entomology

응용곤충학의 한 분과로서 농업경영상 사람에게 직접 및 간접적으로 해를 주거나 이익을 주는 곤충을 농업곤충이라고 하며 이와 같은 곤충을 연구하는 학문을 의미한다.

No.1439 · 산림청 원문

농업보조금 農業補助金 · agricultural subsidy WTO

농업협정상 보조금은 국내보조와 수출보조로 구분되며 동 협정상의 보조금 규정은 여타 협정상의 규정보다 우선 적용되었다. 또한 그 개념도 통상적인 보조금의 개념보다 넓은 의미로 사용되고 있다. 국내보조의 경우 그 규율대상이 일반적인 재정지출에 의한 지원보다 광범위한 실질적인 지원(support)의 개념이다. 그 이유는 WTO 농업협정에서 규율하고 있는 국내보조는 불특정다수 농민에게 혜택이 주어지는 정부가 직접 시행하는 하부구조 개선사업 등 정부서비스정책, 식량안보 목적의 공공재고사업 등을 포함하고 있고 감축대상 보조의 시장가격지지 지원액도 보조지출이 아닌

No.1440 · 산림청 원문

농업종속적임업 農業從屬的林業 · agricultural dependent forestry

농용재의 생산 등 농업경영의 효율화를 위하여 영위되는 임업경영이다.

No.1441 · 산림청 원문

농용림 農用林 · farm use forest

1) 농업용 자재를 생산하기 위하여 경영되는 산림이다. 2) 농업생산 및 농가생활에 직접 또는 간접으로 필요한 임산물의 생산공급과 임지이용(林地利用)을 제공하는 산림으로서 농용림의 종류에는 목재를 이용하는 용재림(用材林), 소 · 양 등의 가축방사(家畜放飼)에 제공되는 방목림(放牧林), 퇴비 · 목초 등의 채취를 목적으로 하는 채초림(採草林), 방풍 (防風) · 방조(防潮) · 방사(防砂) · 방무(防霧) 등을 목적으로 하는 재해방비림(災害防備林), 연료 · 숯 등의 공급을 목적으로 하는 연료림(燃料林) · 신탄림(薪炭林), 종실(種實) · 수피(樹皮) · 수액(樹液) 등의 채취를 목적으로 하는 특용수림(特用樹林) 등을 들 수 있다.

No.1442 · 산림청 원문

농용임지 農用林地 · farm woodland

농용림.

No.1443 · 산림청 원문

농용재 - · farm timber
농업용 자재로 사용하는 목재

No.1444 · 산림청 원문

농임업적방제 農林業的防除法 · -
생태적방제.

No.1445 · 산림청 원문

농지개혁 農地改革 · agrarian reform
농지의 소유제도를 개혁하는 일로서 한국에서는 1949년 농지개혁법에 의해 농지를 농민에게 적절히 분배함으로써 농가경제(農家經濟)의 자립과 농업생산력의 증진으로 농민생활의 향상과 국민경제의 균형 발전을 기하기 위해 실시되었다.

No.1446 · 산림청 원문

농지보전 農地保全 · farm land conservation
홍수 · 토양침식 · 토양매몰 등 농경지의 농업적 이용가치를 저하시키는 위협에 대하여 농지를 지키고 토지의 생산력이 감퇴되는 것을 방지하는 일. 농지를 보전하는 데에는 강우량 · 풍속(風速) · 경사(傾斜) · 정지방식(整地方式) · 토양 · 작물 · 도로배치 · 농지보전시설(배수로 · 방풍림 등)의 현상과 피해상황을 고려한 보전대책이 세워져야 한다. 농지보전은 농지정비의 일환으로서 대책을 세움으로써 효과가 있다.

No.1447 · 산림청 원문

농지임업 農地林業 · farmland forestry
농지의 주변이나 둑, 농지와 산지와의 경계선 등에 유실수 · 특용수 · 속성수 등을 식재하여 조기수입을 올리는 임업.

No.1448 · 산림청 원문

농촌지역 農村地域 · rural region
시설 개발의 정도가 높고, 다른 이용자의 소리가 가까이 있으며 이용의 집중도가 높고, 자동차를 위한 도로나 주차시설이 있는 지역이다.

No.1449 · 산림청 원문

농촌진흥청 農村振興廳 · Rural Development Administration
농림부 장관 소속하에 설치된 기관으로, 농촌진흥을 위한 시험 · 연구 및 농민의 지도와 농촌지도자의 수련에 관한 일이 주요 업무이다. 1906년에 설립된 권농모범장이 시초이며, 일제강점기인 1929년 농사시험장으로 명칭이 바뀌었다. 8 · 15광복 이후 1947년에 교도국과 郡에 농사교도소가 설립되었으며, 1949년 농업기술원으로 명칭이 바뀌었고, 도(道)의 교도국과 군의 교도소를 통합하였다. 1957년 농사개량원이 발족됨에 따라 도농사개량원 및 시 · 군 농사교도소가 설립되었는데, 1962년 농사개량원과 농림부 소속의 지역사회국 및 훈련원이 통합되어 농촌진흥청으로 발족하였다. 1994년 농림수산부 소속의 국립종축원 · 국립농업자재검사소 · 국립잠사소 · 국립종자보급소를 흡수하였다. 조직은 정무직의 청장과 차장이 있으며 차장 밑에 기획관리관 · 농업경영관 · 감사담당관 및 기술공보담당관 · 연구관리국 및 기술지원국 · 총무과 등으로 구성되어 있다. 소속기관에는 농업과학기술원 · 농업기계화연구소 · 축산기술연구소 · 원예연구소 · 농촌생활연구소 · 작물시험장 · 호남농업시험장

· 영남농업시험장 · 고령지농업시험장 · 제주농업시험장 · 종자관리소 · 한국농수산대학교 등이 있다.

No.1450 · 산림청 원문

누구 淚溝 · rill
강우량이 토양의 침투능보다 클 때 토양 중으로 침투되지 못한 물이 경사진 지표면을 따라 흘러내리게 되는데, 이 유하수가 지표면을 깎으면서 흙 입자를 이동시킴으로써 비탈면을 침식하게 된다. 더욱이 지표면의 오목한 곳으로 유하수가 집중되어 가는 골이 패이게 되는데 비탈면의 경사방향을 따라 물이 흐르면서 세로로 길게 생겨나는 여러 개의 가는 골을 누구라 한다. 점토질이 많은 토양의 비탈면, 특히 붕괴지나 민둥산, 식생이 없는 성토면 혹은 경작지 등에서 흔히 볼 수 있는 초기적인 토양침식의 결과로서, 깊이나 폭은 고작 15cm 정도 이하인 것으로서 쟁기질 정도로 없어지는 규모인 것이 골(gully; 구곡)과 구별하는 점이다. 참조: 골.

No.1451 · 산림청 원문

누구막이 淚溝防止工 · rill control works
누구막이는 산지비탈면이나 훼손지의 비탈면에서 강우 및 유수에 의한 비탈침식이 진행되면서 발생하는 누구(rill) 침식의 발달을 방지하기 위하여 누구를 횡단하여 설치하는 물과 흙의 보전을 위한 공작물로서, 골막이보다 규모가 작으며, 누구 상에서 흙막이 및 수로공사의 기초로서의 기능을 겸한다. 주로 돌, 떼, 흙포대 등을 재료로 하여 구축하며, 일반적인 기능은 기존의 흙막이 공작물과 비슷하다.

No.1452 · 산림청 원문

누구매기 淚溝매기 · -
누구막이.

No.1453 · 산림청 원문

누구방지공 淚溝防止工 · -
누구막이.

No.1454 · 산림청 원문

누렁병 - · yellows
기주식물이 황화 되거나 위축되는 식물병.

No.1455 · 산림청 원문

누로 淚路 · -
누구.

No.1456 · 산림청 원문

누름흙쌓기 押盛土工 · earth buttress loaded berm works
흙쌓기 비탈은 다지기 작업을 철저히 하지 않으면 붕괴되기 쉽다. 비탈하부에서부터 상부로 올라가면서 시공한다. 줄떼가 상하방향으로 자라면서 녹화가 이루어진다. 줄떼다지기공사의 성패는 달구판으로 다지기함에 좌우된다.

No.1457 · 산림청 원문

누적오차 累積誤差 · systematic error
이론의 잘못, 측정기계의 부정확, 또는 측정자의 버릇에 따른 오차이며, 정오차 또는 계통오차라 불린다.

No.1458 · 산림청 원문

누차 累差 · cumulative error
누적오차, 정오차. 계통오차.

No.1459 · 산림청 원문

누출 漏出 · Leakage
조림 CDM 프로젝트를 실시함으로써 프로젝트 경계 밖에서 일어나는 CO2배출량 또는 흡수량을 의미한다. 즉, CDM 프로젝트 대상지에서 주민이 화전을 일구었을 ?? 조림 프로젝트 실시로 인하여 이 주민이 프로젝트 경계 밖으로 이동하고 거기서 화전을 일구어 CO2배출이 발생하면 CO2배출량은 누출로서 당해 프로젝트 CO2흡수량에서 제외된다.

No.1460 · 산림청 원문

눈 芽 · bud
싹 줄기의 미발육 상태로 가장 어린 부분으로 줄기의 생장점과 그 주변에 있는 어린 잎 등을 합하여 막연하게 가리키는 용어. 주로 소지의 끝이나 옆에 있는 잎겨드랑이에 달리며 마디가 짧다. 눈은 달리는 위치, 모양, 역할, 구성기관 등에 따라 매우 다양하게 구분되며, 나무의 종류에 따라 다르므로 잎이나 꽃이 없는 시기에 나무를 식별하는 중요한 특징이 될 수 있다. 가지 끝에 달리는 눈은 정아(頂芽, terminal bud), 잎겨드랑이에 달리면 액아(腋芽) 또는 측아(側芽, lateral bud), 정아가 훼손되었을 때 측아가 정아처럼 보이며 그 역할을 하는 경우가 있는데 이를 준정아(準頂芽)라고 한다 또 잎 겨드랑이에 여러 개의 눈이 달리는 경우가 있는데 잎이 달렸던 흔적의 바로 위의 것은 측아 이지만 그 이외의 것들은 부아(副芽, accessory bud)라고 한다. 또한 아린(芽鱗) 즉 비늘조각 같은 것으로 싸여 있는 눈은 인아(鱗芽), 그렇지 않을 경우 나아(裸芽)라고 한다. 그밖에 휴면을 계속하고 있다 줄기의 생장점이 상했을 때 자라는 눈을 잠아(潛芽, dormant bud)라고 부른다. 그밖에 앞으로 꽃이 될 분을 꽃눈 또는 화아(花芽, flower bud), 잎이 될 눈을 잎눈 또는 엽아(葉芽, leaf bud), 꽃과 잎이 함께 될 눈을 혼아(混芽)라고 부른다.

No.1461 · 산림청 원문

눈꽂이 芽揷 · bud cutting
눈을 이용하여 삽목하는 무성번식법이다.

No.1462 · 산림청 원문

눈사태방지공사 雪崩防止工 · avalanche control measures
눈사태 방재를 위해 예방책, 예방말뚝, 유도둑, 유도옹벽, 유도책, 방호책 등을 시설한다. 눈사태발생 우려가 있는 임지에 산림을 조성하여 눈사태의 발생을 방지하거나 경감시킨다. 산림조성 수종은 성장이 빠르고 심근성이며, 수관이 크지 않은 활엽수를 식재하는 것을 원칙으로 한다.

No.1463 · 산림청 원문

눈썹떼공 線芝工 · strip-sod tamping works
줄떼다지기.

No.1464 · 산림청 원문

뉴라운드우호국 뉴라운드友好國 · Friends of a New Round, FNR
WTO 차기협상에 대비하여 호주, 칠레, 체코, 헝가리, 한국, 멕시코, 모로코, 뉴질랜드, 싱가폴, 스위스, 태국, 우루과이, 알젠틴, 홍콩 등 14개국이 모여 뉴라운드 협상방식 등에 대한 의견 교환을 목적으로 하며 주로 포괄적 협상방식을 선호하고 있다.

No.1465 · 산림청 원문

뉴라운드협상 뉴라운드 協商 · New Round Negotiation
세계경제에서 점점 현안문제로 대두되어 가고 있음에도 불구하고 UR 협상과정에서 논의되지 않은 환경과 무역문제, 노동과 무역문제, 공정경쟁과 무역문제 등을 규율하는 새로운 다자간 협정 틀을 만들기 위해 지금 세계무역기구(WTO)나 경제협력개발기구(OECD), 유럽연합(EU) 등에서 새롭게 논의되고 있는 통상문제에 관한 다자간 논의를 뜻하며 Millennium round라고도 한다.

No.1466 · 산림청 원문

뉴우톤식 뉴우톤式 · Newton's formula
뉴우톤식은 벌채목의 재적을 계산하는 구적식의 하나로 다른 방식과는 달리 벌채목의 원구직경, 중앙직경, 그리고 말구직경을 모두 사용하며 특히 각 부위에 대한 가중치를 사용한다는 특징을 가지고 있다. 뉴우톤식에 의한 벌채목의 재적은 인데, 여기서 = 말구단면적, = 원구단면적, = 중앙단면적이며 = 재장이다. 즉, 뉴우톤식은 말구 및 원구단면적에 비하여 중앙직경의 단면적에 4배의 가중치를 주어 재적을 계산한다는 점이 후버식이나 스말리안식과는 다른 점이다.

No.1467 · 산림청 원문

뉴클레오타이드 - · nucleotide
뉴클레오사이드에 인산기가 결합한 것으로 DNA나 RNA를 구성하는 단량체이다.

No.1468 · 산림청 원문

능동수송 能動輸送 · active transport
운반체(carrier)가 관련되며 에너지가 요구되는 물질이동 체계인데 보통 농도 구배를 거슬러 일어난다. 능동수송이 확산(diffusion)과 다른 점은(ATP라는 형태의) 에너지가 필요하다는 점이다.

No.1469 · 산림청 원문

능선 稜線 · mountain ridge, convection
산등성이를 따라 죽 이어진 봉우리의 선을 말한다.

No.1470 · 산림청 원문

능형 菱形 · diamond shape
마름모형.

No.1471 · 산림청 원문

늦된종자 晩熟種子 · serotiny
종자가 성숙한 이후에 열매의 일부 또는 전부가 모수에 남아있는 경우로 Pinus banksiana의 사례, 산화가 잦은 지역이나 사막화된 지역에서 포식자의 수준이 낮아졌을 때 발아하기 위한 전략의 일종이다. 모수에 오래 남아있는 열매를 canopy seed bank라 하기도 한다.

No.1472 · 산림청 원문

늦서리 晩霜 · late frost

월동한 조직(눈, 형성층, 수피)이 봄에 활동을 개시할 시기에 이상저온에 의하여 발생하는 동해이다. 온대지방 활엽수에서 한겨울에 내동성이 가장 약한 부위는 재부유조직으로서 한겨울의 동해는 재부유조직, 눈, 수피의 순위로 나타나고, 초겨울이나 초봄에는 눈(특히 꽃눈), 수피, 재부유조직의 순위로 동해가 많이 나타난다. 한겨울의 이상고온은 만상의 피해를 유발시킨다.

No.1473 · 산림청 원문