산림임업용어사전 — ㅅ (3/3)

← 목차 · 141개 용어 · 식생대 ~ 씨뿜어붙이기

식생대 植生帶 · vegetation zone
생활대의 하나로, 위도나 표고와 함께 온도조건이 변하여 식생이 대상 (帶狀)으로 분포하는 지역. 특히 산림에만 착안한 것이 산림대이다. 우리나라에서는 일제시대에 식목수간(植木秀幹, 1933)이 조선산림대라는 논문을 발표하였다. 표고에 동반하는 식생대는 수직분포대와 같은 뜻이다. 동아시아의 식생대는 Wolfe (1972)가 연평균기온 25℃를 협의의 열대다우림의 북쪽 한계선으로 하였으며, 그 북쪽은 20℃까지 준열대다우림(paratropical rain forest)으로 하였다. 이 준열대다우림은 상관적(相觀的)으로는 열대다우림과 거의 구별이 되지 않기 때문에, 여기까지를 열대의 식생대에 포함시키면 20℃가 온대와 열대의 식생대 경계가 된다. 그 북쪽 20~13℃까지는 상록활엽수림이기는 하지만 열대다우림보다는 잎의 크기가 작고, 판근 (板根)이나 간생화 (幹生花) 등 열대다우림을 특징짓는 속성도 없어져 분명히 다른 상록활엽수림으로 보아 이것을 아중형엽 상록활엽수림 (notophyllous broad-leaved evergreen forest)으로 하였다. 이것은 말하자면, 아열대상록활엽수림이다. 이 영역은 本多(1912)의 난대 · 아열대(21~13℃), Holdridge(1972)의 아열대 · 난온대(24~12℃)에 거의 상당하며 이른바 열대와 온대의 이행부적인 식생대이다. 이행부는 어느 쪽에 포함되더라도 상관없지만, 일본에서는 이 이행부를 이분하여 남반분(南半分)을 아열대, 북반분을 온대의 최남부로서 난온대라고 부르거나 아열대, 난온대라고 부르고 있다. 우리나라의 난대는 대체로 일본의 북반분에 해당되지만 아열대림이라고 표현하는 학자도 있다. Holdridge(1972)는 17℃를 경계로 하여 아열대와 난온대를 구분하고 있다. 탁월한 산림은 어느 것이나 상록활엽수림이다. 또한, Wolfe는 그 북쪽 13~3℃까지는 냉온대낙엽활엽수림이라 하고 있지만, 같은 영역을 Holdridge는 13~6℃로 하고 있으며, 아울러 6~3℃까지를 한온대상록침엽수림으로 하고 있다. 그러나 Holdridge의 시스템은 생물기온을 이용하고 있기 때문에, 한냉인 지역(평균기온이 0℃이하가 된다)에서는 연평균기온과는 달라진다. 일본부근에서는 난온대상록수림과 냉온대낙엽수림의 경계는 약 10℃이며, 냉온대낙엽수림과 한온대침엽수림의 경계는 4℃, 한온대침엽수림의 북쪽 한계는 약 0℃이다.

No.5626 · 산림청 원문

식생대 植生袋 · vegetation sag(bag)
식생자루.

No.5627 · 산림청 원문

식생대 植生帶 · vegetation girdle
식생이 넓게 띠 모양으로 펼쳐진 현상.

No.5628 · 산림청 원문

식생도 植生圖 · vegetation map
식물군락(식생단위)의 지리적 넓이를 구체적으로 나타낸 지도. 보통 지형도에 채색하여 구분하여 왔으나 요즘에는 GIS, 컴퓨터 등을 이용하여 따로 만들기도 한다. 식생도에는 현존식생도, 원식생복원도, 잠재자연식생도 등이 있다. 현존식생도는 실제조사에 의해 만들어지고 원식생도는 화분분석 등의 수단으로 밝혀야 하며 잠재자연식생도는 이론적으로 작성된다. 식생도에 들어가 있는 내용(식생단위의 종류 등)은 그림의 대소축척에 따라 결정되며, 그 축척은 식생도를 만드는 목적, 대상지역의 넓이, 그 지역의 식생에 관한 기초 정보량 등에 의해서 좌우된다. 식생도의 축척과 용도 및 그려지는

식생단위의 수준 대응은 다음과 같다. (1) 소축척식생도(1:100만 이하): 전세계 또는 아시아대륙 등 광역 개관용. 주로 군계 수준. (2) 중축척식생도 (1:100만~10만): 영남지방, 호남지방, 광역시.도 등의 개관용. 군단 또는 우점종형 군락 수준. (3) 대축척식생도(1:10만~1만): 국립공원, 보전지구 개관용. 거의 모든 식생단위. (4) 세밀식생도(1:1만 이상): 생물다양성 보전 및 산림관리 등 특수한 목적에 사용하는 기초도로서 하위단위를 포함한 식생단위가 모두 포함된다. 우리나라에서는 밑그림이 되는 임상도 때문에 1:2만5천의 것이 가장 많이 만들어져 왔다. 식생도에 이용하는 색채는 반드시 통일되어 있지는 않지만 일반적으로 건성지(온난지)의 군락에서 습성지(한냉지)의 군락을 향하여 빨강, 노랑, 초록, 파랑의 순차로 바꾸는 것이 통일을 향한 바람직한 방향이 될 수 있다. 식생도는 그 제작 과정에서 식생구분의 타당성이 검정되어 과거 식생도와의 비교로부터 군락의 동태가 파악되며, 또한 입지도와의 비교로부터 군락분포와 입지조건과의 관계가 밝혀지는 등, 학술적인 효용이 있을 뿐 아니라 응용적으로도 자연보호계획이나 토지이용계획의 기초도 등으로서 유용성이 높다.

No.5629 · 산림청 원문

식생매트 植生매트 · vegetation mat
섬유망이나 펠트(felt), 짚 또는 종이 등의 매트에 종자와 비료 등을 풀로 부착시켜 비탈면에 전면적으로 피복함으로써 비탈면을 보호하는 식생공법용 재료이다.

No.5630 · 산림청 원문

식생반 植生盤 · vegetation block
뜬 떼를 얻기 곤란하여 뜬 떼의 대용품으로 고안되어 사용되던 것으로 밑판과 종자, 표면덮개로 구성되어 대량의 유기물과 비료양분을 함유하므로 보수성과 통기성을 좋게 하고 근계의 발육을 조장하여 식생의 연속을 촉진하며 생육을 보장하는 것

No.5631 · 산림청 원문

식생수로 植生水路 · Grassed Waterway
잔디로 피복된 넓고 얕은 수로로 지면을 통해 유출한 강우유출수를 운송하도록 설계 시공한 것.

No.5632 · 산림청 원문

식생연속 植生連續 · plant succession
식생군락(植物群落)은 발생하고 성장하고 사멸하는 것이라고 생각하고, 이 계열을 추이계열(推移系列)이라 부른다. 같은 입지형(立地形)에 있어서는 일관성 있는 어떤 계열군이 보이고 그 총계열의 최후의 성숙한 군락(群落)을 극성상이라고 부른다. 식생연속(植生連續)은 습성추이(濕性推移), 건성추이(乾性推移 e)가 있다. 또는, 천이(遷移)이라고도 한다.

No.5633 · 산림청 원문

식생연속설 植生連續說 · vegetation continuum theory
군집 연속, 연속적 분포라고도 한다. 한 가지 형의 식생이 매우 미세하게 다른 유형으로 연결되면 두 가지 형이 정확하게 반복되지않는 식생의 한 형태이다.

No.5634 · 산림청 원문

식생자루 植生袋 · vegetation bag
사면녹화를 위해 특수하게 만든 자루. 종자, 비료, 유기질, 흙 등을 혼합하여 조제한 재료를 특수한 소재로 제조한 자루에 채워 넣고 비탈면에 일정한 간격으로 파 놓은 수평구에 파묻는다.

No.5635 · 산림청 원문

식생조사법 植生調査法 · methods of vegetation survey
방형구조사법(quadart method), 선상도조사법(線狀區調査法), 개상구조사법(帶狀區調査法) 등이 있고 수직적 측면의 형태와 구조를 보이는 종단면조사법(縱斷面調査法)이 있다.

No.5636 · 산림청 원문

식생천이 植生遷移 · plant succession
나지가 형성되면 1, 2년생 초본류가 침입하고, 시간이 경과됨에 따라 다년생 초본류부터 관목, 양지성 교목류가 침입하고, 다음에는 내음성이 강한 교목류의 숲으로 변화해 가는 과정

No.5637 · 산림청 원문

식생천이 植生遷移 · vegetation succession
생태계에서 식물상이 변해가는 현상.

No.5638 · 산림청 원문

식생포대 植生布袋 · vegetation bag
식생자루.

No.5639 · 산림청 원문

식수계절 植樹季節 · season for planting
식수하기에 적합한 계절.

No.5640 · 산림청 원문

식수공 植栽工, 植樹工 · tree planting works
나무심기를 말함.

No.5641 · 산림청 원문

식수제 植樹祭 · tree planting festival
식수 전, 후에 치르는 의식.

No.5642 · 산림청 원문

식수조림 植樹造林 · planting
식재조림, 인공식재, 신식 등으로 나타내기도 하며, 벌채지나 나지에 묘목을 심어서 숲을 조성하는 작업이다.

No.5643 · 산림청 원문

식재 植栽 · planting
식재조림(植樹造林), 식목(植木) 등의 용어로 사용된다.

No.5644 · 산림청 원문

식재공 植栽工 · Tree planting works
나무 등을 심어 녹화시키는 공법.

No.5645 · 산림청 원문

식재면적 植栽面積 · planted area plant
식재한 땅의 넓이.

No.5646 · 산림청 원문

식재수종 植栽樹種 · planting species
심는 나무의 종류

No.5647 · 산림청 원문

식재용기구 植栽用器具 · planting tools
식재에 사용하는 기구. 삽이나 괭이 등이 해당.

No.5648 · 산림청 원문

식재지 植栽地 · planting site
나무를 심는 땅, 지역

No.5649 · 산림청 원문

식충식물 食蟲植物 · insectivorous plant
작은 동물을 먹고 소화하여 양분으로 흡수하는 식물을 말한다. 작은 개구리나 다른 절지동물을 잡아먹는 경우도 있지만 주로 곤충을 잡아먹기 때문에 식충식물이라고 한다. 이를 잡아서 소화하는 기구를 벌레잡이잎이라고 한다. 식충식물에는 한번 빠진 벌레가 밖으로 달아나지 못하도록 하는 함정형, 끈끈이주걱의 점액이 묻은 털처럼 점착력을 이용하여 벌레를 잡는 점모형, 통발의 경우처럼 문이 달린 주머니 안으로 벌레를 빨아들여 소화시키는 낭정형, 벌레잡이잎을 양쪽으로 닫아서 가두는 폐합정형 등이 있다. 작은 벌레를 소화하여 양분을 흡수하지만 여기에만 의존하는 것은 아니고 광합성을 하여 에너지를 취하는 독립영양 생물이다. 그러나 산성이 강한 습지 같은 곳에서 흡수하기 어려운 질소나 인산 등을 얻기 위해 적응한 생존 전략으로 보인다.

No.5650 · 산림청 원문

식토 埴土 · clay
점토가 40% 이상, 모래가 45% 이하, 그리고 미사가 40% 이하인 토양의 토성을 가리킨다.

No.5651 · 산림청 원문

신 다윈주의 新 다윈主義 · modern synthesis, neo Darwinism
진화는 돌연변이에 의하여 도입된 유전자의 빈도의 변화로 간주하며 그 변화를 일으키는 여러 가지 원인이 있지만 그 중에서도 자연도태를 가장 중요한 원인으로 생각하는 학설. Futuyama는 이를 다음과 같이 요약하고 있다. 진화적인 합성의 주요 교리는 집단들이 유전변이를 포함하고 있는데 이 변이는 무작위로 발생되고 재조합되어 나타난 것이며 집단들은 무작위로 나타나는 유전자부동과 유전자이동, 특히 자연도태에 의하여 유전자 빈도가 바뀜으로써 진화한다. 가장 유전적으로 적응할 수 있는 변이체가 미세한 표현형효과를 가지게 되어서 표현형 효과는 점진적으로 나타난다. 다양화라는 현상은 집단간의 생식적 격리가 점진적으로 나타나면서 종분화가 나타나기 때문에 생기게 된다. 이러한 과정들이 오래 동안 일어날 때 그 변화가 뚜렷해져서 속(genera), 과(family), 등 높은 분류의 단위들을 명명하는 것이 가능해지게 된다. 즉, 신다윈주의는 진화가 유전자, 표현형, 그리고 집단 수준에서 어떻게 작용하는지에 관한 이론이다. 그 반면 다윈주의는 주로 개체, 종분화, 생물체에 관심을 둔다.

No.5652 · 산림청 원문

신경계 神經系 · nervous system
동물체 내에서 몸의 안팎의 각종 변화에 대처하여 몸의 각 부분의 기능을 종합 통제하는 기관을 말한다.

No.5653 · 산림청 원문

신경절 神經節 · nerve cord
말초신경계의 구성 요소로서 신경 세포체의 집합.

No.5654 · 산림청 원문

신규조림 新規造林 · afforestation
그 전에 숲이었다고 알려지지 않은 땅에 산림을 인위적으로 조성하는 것을 말한다.

No.5655 · 산림청 원문

신기성 新奇性 · novelty
새롭고 기이한 성질, 새롭고 신기하고 기이한 것이다.

No.5656 · 산림청 원문

신기준표본 新基準標本 · neopype
신종을 발표할 때 학명과 기재문에 기록된 정기준표본, 동기준표본이 분실되어 없거나 아예 처음부터 없을 때 이를 보완하기 위해 새로 설정한 표본을 말한다. 따라서 선정기준표본이 우선하여 이도 없을 경우에 대신한다.

No.5657 · 산림청 원문

신나무 楓樹 · 學 Acer ginala
전국에 1500m 이하의 지대에서 계곡과 산록에 자생하는 낙엽관목으로 5~8m 자란다. 잎이 3천렬(淺裂). 잎염료. 낙엽활엽소교목. 기구재(器具材).

No.5658 · 산림청 원문

신뢰계수 信賴係數 · coefficient of confidence
통계적 추정으로 모집단내의 모수를 추정하는 경우에 어떤 구간을 설정하고 그 안에 참모수값이 존재할 확률을 말한다. 보통 90%, 95%, 99% 등으로 표시한다. 신뢰수준과 같은 의미히다.

No.5659 · 산림청 원문

신뢰구간 信賴區間 · confidence interval
통계분석에서는 일반적으로 모수를 추정하기 위해 표본통계량을 구하는데, 문제는 모수가 얼마나 신뢰성 있게 추정되었느냐 하는 점이다. 모수는 언제나 거의 알려져 있지 않기 때문에 통상 모수에 대한 신뢰한계를 설정하여 표본통계량의 신뢰도를 정한다. 여기서 이 신뢰한계의 구간을 신뢰구간이라 하며, 임의의 모수 θ에 대해 $P[L(X)\leq\theta\leq U(X)]=1-\alpha$, $0<\alpha<1$ 가 성립하면, 구간

No.5660 · 산림청 원문

신뢰수준 信賴水準 · confidence level
신뢰계수와 같은 의미이다. 신뢰구간(Confidence interval)은 모수가 어느 범위 안에 있는지를 확률적으로 보여주는 방법이다. $Pr(U < \theta < V) = x$, 이 때 구간 U~V를, "θ에 대한 신뢰구간"이라고 한다. 값 x를 신뢰계수 또는 신뢰수준이라고 하며, 0.95 또는 0.99 등의 값을 주로 사용한다. 다만,

'신뢰수준'이라고 할 때는 대체로 백분율로 나타낸 것을 쓴다(따라서, 95% 혹은 99% 등의 값을 주로 사용한다.)

No.5661 · 산림청 원문

신뢰한계 信賴限界 · confidence limits
어떤 수준의 위험율로써 가설의 엽각(葉却)이 한계. 가령 신뢰도(confidence coefficient) 95%의 신뢰한계 등으로 말한다.

No.5662 · 산림청 원문

신비성 神秘性 · mystery
환경 혹은 경관을 볼 때, 부분적으로 감추어진 부분에 대하여 새로운 것을 발견할 수 있을 것 같은 기대를 일으키는 상태

No.5663 · 산림청 원문

신생대 新生代 · Cenozoic era
중생대에 이어서 지질시대 최후의 대부분으로 약 6,400만년 동안 유지된다. 포유류가 전성을 이루는 시대 즉 포유류시대(Mammalian age)와 일치한다. 제3기와 제4기로 구분되고, 제3기는 다시 오래된 시대부터 팔레오세, 에오세, 올리고세, 마이오세, 플라이오세의 5세로, 제4기는 홍적세(최신세) 및 충적세(현세)로 나누어진다. 인류가 발전해 온 것은 제4기로 그 연수는 170만년으로 계산되며, 고위도 지방은 넓은 지역이 빙하로 덮여 있다.

No.5664 · 산림청 원문

신생대 3기 第三紀 · Tertiary period
신생대를 두 시대로 나눌 때 첫 번째 지질시대에 해당하는데, 약 6500만년전부터 170만년전까지 신생대의 대부분을 차지한다. 제3기는 다시 팔레오세, 에오세, 올리고세, 마이오세와 플라이오세의 5개의 세로 구분할 수 있다. 현재 지상에서 볼 수 있는 알프스, 히말라야, 안데스 등의 산맥은 이 시대의 조산운동에 의해서 형성되었다. 포유류와 현화식물이 크게 번성한 시대이며, 특히 식물계에서는 피자식물이 번성하여 기후변화를 잘 나타내고 있다.

No.5665 · 산림청 원문

신생대 4기 第四紀 · Quaternary period
신생대 시대를 제3기와 제4기 둘로 나눌 때 두 번째 지질시대에 해당하는데, 약 170만년 전부터 현재까지 지질시대 최후의 시대이다. 제4기는 다시 1만년 전 이전의 홍적세와 이후의 충적세로 구분할 수 있다. 제4기에는 빙하기와 간빙기가 반복되는 기후변동이 있었고, 해면이 변화하면서 우리나라의 경우에도 서해와 동해의 면적이 달라졌다. 또한, 인류가 지구상에 출현한 시대이다.

No.5666 · 산림청 원문

신생세포 新生細胞 · neoplastic cell
넓은 뜻으로는 조직(組職)의 신생(新生, 英 new formation)을 일으키는 세포(細胞). 새로운 조직을 생성하는 세포. 염증, 재생, 비대, 종양 시에 새로이 나타난다.

No.5667 · 산림청 원문

신식물대 新植物代 · Caenophytic era
피자식물이 대단히 우세하였던 백악기 후반부터 현재까지의 시대로 피자식물대라고도 한다. 식물계의 변천은 동물계보다 앞서있어 백악기 후반에는 이미 다수의 피자식물이 출현하여, 침엽수, 소철, 은행나무 등 중식물대(中植物代)의 식물은 쇠퇴하고 점점 현재의 식물경관에 가까워졌다. 이 변화를 식물계의 백악기 변혁(Cretaceous transformation)이라고 부르고 있다.

No.5668 · 산림청 원문

신에너지 新에너지 · new energy
동식물에서 유래한 유기물, 바이오매스, 태양열, 냉동설비, 눈 또는 얼음, 지열, 풍력, 수력, 태양전지 등을 열, 발전 등에 이용하는 것을 말한다.

No.5669 · 산림청 원문

신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법 新 再生에너지 開發 利用 普及 促進法 · new energy and renewable energy development, use and supply promotion law
신에너지 및 재생에너지의 기술개발 · 이용 · 보급촉진과 신에너지 및 재생에너지산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 저감을 추진함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함을 목적으로 하는 법이다. 이법의 정의에 따르면, 신재생에너지란 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛 · 물 · 지열(地熱) · 강수(降水) · 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 신에너지 및 재생에너지를 말한다. 즉 태양에너지, 바이오에너지, 풍력, 수력, 연료전지, 가스화한 에너지, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지, 수소에너지 등이 포함된다.

No.5670 · 산림청 원문

신용장 信用狀 · letter of credit, l.c.
엘씨. 주문이 있어서 수출업자가 승락을 하면 수입업자는 자기가 거래하는 은행에 담보를 제공하여 자기의 신용할 수 있는 대리점이나 지점을 통해서 수출인에게 소개하는 서류이다. 우편 또는 전신으로써 그 내용을 지정한다.

No.5671 · 산림청 원문

신장율 伸張率 · stretch, tensile stretch
종이의 인장하중에 대한 신장율. 이 성질은 두루마리 인쇄용지 및 포장용지에 있어서 중요하다.

No.5672 · 산림청 원문

신장이상재 - · -
신장재.

No.5673 · 산림청 원문

신장재 伸張材 · tension wood
신장이상재. 활엽수류의 수간에서 바람 또는 기울음에 의하여 인장력을 받는 부위에 교질섬유가 다량으로 생겨나고 도관의 수가 감소하는 대신에 두꺼운 세포벽을 갖는 섬유의 수가 증가한다.

No.5674 · 산림청 원문

신장형 腎臟形 · reinform
식물의 기관에서 그 모양을 나타내는 말로써 길이보다 너비가 길며 아랫부분이 둥글면서도 오목하게 들어가 전체적으로는 신장 즉 콩팥모양을 하는 형태이다.

No.5675 · 산림청 원문

신재 薪材 · fuelwood
연료재(燃料材).

No.5676 · 산림청 원문

신종 新種 · new species
처음으로 발견 또는 연구되어 새로운 분류군으로 동정된 종류를 말한다. 신종이 발견되면 분류학적인 검토를 거쳐 확정하고, 명명규약에 따라 학명을 부여하며 라틴어 기재문을 작성하고, 기준표본을 설정하고 새로 부여된 학명과 기재문을 유효출판하여야 한다. 이때 기준표본이 있는 장소와 기관을 기재문에 포함시켜야 한다.

No.5677 · 산림청 원문

신지식인 新知識人 · neo-professional
신지식인이란 정규 교육을 통해 남보다 다양한 사관지만 보유한 사람이 아니라, 방법지를 체득하고 지식의 생성-저장-활용-공유 과정에 필요한 정신 자세, 습관, 기본 능력을 갖추고 지속적으로 행동을 통해 새로운 가치를 창조해 나가는 개인을 의미한다. 한마디로 신지식인이란 학력의 유무와 상관없이 일상 생활에서 끊임없이 새로운 부가가치를 창출해 나가는 사람을 뜻한다.

No.5678 · 산림청 원문

신축성원칙 伸縮性原則 · principle of flexibility
1995년 APEC 동경 정상회담에서 다시 대두된 국제무역 및 투자자유화 추진원칙으로서, 이 신축성의 원칙은 APEC이 지향해 나가는 무역 및 투자의 자유화와 원활화를 회원국 정부의 입장에서 추진하는 것이 아닌 기업가 및 무역당사자의 입장에서 추진해 나가야 한다는 개념으로 사용하고 있다. 다시 말해, APEC 각 회원국간에 무역 및 투자가 자유스럽고 원활하게 이루어질 수 있도록 추진해 나가자는 원칙을 뜻한다.

No.5679 · 산림청 원문

신축줄눈 伸縮? · expansion joint
콘크리트를 사용하여 사방댐의 본체나 붙이기를 할 경우 온도 차이에 의한 균열을 방지하기 위하여 넣는 줄눈

No.5680 · 산림청 원문

신크로트론 - · synchrotron
전자(電子)의 가속장치.

No.5681 · 산림청 원문

신탄 薪炭 · domestic fuel
땔나무와 숯.

No.5682 · 산림청 원문

신탄림 薪炭林 · fuel production forest
연료림. 탄재의 생산을 주목적으로 하는 임분. 용재림에 비하여 벌기령이 짧고 소자본으로 생산이 가능한 반면 지력감퇴, 수익성 저조 등 단점도 있다.

No.5683 · 산림청 원문

신탄재 薪炭材 · firewood
땔감나무, 숯 등 연료재로 사용되는 산림생산물이다.

No.5684 · 산림청 원문

신틸레이션 - · scintilation
광점(光點)이 강하게 빛나는 것을 뜻하는 말. 특히 형광판을 방사선으로써 충격할 때 볼 수 있다. A선에 대해서 가장 현저하다. 방사선이 특수한 물질에 충돌할 때 발하는 빛(신틸레이션)에 의해서 계수(計數)하는 것을 신틸레이션 계수관이라 한다.

No.5685 · 산림청 원문

신형질 新形質 · new character
새로운 형질.

No.5686 · 산림청 원문

실루리아기 志留紀 · Silurian period
고생대에서 세 번째의 지질시대로서 오르도비스기와 데본기 사이에 해당하는 약 4.4억년 전부터 4.1억년 전에 해당한다. 생물이 육상으로 진출을 시작한 시대이며 생물에 나쁜 자외선을 흡수하는 오존층이 형성된 시대라고 한다.

No.5687 · 산림청 원문

실뿌리 煩根 · fibrous root
단자엽류의 정상적인 뿌리형태로서 발아 후 주근이 퇴화하고 유경이나 배축에서 부정근이 여러 개 발생한다.

No.5688 · 산림청 원문

실생 實生 · seedling
종자(種子)가 발아한 유식물(幼植物).

No.5689 · 산림청 원문

실생목 實生木 · seedling plant
종자가 발아하여 생장한 나무로 맹아나 삽목, 접목으로부터 발달한 나무와 구분된다.

No.5690 · 산림청 원문

실생묘 實生苗 · seedling, sapling
종자가 발아하여 생장한 묘목으로 영양번식된 삽목묘, 접목묘, 분근묘 등에 대한 말이다.

No.5691 · 산림청 원문

실업 失業 · unemployment
노동할 의욕과 능력을 가진 자가 자기의 능력에 상응한 노동의 기회를 얻지 못하고 있는 상태 혹은 노동력이 완전 고용되지 않은 상태이다.

No.5692 · 산림청 원문

실엽 實葉 · fertile frond
포자엽. 포자를 맺는 잎이다.

No.5693 · 산림청 원문

실온변동비 室溫變動比 · room temperature changing rate
외부온도의 하루변화량에 대한 실내온도의 하루 변화량의 비.

No.5694 · 산림청 원문

실용단위 實用單位 · practical unit
기본단위 또는 그 유도단위가 사용에 불편할 때 별도로 적당한 크기의 단위를 설정하는 일이 있다. 이것을 실용단위라고 한다.

No.5695 · 산림청 원문

실적 實積 · solid content
목재는 그 재적을 측정하지 않고 나무를 쌓아서 그 쌓은 나무의 용적을 측정하여 목재의 양을 표시하는데, 공간을 포함하지 않은 용적 즉, 목재만의 재적을 실적이라고 한다.

No.5696 · 산림청 원문

실적계수 實積係數 · solid contents of stacked wood
실적을 층적(層積)으로 나눈 비(%)를 실적계수라 한다. 여기서 층적은 실적과는 달리 목재와 공간을 포함한 용적을 말한다. 따라서 실적계수를 알면 층적을 측정하여 쉽게 실적을 구할 수 있다. 또한, 실적계수는 수종, 형상과 크기, 쌓는 방법, 목재의 건조 등과 같은 인자들에 의하여 그 값이 달라지는데 일반적으로 그 값은 0.6~0.7의 범위가 가장 많다.

No.5697 · 산림청 원문

실제연령 實際年齡 · physical age
실질적인 연령을 말함.

No.5698 · 산림청 원문

실중 實重 · weight of thousand seeds
종자 1,000알의 중량이다.

No.5699 · 산림청 원문

실증발산량 實蒸發産量 · actual evapotranspiration
식물이 증산한 수분량과 물체의 표면에서 증발된 수분량의 합계로서 생태계로부터 대기로 나간 수분의 양.

No.5700 · 산림청 원문

실체사진측량 實體寫眞測量 · stero photo
실체사진측량은 한쌍의 중복사진을 입체시하면서 지형의 입체상을 기계적으로 측량하는 것이다. 이때에는 사진의 표정(標定, orientation)이 중요하다. 이것은 한쌍의 사진을 투사기(投射器)에 바르게 정치(整置)하는 일을 말한다. 이때 한쌍의 사진을 촬영하였을 때와 같은 관계적 위치에 두는 것을 상호표정(相互標定, two-projector orientation)이라 한다. 연속촬영사진의 위치에 가져오는 것을 연속표정(接續標定, one projector orientation)이라 한다.

No.5701 · 산림청 원문

실측 實測 · location surveying
예측에 의하여 구한 노선을 현지에 설정하여 정밀한 측량을 실행하는 것

No.5702 · 산림청 원문

실크스크린 인쇄 絹布印刷 · silk screen printing
망목이 거친 견포를 틀에 넣어 화선 이외의 부분을 피복하여 그 표면으로부터 잉크를 종이에 짜내어 인쇄하는 방법. 포스터 형광잉크 인쇄 비닐 및 폴리에틸렌 등에 인쇄.

No.5703 · 산림청 원문

실트펜스 微砂冊 · silt fence
표준강도 또는 고강도 여과섬유를 철재 지지펜스에 고정하여 바람에 날아가는 미세한 모래를 포착하는 장치

No.5704 · 산림청 원문

실파공 實播工 · Directseeding works
종자를 뿌려 식물을 키워내는 공법

No.5705 · 산림청 원문

실편 實片 · ovuliferous scale
구과 즉 솔방울과 같은 열매는 크게 포린과 실편 두 부분으로 나뉘는데 그 중에 배주에 붙여 열매를 싸고 있는 조각을 실편이라고 한다. 일부 식물에서는 날개가 달리기도 한다.

No.5706 · 산림청 원문

실행지침 實行指針 · modalities
하나의 협정이 실행될 방식을 규정한 지침을 말한다.

No.5707 · 산림청 원문

실험개체군 實驗個體群 · experimental population
어떤 가설을 검증하기 위하여 실험실내 또는 야외에서 특정한 조건을 주어 인위적으로 설정한 개체군. 자연개체군의 반대어. 또한, 실험 재료유지 등도 포함하여 실내에서 기르는 개체군은 실험실개체군(laboratory population)이라고 불러야 하며 이것은 야외개체군(field population)의 반대어이다.

No.5708 · 산림청 원문

실험계획법 實驗計劃法 · design of experimnet
실험착오(實驗着誤, experimental error)를 적게 하기 위해서 반복(replication 또는 repetition)을 하게 된다. 실험계획에는 윤리성과 객관성이 수반되어야 한다.

No.5709 · 산림청 원문

실험생물학 實驗生物學 · experimental biology
생물에 대한 실험결과를 기초로 하여 법칙을 추출하는 학문을 말한다. 관찰, 계측 등을 기초로 하는 기재생물학의 대응어. 그러나 일찍이 생물학의 방법을 비교적 방법과 실험적 방법으로 구별하였고(특히 19세기 말부터 20세기 초), 이 경우에는 비교생물학의 대응어가 되었다. 단순히 각종의 측정장치를 사용하기도 하고 물리학, 화학의 방법을 적용하기도 한 것은 꽤 오래전부터 생리학에서 실시되었다. 하지만 생물현상의 인과적 분석이라는 목표를 확립한 실험생물학이 생물학의 주류가 된 것은 1880년대 이후에 해당한다.

No.5710 · 산림청 원문

실화 失火 · an accidental fire
방화(放火)와 대비되는 의미로서 사람의 부주의한 실수로 산불을 발생시키는 것을 말한다.

No.5711 · 산림청 원문

실화백 日本絲花柏 · 學 Chamaecyparis pisifera var. filifera
가지가 실과 같이 늘어지는 편백이나 화백나무의 변이종.

No.5712 · 산림청 원문

실효습도 實效濕度 · effective humidity
당일과 전일들의 상대습도에 가중치를 붙인 평균습도를 말하며, 이것은 측정된 값이 아니기 때문에 측정된 습도로부터 계산에 의하여 구하고 적용기간은 당일을 포함하여 5일간의 상대습도로 계산한다.

No.5713 · 산림청 원문

심각등분법 心角等分法 · equal angle disk diameter measurement method
수간해석은 원판을 채취하여 임목의 생장과정을 정밀하게 측정할 목적으로 수행된다. 채취된 원판에 대한 직경생장량의 측정은 보통 단면의 반경은 4방향으로 측정하여 평균하게 되는데, 이때 단면반경의 측정방향을 결정할 때 사용하는 방법 중의 하나가 심각등분법이다. 따라서 심각등분법은 나무의 수(髓, pith)로부터 반경을 서로 직교하게 4방향으로 그어 임령별 직경생장량을 측정하는 방법이다. 심각등분법 이외에 반경의 측정방향을 결정하는 방법으로는 원주등분법과 절충법이 있다. 참조: 원주등분법.

No.5714 · 산림청 원문

심강 心綱 · core of wire rope
심줄과 같은 의미. 와이어로프에서 스트랜드가 에워싸고 있는 중앙에 들어있는 부분을 말하며 이에는 마(麻) 등의 천연섬유, 합성섬유, 가는 와이어로프 등을 사용한다.

No.5715 · 산림청 원문

심거재 心去材 · timber without pith
수부위가 없는 목재.

No.5716 · 산림청 원문

심곡 深谷 · ravine
구곡이 어느 정도 더 진행 발달되어 그 나비가 넓어지고 구곡바닥의 물매가 비교적 완만하게 된 것

No.5717 · 산림청 원문

심근성수종 深根性樹種 · deep-rooted tree species
근단분열조직에서 발달한 1차근 또는 주건(主根)이 깊게 자라고 주근에서 분기한 측근이 수평으로 넓게 자라 근계를 형성한다. 야자나무, 유카리나무는 땅속 15~30m까지 내려간다. 우리나라 적송, 곰솔, 미국의 테다소나무, 루브라참나무, 폰데로사소나무, 아프리카 지역의 아카시아나무(Acasia spp.) 등이 심근성 뿌리를 갖고 건조한 지역에서 비교적 잘 자란다.

No.5718 · 산림청 원문

심벽 心壁 · impervious core wall
댐의 중앙에 넣는 불투수층. 침윤선을 낮추어 대수면이 세굴되지 않도록 한다.

No.5719 · 산림청 원문

심부병균 心腐病菌 · stem rot fungus
나무의 줄기를 썩히는 병균.

No.5720 · 산림청 원문

심사 審査 · screening
골라내는 작업.

No.5721 · 산림청 원문

심성암 深成岩 · plutonic rock
1) 지표면 깊은 곳에서 생긴 화성암이다. 2) 지하 깊은 곳에서 마그마가 서서히 식어 생겨나 입자의 크기가 거친 암석을 가리킨다.

No.5722 · 산림청 원문

심슨 방법 - · Simpson's rule
사다리꼴의 공식은 선형으로 이루어져 있기 때문에 오차값을 줄이기 위해서 2차 보간법을 사용하기 위하여 사용된 공식이다. Riecke공식을 구분구적법(區分求積法)으로 응용한 것이다.

No.5723 · 산림청 원문

심열 心裂 · heartshake
심할(心割). 목재의 수심(髓心)으로부터 외측으로 향해서 갈라지는 열목(裂目).

No.5724 · 산림청 원문

심장저 心臟底 · cordate
식물기관의 아래 부분(주로 엽저를 표현 할 때 쓰임)을 나타내는 말로써 식물기관의 아랫부분이 심장의 윗부분처럼 둥글고 중간이 들어간 형태이다. 피나무의 잎에서 나타나는 모양이다.

No.5725 · 산림청 원문

심장형 心臟形 · heart-shaped
식물의 기관에서 그 모양을 나타내는 말로써 그 모양이 심장처럼 생긴 모양이다. 즉 위쪽은 뾰족하고 아래쪽은 오목하게 들어가 원형인 형태. 피나무, 고깔제비꽃, 수수꽃다리 등이 이 모양에 해당된다. 또한, 반대로 위 아래가 바뀐 상태의 모양을 도심장형(倒心臟形, obcordate)이라고 하며 괭이밥의 소엽에서 볼 수 있는 모양이다.

No.5726 · 산림청 원문

심재 心材 · heart wood
목재의 원주에서 재색이 진한 안쪽부분. 변재와 구별

No.5727 · 산림청 원문

심재부후 心材腐朽 · heartwood rot
임목이나 목재가 목재부후균의 침입을 받아 심재가 선택적으로 부후되는 현상이다.

No.5728 · 산림청 원문

심재부후균 心材腐朽菌 · heartwood rot fungi
목재부후균.

No.5729 · 산림청 원문

심줄 心綱 · core of wire rope
와이어로프에서 스트랜드가 에워싸고 있는 중앙에 들어있는 부분을 말하며 이에는 마(麻) 등의 천연섬유, 합성섬유, 가는 와이어로프 등을 사용한다. 참조: 와이어로프, 스트랜드.

No.5730 · 산림청 원문

심줄박기 現場打工 · slope stabilizing crib works
힘줄박기. 정상적인 큰크리트 블록으로 된 격자틀 붙이기 공법으로는 처리하기 곤란한 사면에 현장에서 직접 거푸집을 설치하고 콘크리트 치기를 하여 사면안정을 위한 뼈대(힘줄)을 만들어 그 안을 작은 돌이나 흙으로 채우고 녹화하는 비탈면 안정공법이다. 힘줄박기의 시공모양에는 사각형, 삼각형, 계단상수평띠의 모양의 틀이 있다.

No.5731 · 산림청 원문

심층풍화 深層風化 · deep weathering
지하수면보다 더 깊은 곳(해저, 호저 등)에 있어서 서서히 풍화되는 것

No.5732 · 산림청 원문

심층화 深層化 · deep stratification
표본을 그 특성에 따라 여러 계층으로 구분하는 것으로 표본의 오차를 줄이는 표본추출 방법이다.

No.5733 · 산림청 원문

심토 深土 · subsoil
포토의 아래에 있는 토양. 이는 경운에 의하여 교란되지 아니하며, 물과 무기양분의 저장장소가 되고 대부분의 뿌리 발달이 표토에서 일어나지만 일부는 심토에까지 뿌리가 자란다. 심토에 불투수성이 있으면 토양이 과도하게 습하게 되어 오히려 식물의 생육에 지장을 주기도 한다.

No.5734 · 산림청 원문

심포지움 - · symposium
특정한 문제에 대하여 두 사람 이상의 전문가가 서로 다른 각도에서 의견을 발표하고 참석자의 질문에 답하는 형식의 토론회이다. 원래 그리스어의 심포시아(symposia: 함께 술을 마시는 것), 심포시온(饗宴, 饗應, symposion)에서 라틴어의 심포지엄(symposium)으로 옮겨진 말이다. 오늘날에는 향연이라는 의미 외에도 화기애애한 분위기에서 진행되는 학술적인 토론회나 그 밖에 신문이나 잡지 등에서 특정한 테마를 놓고 2명 또는 그 이상의 사람들이 각자의 견해를 발표하는 지상토론회의 뜻으로 널리 통용된다.

No.5735 · 산림청 원문

심피 心皮 · carpel
엽상구조로써 암술의 기본 단위이다. 장차 씨앗이 될 배주를 싸고 있는 기본구조를 말한다. 즉, 대포자낭(배주)을 싸고 가장자리가 맞붙은 대포자엽으로 한 개의 단위이다. 발달한 식물군에선 여러 개의 심피가 모여 암술을 이룬다. 꽃의 구조에서 가장 안쪽에 위치하며 1~여러 개의 배주를 포함한다.

No.5736 · 산림청 원문

십문자유전 十文字遺傳 · crisssross inh
어머니의 형질이 아들에게, 아버지의 형질이 딸에게 전해지는 현상.

No.5737 · 산림청 원문

십분위수 十分位數 · decile
변량의 총량을 균등하게 10등분한 것의 임의의 1개의 범위.

No.5738 · 산림청 원문

십자모양꽃 - · -
십자화.

No.5739 · 산림청 원문

십자선 十字線 · cross hair
트랜싯트의 망원경 안에 있는 선. 거미줄, 견사(絹絲), 백금선 등으로 만든다. 십자모(十字毛).

No.5740 · 산림청 원문

십자줄눈 - · through joint
통줄눈.

No.5741 · 산림청 원문

십자화 十字花 · cruciate flower; 십자모양꽃
꽃잎 4장이 마치 좌우대칭, 방사상칭으로 붙어 있어 마치 십(十)자 모양으로 보이는 화관. 꽃잎은 서로 붙어 있지 않으며 일반적으로 그 사이에 꽃받침 잎이 역시 같은 모양으로 달린다. 냉이, 꽃다지 등 십자화과 식물에서 주로 나타나는 특징이다.

No.5742 · 산림청 원문

십장 什長 · foreman
벌목조재사업(伐木造材事業) 또는 운재(運材)같은 것을 할 때 노동자를 감독하고 임금을 지불하는 등 일의 진행을 맡아보는 사람.

No.5743 · 산림청 원문

싸리나무 山萩 · 學 Lespedeza bicolor
전국 산야에 자생하는 3m 높이의 콩과 낙엽성 관목. 잎은 3장이고, 꽃은 7~8월에 자색으로 피고 밀원으로 좋다. 공중질소를 고정하므로 땅을 좋게한다.

No.5744 · 산림청 원문

싸이토진 - · cytogene
세포질유전자. 핵(核)유전자의 지배를 받아 생산되고, 대응하는 기질(基質)이 있는 동안은 자기증식을 하나 유전자가 있어도 기질이 없으면 점점 소실되어 없어지는 세포질중(細胞質中)의 인자.

No.5745 · 산림청 원문

싹 芽 · sprout
발생 중인 눈으로 잎이 보이는 것이다. 자라서 가지와 잎이 나오고 꽃이 피기도 한다.

No.5746 · 산림청 원문

싹트기 發芽 · germination
휴면상태에 있는 종자, 포자, 화분 등이 생장조건이 알맞을 때 생장을 개시하는 과정이다. 휴면상태에 있는 동아나 휴면아(잠아, 액아)가 환경조건의 변화로 눈이 트는 과정에도 해당되지만 주로 종자발아에 많이 사용된다. 종자발아의 첫째 과정은 종자의 휴면타파이다. 종피의 기계적 휴면의 경우 열탕처리, 황산처리(95% 황산에 15분~2시간)에 의하여 종피의 투수성을 높이고, 발아억제물질에 의한 또는 배발육 미숙에 의한 생리적 휴면의 경우 저온처리 또는 저온-고온 반복처리에 의하여 종자휴면을 타파한다. 생리적 휴면의 경우 물의 흡수는 필수적인 과정이다. 건조종자는 저온처리를 받아도 휴면을 타파하지 않는다. 종자발아의 두 번째 과정은 저장영양 물질의 소화이다. 휴면이 타파된 종자는 알맞은 온도, 수분, 광조건(대부분의 수목종자에 있어서 광조건은 필수조건이 아니다)에서 떡잎 또는 배우에 저장된 종자 저장양분(전분, 지질, 단백질)이 식물호르몬에 의하여 활성화되거나 또는 유도합성된 효소의 작용으로 호흡과정을 통해 새로운 생장에 이용할 수 있는 가용성 양분과 에너지원이 된다. 종자발아의 세 번째 과정은 유근의 생장에 뒤따라 지하자엽형 발아(예: 참나무류)의 경우 상배축(epicotyl)이 자라고 또는 지상자엽형 발아(예: 소나무류)의 경우 하배축(hypocotyl)의 생장이 이루어지고, 뒤따라 1차본엽의 생장이 계속된다. 휴면상태에 있는 동아(冬芽)도 겨울동안 저온처리를 받아 휴면이 타파되어야 발아가 가능하다. 기부에 있는 잠아나 액아는 주지(主枝) 또는 정아(頂芽)가 피해를 받았을 때 발아가 되는데 이는 정아에서 고농도 옥신에 의하여 발현되는 정아우성의 작용이 없어졌기 때문이다.

No.5747 · 산림청 원문

싹틈 發芽 · germination
싹트기, 발아

No.5748 · 산림청 원문

쌍꼬리 雙尾 · cercus
배의 제일 끝마디의 부속지(附屬肢)로서 공기의 흐름을 탐지하는 감각털이 집중적으로 모여 있지만(바퀴), 가위모양으로 변형된 경우도 있다(집게벌레).

No.5749 · 산림청 원문

쌍떡잎식물 雙子葉植物 · dicotyledon; 쌍자엽식물
피자식물중에서 배(胚)에서의 떡잎(자엽) 수가 2장인 종류. 이러한 떡잎의 수가 식물분류에서 계통을 나누는 큰 특징이 되기도 하는데, 이러한 분류는 16세기 이미 알려졌으나 1789년 A. L. de Jussieu에 의해 처음 분류군으로 인정되었다. 쌍떡잎식물은 외떡잎식물에 비해 떡잎의 수가 2장, 잎 주맥의 대부분 그물맥이며 진정중심주를 가지고 있는 등의 특징이 있다.

No.5750 · 산림청 원문

쌍무협정 雙務協定 · bilateral negotiation
UR협상처럼 여러 국가들이 동시에 협상을 하는 다자간협상과는 달리 이해 관련 당사국 2개국이 벌이는 통상협상을 말한다.

No.5751 · 산림청 원문

쌍부자 雙浮子 · twin float
이중부표.

No.5752 · 산림청 원문

쌍사기 雙絲期 · diplotene stage
복사기(複絲期). 감수분열의 제1분열 전기에 있어서 파키텐기에 이어지는 시기로 밀착한 두 개의 상동염색사의 분리가 시작 되면서부터 염색분체가 기질을 증가시켜 나선상으로 꼬여 짧아지기까지의 시기. 제일1열전기인 세사기, 접합사기, 태사기에 잇따른 시기.

No.5753 · 산림청 원문

쌍안경 雙眼鏡 · binocular
망원경. 두 개의 망원경의 광측을 평행하게 나열하여 두 눈으로 동시에 원경을 확대하여 보는 광학기계. 배율은 보통 7~8배로서 입체감이나 원근의 식별성이 강함. 갈릴레오식 · 프리즘식 등이 있음. 양안경(兩眼鏡).

No.5754 · 산림청 원문

쌍자엽류 雙子葉類 · dicotyledones dico
피자식물(被子植物) 안에 있어서 단자엽류(單子葉類)에 대한 말.

No.5755 · 산림청 원문

쌍자엽식물 雙子葉植物 · dicotyledon
쌍떡잎식물. 피자식물에 속함. 2장의 자엽과 개방유관속의 줄기, 잎은 우상맥이고 뿌리는 직근계로 생장점은 식물에의 위쪽에 자리한다.

No.5756 · 산림청 원문

썩은 낙엽더미 半腐殖質 · duff
낙엽, 초본식물 그리고 썩은 나무로 구성된 광물질 토양 바로 위에 부분적으로 재구성된 유기물질 층을 말한다.

No.5757 · 산림청 원문

썩은 옹이 朽節 · rotten knot
목질부내에 가지의 흔적이 썩은 것이 남아 있는 것으로, 목재에서 빠져서 구멍이 생긴다.

No.5758 · 산림청 원문

썰매 - · sled
겨울 목재운반에 쓰인다.

No.5759 · 산림청 원문

썰매운재 運材 · sledging
썰매로 목재를 운반하는 것.

No.5760 · 산림청 원문

쐐기 楔 · wedge
벌목작업에 있어서 주로 벌도방향의 결정과 안전작업을 위하여 사용되는 도구

No.5761 · 산림청 원문

씨 種子 · seed
고등식물에서 배주(胚珠)가 수정된 후 성숙하여 만들어 진 것. 포자를 생산하는 하등식물과 비교할 때 더욱 효율적인 방법으로 다음 세대를 이어주고 생존시키는 수단이 된다. 씨는 식물의 축소형이라고 할 수 있는 배(胚), 배유(胚乳)를 포함한 저장물질 및 가장 바깥쪽에서 건조, 물리적인 피해, 미생물 및 곤충 등의 침입으로부터 보호해주는 종피(種皮)로 구성되어 있다. 배는 다시 1개 이상의 떡잎, 유아(幼芽), 유근(幼根) 등으로 구성되어 있으며 나무의 종류에 따라 크기가 다르다. 또한 씨에는 떡잎에 저장물질이 있는 경우 배유가 없는데 이를 무배유종자(exalbuminous seed), 배의 주변조직에 배유를 가지고 있는 것을 배유종자(albuminous seed)라고 한다. 종피의 표면상태에 따라 분류학적인 특징이 되기도 하는데 날개모양의 털이 있기도 하고 주목처럼 가종피(aril)가 있는 경우도 있다. 씨에는 여러 에너지원이 저장되어 있는데 나무의 종류마다 달라서 밤나무나 참나무류는 탄수화물이 현저히 높고 나자식물의 경우에는 지방이나 단백질이 많다. 그밖에 아미노산, 무기염, 인산화합물 등 다양하게 함유되어 있어 식물이 자라 광합성을 하기전까지 양분으로 이용된다. 씨는 성숙함에 따라 휴면상태로 들어가는 경우도 있고 수분, 온도. 빛 등의 조건이 갖추어지면 배가 생장을 시작하여 종피를 뚫고 나오게 된다.

No.5762 · 산림청 원문

씨받이숲 菜種林分 · seed production stand
잠정채종원. 채종 임분

No.5763 · 산림청 원문

씨방 子房 · ovary
피자식물의 암술에서 배주(胚珠)를 가지고 있는 자루모양의 기관. 수정 후에 발달하여 과실이 되고 그 안의 배주는 씨가 된다. 암술은 그밖에 암술머리와 암술대로 구성되어 있다. 씨방은 몇 개의 심피

로 구성되어 있느냐에 따라 구분되기도 하는데 하나의 심피로 된 것은 일심피자방(monocarpellary ovary)이라 하며 콩과식물이 이에 속하고 배주가 달리는 위치에 2개의 유관속을 볼 수 있다. 두 개의 심피가 연결되지 않고 각각의 씨방을 만든 것을 이심피자방(liberate ovary)이라고 하며 미나리아재비, 작약 등이 이에 속한다. 또한, 여러 개의 심피에 의해 하나의 씨방이 구성되는 것을 합생자방(coalescent ovary)이라고 한다. 씨방 벽에 붙어 있는 배주의 자루를 주병(funiculus)이라고 하고, 그 부착부위를 태좌(placenta)라고 한다. 태좌의 위치에 따라 중축태좌(axis p.), 측벽태좌(parietal p.), 독립중앙태좌(free central p.), 기저태좌(basal p.)로 구분하며 분류군을 나누는 중요한 특징이 된다. 씨방과 꽃의 다른 기관과의 상대적인 위치에 따라 3가지 유형으로 구분하는데 (1) 십자화과, 용담과 등과 같이 씨방이 화피나 수술보다 상부에 있을 때에는 자방상위(superior ovary), 국화과, 박과 등과 같이 씨방이 하부에 있을 때에는 자방하위 (inferior ovary), 씨방의 중간에 있을 경우에는 반하위자방(half-inferior ovary)로 구분한다. 그밖에 벚나무처럼 화피가 씨방에서 떨어져 있을 경우에는 주위자방(perigyny)이라고도 한다.

No.5764 · 산림청 원문

씨뿌리기 直播工 · direct seeding works

종자를 사면에 직접 뿌리기. 씨뿌리기 전에 조건에 맞는 것을 가릴 수 있도록 풍구로 불리거나 소금물에 담가 고르고 소독도 한다. 또한, 싹이 빨리 트도록 씨앗을 물에 담그기도 한다. 종자를 하루쯤 물에 담가 두어 싹트기에 필요한 수분을 흡수한 것 또는 싹이 트기 시작한 것을 뿌리기도 한다. 흩어뿌리기, 줄뿌리기, 점뿌리기가 있다.

No.5765 · 산림청 원문

씨뿜어붙이기 種子吹付工 · hydroseeding measures

종자, 비료, 토양안정제, 색소를 섞어서 뿜어붙여 녹화하는 공법. 기계화 시공이 가능한 도로변의 대면적 시공에 적합하다.

No.5766 · 산림청 원문