산림임업용어사전 — ㅇ (1/2)

← 목차 · 1,121개 용어 · 아고산대 ~ 위성화상

아고산대 亞高山帶 · subalpine zone
수직분포대의 하나로 산지대와 고산지대 사이에 있는 수목한계선의 바로 아래 부분을 말한다. 우리나라에서는 사스레나무, 가문비나무, 잎갈나무 등이 자란다.

No.5767 · 산림청 원문

아교 膠 · glue
동물성 단백질을 원료로 하는 접착제.

No.5768 · 산림청 원문

아그배나무 棠梨 · 學 Malus sieboldii
중부이남에 분포한다. 꽃은 처음에는 홍색이나 뒤에 백색으로 된다.

No.5769 · 산림청 원문

아극상 亞極相 · subclimax
불안정기라고도 한다. 진정한 극상군락(極相群落)에 도달하기 이전의 단계에 있고 겉으로 안정군락을 만들고 있는 듯이 보이는 상태.

No.5770 · 산림청 원문

아날린 - · aniline
CHNH2. 일명 아미노벤젠. 냄새있는 무색의 액체. 염료의 원료.

No.5771 · 산림청 원문

아네로이드기압계 氣壓計 · aneroid barometer
액체를 사용하지 않는 기압계로서, 기압의 변화에 따른 수축과 팽창으로 공합(空盒, 금속용기)의 두께가 변하는 것을 이용하여 기압을 측정한다.

No.5772 · 산림청 원문

아닐린블루액 - · anilinblue solution
아날린 블루의 1% 알코올 용액을 이용한다. 세포벽을 청색으로 염색한다.

No.5773 · 산림청 원문

아데노신 - · adenosine
침상결정(針狀結晶). CHO4N + 1.5 H2O. 생체의 반응에 주요한 작용을 한다.

No.5774 · 산림청 원문

아데닌 - · adenine
장(臟)등의 동물조직 또는 차엽(茶葉)에서 발견되는 염기. 핵산(核酸)의 일부를 형성한다.

No.5775 · 산림청 원문

아동유원 兒童遊園 · playground for small
아이들 본위의 공원으로서 보건과 놀이터를 주는데 있고 아이들이 길가에서 노는 위험성을 막기 위한 것이다.

No.5776 · 산림청 원문

아드솔 - · adsol
건조제의 일종. 산성백토를 가공해서 얻은 분말 또는 봉상(棒狀)의 것. 그 중량의 25~35%의 수분을 흡수한다. 200℃ 가량의 열로 처리해서 반복사용할 수 있다.

No.5777 · 산림청 원문

아라비노갈락탄 - · arabinogalactan
갈락토오스와 아라비노오스가 축합된 다당류의 일종으로 낙엽송재에 많다. 냉수로 추축되므로 헤미셀룰로오스의 부류가 아닌 목재 추출성분이다.

No.5778 · 산림청 원문

아라비노오스 - · arabinose
C5H10O5. 펜토스의 일종. 자연계에 널리 분포하며 특히 이 물질과 축합한 아라비난의 형으로 존재하는 것이 많다. 감미를 갖으며, 에탄올로 발효되지 않고 D,L 2종의 이성체가 있으나 자연계에는 D형이 많다.

No.5779 · 산림청 원문

아랫입술 下脣 · labium
구기를 구성하는 한 부분으로서 곤충에서는 작은턱 바로 뒷마디의 양부속지가 융합한 것이며 후기절(後基節)과 전기절(前基節)로 양분한다. 아랫입술수염이나 그 밖의 아랫입술을 움직이는 근육은 전기절에 붙어 있다. 전기절의 기부부근에서 1쌍의 아랫입술수염이 생기며 이것은 1~4절로 되어 있으나 보통 4절이다. 전기절의 끝에 2쌍의 순설(脣舌)이 있는데 바깥쪽의 1쌍을 측설(側舌)이라 하고 안쪽의 1쌍을 중설(中舌)이라 한다.

No.5780 · 산림청 원문

아로몰포시스 - · aromorphosis
진화에 있어서 큰 계통(포유류, 곤충류 등)의 새로운 체제(독 Bauplan)의 형성은 다소 비약적으로, 그리고 빠른 속도로 이루어졌다고 믿고 Sewertzoff는 이것을 aromophosis라고 말했다. 이와 같이 해서 생긴 체제가 제종의 생활환경에 점차로 적응하고 분기해 가는 과정을 개별적응이라 했다.

No.5781 · 산림청 원문

아르 - · are
면적의 단위. 기호 a. 1a = 100㎡.

No.5782 · 산림청 원문

아린 芽鱗 · bud scale
눈이 형성될 때 제일 먼저 만들어지며 눈을 보호하고 양분을 저장하는 역할을 한다.

No.5783 · 산림청 원문

아릴기 - · **aryl group**
방향족탄화수소(方向族炭化水素)의 핵으로부터 수소 1원자를 제거한 잔기의 총칭. 예, 벤젠 Benzen C H - . 나프탈릴부터 나프칠기 C H - 등의 아릴기가 유도된다.

No.5784 · 산림청 원문

아마인유 亞麻仁油 · **linssed oil**
아마(Linum usitatissimum)의 종자를 압착(壓搾)해서 얻어지는 건성지방유(乾性脂肪油). 비중 0.91~0.94. 공기중에 두면 탄력성이 있는 내수성 반투명의 리노티신을 만든다. 페인트, 와니스, 인쇄잉크, 유지(油紙)등의 제조에 쓰인다.

No.5785 · 산림청 원문

아미노 - · **amino**
아미노(amino)라고도 한다. 1가의 기 -NH_2.

No.5786 · 산림청 원문

아미노산 - · **amino acids**
단백질을 만들 때 중합되는 기본 단위의 총칭. 단백질에서는 일반적으로 20개의 아미노산이 발견된다. 각 아미노산은 알파 카본이라는 중앙 탄소원자에 하나의 수소원자, 하나의 아미노기(-NH2), 하나의 카복실기(-COOH)가 붙어있고 R로 표시되는 측쇄를 가지고 있다. 물에서는 카복실기가 녹아서 수소 이온이 떨어져 나갈 수 있으며 염기인 아미노기는 수소 이온 하나를 받아 들일 수 있다. 따라서 하나의 분자에 +기 하나와 -기 하나를 가질 수 있다.

No.5787 · 산림청 원문

아미노알코올 - · **aminoalcohol**
일명알카민. 알콜과 아민을 합한 화합물의 총칭.

No.5788 · 산림청 원문

아미드 - · **amide**
산의 OH가 NH2기로 치환된 것.

No.5789 · 산림청 원문

아미드식물 아미드植物 · **amide plant**
과잉으로 흡수 · 축적된 암모니아의 대부분을 아스파라긴과 같은 아미드로 변화시킴에 따라서, 암모니아의 독을 제거하고 있는 것으로 생각되는 식물을 말한다. 그러나 산성식물과의 구별은 그다지 명확하지가 않다. 소위 전형적인 아미드식물(콩류)이라도 아미드/암모니아의 값은 상당한 변동이 있으며, 특히 세포액의 산도가 클수록 변동은 심하다.

No.5790 · 산림청 원문

아민 - · **amine**
암모니아 NH_3의 수소원자를 탄호수소기로 치환한 화합물.

No.5791 · 산림청 원문

아밀 - · **amyl**
1가의 기. C H -. Am의 약어를 쓴다.

No.5792 · 산림청 원문

아밀알코올 - · amyl alcohol
C H OH. - 일명 펜타아르. 8종의 이성체가 있다. 비점은 102 ℃ ~ 137℃.

No.5793 · 산림청 원문

아배양 芽培養 · shoot tip culture, bud culture
액아 또는 정아를 배양하여 식물을 클론으로 증식하는 방법. 이 방법은 보통 액아에 줄기원기가 포함되어 있는 식물의 증식에 쓰인다. 세포배양, 캘러스 배양 등에 비하여 유전적으로 안정하여 체세포변이가 일어날 확률이 적다. 보통 이 방법은 치상, 줄기유도, 발근 유도의 3단계로 구성되며 각 단계별로 다른 생장조절물질을 배지를 첨가한다.

No.5794 · 산림청 원문

아베나굴곡시험법 屈曲試驗法 · Avena curvature test
Went(1928)가 창안하고 그 뒤 많은 연구자가 개량을 한 오키신 정량법. 표준아베나 테스트 또는 단순히 아베나 테스트라고도 한다. 가장 널리 이용되고 있다.

No.5795 · 산림청 원문

아베나신장생장시험법 伸張生長試驗法 · Avena straight growth test
Avena 자엽(子葉)초의 신장대의 신장생장이 오키신 농도에 비례하는 성질을 이용한 식?O생장 호르몬측정법. Avena 절편법. Avena 원통법이라고도 한다. Avena 굴곡시험법처럼 Avena의 황화유묘(黃化幼苗)를 만들어 시험한다.

No.5796 · 산림청 원문

아베나테스트 - · Avena test
Avena sativa의 자엽(子葉)초의 생장반응을 이용한 auxin의 정량법.

No.5797 · 산림청 원문

아복접 芽服接 · chip budding
접아(接芽)의 안쪽에 목부를 남겨두고 대목의 접목부위에 삭면(削面)을 만들 때 그 조직의 일부를 제거해서 접수의 삭면에 합치하도록 하는 아접법(芽接法). 대목의 껍질이 잘 벗겨지지 않을 때 적용.

No.5798 · 산림청 원문

아브네이레블 - · Abney level
아브네이측고기.

No.5799 · 산림청 원문

아브네이측고기 아브네이測高器 · Abney hand level
아브네이측고기는 본래는 물리학에서 일반구조물의 높이를 측정하는데 사용되는 기구로 가볍고 구조가 간편하며 쉽게 사용할 수 있어서 수고측정에도 많이 사용되며 비교적 좋은 결과를 보여준다. 이 측고기의 구조는 길이 15cm, 1변의 길이 1.5cm의 4각형으로 된 상자에 수준기, 고저 분도환과 수준기조정 손잡이가 부착되어 있으며, 상자의 한쪽에는 시준공이 있어 이를 통하여 목표물을 시준할 수 있게 되어있다. 사용방법은 나무의 초두부(梢頭部, tip)를 시준공을 통하여 시준하면 통 내부의 반사경에 의하여 수준기의 기포를 수평위치에 오도록 수준기조정 손잡이를 조정하여 수준기의 기포축과

시준선이 이루는 각이 분도환에 나타나게 한다. 이때 분도환의 각을 표시하면 고저각을 표시할 수 있으나 탄젠트로서 표시하면 수직거리 즉, 수고를 측정할 수 있다. 수고를 측정하고자 할 때에는 나무의 초두부와 근부(根部)에서 읽은 수치를 합하면 된다. 이때 기구의 눈금은 탄젠트를 %로 표시하고 있기 때문에 순또측고기의 원리와 같이 만약 100m 전방에서 측정하면 분도환에서 가리키는 수치가 바로 수고가 되며 20m 전방에서 측정하였다면 분도환에서 기리키는 수치에 1/5를 곱해줌으로써 수고를 측정할 수 있다.

No.5800 · 산림청 원문

아브시스산 - · abscisic acid
고등식물의 노화, 낙엽 낙과 낙화 발아억제 등에 관련된 생장조절물질.

No.5801 · 산림청 원문

아삽 芽揷 · bud cutting
눈꽂이. 눈과 일부 조직을 삽수처럼 이용하여 발근시켜 완전한 식물체를 키워내는 삽목의 한 종류.

No.5802 · 산림청 원문

아생생식 芽生生殖 · bud reproduction]
(설명 없음)

No.5803 · 산림청 원문

아성대토양 芽成帶土壤 · intrazonal
→ 성대토양(成帶土壤).

No.5804 · 산림청 원문

아세나프텐 - · acenaphthene
C H . 무색의 결정체. 융점 95℃. (네이브)산화하면 나프탈산으로 변함(1.8- ethylene naphthalene).

No.5805 · 산림청 원문

아세톤 - · acetone
CH3COCH3. 냄새있는 무색의 액체.

No.5806 · 산림청 원문

아세톤알콜 - · acetonealcohol
CH_3COCH_2OH. 무색의 액체. 비점 145 ~ 146℃.

No.5807 · 산림청 원문

아세톨 - · acetoll
아세톤 알콜과 같음.

No.5808 · 산림청 원문

아세트니트릴 - · acetonitrile
CH_3CN. 사이안화메칠(틸)이라고도 한다. 에테르 비슷한 향기가 나는 무색의 액체.

No.5809 · 산림청 원문

아세트아미드 - · acetamide
무색의 침상결정. 물과 알콜에 잘 녹는다. CH_3CONH_2.

No.5810 · 산림청 원문

아세트알데히드 - · acetaldehyde
CH_3CHO. 단순히 알데히드라고도 한다. 자극적인 냄새를 가지는 무색의 액체.

No.5811 · 산림청 원문

아세트초산 醋酸 · acetoacetric acid
$CH_3CO \cdot CH_2COOH$. 불안정하고 탄산가스를 잃어서 아세톤으로 되기 쉽다.

No.5812 · 산림청 원문

아세트초산에틸 - · ethyl acetoacetate]
$CH_3CO \cdot CH_2COOC_2H$. 방향이 있는 무색의 액체.

No.5813 · 산림청 원문

아세틸 - · acetyl
1가의 acyl기 CH_3CO-. 초산으로부터 유도된다.

No.5814 · 산림청 원문

아세틸렌 - · acetylene
HCCH. 아세칠(틸)렌렬 탄화수소중 가장 간단한 것.

No.5815 · 산림청 원문

아세틸화 化 · acetylation
유기화합물의 수소기 OH, 아미노기 NH2 등의 수소원자를 아세칠(틸)기 CH_3CO -로써 치환하는 것.

No.5816 · 산림청 원문

아소스측고기 - · Aso's hypsometer
아소스측고기는 사거리(斜距離)를 측정하여 한 번의 측정에 의하여 나무의 높이를 구할 수 있는 장점이 있는 측고기이다. 그림에서 보는 바와 같이 아소스측고기의 구조는 와이제측고기와 비슷하지만 원통형의 자에는 사거리를, 자 B에는 입목의 높이를 표시했고, 자 B를 수직이 되도록 하기 위하여 추가 달려 있다. 아소스측고기를 사용하여 수고를 측정하고자 할 경우에는 테이프로 사거리를 측정하여 자 B의 위치를 A에 정한다. 그리고, E에서 A를 통하여 나무 밑을 보아 A를 맞추고 추로 B자를 수직이 되게 한 다음 나무의 꼭대기를 시준하여 F를 시준선 상에 들어가게 할 때, F가 가리키는 곳을 읽으면 수고를 얻을 수 있다. 그리고, 시준선이 나무의 밑을 시준할 수 없을 때에는 나무 밑에 폴(pole)을 세우고 폴을 보아 A를 맞추고 수고를 측정한 후 폴의 길이를 가산하여 나무의 높이를 구하는 경우도 있다.

No.5817 · 산림청 원문

아스베스트 石綿 · asbestos
석면

No.5818 · 산림청 원문

아스티친틴 - · astatine
At, 원자번호 85. 할로겐족원소의 하나.

No.5819 · 산림청 원문

아스파라긴 - · asparagine
아스파라긴산의 모노아미드에 상당한다. CH_2CONH_2

No.5820 · 산림청 원문

아스파라긴산 - · asparaginic acid
α-아미노산의 하나. 아스파라긴산은 단백질로 포함되어 있고 무색사방판상결정(無色斜方板狀結晶).

No.5821 · 산림청 원문

아시아개발은행 아시아開發銀行 · Asia Development Bank, ADB
아시아 지역의 경제성장과 경제협력을 증진하고, 지역 내 개발도상국의 경제개발을 촉진하기 위하여 설립되었다. 1963년 아시아극동 경제위원회(ECAFE: 아시아태평양경제사회위원회의 전신) 각료회의에서 구상이 제안, 1965년 12월 필리핀의 마닐라에서 설립 협정에 조인, 1966년 12월 활동을 개시하였다. 주요활동은 모든 회원국에 대한 대출, 기술원조, 실태 조사, 특정 프로젝트에 대한 융자 등이며, 1990년 후반에 이르러 석유 위기에 의한 회원국의 무역수지 악화를 줄이기 위한 긴급융자가 늘어가고 있다. 개발자금의 공여 등을 통하여 이 지역에서의 임업발전에도 깊게 관여하고 있다. ADB에서는 최근 지역사회에 필요한 생활용 목재나 사료의 수요를 충당하기 위하여 사회임업이나 벌채적지, 척악임지, 황폐유역 등의 조림에 심혈을 기울이고 있다. 활동에 필요한 비용의 재원은 일반재원으로는 자본금 및 차입금이 있다. 차입금은 아시아개발은행채의 발행에 의하여 이루어진다. 그밖에 다목적 특별기금, 기술원조 특별기금 및 1974년 6월에 발족한 아시아개발기금(Asian Development Fund, ADF)의 3가지 특별기금이 있다. 가맹국의 별도 각출금과 각 국의 납입자본 중 10%를 재원으로 하고 있다. 1999년 현재 각 국에 50억 달러를 빌려주었으며, 기술적 지원금은 1억 7300만 달러에 이른다. 참가국은 1999년 현재 한국을 비롯한 역내 41개 국, 역외 16개국이다. 최고정책기관인 총회와 업무운영 관리기구인 이사회 및 총회가 선출하는 총재와 그 지휘하의 업무부문으로 구성된다. 본부는 마닐라에 있으며, 도쿄, 프랑크푸르트, 워싱턴 D.C.에 대표사무소가 있다.

No.5822 · 산림청 원문

아시아유럽 정상회의 아시아유럽 頂上會議 · Asia-Europe Meeting, ASEM
아시아 10개국과 유럽연합(EU) 15개 회원국의 국가원수 또는 정부수반과 EU 집행위원장이 모여서 2년에 한 번씩 개최하는 아시아 유럽정상회의를 말하며, 다양한 분야의 협력을 추진하기 위하여 외무, 경제, 재무장관회의 등 각료회의가 정상회의가 열리지 않는 해에 열리며 고위관리회의(SOM)를 수시로 개최하여 정상회의시 합의된 사항을 이행하기 위한 후속조치를 협의한다. 제1차 정상회담이 1996.3. 방콕에서 개최된 이후 1998.4. 런던에서 제2차 정상회담이 열렸으며, 2000년 제3차 회담은 우리나라 서울에서 10월 19일부터 21일까지 개최되었다.

No.5823 · 산림청 원문

아시아자유무역지대 아시아自由貿易地帶 · ASEAN Free Trade Area, AFTA
가장 초보적인 경제통합단계로서 아세안 회원국들간의 교역시 제한적 품목에 대한 관세인하 및 수량제한을 철폐하기로 한 지역 경제통합체를 말한다. 가공 농산물을 포함한 모든 공산품을 관세인하 및 수량제한 철폐 대상 품목으로 하면서 1993년부터 본격적인 관세인하 조치를 시작하였으며 2003년을 최종 실현시키기로 하고 있다.

No.5824 · 산림청 원문

아시아태평양 경제협력체 아시아太平洋 經濟協力體 · Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC

APEC은 1960년대말 이래 PBEC(태평양경제협의회), 1980년대초 PECC(태평양 경제협력위원회)를 기원으로 하여 1970~1980년대 아 · 태경제의 고도성장에 따라 지속적 경제활력유지 및 심화되는 상호 의존관계의 효율적 관리 필요성이 대두되고, 국제경제환경의 급격한 변화와 불확실성에 효율적으로 대처하기 위한 지역차원의 상호협의 및 공동대응이 필요함에 따라 1989년 1월 호크 호주 수상이 아 · 태지역 경제협력기구 창설제안, 1989년 11월 개최된 제1차 APEC 각료회의(캔버라)에서 설립되었다. 그동안 APEC의 연혁을 살펴보면 다음과 같다. ▶ 1989. 11월 제1차 아태 각료회의(호주 캔버라): 한국, 미국, 일본 및 ASEAN 6개국 등 12개국 대표 참가 ▶ 1990. 7월 제2차 각료회의(싱가포르): 각료회담 정례화에 합의 ▶ 1991. 11월 제3차 각료회의(서울): 중국, 대만, 홍콩 신규 가입 및 APEC의 원칙, 대상, 조직 등을 규정 ▶ 1992. 9월 제4차 각료회의(방콕): 싱가포르에 상설 사무국 설치 합의(1993년 2월) ▶ 1993. 11월 제5차 각료회의 및 제 1차 정상회의 (시애틀): 멕시코, 파푸아 뉴기니 신규 가입: EU에 UR 합의 촉구 ▶ 1994. 11월 제6차 각료회의 및 제 2차 정상회의(보고르): 칠레 신규가입으로 모두 18개 회원국: 자유화 완료 시한을 선진국은 2010년, 개도국은 2020년으로 합의한 보고르 선언 발표 ▶ 1995. 11월 제7차 각료회의 및 제3차 정상회의(오오사카): 보고르 선언의 구체적 실현을 위한 행동지침 (Action Agenda)을 채택하는 오오사카 선언발표; 무역자유화의 대상은 국가별 경제발전 수준의 다양성을 인정하여 '신축성'을 부여하기로 합의 ▶ 1996. 11월 제8차 각료회의 및 제4차 정상회의(수빅): 오오사카 행동지침에 이어 '무역자유화 및 원활화(MAPA)'에 대한 구체적 실행계획을 발표하고 자발적 조기자유화 합의 ▶ 1997. 11월 제9차 각료회의 및 제5차 정상회의(벤쿠버): 자발적 조기자유화 대상분야를 확정하고 우선 추진분야 (9) 및 추가검토분야 (6)로 나누어 논의키로 합의 ▶ 1998. 11월 제10차 각료회의 및 제6차 정상회의 (쿠알라룸푸르); 자발적 조기자유화 대상분야중 임산물 등 우선추진분야 9개 분야에 대하여 1999년부터 이행하려던 당초 계획이 무산되고 1999년도에도 계속 논의하되 WTO 협상과 연계토록 합의 ▶ 1999. 6월 APEC 통상장관회의(오클랜드): 농산물은 WTO 차기 농산물협상에서 다룬다는 우리입장을 반영시킨 고위급회의 의장보고서와 통상장관회의 선언문을 이끌어 냈다. 선언문의 주요 골자는 '조기자유화 6개 분야중 농산물 2개분야는 WTO에서 합의한 일정에 따라 2000년부터 시작되는 차기협상에서 논의하되 WTO는 그 동안의 노력을 주목하며, 이러한 노력을 파기협상에서 고려할 것을 요청한다'로 이루어져 있다. ▶ 1999. 9월 APEC 정상회의(오클랜드): WTO 내에서 새로운 무역협상의 출범을 지지. 우리나라는 1989년 출범당시 호주와 함께 APEC 창설을 주도하였고, 각종 APEC 활동에 적극적으로 참여해 오고 있으며, 1991년 제3차 각료회의를 서울에 유치하여 서울선언을 채택하고 역내의 주요경제지역인 중국, 대만, 홍콩의 가입을 성사시켜 APEC 발전의 토대를 구축하였다. 1993년 시애틀 지도자회의에서 제 2차 APEC 지도자 회의 개최를 제의, 연례화시킴으로써 APEC 강화 발전에 기여하였으며 1994~1995년 CTI 의장국으로서 자유화 및 경제협력과제에 대한 세부분야별 구체적 활동계획을 마련하는데 기여하였다. ▶2005년에는 우리나라에서 제13차 APEC 정상회의가 개최되기도 했다.

No.5825 · 산림청 원문

아시아태평양경제사회이사회 아시아太平洋經濟社會理事會 · Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP

ESCAP(아시아 태평양 경제사회위원회)은 1947. 3월 UN 경제사회이사회 결의에 의거 ECAFE(아시아 극동경제위원회)로 발족하였으나 1974. 8월 ECAFE 총회에서 ESCAP으로 개명되었다. ESCAP은 역내 제국의 경제재건과 발전을 위한 협력을 촉진하고, 경제적 기술적 문제를 조사하여 연구사업을 실시하거나 원조하고, 역내 경제문제에 관하여 UN 경제사회이사회를 보좌할 목적으로 설립되었

다. 현재 정회원국은 역내국가 43개국과 역외국으로 미, 영, 불, 화란, 러시아 등 5개국을 포함하여 48개국이며, 10개국의 준회원국을 가지고 있다.

No.5826 · 산림청 원문

아시아태평양임업회의 아시아태평양임업회의 · Asia Pacific Forestry Commission, A.P.F.C.
제5회 FAO 총회의 의결(1949)에 의해 설치된 국제기구. 목적은 아시아태평양지역에서 임업정책의 책정과 그 실시에 관한 조언과 권고 정보교환, 기술적문제에 관한 조언과 권고를 한다. 구성원은 호주, 버어마, 스리랑카, 프랑스, 인도, 인도네시아, 일본, 한국, 라오스, 말레이시아, 네팔, 뉴질랜드, 파키스탄, 필리핀, 포르투칼, 태국, 미국, 베트남이며 옵저버로서 영국이 있다.

No.5827 · 산림청 원문

아시이 科 · aceae
분류에 있어서 과명(科名)의 끝에 붙이는 어미. 몇 가지예외가 있다. Palmae, Leguminosae, Gramineae, Compositae, Umberliferae. Gramineae, Compositae, Umberliferae.

No.5828 · 산림청 원문

아실 - · acyl
카보실산(carboxylic acid)의 카보키실산 -COOH의 OH기를 제거한 잔기. 에. 아세칠(틸)CH_3CO-, CO-, 프로피오닐 C_2H CO-. CH_3CO-, CO-, 프로피오닐 C_2H CO-.

No.5829 · 산림청 원문

아에 綱 · ae
분류에 있어서 강(綱)에 붙이는 어미.

No.5830 · 산림청 원문

아연 亞鉛 · zinc
미량요소의 하나로서 고등식물에서는 아연이 결핍하면 잎에 병반이 나타나고 그반점은 엽맥을 넘고 나중에는 주맥에 이르는 것이 그 특징이다. 또한 아미노산의 일종인 tryptophan의 생산에 관여함으로서 부수적으로 이 아미노산으로 만들어지는 식물호르몬인 auxin 생산에 관여한다. Zn, 원자번호30, 원자량 65,38.65,38.

No.5831 · 산림청 원문

아열대우림 亞熱帶雨林 · subtropical rain forest
열대와 온대 사이의 지대로서 기온에 의하여 정의할 때에는 여름에 고온이 되고 겨울에는 극단적인 저온이 없는 지대인 아열대의 난온대 다우지방(多雨地方, 연강수량 1,300mm이상)에서 발달하는 상록활엽수림이다. 열대다우림의 고위도쪽에 분포하고, 대륙동안(大陸東岸)에 형성되며, 상록활엽수림과 거의 같다고 생각해도 무방하다. 멕시코북부, 플로리다 남부, 브라질 남부, 뉴질랜드 북부, 중국 동남부, 대만, 일본의 오키나와, 큐슈남단, 오가사하라아제도 등에서 볼 수 있다.

No.5832 · 산림청 원문

아염소산 亞鹽素酸 · chlorous acid
$HCLO_2$. 수용액으로서 알려지고 있다. $HCLO_2$.

No.5833 · 산림청 원문

아염소산염 亞鹽素酸鹽 · chlorite
M^1CLO_2(M^1은 1가의 금속).

No.5834 · 산림청 원문

아왜나무 珊瑚樹 · 學 Viburnum awabuki
상록활엽소고목, 잎은 전체 녹색이며 혁질, 꽃은 원추화서, 화관은 백색, 열매는 늦여름에 흑색으로 익는다. 제주도에 분포.

No.5835 · 산림청 원문

아우점종 亞優占種 · subdominant species
이차적인 뜻을 가진 우점종. 따라서 족속종의 하나.

No.5836 · 산림청 원문

아웃소싱 外部調達 · outsourcing
기업이 생산 · 유통 · 포장 · 용역 등 업무의 일부분을 기업 외부에서 조달하는 것을 말한다. 미국기업이 제조업 분야에서 활용하기 시작해 경리 · 인사 · 신제품 개발 · 영업 등의 분야로 확대되고 있다. 이는 회사 업무의 일부를 축소하여 인원절감과 생산성향상이라는 일석이조의 효과를 가능하게 한다. 전문가들이 지적하는 아웃소싱을 하는 이유는 ① 기업이 업무나 기능을 자체적으로 제공 · 유지하기에는 수익성 부족이 야기되는 경우, ② 조직 내부갈등을 해결하기 위해 제3자에게 문제를 위임하는 경우, ③ 내부적인 전문성은 없지만 당장 그 기능이 필요해 그 부분을 외부에서 조달하기 위한 경우 등이다. 하지만 무엇보다도 아웃소싱을 하는 가장 큰 이유는 조직의 유연성과 민첩성을 높이는데 가장 효과적인 수단이기 때문이라고 전문가들은 지적하고 있다. 주 5일 근무제가 실시되면 사회 전체적으로 주 2일 연휴를 자기 계발에 쏟는 사람이 크게 늘어나, 장차 교육 및 취미 계발 관련 업종이 급부상할 것으로 전망되고 있다. 또 짧은 근무시간 때문에 기업들이 비정규직을 선호하는 경향이 늘어나, 아웃소싱이나 파트타이머 고용이 확대될 것으로 나타났다.

No.5837 · 산림청 원문

아이소토오프 同位元素同位體 · isotope
원자번호가 같고 질량수가 다른 원자.

No.5838 · 산림청 원문

아접 芽接 · bud grafting
눈을 떼어 다른 나무에 붙이는 접.

No.5839 · 산림청 원문

아접용대목 芽接用臺木 · rootstocks for budding grafting
눈접을 하는 대목.

No.5840 · 산림청 원문

아조 芽條 · shoot
묘조(苗條), 엽조(葉條), 아조(芽條)라고도 한다. 잎과 줄기를 말한다.

No.5841 · 산림청 원문

아조도태 芽條淘汰 · bud selection
도태, 영양계선발의 일종. 아조(芽條)돌연변이에 의해서 하는 영양계선발의 일종.

No.5842 · 산림청 원문

아조돌연변이 芽條突然變異 · bud mutation
체세포돌연변이의 일종.

No.5843 · 산림청 원문

아조벤젠 - · azobenzene
C H N = N C H. 등적색의 결정. 알콜과 에테르에 잘 녹는다.

No.5844 · 산림청 원문

아조변이 芽條變異 · bud sport, bud mutation
어떤 식물 개체에서 한 가지가 어떤 특정의 변화를 나타내는 것이다.

No.5845 · 산림청 원문

아조염료 染料 · azodyes, azocolour
아조기(-N=N-)를 발색단으로 하는 일군의 염료로서 종류가 가장 많다.

No.5846 · 산림청 원문

아조의끝 芽條頂端 · shoot apex
잎과 줄기의 끝으로 정단부이다.

No.5847 · 산림청 원문

아조토박터 - · azotobacter
아조토박터과(azotobacteraceae)에 속하는 세균의 1속으로, 질소고정을 하는 편성호기성(偏性好氣性)균이다. 자연계에서는 토양이나 수중에 널리 분포하며, 자유형의 질소고정생물로서 중요한 역할을 하고 있지만 일반적으로 산성쪽에서는 생육이 어렵다.

No.5848 · 산림청 원문

아종 亞種 · subspecies
생물분류의 린네식 계층생물분류체계에서 종(種)아래에 있는 계급으로 고유의 특성을 공유하며 특정한 지역에 분포하는 집단전체를 의미한다. 동종(同種)내의 다른 아종(亞種)은 서로 겹치지 않는 분역을 차지하며, 잠재적으로는 교배가 가능하다.

No.5849 · 산림청 원문

아지드 - · azide
아지드화물이라고도 하는 $-N_3$기를 가지는 화합물. 생물화학적연구에서는 나트륨아지드 NaN_3가 대사의 저해 또는 촉진을 하는 물질로 잘 쓰이고 있다.

No.5850 · 산림청 원문

아질산태질소 亞窒酸態窒素 · nitrite
질소의 무기화과정이나 식물체에 흡수된 질산태질소가 환원된 중간생성물이다. 암모늄이 아질산태질소가 될 때는 Nitrosomonas라는 세균이, 그리고 아질산태질소가 질산태질소로 산화될 때는 Nitrobactor라는 세균이 작용을 한다.

No.5851 · 산림청 원문

아질염산 亞窒鹽酸 · nitrite
M^1NO_2(M^1은 1가의 금속)

No.5852 · 산림청 원문

아초산 亞硝酸 · nitrous acid
HNO_2. 수용액으로 존재하는 역한 염기산. =아질산.

No.5853 · 산림청 원문

아카시아 刺槐 · black locust, 學 Robinia pseudoacacia
미국원산, 아까시나무.

No.5854 · 산림청 원문

아카시아나무흰가루병 白粉病 · powdery mildew of black locust
아까시나무의 연한 잎에 생기는 흰가루병.

No.5855 · 산림청 원문

아카시아진딧물 - · Aphis medicagnis, cowpea aphid
진딧물과, 노린재목. 아카시아, 무궁화, 주엽나무 그밖의 콩과작물을 가해하고 전국에 분포한다. 1년에 10회이상 발생한다.

No.5856 · 산림청 원문

아크등 燈 · arc lamp
아크방전을 이용한 전등, 탄소아크릴등, 탄그스텐아크등, 수은등 여러가지 종류가 있다. 사진조명, 탐조등 등에 쓰인다.

No.5857 · 산림청 원문

아탄 亞炭 · lignite
갈탄의 일종으로서 탄화정도가 낮은 것.

No.5858 · 산림청 원문

아포믹시스 無融合生殖 · apomixis
배우자와의 유합없이 생식이 될 때를 총칭해서 하는 말.

No.5859 · 산림청 원문

아포크로마트 - · apochromat
렌즈등의 광학계에 있어서 색수차(色收差)의 보정을 보통의 아크로마트 보다 더 좋게 한 것.

No.5860 · 산림청 원문

아피통 - · apitong
남양산의 활엽수. Dipterocarpus속.

No.5861 · 산림청 원문

아한대림 亞寒帶林 · subarctic forest
온대와 한대 사이에 해당하는 지대로서 쾨펜의 기준에 따르면, 가장 따뜻한 달의 기온이 10℃ 이상이고, 가장 추운 달의 기온이 –3℃ 이하인 기후에 자라는 산림대이다.

No.5862 · 산림청 원문

아황산 亞黃酸 · sulphurous acid sulfur
H_2SO_3.수용액. =아류산(亞硫酸).

No.5863 · 산림청 원문

아황산법 亞黃酸法 · sulfite process
목재 펄프 제조법에서 가장 중요한 방법 중의 하나. 산성 아황산법, 중아황산법, 아황산염을 이용하는 방법 등 크게 세 가지 종류가 있다. 이들 방법을 기초로해서 이들의 개선법과 이단증해법이 행하여지고 있다.

No.5864 · 산림청 원문

아황산염 亞黃酸鹽 · sulfite
아황산에 함유된 수소를 금속으로 치환하면 생기는 염으로 무색 결정이다. 나트륨염, 암모늄염, 칼륨염, 칼슘염, 바륨염 등이 있다.

No.5865 · 산림청 원문

아황산펄프 亞黃酸 · sulfite pulp
섬유재료를 아황산용액으로 고온 · 고압에서 쪄서 만든 펄프.

No.5866 · 산림청 원문

악 ? · calyx
꽃받침. 꽃의 외측을 둘러싸서 받치고 있는 잎.

No.5867 · 산림청 원문

악기 樂器 · musical instrument
소리를 내어 음악을 이루는 요소가 되는 기구

No.5868 · 산림청 원문

악편 ?片 · sepal calyx lobe
꽃받침의 한 조각

No.5869 · 산림청 원문

안고초 - · Arundinella hirta
산지, 들판, 길가에 나고 전국적으로 분포한다. 초고 1m 가량, 사방용으로 쓰이고 있다.

No.5870 · 산림청 원문

안내기둥 案內기둥 · guide spar
가선집재에서 앞기둥과 뒷기둥 외에 안내도르래를 설치하는 임목을 말한다. 참조: 가공선집재.

No.5871 · 산림청 원문

안내도르래 案內도르래 · guide block
안내도르래(· 滑車, 案內滑車, guide block)는 가선집재지의 임내를 광범위하게 순회하는 작업.

No.5872 · 산림청 원문

안드로 雄性 · andro
숫컷을 뜻하는 접두어.

No.5873 · 산림청 원문

안디솔 - · Andisols
화산분출물에서 기인한 비교적 신생토양으로 무정형의 교질물을 다량 포함하며 일반적으로 매우 비옥하다.

No.5874 · 산림청 원문

안료 顔料 · pigment
물에 불용 혹은 난용성의 분말상 착색료. 인쇄잉크, 도료, 제지, 화구, 고무, 플라스틱 등의 제조에 널리 쓰인다.

No.5875 · 산림청 원문

안산암 安山岩 · andesite
조면암과 같은 중성화산암으로 주성분은 사장석이며 휘석, 각섬석, 흑운모 등이 함유되어 있으며 때로는 소량의 감람석과 석영을 포함한다. 안산암은 안데스산맥에 있는 여러 화산에서 생겨나므로 그 이름이 붙여졌다. 안산암에 기인한 토양은 대부분 갈색의 식질토양이 되며 중점토로 보수력이 매우 크다.

No.5876 · 산림청 원문

안식향 安息香 · benzoin(benzoinum)
일명 벤조인. 남양제도에 나는 식물인 안식향(安息香, Styrax bezoin)의 수피에 상처를 내어 분비하는 수액을 응고시킨 일종의 발삼. 포마드의 원료가 된다.

No.5877 · 산림청 원문

안쏠림 側脚 · inclination to inside
궁궐 고건축에서 기둥이 건물 안쪽을 향해 쏠리도록 기울여 세우는 독특한 기법으로 비중의 무게에 의하여 기둥이 바깥쪽으로 벌어지는 것을 막고, 시각적으로도 건물이 벌어지게 보이는 것을 방지한다. 이것은 기둥 상단에서 중심점 이동 치수를 기준으로 삼을 경우 중심축 기울기에 따른 각도와 기둥 높이 사이에 반비례 관계로 작용된다.

No.5878 · 산림청 원문

안전구역 安全區域 · safety zone
발화물질을 제거하여 군데군데 불씨가 일부 남아있거나 진화선 바깥의 불로 인해 진화대 주변이 안전하지 못한 경우 퇴각시 이용할 수 있는 지역. 진화작업 동안 대원들은 안전 구역에서 되도록 멀리 떨어지지 않은 상태에서 이동하여야 한다. 또한, 안전구역은 보호막의 역할을 하기도 한다.

No.5879 · 산림청 원문

안전도 安全度 · factor of safety
안전계수. 실용강도와 파괴강도와의 비이고 이 값은 이때까지의 경험으로 보면 석재에 있어서는 10~40, 목재에 있어서는 4~10이다.

No.5880 · 산림청 원문

안전시거 安全視距 · safety sight distance
자동차 주행의 안전이라는 측면에서 필요한 최소한도의 바라보이는 거리이다. 임도시설규정에서는 차도의 중심선상 1.2m의 높이에서 당해 차선의 중심선 상에 있는 높이 10cm인 물체의 정점을 볼 수 있는 거리를 시거라고 정의하고 있다.

No.5881 · 산림청 원문

안정기 安定期 · climax
극상(極相).

No.5882 · 산림청 원문

안정물매 安息角 · angle of repose
미고결된 퇴적물이 경사면 위에 퇴적될 때 흘러내리지 않고 퇴적될 수 있는 최대 경사각.

No.5883 · 산림청 원문

안정성선택 安定性選擇 · stabilizing selection
한 쪽으로의 방향성이 없는 선택, 집단의 평균치는 항상 비슷한 수준을 유지한다. 돌연변이에 의해서 새로 생기지만 도태에 의해서 제거되어 낮은 빈도로 유지되는 형질의 예를 들 수 있다.

No.5884 · 산림청 원문

안주 岸洲 · bankfield
시냇가에 있는 사주(砂洲).

No.5885 · 산림청 원문

안쪽 물매 內的傾斜 · Inslope
산마루 쪽이 낮고, 산기슭 쪽이 높게 형성된 도로 등의 경사.

No.5886 · 산림청 원문

안쪽 물매화 內的傾斜化 · Insloping
도로 및 산책로 처방과 관련된 공법. 도로의 황단경사를 안쪽 물매지게 하여 물이 배수로에 모이게 하는 공법.

No.5887 · 산림청 원문

안토시아닌 - · anthocyanin
flavonoids 화합물 중의 한 가지 그룹으로서 꽃, 열매, 줄기, 잎의 붉은색, 보라색, 청색을 나타내는 색소물질이다. 속씨식물의 가을철 붉은 단풍은 안토시아닌이 합성되어 축적되기 때문에 나타난다. 아름다운 단풍은 맑고, 서늘하고, 약간 건조한 기후 조건에서 나타난다. 겉씨식물에는 안토시아닌 그룹을 가지고 있지 않다. 안토시아닌은 충매 곤충을 유인하고 UV의 피해에 저항성을 주는 것으로 알려지고 있다.

No.5888 · 산림청 원문

안토시안 花靑素 · anthocyan
식물의 꽃 또는 과피등에 존재하는 배당체로서 적, 청이며, 알콜에 녹는다.

No.5889 · 산림청 원문

안티옥신 - · antiauxin
옥신의 작용과 경쟁해서 생장을 억제하는 작용을 가진 물질.

No.5890 · 산림청 원문

안티코돈 - · anticodon
mRNA의 3염기 코돈에 상보적인 tRNA의 3염기 코돈을 말한다.

No.5891 · 산림청 원문

알?비?이 相對的 生物學的 效率 · r.b.e
생물학적 효과비율의 약어. relative biological effectiveness 비생물학적 효과라고도 한다. 이온화 방사선이 생체를 지나갈 때 이온대를 만들고 그 분포는 방사선의 종류에 따라 다르다. 방사선의 경과에 따라 생기는 1미크론(10-^{4}cm)당의 이온대의 수를 비전이능이라고 부른다. 일반적으로 달라도 비전이능이 같으면 생물학적 효과는 같 다고 본다. 250kv의 X선의 비전이능은 평균해서 물속에서 1미크론 당 100이온대를 만들므로 이 값을 취해서 REB의 단위로 하고 있다.

No.5892 · 산림청 원문

알?에프 - · r.f.
paper-chromatography의 용어. rate of flow에서 온 말. 0.55 또는 0.99등으로 표현. 1.0보다 작은 값을 가진다.

No.5893 · 산림청 원문

알간표 - · Algan table
사용자의 입장에서 입목 재적을 알기 위해 기존의 조제된 재적표를 사용할 경우, 그 재적표가 사용자의 임분에 얼마나 적합한지가 중요하다. 따라서 사용자의 입장에서는 기존의 재적표가 얼마나 정확한지를 검토해보아야 하는데, 이를 위해서는 해당 임분의 몇 개 입목을 벌채하여 구분구적법으로 재적을 정확히 구한 후 재적표와 비교해 보아야 하는 번거로움이 있다. 알간표는 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 조건의 임분을 여러 가지 계급으로 구분하여 직경별 입목재적을 찾을 수 있도록 조제된 재적표를 말한다. 결과적으로 알간표를 사용할 경우 해당 난의 계급과 직경에 맞는 입목재적을 구할 수 있다.

No.5894 · 산림청 원문

알기닌 - · arginine
염기성이 아미노산의 하나. Larginine은 단백질을 구성하는 아미노산의 하나로 존재. 식물종자중에는 유리상태로 소량존재한다.

No.5895 · 산림청 원문

알데히드 - · aldehtde
1. 아세트알데히드의 약칭. 2. 알데히드기 - CHO를 가지는 화합물의 총칭.

No.5896 · 산림청 원문

알도스 - · aldose
수산기에 이웃해서 알데히드기를 가지는 단당류.

No.5897 · 산림청 원문

알라닌 - · alaline
$CH_3CH(NH_2)COOH$. 백색결정.

No.5898 · 산림청 원문

알락박쥐나방 一点?蛾 · grape tree borer
박쥐나방과, 나비목, 복숭아, 물푸레, 플라타너스, 아카시아, 단풍나무, 참나무, 밤나 무, 붉나무, 딱총나무, 오리나무, 무궁화, 버들, 호두나무 등을 가해하고 가지. 수간(樹幹) 등의 목부를 유충이 먹는다. 구멍에 들어 있는 유충을 철사로 찔러 죽이고 접촉제를 주입한다.

No.5899 · 산림청 원문

알락하늘소 - · 學 Anoplophora malasiaca
하늘소과, 딱정벌레. 미류나무, 플라타너스, 귤나무, 버들, 뽕나무 등의 목질부에 구 멍을 뚫고 먹어 들어간다. 유충은 몸길이가 44~47mm 가량이고 납작한 원통형이며 몸 은 담황색이고 머리는 갈색이다. 몸의 제1절의 배면에 반문(班紋)이 있다. 성충은 몸길이가 30~35mm이고 광택이 있는 흑색이다. 날개에는 15~16개의 백점이 있는 기부(基部)에는 큰 점핵(點刻)이 밀포(密布)되어 있다. 2년에 한번 발생하며 성충은 6~8월에 우화(羽化)한다. 충공(蟲孔)에 DDT등의 접촉제(接觸劑)를 주입하고 또는 철사를 넣어 유충(幼蟲)을 찔러 죽인다.

No.5900 · 산림청 원문

알레스 目 · ales
분류에 있어서 목의 어미. 대표적인 과명의 어미에 ales를 붙여서 목명으로 한다.

No.5901 · 산림청 원문

알로메트리 相對生長 · allometry
상대생장에 의한 비비례적(非比例的) 생장관계를 나타내는 말. y=bx의 식이 타당하다는 것. y는 부분기관(器官)의 크기이고 x는 다른 부분 또는 전체의 크기이며 길이 또는 무게를 나타낼 때도 있다. b와 a는 정수이고 b는 초생장지수, a는 평형정수라 부른다. 상식 을 보통 알로메트리의 식이라 하고 이 식의 양변의 대수그라프를 얻으면 직선이 된다. 알로미트리의 관계는 개체의 생장의 경우 이외의 다른 개체간의 크기의 비교에도 특히 진화의 연구에 적용되는 일도 많다. 그래서 개체내의 알로미트리를 특히 개체발생적 알로메트리(영 ontogenetic allometry, heterauxesis)라 하고 다른 쪽을 aromorphosis (영)라 해서 구별한다.

No.5902 · 산림청 원문

알로몬 他種反應化合物 · allomone
어떤 생물이 생성한 물질이 다른 종의 생리적 또는 행동적 반응을 일으켜 그 반응이 그 물질의 생산자에게 좋게 작용하는 물질이다. 예를 들면 꽃향기나 꿀은 곤충을 유인하는 알로몬으로서 수분하는데 유리하다.

No.5903 · 산림청 원문

알로몰포시스 - · allomorphosis
동시기에 존재하는 이종류의 생물의 상대생장관계를 말한다. 넓은 뜻으로는 알로메트리의 일부를 이룬다. 동계통에 속하고 크기가 다른 개체간의 individual allomorphosis, 이계통이품종, 이아종간의 race allomorphosis, 동속이종간의 speciesform allomorphosis, 일진화 계통상의 종류간의 lineage allomorphosis, 등이 구별된다.

No.5904 · 산림청 원문

알루미나 - · alumina
산화알미늄 Al_2O_3를 말하고 알미늄의 원료가 된다.

No.5905 · 산림청 원문

알루미나8면체 알루미나8 面體 · alumina octahedron
알루미늄을 중심으로 6개의 정점에 산소 또는 수산기가 배위한 8면체이다. 알루미늄 자리에 마그네슘이나 철 등의 양이온이 치환된 것도 있다. 이들 8면체가 연결되면 알루미나8면체판이 되고 규산4면체판과 1:1, 2:1, 2:1:1 등의 비로 결합하여 다양한 2차광물을 형성한다.

No.5906 · 산림청 원문

알루미넘 - · aluminum
알미늄의 미국명.

No.5907 · 산림청 원문

알루미늄8면체 알루미늄8 面體 · aluminum octahedron
알루미나8면체.

No.5908 · 산림청 원문

알리데이드 視方規 · alidade
측선의 방향을 시준하고 또 시준선의 경사를 측정하며 아울러 평판의 정준을 할 수 있는 기포관을 가지는 것이다.

No.5909 · 산림청 원문

알릴 - · allyl
1가의 불포화탄화수소기 $CH = CH- CH_2-$.

No.5910 · 산림청 원문

알미늄 - · aluminium
Al. 원자번호 13, 원자량 26.97.

No.5911 · 산림청 원문

알베도 反照率 · albedo
태양에서 오는 빛을 반사하는 정도를 나타내는 량이고 입사광의 강도의 비이다. 여기서 반사라 하는 것은 평면반사에 한하지 않고 지면 또는 구름 등에 의해 산란되는 것도 포함하고 있다. 천체에서는 그것을 둘러 싼 대기가 많을수록 알베도가 커진다.

No.5912 · 산림청 원문

알엔에이 - · RNA
리보핵산(ribonucleic acid)이라고도 한다. 핵산의 단위물질인 뉴클레오티드가 매우 길게 연결된 고분자 유기물인데, 이 뉴클레오티드는 염기와 탄수화물의 일종인 펜토스(오탄당), 그리고 인산이 각각 1분자씩 결합한 물질이다. 이 구성성분에서 펜토스의 당이 리보스일 때 RNA라 하고, 디옥시리보스이면 DNA라 한다. RNA를 구성하는 뉴클레오티드의 4가지 염기는 아데닌(adenine:A)·구아닌(guanine:G)·사이토신(cytosine:C)·유라실(uracil:U)이다. 따라서 RNA의 뉴클레오티드에도 A, G, C 또는 U를 가진 네 가지가 있게 된다.

No.5913 · 산림청 원문

알줄기 莖葉 · corm
지하부의 줄기가 비대 생장하여 겨울동안 물질저장의 기능을 하는 다년성 초본류의 지하경이다. 잎이 발달한 인경과 형태적으로 비슷하나 해부학적으로 다르다.

No.5914 · 산림청 원문

알칼로이드 植物鹽基 · alkaloid
식물체중에는 질소를 가지고 염기성이며 강한 생리작용을 가지는 물질이 있다. 이것을 알칼로이드라고 부른다. 대부분의 알칼로이드는 탄소, 수소, 산소, 질소로 조성되고 결정성이나 그 중에는 산소를 가지지 않는 액체의 것도 있다.

No.5915 · 산림청 원문

알칼리 ?性 · alkali
염기성을 나타내는 물질.

No.5916 · 산림청 원문

알칼리섬유소 ?性 纖維素 · alkaline fiber
섬유소를 20%가량 되는 수산화나트륨 액체에 담그면 섬유소는 팽윤하고 길이는 수축하고 단면은 원형으로 된다. 물에 씻어도 그 성질은 그대로 있고 각종의 염료에 대한염색성이 좋아지고 흡습성이 증가해진다. 만일 수산화나트륨액에 침지할 때 수축하지 않도록 긴장시켜서 처리하면 실과 직포는 광택이 좋아지고 투명성이 증가하고 표면은 평활하게 된다. 이것은 1884년 영국인 Mercer에 의해서 발견되었으므로 이와 같은 처리법을 Mercerization이라하고 선사(線絲), 선포(線布) 가공법으로서 널리 쓰여지고 있다.

No.5917 · 산림청 원문

알칼리성 ?性 · alkaline
어떤 물질이 알칼리성을 나타내는 때 그 물질은 알칼리성이라고 한다. 수용액 중에서 수산기를 만들고 PH가 7.0보다 더 크다.

No.5918 · 산림청 원문

알칼리성토양 ?土 · alkali soil
토양반응이 알칼리성인 토양이다. 알칼리 및 알칼리 토류의 염화물, 황상염, 탄산염등의 가용성의 염류, 특히 Na_3Co_3을 다량으로 가지고 알칼리성을 보이는 토양, 만주 몽고, 아프리카, 북미 등의 편건지에 보인다. 배수가 불량하면 Na_2CO_3의 생성이 적고 그러한 알카리 토양을 염토(saline soil)라 한다.토양의 모재로부터 토양이 형성될 때 빗물에 의한 풍화생성물의 용탈정도는 토양반응에 영향을 미치는데, 강우량이 적은 지역에서는 규산염광물의 가수분해에 의하여 나트륨염, 칼슘염, 마그네슘염, 칼륨염 등이 토양에 집적되고 이들 염이 용해도에 따라 알칼리성의 정도가 달라진다. 즉 칼슘이나 마그네슘의 탄산염은 용해도가 낮아 이들이 포함된 토양은 약알칼리성을 나타내며, 나트륨이나 칼륨의 탄산염은 용해도가 높아 강알칼리성을 나타낸다.

No.5919 · 산림청 원문

알칼리염 ?鹽 · alkali
알칼리 금속의 염. 보통 무색이고 물에 잘 녹는다.

No.5920 · 산림청 원문

알코올 乙醇 · alcohol
1.에틸알코올의 약칭. 2. 탄화수소의 수소원자를 수산기로 치환한 화합물. 수산기 한개를 가지는 것을 일가 알콜(예. 메틸알코올), 두개를 가지는 것을 이가알코올, 3개를 가지는 것을 삼가알코올이라고 하고, 이가이상인 것을 다가알코올이라 한다. 수산기가 제일탄소원자에 축합하고 -CH_2OH와 같은 구조를 가진 것을 제일알코올이라 한다. 제이탄소원자에 축합하고 =CHOH와 같은 구조를 가진 것을 제이알코올, 제삼탄소원자에 축합하고 COH와 같은 구조를 가지는 것을 제삼알코올이라 한다. 분자안에 이중 또는 삼중종합을 가지는 것을 불포화알코올, 그렇지 않은 것을 포화알코올이라 한다.

No.5921 · 산림청 원문

알코올발효 乙醇醱酵 · alcoholic fermentation
당 또는 다당류로부터 에탄올과 이산화탄소로 분해되는 현상

No.5922 · 산림청 원문

알코올온도계 溫度計 · alcohol thermometer
에틸알코올을 쓴 액체온도계.

No.5923 · 산림청 원문

알킬 - · alkyl
메탄열탄화수소에서 수소1원자를 제거한 나머지의 원자단. 즉 C H_2인 일반식을 가지는 일가의 기.

No.5924 · 산림청 원문

알킬화 - · alkylation
유기화합물의 수소원자를 알킬기로 치환하는 것.

No.5925 · 산림청 원문

알킬화제 - · **alkylating agents**
유기화합물의 활성수소원자와 알킬기의 치환을 일으키는 화합물이다. 이 화합물이 가지고 있는 반응기의 수에 따라 알킬화제는 단기능적, 복기능적, 다기능적 알킬화제로 분류된다.

No.5926 · 산림청 원문

알톡톡이 黃星丸跳蟲 · **garden springtail**
알톡톡이과 톡톡이목. 체장이 1.5mm 내외의 구형에 가까운 무시의 곤충인데 전체가 암적색이고 원형의 황색소반 또는 세점(細點)이 산재하고 머리끝과 말단은 황색이다. 성충으로 월동하고 일년에 수회발생한다. 유묘의 경엽(耕葉)을 먹는다. DDT, 알드린, 협타클로 르등의 분제를 뿌린다.

No.5927 · 산림청 원문

알파화합물 化合物 · **alphacompoun**
측쇄 즉 지방족산(aliphatic acid)이 탄소 1에 붙어 있는 나프타린계열에 있어서 식물호르몬의 종류.

No.5928 · 산림청 원문

알피솔 - · **Alfisols**
반건조-습윤지역에 나타나는 토양목으로 주로 활엽수림하에서 볼 수 있다. 점토가 풍부한 하층토 및 높은 비옥도가 특징이며 식량생산에 매우 중요하다.

No.5929 · 산림청 원문

암거 暗渠 · **culvert**
속도랑

No.5930 · 산림청 원문

암괴 岩塊 · **rock**
바위 덩어리.

No.5931 · 산림청 원문

암꽃 雌花 · **pistillate flower**
한 개 이상의 암술이 발달하고 수술이 기능적으로 퇴화되었거나 없는 꽃

No.5932 · 산림청 원문

암메이트 - · **ammate**
ammonium sulfamate의 약어. 수용액으로서 잎이나 변재에 뿌려서 살목제로 쓴다. 결정을 수체내에 주입하기도 한다.

No.5933 · 산림청 원문

암모늄 - · **ammonium**
1가의 원자단 NH_4-를 말한다. 알칼리 금속이온 비슷한 성질을 보이는 일이 많다.

No.5934 · 산림청 원문

암모늄화작용 ?化作用 · **ammonification**
무기화

No.5935 · 산림청 원문

암모니아 - · ammonina
NH_3. 상온에 있어서는 무색의 기체.

No.5936 · 산림청 원문

암모니아수 - · ammonina water
암모니아 수용액.

No.5937 · 산림청 원문

암모니아식물 ?化植物 · ammonia plant
산성식물

No.5938 · 산림청 원문

암발아종자 暗發芽種子 · dark germintater
광선에 의해서 발아가 억제되는 종자.

No.5939 · 산림청 원문

암석 岩石 · rocks
바위와 돌.넓 은 뜻으로는 지각을 구성하는 모든 물질을 암석이라 한다.

No.5940 · 산림청 원문

암석권 岩石圈 · lithosphere
수권, 기권과 대응하는 말로 암석권은 일반적으로 지각, 맨틀의 고체 부분 즉 ??은 지구를 가리키는 말이다. 암석권의 평균 화학 조성과 존재량을 많은 순서로 알아보면 산소 46.71%, 규소 27.69%, 알루미늄 8.07%, 철 5.05%, 칼슘 3.65%, 나트륨 2.75%, 칼륨 2.58%, 마그네슘 2.08%, 티탄 0.62%, 수소 0.14%, 기타 0.66%이다.

No.5941 · 산림청 원문

암석식물 岩石植物 · lithophyte
바위채송화, 솜다리류, 담자리꽃나무 등과 같이 암석의 표면에 직접 또는 여기에 얇게 분포하는 토양을 의지하여 생육하는 식물을 말한다. 수분을 함유하는 조직이 있어서 건조에 견디는 성질이 강하다. 대체로 잎이 두껍고, 키가 작다.

No.5942 · 산림청 원문

암석현미경 岩石顯微鏡獨 · petrographic microscope
암석을 전문적으로 보는 현미경.

No.5943 · 산림청 원문

암설 岩屑 · rock debris
너덜. 돌 부스러기. 풍화 작용으로 파괴되어 생긴 바위 부스러기.

No.5944 · 산림청 원문

암쇄토양군 岩碎土壤群 · lithosols, Li
우리나라 산림토양분류에 의한 8개 토양군 가운데 하나로 산정이나 경사가 급한 산복 사면과 완사면의 계곡에 주로 분포하고 A~C층의 단면형태를 가지며, 퇴적물이 섞여있는 토양으로서 A층이 얇거나 없는 토양이다. 토양입자는 비교적 조립질이고 큰 자갈이 많으며 임목생육상태는 매우 불량하다.

No.5945 · 산림청 원문

암수딴그루 雌雄異株 · dioecism
종자식물 가운데 암꽃과 수꽃을 각각 갖는 단성화가 서로 다른 개체에 달리는 것. 은행나무의 경우가 가장 대표적인 사례이며 은행나무는 수꽃과 암꽃이 완전하게 구분되어 있는 경우도 있고, 다래처럼 수꽃과 암꽃 각각이 존재하되 암꽃에는 수술의 흔적이 남아 있는 경우도 있다. 그밖에 양치류나 이끼류와 같은 하등한 식물에서 암 · 수의 생식기관을 다른 개체에서 만든 것을 말하기도 한다. 예를 들면 생이가래나 네가래의 전엽체가 이에 해당된다.

No.5946 · 산림청 원문

암수딴몸 雌雄異體 · dioecism
암수딴몸 식물은 자웅이주 또는 자웅별주, 자웅이체라고하며 자웅동주에 대응하는 용어.

No.5947 · 산림청 원문

암수한그루 雌雄同株 · monoecism
종자식물 가운데 암꽃과 수꽃을 각각 갖는 단성화가 한 개체에 달리는 것. 소나무처럼 암꽃이 위쪽에 수꽃 화서가 아래쪽에 달리는 종류를 말한다. 넓은 의미로는 1개의 꽃속에 암술과 수술이 다 들어있는 양성화를 이에 포함시키기도 한다. 또 양치식물에서 포자가 발아해서 되는 전엽체에 조정기와 조란기가 함께 있는 것을 포함시킬 수 있다.

No.5948 · 산림청 원문

암술 雌? · pisil gynoecium
종자식물에서 열매를 만드는 기관, 꽃밥을 형성하는 수술과 상대되는 용어이다. 일반적으로 암술의 기본 단위는 심피로 1~다수의 심피로 이루어지며, 보통 암술머리, 암술대, 씨방으로 구성된다. 암술의 복합체를 자예군(雌 · 群)이라고 한다.

No.5949 · 산림청 원문

암술(자예) 雌蘂 · pisil gynoecium
꽃의 중심에 있고 심피(carpel)로 구성되어 있다. 한개의 심피로 되면 단자예(simple pistil, 콩과 식물). 두개 이상이면 복자예(apocarpous, 버즘나무), 붙은 것을 합성자예(syncarpous, 무궁화, 오동나무, 감나무)라 한다.

No.5950 · 산림청 원문

암술대 花柱 · style
암술의 한 부분으로써 위로는 암술머리를 달고 있으며 아래로 씨방과 연결되어 있는 즉 암술머리와 씨방 사이의 조직이다. 분류군에 따라 모양과 수가 매우 다양하여 식물의 식별에 있어서 중요한 형질이 된다. 암술대가 없는 암술도 있다.

No.5951 · 산림청 원문

암술머리 柱頭 · stigma
암술의 가장 위쪽 끝에 있는 일부분으로 꽃가루를 받는 즉 꽃가루가 부착되는 지점이다.

No.5952 · 산림청 원문

암장 岩漿 · rock magma
지하에 있는 용융한 조암물질로서 고화하면 화성암이 된다.

No.5953 · 산림청 원문

암적색산림토양군 暗赤色山林土壤群 · dark red forest soils, DR
우리나라 산림토양분류에 의한 8개 토양군 가운데 하나로 석회암, 응회암 등을 모암으로 하는 토양에서 주로 나타나는 약산성토양으로 모재층에 가까울수록 암적색을 강하게 나타낸다. 이 토양은 염기성암에서 유래하여 칼슘과 마그네슘의 함량이 높고 식질의 견밀한 토양이며 점착성이 강하고 물리성은 불량하다. 석회암을 모암으로 하는 암적색산림토양아군과 응회암을 모암으로 하는 암적갈색산림토양아군으로 나뉜다.

No.5954 · 산림청 원문

암종병 癌腫病 · tumor disease
증식이 조절되지 않는 과대 생장된 조직이 나타나는 병이다. 예: 근두암종병 등.

No.5955 · 산림청 원문

암종유발플라스미드 癌種誘發플라스미드 · Ti plasmid
아그로박테리아(Agrobacterium tumefaciens)의 거대한 플라스미드로서 자체 내에 T-DNA라는 부분을 식물세포로 이식시키는 기전을 대부분 가지고 있다. 이 T-DNA 상에는 싸이토키닌, 오옥신 등의 식물호르몬 합성 유전자가 있는데 이 유전자들은 아그로박테리아의 RNA 중합효소에 인식되지 못하여 이 박테리아에서는 호르몬을 만들어 내지 못한다. 그러나 일단 식물에 들어 갈 경우 식물의 RNA 중합효소에 의해서 활발하게 전사되어 호르몬을 만들어 낸다. 크라운 골(crown gall)이라는 암종(tumor)은 이 호르몬 작용에 의하여 만들어진 일종의 캘러스라고 할 수 있다. 그러나 일반적인 캘러스와 이 암종의 근본적인 차이는 호르몬의 자가생산력 여부라고 할 수 있다. 캘러스는 배양시 호르몬을 첨가하여야 계속 생장할 수 있으나 암종의 경우 호르몬 없는 배지에서도 다른 양분이 공급되는 한 무한정으로 생장할 수 있다. 암종 세포 내에 아그로박테리아 자체는 들어가지 않는다. 이 조직은 스스로 호르몬을 만들어 내므로 양분만 존재한다면 무한정으로 자랄 수 있다.

No.5956 · 산림청 원문

암컷 雌 · female
란(卵)을 가질 수 있는 생물개체.

No.5957 · 산림청 원문

암편 岩片 · rockfragment
모암의 한 조각, 암석의 한 조각 편.

No.5958 · 산림청 원문

압력계 壓力計 · manometer
유체의 압력을 측정하는데 쓰이는 기계.

No.5959 · 산림청 원문

압력수두 壓力水頭 · pressure head
물기둥 또는 수은주의 높이로 나타낸 유체(流體)의 압력 에너지. 유체가 흐르고 있을 때에, 그 속의 한 점의 압력을 단위 부피의 무게로 나눈 값이다.

No.5960 · 산림청 원문

압력재 壓力材 · compression wood
침엽수류의 수간에서 바람 또는 기울음에 의하여 압력을 박는 부위에 세포분열이 촉진되고 목부조직이 비대해지는 목재가 생성된다. 가도관이 짧고 세포벽이 두껍다.

No.5961 · 산림청 원문

압력포텐셜 壓力포텐셜 · -
중력포텐셜.

No.5962 · 산림청 원문

압밀실험 壓密試驗 · consolidation test
흙의 압밀특성과 압축속도에 관한 여러 계수를 구하는 시험.

No.5963 · 산림청 원문

압베묘화장치 描畵裝置 · Abbe's drawing apparatus
현미경에 부속된 것으로 큰 조직의 그림을 그릴 때 쓰인다. 묘화대(描畵臺, drawing stage : Zeichentisch)를 함께 쓴다.

No.5964 · 산림청 원문

압조 壓條 · layer
취목, 목조. 휘묻이.

No.5965 · 산림청 원문

압조법 壓條法 · unhaufeln
복조법(伏條法) 또는 취목법(取木法)과 같음.

No.5966 · 산림청 원문

압축강도 壓縮强度 · compressive strength
물체가 어느 정도 견디어 낼 수 있는지 그 압축력의 한도를 나타내는 수치.

No.5967 · 산림청 원문

압축개스 壓縮 · compressed gas
액화하지 않을 정도로 상온에서 압축한 기체. 보통 본베(bomb)에 저장한다.

No.5968 · 산림청 원문

압축시험 壓縮試驗 · compression test
재료에 하중을 가하여 그 변형과 응력(應力)을 측정하여 기계적 성질이나 변형 저항을 조사하는 시험.

No.5969 · 산림청 원문

압축이상재 壓縮異常材 · compression wood
굽혀진 재목의 경사아래방향으로 즉 압축방향으로 성장륜의 폭이 넓게 편심생장하는 것으로 알려져 왔음. 최근의 연구에 의하면 굽혀진 방향에 관계없이 아래쪽 방향으로 편심비대성장하는 것으로 밝혀졌음. 침엽수에서 발생함. 상대어로 활여수에서 발생하는 인장응력재가 있음.

No.5970 · 산림청 원문

앙각 仰角 · angle of elevation
올려본 각도.

No.5971 · 산림청 원문

앞기둥 先柱 · head spar
머리기둥. 가공본줄이 통과하는 지주목 중에서 집재기에 가까운 쪽에 위치한 기둥 또는 임목을 뜻하며 일반 집재기에서는 보통 임목을 이용하지만 타워야더 집재기에서는 집재기 자체에 철제타워가 부착되어 있다. 참조: 가공줄집재.

No.5972 · 산림청 원문

앞날개 前翅 · elytra
딱정 벌레나 멸구과의 앞쪽의 가죽 같거나 키틴질의 날개; 휴식할 때 등의 중간에서 일직선으로 만나고 뒤날개를 덮고 있다.

No.5973 · 산림청 원문

앞모래언덕 前砂丘 · fore-sanddune
해안 가까이 형성된 낮은 사구

No.5974 · 산림청 원문

애리디솔 - · Aridisols
건조 및 반건조기후의 사막과 건조관목지에서 일반적으로 나타나며 유기물의 함량이 매우 낮고 수분부족현상이 특징이다. 풍화와 토양발달이 비교적 많이 진행된 토양목이다.

No.5975 · 산림청 원문

애벌레 若蟲 · nympha
곤충류가 부화한 후 성충이 되기 전까지의 발생단계.

No.5976 · 산림청 원문

애소나무좀 松絲坑切梢小蟲 · minute pine bark beetle
딱정벌레목 나무좀과. 일본잎깔나무, 서어나무류의 수간의 형성층에 수평으로 모갱(母坑)을 만들므로 나무가 고사한다. 성충이 신초 끝 3~6mm 가량되는 곳에다 구멍을 뚫고 들어가 중심부를 먹어 올라가서 끝으로 탈출하거나 먹어들어간 구멍으로 탈출하므로 신초끝이 적갈색으로 되어 말라 죽는다. 성충은 몸길이가 3mm가량이고 흑갈색이며 1년에 한번 발생하고 성충으로 월동한다. 양약목(襄弱木)을 곧 제거한다.

No.5977 · 산림청 원문

애이커푸우트 - · acre foot
수량의 단위. 한 애이커의 면적을 1푸우트의 깊이로 덮을 수 있는 수량. 약 43.560 입방 피이트의 수량에 상당.

No.5978 · 산림청 원문

애초록풍뎅이 綠銅金龜子 · 學 Anomala joponica
풍뎅이과, 딱정벌레목. 각종활엽수의 잎을 망상으로 갉아 먹고 엽맥만 남긴다. 성충은 녹색 또는 다갈색인데 색채의 변이가 많다. 날개에 10줄의 점각종구(點刻縱構)가 있고 그 사이가 약간 융기되며 전체가 광택이 있고 매끈매끈하다. 1년에 한번 발생하며 유충으로 월동한다. 성충은 7월상순을 전후해서 발생한다. DDT 분말의 살포. 유충에는 헵타클로르 또는 알드린 2.5% 분제(10a 당 3~5kg)로 토양처리를 한 다음에 파종 또는 정식을 한다.

No.5979 · 산림청 원문

애추 崖錐 · talus
가파른 낭떠러지 밑이나 경사진 산허리에 고깔 모양으로 쌓인 흙모래나 돌 부스러기.

No.5980 · 산림청 원문

액과 液果 · sap fruit succulent fruit
다육과 또는 습과라고도 한다. 육질이고 수분함량이 많은 과피를 가지는 과실의 총칭.

No.5981 · 산림청 원문

액면계 液面計 · liquid level meter
기내의 액면의 높이를 외부에 지시하는 장치.

No.5982 · 산림청 원문

액비 液比 · liquor to wood ratio
칩의 전건중량에 대한 증해액 양의 비. 여기서 증해액의 양은 증해용 백액, 흑액 외에 칩 중의 수분도 함유한 것으로, 보통 KP때 액비는 3~4이다. 펄프의 품질은 균일성에서 본다면 액비는 클수록 좋으나 증해용의 열원, 증해속도, 회수고형분의 농도에서 본다면 반대로 적은 것이 좋다.

No.5983 · 산림청 원문

액상 液相 · liquid phase
토양을 구성하는 3상 가운데 하나로, 토양수분이 차지하고 있는 공간을 가리킨다.

No.5984 · 산림청 원문

액성한계 液性限界 · liquid limit
가소성을 보이는 토양에서 일정 수분 이상의 수분이 포함되면 유동하는 액체의 성질을 보이며 이때의 수분 함량을 가리킨다.

No.5985 · 산림청 원문

액아 腋芽 · axillary bud
잎겨드랑이에 달리는 눈이다. 일반적으로 꽃눈이 되는 경우도 있고, 줄기가 손상을 당했을 때 가지에서 새로운 줄기를 내놓기 위해 준비된 눈인 경우도 있다.

No.5986 · 산림청 원문

액재 液材 · sap wood
변재. 목질부의 바깥쪽둘레에 있는 유연하고 수분함유량이 비교적 높은 부분.

No.5987 · 산림청 원문

액체 液體 · liquid
물이나 기름과 같이 자유로이 유동하여 용기(容器)의 모양에 따라 그 모양이 변하며 일정한 형태를 가지지 않고 압축해도 거의 부피가 변하지 않는 물질.

No.5988 · 산림청 원문

액체배지 液體培地 · liquid culture medi
고정이나 지지할수 있는 경화재료를 첨가하지 않은 배지.

No.5989 · 산림청 원문

액침법 液浸法 · immersion method
현미경의 개구수를 증가시키고자 대물렌즈와 물체사이에 굴절율이 비슷한 렌즈액으로 충만시키는 것.

No.5990 · 산림청 원문

앨리데이드 - · alidade
평판측량에서 사용되는 방향시준기로서 중앙에 기포관 수준기가 있고, 후방의 시준판 구멍(시준공)으로부터 전방에 있는 시준판의 실(시준사)을 내다보면 방향선이 정해지도록 되어 있는 기구이다. 구조에 따라 보통 앨리데이드와 망원경 앨리데이드로 나누어진다.

No.5991 · 산림청 원문

앵겔만가문비나무 - · white spurce engelm, 學 Picea glauca
가문비나무 속의 나무로 목재 무늬가 아름답고 음향이 좋아 악기재료로 쓰인다.

No.5992 · 산림청 원문

앵두나무 櫻桃 · 學 Prunus tomentosa
중국원산으로 우리나라에는 1600년경에 들어옴. 장미과의 낙엽활엽관목으로 3m 정도 자란다. 잎은 도란형이고 꽃은 연한 홍색 내지 백색이며 4~5월에 잎보다 먼저 또는 동시에 나온다. 열매는 6월에 붉은 색으로 성숙한다.

No.5993 · 산림청 원문

앵커박기 - · anchor works
이동층을 관통하여 부통기판까지 삭공하고, 그 구멍에 강재 등을 삽입한 후에 선단부를 그라우트 고정하고, 지표면의 고착판과 단단히 고정하여 산사태나 사면붕괴를 억지하는 공법

No.5994 · 산림청 원문

야간복사계 夜間輻射計 · pyrgeometer
다른 말로 지면복사계(知面輻射計)라고도 하며, 야간 복사량을 측정하는 기계.

No.5995 · 산림청 원문

야계 野溪 · torrent
유로가 비교적 짧고 물매가 급하며 평상시에는 수량이 적지만 강우나 눈이 녹아 유량이 급격히 증가함으로서 계류의 기슭 도는 바닥을 침식시켜 토사석력을 생산하고 유하시켜 그 하류에 퇴적하는 하천의 상류부를 말한다.

No.5996 · 산림청 원문

야계공사 野溪工事 · torrent erosion control
야계에 토목적 공사를 해서 그 침식을 방지하고 유출을 막고 홍수의 해를 경감시키며 재해를 예방하는 것이다.

No.5997 · 산림청 원문

야면석 野面石 · quarry stone
계곡이나 산지에서 무게가 약 100kg이상인 자연석으로 돌쌓기에 사용된다.

No.5998 · 산림청 원문

야생동물 野生動物 · wildlife
자유로이 이동가능하며 길들여지지 않은 어류, 양서류, 파충류, 조류, 포유류 등의 척추동물.

No.5999 · 산림청 원문

야생묘 野生苗 · wildings, wild seedlings
인공으로 재배하지 않은 야생에서 자라는 묘목

No.6000 · 산림청 원문

야생생물 野生生物 · wildlife
이전에는 wildlife를 야생동물이라 번역하고 포유류와 조류만 주로 지칭하였으나, 지금은 가축으로 길러지지 않고 산과 들에서 자유로이 생활하는 척추동물 즉 조류, 포유류, 파충류, 양서류 및 담수어를 포함하고 나아가서는 육상과 물에 사는 식물과 동물 모두를 통칭한다.

No.6001 · 산림청 원문

야생지역 野生地域 · wild area
사람이 살거나 경작되지 않고 자연 그대로 보존된 지역.

No.6002 · 산림청 원문

야생형 野生型 · wild type
표준형. 돌연변이형에 대비되는 형질로 자연에서 가장 흔히 볼수 있는 형질.

No.6003 · 산림청 원문

야업 野業 · field work
야외작업

No.6004 · 산림청 원문

야영 野營 · camping
도시 중심부에서 벗어난 지역에서 텐트나 그밖에 임시로 이용할 수 있는 산장이나 대피소 등에서 일시적으로 생활함으로써 즐거움이나 만족, 휴식을 추구하는 행위.

No.6005 · 산림청 원문

야영장 野營場 · camping ground
야영을 위해 천막 따위를 치고 야외에서 잠을 잘 수 있는 장소.

No.6006 · 산림청 원문

야외생리학 野外生理學 · field physiology
야외조건에서 실험하는 생리학의 한 분야. 나중에 실험생태학으로 발전하고 개체생태학의 핵심을 이루게 되었다.

No.6007 · 산림청 원문

야외시험 野外試驗 · field trial
환경에서 유전자 변형생물체의 무제한적인 방출의 문제점이나 이 생물체의 적응성, 생존성 등을 조사하기 위하여 유전자 변형생물체를 환경에 방출하여 시험하는 행위.

No.6008 · 산림청 원문

야외조사 野外調査 · field survey
현지조사라고도 하며, 어떤 시업을 실행하기 위하여 시업지에 직접 나가서 사물의 내용을 자세히 관찰하거나 찾아보는 일련의 활동.

No.6009 · 산림청 원문

야외휴양 野外休養 · outdoor recreation
개인이 자유시간에 야외에서 참여하는 즐거움을 동반하고 사회적으로 가치있는 활동.

No.6010 · 산림청 원문

야외휴양관리모델 野外休養管理모델 · outdoor recreation management model
야외휴양지 관리에 관련된 법, 제도, 조직 등을 유기적 시스템으로 연결하는 모형.

No.6011 · 산림청 원문

야자나무류 椰子나무類 · palm trees
Arecaceae에 속한 나무 종류로 열대에서 가장 중요한 작물.

No.6012 · 산림청 원문

야자유 椰子乳 · coconut milk, coconut water
야자열매에서 나오는 진한 액체. 배가 성숙할 때 양분과 생장촉진 호르몬을 제공하는 역할을 담당하며 배가 성숙되면 마르거나 재흡수된다.

No.6013 · 산림청 원문

야잠 野蠶 · wild silkworm
산누에.

No.6014 · 산림청 원문

야장 野帳 · fieldbook
측량 등의 야외작업을 할 때 필요한 자료를 써 넣은 책.

No.6015 · 산림청 원문

야행동물 夜行動物 · nocturnal animals
주로 밤에 섭식과 생식활동을 하는 동물로 주행동물(diurnal animals)의 반대어.

No.6016 · 산림청 원문

야화 野火 · field fire
들불.

No.6017 · 산림청 원문

야화 野化 · escape
도입된 수목으로서 그것이 자연상태에 있어서 증식이 될 수 있을 때.

No.6018 · 산림청 원문

약 葯 · anther
꽃밥이라고도 하며, 소포자엽에 해당하는 수술의 일부에서 화분을 만드는 자루모양 부분

No.6019 · 산림청 원문

약도 略圖 · simplified map
주요한 것만 간략하게 줄여 그린 도면이나 지도.

No.6020 · 산림청 원문

약도의간벌 弱度의間伐 · light thinning
A도 간벌. 하층간벌에서 4급목과 5급목만을 제거하는 간벌.

No.6021 · 산림청 원문

약밤나무 板栗 · Castanea bungeana, chinese chestnut
중국 원산의 밤나무.

No.6022 · 산림청 원문

약배양 葯培養 · anther culture
세포를 증식하거나 식물체를 얻기 위하여 약을 무균상태로 배양하는 기술로 보통 반수체 식물을 얻기 위하여 많이 이용되고 있으나 확보된 반수체를 2배체로 전환시켜 순계로 활용한다는 연구는 실제적으로는 성공한 예가 드물다.

No.6023 · 산림청 원문

약사각사진 弱斜角寫眞 · low oblique photographs
저사각사진(底斜角寫眞)이라고도 하며 카메라축과 연직축(vertical axis)이 만드는 각도가 60° 이하인 사진.

No.6024 · 산림청 원문

약산 弱酸 · weak acid
해리도가 작은 산.

No.6025 · 산림청 원문

약산법 略算法 · approximate calculation
자승법이라고도 하며, 수고 25m, 형수 0.51을 전제로 하여 만든 재적을 구하는 식으로 개략적인 재적을 알고자 할 때 사용하는 방법.

No.6026 · 산림청 원문

약속 約束 · commitment
교역자유화에 따라 각종 보호 및 지원조치를 구체적으로 감축하겠다는 약속.

No.6027 · 산림청 원문

약염기 弱鹽基 · weak acid
해리도가 작은 염기.

No.6028 · 산림청 원문

약용식물 藥用植物 · medicinal plants
약효성분을 고농도로 함유하는 식물의 총칭. 초본일 경우에는 약초라고도 한다.

No.6029 · 산림청 원문

약제저항성 藥劑抵抗性 · drug resistance
어떤 생물의 생육을 저해하는 약제에 대해 그 생물이 변이에 의해 생존, 생육할 수 있게 되는 것.

No.6030 · 산림청 원문

약제주입법 藥劑注入法 · impregnation
약제를 세포 내에 넣는 것.

No.6031 · 산림청 원문

약충 若蟲 · nymph
불완전변태를 하는 곤충의 유충으로 보통은 유충이라고 부르나, 완전변태를 하는 곤충의 유충과 구별이 필요할때 사용한다.

No.6032 · 산림청 원문

양 量 · quantity
세거나 잴 수 있는 분량이나 수량.

No.6033 · 산림청 원문

양각기계획법 兩脚器計劃法 · divider step method
양각기를 이용하여 지형도상에 적정한 종단물매의 임도예정노선을 그리는 것.

No.6034 · 산림청 원문

양극 陽極 · anode positive pole
화학전지의 두 극 중에서 전위가 높은 극.

No.6035 · 산림청 원문

양단면적평균법 兩斷面積平均法 · end area formula
각 측점의 단면적을 이용해 토적을 계산하는 방법으로 일정 구간의 토적을 계산할 때에 양단면적을 구한 후 이를 평균하여 구간거리와 곱하여 토적을 구한다. 일반적으로 실제 토적에 비해 많은 값이 나오지만 도로나 철도의 토적계산에 널리 이용된다.

No.6036 · 산림청 원문

양료 養料 · nutrient
양분

No.6037 · 산림청 원문

양류 陽柳 · lombardy poplar
줄기가 곧고 잔가지가 위로 자라 수형이 빗자루와 같은 사시나무속 수종.

No.6038 · 산림청 원문

양립유관속 兩立維管束 · bicollateral vascular bundle
복병립유관속, 복병립관다발이라고도 하며 목부, 사부 중에서 어느 한쪽이 다른 쪽을 내외 양쪽에서 끼듯이 위치하는 유관속.

No.6039 · 산림청 원문

양면식온실 兩面式溫室 · even span greenhouse
서까래의 길이가 같은 모양의 지붕을 갖는 온실.

No.6040 · 산림청 원문

양버즘나무 美國梧桐 · 學 Platanus occidentalis
북미 원산으로 전국 각지에 가로수, 공원수로 심는 낙엽활엽교목.

No.6041 · 산림청 원문

양봉 養蜂 · beekeeping
벌꿀과 밀랍을 생산하기 위하여 꿀벌을 사양하는 일.

No.6042 · 산림청 원문

양분 養分 · nutrient
양료. 식물의 생장에 필수적이며, 토양 내 원소나 화합물로서 존재하는 것. 식물의 생장과 개화 및 결실에 절대적으로 필요한 양분를 필수양분이라고 한다.

No.6043 · 산림청 원문

양분원소의 생리작용 養分元素生理作用 · -
양분이 식물체에 흡수되어 나타내는 생리적 작용.

No.6044 · 산림청 원문

양분유효도 養分有效度 · nutrient availability
토양 내 존재하는 양분의 식물에 흡수, 이용 가능한 형태로의 존재 척도를 가리킨다. 일반적으로 토양의 pH가 양분의 유효도를 결정하는데, 인의 유효도는 pH 6~7 사이에서 높고 대부분의 중금속은 산성으로 갈수록 유효도가 높아지는 경향이 있다.

No.6045 · 산림청 원문

양생 養生 · curing of concrete
콘크리트를 쳐서 충분히 경화(硬化)하도록 보존하는 것. 즉 일광이나 풍우에 대하여 콘크리트를 보호하고 충격이나 과대한 하중을 받지 않도록 하며, 충분한 습기와 적당한 온도를 유지시키는 과정.

No.6046 · 산림청 원문

양생식물 兩生植物 · amphibious plants
수중과 육상 모두의 환경에서 살 수 있는 유관속 식물.

No.6047 · 산림청 원문

양생제 養生劑 · curing agent
콘크리트가 완전히 굳을 때까지 적당한 수분을 유지하고 충격을 받거나 얼지 아니하도록 보호하는 역할을 하는 보조제.

No.6048 · 산림청 원문

양성생식 兩性生殖 · bisexual reproduction
단성생식의 반대로 수정에 의한 생식.

No.6049 · 산림청 원문

양성원소 陽性元素 · positive element
원자부터 전자를 잃고 쉽게 양이온으로 될 수 있는 원소. 금속원소는 모두 양성원소이나 특히 알칼리금속이 대표적 양성원소이다.

No.6050 · 산림청 원문

양성이온 兩性이온 · ampho-ion
양성전해질이 그 자신의 분자 내에서 양자를 이동시키는 결과 생기는 일종의 전기적 쌍극자.

No.6051 · 산림청 원문

양성잡종 兩性雜種 · dihybrid
2유전자잡종. 2개의 특정유전자에서의 이형접합체.

No.6052 · 산림청 원문

양성전해질 兩性電解質 · amphoteric electrolyte
산성 및 염기성의 양성질을 가지는 전해질.

No.6053 · 산림청 원문

양성콜로이드 陽性콜로이드 · positive colloid
입자가 양전하를 가지는 콜로이드.

No.6054 · 산림청 원문

양성화 兩性花 · bisexual flower
하나의 꽃에 암술 및 수술을 함께 갖는 꽃.

No.6055 · 산림청 원문

양성화합물 兩性化合物 · amphotric compound
산성의 용액에서는 염기의 작용을 하고 염기성의 용액에서는 산의 작용을 하는 화합물.

No.6056 · 산림청 원문

양수 陽樹 · intolerant tree
어릴 때에는 비교적 많은 양의 햇볕을 요구하는 수종. 양수는 광포화점이 높고, 광보상점이 낮아 광도가 높은 조건에서는 잘 자라지만 광도가 낮은 조건에서는 갱신이 되지 않고 잘 자라지 못한다.

No.6057 · 산림청 원문

양수 揚樹 · Upliftpressure
빛을 좋아하는 나무 수종

No.6058 · 산림청 원문

양수곡선 量水曲線 · hydrograph
수문곡선

No.6059 · 산림청 원문

양수류 陽樹類 · light demanding trees
양수성 수목 부류

No.6060 · 산림청 원문

양수언 量水堰 · gauging weir, measuring weir
양수웨어, 산림유역 내에서 이수시험을 하는 장치, 댐, 웨어시설

No.6061 · 산림청 원문

양수웨어 量水웨어 · gauging weir, measuring weir
하천의 수위 및 수심을 확보하고 수위 및 유량을 측정하기 위하여 하천을 횡단하여 설치하는 관측용 하천공작물로서, 수문현상을 연구하는데 필요한 산림유역시험의 주요시설의 하나.

No.6062 · 산림청 원문

양엽 陽葉 · sun leaf
많은 햇빛을 받고 자란 잎으로서 높은 광도에서 광합성을 하는데 유리한 형질, 즉 큐티클층과 잎의 두께가 두껍고 울타리 조직이 잘 발달되어 있고 크기는 비교적 작다.

No.6063 · 산림청 원문

양의상관 陽의相關 · positive correlation
어느 두 형질 사이에 한쪽 값이 많아지면 다른 쪽도 많아지는 관계를 말함.

No.6064 · 산림청 원문

양이온 - · positive ion
양전하를 가진 이온.

No.6065 · 산림청 원문

양이온교환 陽이온交換 · cation exchange
토양에 정전기적으로 흡착되었던 양이온이 용액 중의 다른 양이온과 교환되어 토양용액 중으로 방출되는 현상.

No.6066 · 산림청 원문

양이온교환용량 陽이온交換容量 · cation exchange capacity
특정 pH에서 일정량의 토양에 전기적 인력에 의하여 다른 양이온과 교환이 가능한 형태로 흡착된 양이온의 총량.

No.6067 · 산림청 원문

양이온치환 陽이온置換 · cation exchange
양이온교환.

No.6068 · 산림청 원문

양이온치환용량 陽이온置換容量 · cation exchange capacity
양이온교환용량.

No.6069 · 산림청 원문

양이온흡착용량 陽이온吸着容量 · cation absorption capacity
양이온교환용량.

No.6070 · 산림청 원문

양자 陽子 · proton
양의 전하를 가지며 원자액을 구성하는 소립자의 하나로 전자 질량의 1836.14배의 질량을 가진다.

No.6071 · 산림청 원문

양자간 무역협정 兩者間 貿易協定 · bilateral trade agreement
두 나라간의 교역수행 조건을 설정하기 위해 체결하는 협정.

No.6072 · 산림청 원문

양적생장 量的生長 · quantity increasement
세포의 수, 생물체의 무게 또는 체적이 양적으로 증가하는 생장으로서 형태적, 기능적으로 특수화하는 질적 생장과 대비된다.

No.6073 · 산림청 원문

양적유전 量的遺傳 · quantitative inheritance
길이, 면적, 무게 등의 수치로 나타낼 수 있는 형질의 유전

No.6074 · 산림청 원문

양적유전학 - · Quantitative genetics
다수의 미소효과를 갖는 유전자나 환경이 양적인 형질에 미치는 영향을 연구하는 집단 유전학의 한 분야

No.6075 · 산림청 원문

양적형질 量的形質 · quantitative character
복합유전자에 의해서 조절되는 양적형질

No.6076 · 산림청 원문

양전자 陽電子 · positron
속성은 전자와 같지만 양의 전하를 가지는 소립자.

No.6077 · 산림청 원문

양전하 陽電荷 · positive electric charge
양의 전기를 띤 전하.

No.6078 · 산림청 원문

양접 陽? · bench grafting
양묘장에서 이루어지는 접목.

No.6079 · 산림청 원문

양질 陽疾 · compression wood, hard steaks
침엽수 측지의 아래쪽 또는 경사진 줄기의 아래쪽에 연령에 따라 발달한 이상재의 붉고 단단하게 된 부분.

No.6080 · 산림청 원문

양철 洋鐵 · tin plate
철판의 표면에 주석을 입힌 것.

No.6081 · 산림청 원문

양측검정 兩側檢定 · double-tailed or two-tailed test
검정량이 기각치 이하이거나 이상이면 귀무가설을 기각하는 검정.

No.6082 · 산림청 원문

양치식물 羊齒植物 · ferns, pteridophytes
고사리 식물. 1) 녹색 유관속 식물중의 하나로 줄기는 모두 근경이다. 이끼나 지의류에 비하여 뿌리를 갖고 있다는 점은 종자식물과 양치식물의 공통점이다. 종자식물은 유근에서 처음으로 주근을 발달시키지만, 양치식물은 처음부터 부정근을 발달시키는 점이 종자식물과의 차이점이다. 2) 관속식물이지만 포자로 번식하는 식물의 총칭.

No.6083 · 산림청 원문

양치잎 羊齒葉 · frond
양치식물에 달리는 잎은 종자식물에 달리는 잎과 구분하여 다르게 쓴다. 양치잎에는 포자낭이 형성되지 않은 영양엽(sterile frond)과 포자낭이 만들어지는 포자엽(fertile frond) 등 두 가지가 있다.

No.6084 · 산림청 원문

양토 壤土 · loam
52% 미만의 모래, 28~50%의 미사, 그리고 7~27%의 점토가 포함된 토양의 토성.

No.6085 · 산림청 원문

양허관세 讓許關稅 · bounded tariffs
다자간 협상과정을 통해 국제적으로 공인된 관세.

No.6086 · 산림청 원문

양허표 讓許表 · schedules of concessions
GATT에서 관세교섭 결과로서 관세율 등을 국별로 종합한 것. GATT일반협정에 부속되어 있으며, 협정의 일부분을 이루고 있다.

No.6087 · 산림청 원문

양허표의 수정 讓許表의 修正 · modification of schedules
GATT 28조에 의거하여 관세양허가 수정되거나 철회될 때 보상의 협상을 위한 절차.

No.6088 · 산림청 원문

양화 陽畵 · postive picture
피사체나 원도와 같은 명암이나 색상을 지닌 화상.

No.6089 · 산림청 원문

어교 魚膠 · fishglue
부레풀. 말린 민어의 부레를 끓여서 만든 풀.

No.6090 · 산림청 원문

어긋나기 互生 · alternate
잎 등이 배열하는데 1개의 마디에 1개씩 달리는 경우.

No.6091 · 산림청 원문

어는점 氷點 · freezing point
액체를 냉각시켜 고체로 상태변화가 일어나기 시작할 때의 온도. 빙점.

No.6092 · 산림청 원문

어도 魚道 · fish path
높낮이가 심하지 아니한 고깃길

No.6093 · 산림청 원문

어리기생성천적 捕食寄生性天敵 · parasitoid
기주 곤충에 기생하지만, 결국엔 기주를 완전히 죽이면서 생장발달함. 일반 기생성 곤충은 기주를 죽이지는 않음. 예로 솔잎혹파리 먹좀벌이 등이 있음.

No.6094 · 산림청 원문

어린나무 稚樹 · young tree
수령이 적은 작은 나무. 치수(稚樹)는 자연적으로 자라난 어린 나무를 뜻하는 것으로 의미가 조금 다르게 쓰이기도 한다.

No.6095 · 산림청 원문

어린나무가꾸기 稚樹撫育 · tending of young tree
임지에 있는 어린 나무를 잘 자라게 하기 위한 작업.

No.6096 · 산림청 원문

어린새 幼鳥 · juvenile bird
알에서 깬 뒤에 깃털이 완성되고 그로부터 처음 깃털갈이(보통, 태어난 해의 가을)를 하기까지의 새.

No.6097 · 산림청 원문

어린이공원 兒童公園 · children´s park
도시공원및녹지등에관한법률에 의해 조성되는 도시공원중 생활권공원의 하나로서 어린이들의 휴식과 놀이를 위한 공간제공을 목적으로 제공되는 공원으로 최소규모를 1,500제곱미터 이상으로 정하고 있음

No.6098 · 산림청 원문

어메니티 快適景觀 · amenity
쾌적성. 어떠한 공간에 존재하는 인간에게 친근감을 주는 모든 특성.

No.6099 · 산림청 원문

어미나무 母樹 · mother tree
충분히 자라서 열매를 생산하는 나무.

No.6100 · 산림청 원문

어미새 成鳥 · adult bird
웬만큼 자라서 깃털색에 큰 변화가 일어나지 않는 나이에 다다른 새로 성적으로 성숙하여 번식 능력이 있는 새.

No.6101 · 산림청 원문

어부림 魚付林 · forest for fish shelter
어류의 유치와 증식을 위해 조성한 숲.

No.6102 · 산림청 원문

어부보안림 魚付保安林 · providing fish habitat forest
해류가 급하지 않고 간만(干滿)의 차가 작은 해안선을 따라 어류의 유치 및 증식상 필요하다고 인정되어 보안림으로 지정된 산림.

No.6103 · 산림청 원문

어스렝이나방 - · Dictyoploca japonica, camphor silk moth
산누에나방. 밤나무, 호두나무, 플라타너스, 은행나무 등의 잎을 갉아먹는다. 유충은 어릴 때에는 흑색이지만 커지면서 황갈색으로 된다.

No.6104 · 산림청 원문

어안렌즈 魚眼렌즈 · fisheye lens
카메라 앵글이 180도를 넘는 초광각 렌즈. 전천렌즈 혹은 스카이렌즈라고도 함.

No.6105 · 산림청 원문

어유 魚油 · fish oil
정어리 등에서 얻는 지방기름.

No.6106 · 산림청 원문

억압유전자 抑壓遺傳子 · suppressor, inhibitor
억제유전자.

No.6107 · 산림청 원문

억제공 抑制工 · control works
사면 붕괴가 발생하는 것을 억눌러 그치게 함하는 공법

No.6108 · 산림청 원문

억제물질휴면성 抑制物質休眠性 · inhibitor dormancy
종자조직의 어느 부분에 화학적인 발아억제물질이 생겨 휴면의 원인이 되는 것.

No.6109 · 산림청 원문

억제유전자 抑制遺傳子 · suppressor, inhibitor
어떤 형질의 발현을 억제하도록 작용하는 돌연변이 유전자.

No.6110 · 산림청 원문

억지공 抑止工 · restraining works
억눌러 산사태, 사면붕괴 등의 발생이 없도록 하는 공법.

No.6111 · 산림청 원문

언피해 凍害 · freezing damage
동해. 영하의 온도에 의해서 일어나는 식물의 피해.

No.6112 · 산림청 원문

얼룩 斑點 · variegation
한 가지 색으로 되어야 할 조직이 두 가지 이상의 다른 색으로 된 경우.

No.6113 · 산림청 원문

엄격한 보호구역 嚴格한 保護區域 · strict protection
학술목적 또는 원생지(wilderness)를 보호하는 것을 주목적으로 관리하는 보호구역.

No.6114 · 산림청 원문

엄나무(음나무) 海桐木 · 學 Kalopanax pictum
전국에 분포하는 낙엽활엽교목으로 가지에 가시가 많다. 잎은 손바닥모양으로 5-9개로 갈라져 있으며, 어린 잎과 수피는 식용으로 사용된다.

No.6115 · 산림청 원문

엄밀집성사진 嚴密集成寫眞 · controlled mosaic photo
편위수정된 여러 장의 항공사진을 결합하여 만들어진 사진으로, 동일한 축척을 가지는 사진과 연직사진을 가지고 만들었기 때문에 모자이크의 어느 부분에서나 축척이 동일하게 된다.

No.6116 · 산림청 원문

에너지 원단위 - · energy intensity
어떤 재화나 서비스의 생산 물량 단위 또는 부가가치 단위에 대한 에너지 투입량 비율을 말하며, 에너지 분야에서 주로 사용하는 원단위에는 물량에너지 원단위와 부가가치원단위가 있다. 물량에너지 원단위는 제품생산량 에너지 소비량이며, 부가가치원단위는 부가가치 액당 에너지 소비량을 의미한다.

No.6117 · 산림청 원문

에너지 자립도 에너지 自立度 · energy self sufficiecy
국내 총소비에너지량에 대하여 신 · 재생에너지 등 국내 생산에너지량 및 우리나라가 국외에서 개발(지분 취득을 포함한다)한 에너지량을 합한 양이 차지하는 비율을 말한다.

No.6118 · 산림청 원문

에너지대사율 에너지代謝率 · relative metabolic rate
육체적 작업강도를 나타내는 것으로 R.M.R. = (작업할 때 소비되는 에너지 - 안정할 때의 에너지)/기초대사에너지.

No.6119 · 산림청 원문

에너지흐름 - · energy flow
생태계에서 생물요소간 및 생물과 비생물요소간의 에너지 흐름. 태양에서 오는 빛에너지의 일부는 생산자에 의해 화학에너지로 전환되고, 그 후 먹이사슬, 부식연쇄의 영양단계를 통해 흘러간다.

No.6120 · 산림청 원문

에다폰 土壤微小生物群集 · edaphone
토양 표면 혹은 내부에 분포하는 비교적 미소한 생물의 군집.

No.6121 · 산림청 원문

에르고메타 - · ergometer
실내체력훈련과 재활의학에서 정확한 운동부하를 설정할 수 있는 기구로 보통은 자전거 형태로 전자식 또는 기계식 장치에 의하여 일정한 속도로 바퀴가 회전시 마찰력을 조정하여 정확한 운동부하 설정이 가능하다.

No.6122 · 산림청 원문

에르고스테롤 - · ergosterol
살아있는 곰팡이의 균사 원형질막에 존재하는 스테롤로서 균사의 양을 추정하는데 이용될 수 있다. 비타민 D의 전구물질이다.

No.6123 · 산림청 원문

에르고티오네인 - · ergothioneine
아미노산 구조의 화합물. 에르고티오네인은 항산화 물질로 인체나 동물의 혈액, 간, 신장, 뇌, 안구, 중추신경계, 골수 등에서 발견되고 있으며 활성산소 등에 의한 이들 세포의 산화적 반응을 억제하는 기능을 한다. 또한 에르고티오네인은 생체 내에서 적혈구의 에너지 요구도를 조절하는 역할을 함으로써 세포의 정상적인 대사기능에 중요한 역할을 하고 있다. 에르고티오네인은 버섯류와 같은 균류나 마이코박테리아에서만 생합성되며 인간이나 동물 및 고등식물 내에서는 생합성되지 못하여 외부로부터 공급, 흡수되어야만 하는 물질이다.

No.6124 · 산림청 원문

에르그 - · erg
일 또는 에너지의 CGS 단위.

No.6125 · 산림청 원문

에브시식산 落葉酸 · abscisic acid, ABA
식물호르몬의 하나로 휴면 유도, 탈리 현상 촉진, 수분 스트레스 감지 및 기공 폐쇄, 종자발아억제 등의 작용을 한다.

No.6126 · 산림청 원문

에스?티?에이치 生長激素 · s.t.h
생장호르몬(somatotrophic hormone)의 약칭.

No.6127 · 산림청 원문

에스에이치시약 SH 試藥 · SH-reagent
SH기와 반응해서 그 기능을 억제하는 시약.

No.6128 · 산림청 원문

에스유전자 S 遺傳子 · S-gene
식물의 수분과정에서 화분과 화주의 성질을 지배하는 유전자로 염성과 불염성을 정한다.

No.6129 · 산림청 원문

에스자상곡선 S 字狀曲線 · sigmoid curve
S자 형태로 된 곡선.

No.6130 · 산림청 원문

에스테레이스 - · esterase
가수분해효소류 중 에스테르의 가수분해반응을 촉매하는 효소의 총칭.

No.6131 · 산림청 원문

에스테르 - · ester
산과 알코올이 작용하여 생긴 화합물.

No.6132 · 산림청 원문

에스테르가 에스테르價 · ester value
유지나 왁스 1그램에 들어 있는 에스테르를 비누화하는데 필요한 수산화칼륨의 mg 수.

No.6133 · 산림청 원문

에스테르화 에스테르化 · esterification
산을 에스테르로 변화시키는 것.

No.6134 · 산림청 원문

에어로졸 - · aerosol
대기중의 미세한 입자들로서 화산폭발이나 화재, 매연 등이 자연요인과 인위적 요인으로도 생긴다. 이것은 온실가스와는 태양관을 차단하거나 산란 시켜서 대기를 냉각 시키고 빗방울이나 눈의 핵이 되기도 한다.

No.6135 · 산림청 원문

에오신 - · eosine
선명한 붉은 색의 산성 색소.

No.6136 · 산림청 원문

에오신액 에오신液 · eosin solution
원형질, 유세포의 세포막을 염색하는 용액.

No.6137 · 산림청 원문

에이디피 ADP · adenosine diphosphate]
(설명 없음)

No.6138 · 산림청 원문

에이제로층 A0 層 · A0 horizon
토양단면에서 지표 아래있는 유기물층.

No.6139 · 산림청 원문

에이층 A 層 · A horizon
토양단면의 무기광물 가장 윗층으로 표층 혹은 용탈층이라고도 한다.

No.6140 · 산림청 원문

에이티피 - · ATP, adenosine triphosphate
(설명 없음)

No.6141 · 산림청 원문

에코케이션 - · ecocation
에코 투어에 문화재를 통한 역사 교육이라는 교육적 효과까지 겸할 수 있는 단어

No.6142 · 산림청 원문

에코테리언 - · ecotarian
친환경 방식으로 만든 음식만 먹는 사람을 뜻하는 것

No.6143 · 산림청 원문

에코필라 사방댐 親環境沙防댐 · eco-pillar check dam
재해예방은 물론 생태계 보호와 자연 훼손을 최소화하고 설치비가 적게 드는 효율적인 공법으로, 앞뒤 2줄로 간격을 두고 설치된 대형 콘크리트 기둥이 돌과 나무 등을 걸러내고, 댐 위 아래의 물길을 이어줘 어도 없이도 물고기의 이동이 자유롭게 설계된 게 특징이다.

No.6144 · 산림청 원문

에키나타소나무 - · shortleaf pine, 學 Pinus echinata
미국 남동부 원산으로 짙은 푸른 색의 2개 침엽이 묶음으로 된 소나무.

No.6145 · 산림청 원문

에탄 - · ethane
탄소 수가 두 인 포화 탄화수소. 무색무취의 기체로 천연가스나 석탄가스에 들어 있다.

No.6146 · 산림청 원문

에탄올 - · ethanol
에탄의 수소 원자 하나를 하이드록시기로 치환한 화합물로 무색투명한 휘발성 액체.

No.6147 · 산림청 원문

에테르 - · ether
산소 원자에 두 개의 탄화수소기가 결합된 유기화합물을 통틀어 이르는 말.

No.6148 · 산림청 원문

에테르화 목재 - · etherified wood
목재에 트리에틸아민을 촉매로 하여 프로필렌옥사이드, 부틸렌옥사이드, 에피클로하이드린 등의 에폭시드를 가압하에서 고온으로 반응시키면 에테르화 목재가 된다.

No.6149 · 산림청 원문

에틸렌 - · ethylene
원유와 천연가스로부터 얻을 수 있는 무색의 가스로 폴리에틸렌을 비롯한 여러 화학물질의 제조에 사용된다.

No.6150 · 산림청 원문

에틸렌이민 - · ethylene imine
암모니아 비슷한 냄새를 가지는 액체.

No.6151 · 산림청 원문

에틸아민 - · ethylamine
탄소 수가 두 개인 일차 아민. 무색의 액체로 물에 녹으며 암모니아와 비슷한 냄새가 난다.

No.6152 · 산림청 원문

에틸알코올 - · ethyl alcohol
알코올, 에탄올, 주정이라고도 하며 사슬 또는 지방족 고리 탄화수소의 수소를 하이드록시기로 치환한 화합물을 통틀어 이르는 말.

No.6153 · 산림청 원문

에틸에테르(디에틸에테르) - · ethyl ether, diethyl ether
산소 원자에 에틸기가 두 개 결합한 화합물. 무색의 액체로 에틸알코올에 진한 황산을 넣고 증류하여 만든다.

No.6154 · 산림청 원문

에프분포 F 分布 · F distribution
추측통계학에서 가설 검정에 쓰는 분포이다.

No.6155 · 산림청 원문

에프원 - · F_1
잡종 제1세대의 기호.

No.6156 · 산림청 원문

엑손 - · exon
한 유전자안에서 mRNA로 전사되는 핵산염기서열.

No.6157 · 산림청 원문

엑스선 X 線 · X-rays
감마선과 자외선의 중간 파장에 해당하는 전자기파.

No.6158 · 산림청 원문

엑스염색체 X 染色體 · X-choromosome
성을 결정하는 성염색체의 하나. 수컷의 체세포에 하나가 들어 있고, 암컷의 체세포에 두 개씩 들어 있다.

No.6159 · 산림청 원문

엑스원 - · X_1
X선 조사후의 제1세대를 나타내는 부호.

No.6160 · 산림청 원문

엔에스비 NS비 · NS ratio
습윤도를 나타내는 지수로 N/S = 강수량/(포화수증기장력 - 실제 수증기장력)으로 정의되며 보통 연간량을 대상으로 한다.

No.6161 · 산림청 원문

엔트로피 - · entropy
한 물리적 계(system)의 무질서의 정도. 외부로부터 에너지가 공급되지 않는 폐쇄된 계에서는 열역학 제2의 법칙에서 엔트로피 즉, 일에 사용될 수 없는 에너지는 일정하게 남아있으며 절대 감소하지 않는다.

No.6162 · 산림청 원문

엔티솔 - · Entisols
A층 이외는 특별한 층위발달이 없으며 모재상태가 유지되고 있는 토양목이다.

No.6163 · 산림청 원문

엘디50 50% 致死量 · LD50(lethal dose 50%)
대상 생물의 50%를 죽일 수 있는 방사선 또는 약제 등의 양.

No.6164 · 산림청 원문

엘래미 - · elemi
필리핀에서 나는 Burseraceae에 속하는 Canarium luzonicum으로 부터 얻어지는 끈적끈적한 풀 모양의 수지. 도료의 원료가 된다.

No.6165 · 산림청 원문

엘리시타 誘導因子 · elicitor
식물이 가지는 전신방어기능을 말하는 것으로서, phytoalexin같은 성분이 방어물질로 작용한다.

No.6166 · 산림청 원문

엠염색체 M 染色體 · M-chromosome
중앙부에 동원체를 가지는 보통의 염색체로 M은 median을 나타낸다.

No.6167 · 산림청 원문

엥글러 - · Heinrich Gustav Adolp Engler
독일의 대표적인 식물학자(1844~1930).

No.6168 · 산림청 원문

여가 餘暇 · leisure
인간의 기본욕구 충족과 일과 생활 등을 위해 필요한 시간을 제외한 나머지 비구속시간 중 개인의 자유의사대로 행할 수 있는 시간.

No.6169 · 산림청 원문

여과 濾過 · filtration
다공성물질을 사용해서 액체만 통과시키고 개체와 액체를 분리하는 방법.

No.6170 · 산림청 원문

여과성병원체 濾過性病原體 · filtrable microorganism
바이러스. 여과성미생물 혹은 여과성병독이라고도 한다.

No.6171 · 산림청 원문

여관 濾管 · filter tube
여과에 사용하는 관. 여과지를 사용할 수 없는 강산, 강알칼리의 용액을 여과하는데 사용하며 주로 유리로 만든다.

No.6172 · 산림청 원문

여교배 戾交配 · backcross
잡종 제1대와 처음 교잡에 사용한 양친중 어느 한쪽과의 교잡

No.6173 · 산림청 원문

여교잡 戾交雜 · backcross
교잡에 의해 생긴 잡종과 그 양친 중 어느 한편과의 교배를 말하며 퇴교잡이라고도 한다.

No.6174 · 산림청 원문

여교잡육종 戾交雜育種 · backcross method of breeding
여교잡을 한 번 이상 사용하는 육종.

No.6175 · 산림청 원문

여교잡친 戾交雜親 · backcross parent
여교잡할 때의 양친.

No.6176 · 산림청 원문

여기 廬起 · excitation
원자 또는 분자의 가장 밖에 있는 전자는 보통 어너지 기준상태에 있는데 외부로부터 자극에 의해 원자나 분자에 있는 전자가 더 높은 어너지 상태로 되는 경우를 가르킨다.

No.6177 · 산림청 원문

여기상태 廬起狀態 · excited state
여기된 상태.

No.6178 · 산림청 원문

여러해살이풀 - · perennial herb
다년생초본.

No.6179 · 산림청 원문

여론조사 與論調査 · public opinion survey
대중의 자유로운 의사를 알기 위하여 개별적인 면접이나 질문서를 보내거나 하여 자료를 모아 세론(世論)을 조사하는 일.

No.6180 · 산림청 원문

여름깃 夏羽 · summer plumage
번식깃(breeding plumage)과 같은 의미로써 조류의 번식에 관계가 있는 깃털.

No.6181 · 산림청 원문

여름사진 夏寫眞 · summer photographs
여름에 촬영된 사진으로 산림사진으로는 가장 알맞으며 대략적인 수종과 임상의 판별에는 적합하나 수종간의 색조의 변화가 크지 않으므로 상세한 수종 판별은 곤란하다.

No.6182 · 산림청 원문

여름잠 夏眠 · aestivation
생물이 무덥고 건조한 계절을 휴면으로 지내는 것을 말하는데 동면과 대비가 된다.

No.6183 · 산림청 원문

여름철새 夏鳥 · summer visitor
봄에 동남 아시아 등 남쪽으로부터 찾아와 우리나라에서 번식하고 가을에는 다시 남쪽으로 이동하는 새.

No.6184 · 산림청 원문

여름포자 夏胞子 · urediniospore
단세포아고 구형 내지 난형이며, 여름포자의 표면에도 다양한 무늬돌기가 존재한다.

No.6185 · 산림청 원문

여름형 일년초 夏型 一年草 · therophyte
라운키에르(C. Rounkier)의 고등식물 생활형의 하나로 일년생 식물이 생활에 양호한 생육기간 중에 발아하여 결실까지 생활환을 마치고 생활에 불리한 기간에는 종자상태로 지나는 식물을 말한다.

No.6186 · 산림청 원문

여색도화기 餘色圖化機 · anaglyphic plotting instrument
여색입체시에 의하여 입체사진을 측정하면서 도화하는 기계.

No.6187 · 산림청 원문

여색법 餘色法 · anagryphic method
두 장의 입체사진을 서로의 여색(餘色)으로 투영 또는 인쇄하여 같은 여색의 필터를 통해 볼 때 입체적 모델을 얻을 수 있는 방법.

No.6188 · 산림청 원문

여색사진 餘色寫眞 · anagryphics
중복된 두 장의 사진을 가지고 중복부를 한 장의 종이 위에 중복시켜 인쇄하여 두 눈으로 서로 다른 사진 상을 볼 수 있도록 인쇄한 것으로 한 사진은 적색, 다른 사진은 청색의 여색으로 인쇄한 사진을 말한다.

No.6189 · 산림청 원문

여성 餘盛 · extra banking
더쌓기. 더돋기. 흙쌓기를 실시할 때 5~10% 정도를 더 쌓아 지반의 침하에 대비하는 것을 말한다. 즉 일반적으로 흙쌓기를 실시한 지역은 시간이 경과함에 따라 수축하여 용적이 감소되어서 시공면이 어느 정도 침하되기 때문에 더쌓기를 실시한다.

No.6190 · 산림청 원문

여유고 餘裕高 · allowable height
둑 따위를 쌓을 때 홍수나 파도에 대비하여, 평상시의 수위보다 더 높이 쌓는 여유분의 높이.

No.6191 · 산림청 원문

여유변수 餘裕變數 · slack variables
선형계획모형에서 수식모델을 구성하는 과정에서 최적해는 결코 이용할 수 있는 모든 자원을 전부 사용하는 것은 아니다. 사용되지 않은 자원을 설명하기에 충분한 일반적인 모형을 구성하기 위해서 도입된 변수가 여유변수이다.

No.6192 · 산림청 원문

여조 旅鳥 · travellers
어떤 지방을 통과하고 있는 새.

No.6193 · 산림청 원문

여지 濾紙 · filter paper
다공질의 종이로 액체중의 침전물 또는 협잡물을 선별하는데 사용되는 것.

No.6194 · 산림청 원문

여판 濾板 · filter plate
많은 작은 구멍을 가지는 유리 혹은 자석의 성질을 가지는 체.

No.6195 · 산림청 원문

여행경험 旅行經驗 · traveling experience
여행의 실천을 통하여 직접 자아에 얻게되는 지식 또는 기능.

No.6196 · 산림청 원문

여행동기 旅行動機 · traveling motive
여행에 대해 행동을 활성화하고 지시하고 유도하는 내적 상태.

No.6197 · 산림청 원문

여행비용법 旅行費用法 · traveling cost model
자연자원을 위락의 장소로 이용하는 사람들이 지출한 비용, 즉 여행기간 동안 상실한 기회비용(소득)으로부터 자연환경의 가치를 평가하는 방법.

No.6198 · 산림청 원문

여행태도 旅行態度 · traveling attitude
여행에 대하여 일관성 있게 호의적 혹은 비호의적으로 반응하려는 학습된 경향.

No.6199 · 산림청 원문

역 ? · threshold
한계라고도 하며, 어떤 원인이 생체에 반응을 일으키느냐 그렇지 않느냐의 한계.

No.6200 · 산림청 원문

역가 力價 · titer strength
적정에 사용하는 표준 용액 작용의 세기. 1리터의 용액 중에 존재하는 용질의 그람당량수를 그 용액의 역가라 한다.

No.6201 · 산림청 원문

역교잡 逆交雜 · back cross
여교잡이라고도 하며, 교잡에 의해서 생긴 잡종과 그 양친 중 하나와의 교배 또는 양친 중 한쪽과 동일한 유전자형을 가진 개체와의 교배.

No.6202 · 산림청 원문

역권의경계 役權의境界 · boundry of servitude
특정인 혹은 특정 토지의 편익을 위해 타인의 부동산이나 동산을 제한적으로 직접 사용할 수 있는 권리의 한계를 의미한다. 역권은 자신의 토지의 편익을 위해 타인의 토지를 이용하는 지역권과 특정인의 이익을 위하여 타인의 물건이나 권리, 또는 재산을 이용하는 인역권으로 나누어진다.

No.6203 · 산림청 원문

역류냉각기 逆流冷却器 · counter current condenser
환류냉각기. 용매의 증기를 냉각하고 응축하여 다시 원래의 용기 안으로 돌려 보내는 유리 기구.

No.6204 · 산림청 원문

역사공원 歷史公園 · historic park
도시공원및녹지등에관한법률에 의해 조성되는 도시공원중 주제공원의 하나로서 역사와 관련된 주제를 가지고 조성하는 공원

No.6205 · 산림청 원문

역암 礫石 · conglomerate
퇴적암의 일종으로 물에 의하여 운반, 퇴적되어 마모정도가 심하고 자갈과 모래가 섞여서 굳어진 암석.

No.6206 · 산림청 원문

역위 逆位 · inversion
염색체 이상으로 유전자 순서가 반대로 되는 현상.

No.6207 · 산림청 원문

역작용 逆作用 · reaction
의도한 것과는 정반대의 영향을 주는 작용.

No.6208 · 산림청 원문

역적 力積 · impulse
충격량. 힘의 크기와 그 힘이 작용한 시간과의 곱.

No.6209 · 산림청 원문

역전사 易轉寫 · reverse transcription
외가닥의 mRNA 분자를 주형으로 complementary DNA를 만들어내는 반응.

No.6210 · 산림청 원문

역전사효소 易轉寫酵素 · reverse transcriptase
역전사에 사용되는 효소.

No.6211 · 산림청 원문

역접 逆? · reciprocal graft
거꾸로 붙이는 접붙이기 방법.

No.6212 · 산림청 원문

역지 力枝 · major branch
가장 길고 굵은 가지.

No.6213 · 산림청 원문

역청탄 瀝青炭 · bituminous coal
검고 광택이 있는 가장 일반적인 석탄. 갈탄과 무연탄의 중간 정도로 탄화된 것으로 탄소의 함량은 무연탄보다 적지만 유질이 풍부하다.

No.6214 · 산림청 원문

역토 礫土 · gravel soil
토양 입자 중 지름이 2mm 이상인 광물질 입자를 석력(石礫, gravel)이라고 하며 대부분 석력으로 된 땅.

No.6215 · 산림청 원문

역티아접 逆 T 芽? · inverted T budding
눈을 떼어 거꾸로 붙이는 접.

No.6216 · 산림청 원문

역학 力學 · dynamics, mechanics
물체의 운동에 관한 법칙을 연구하는 학문.

No.6217 · 산림청 원문

역학조사 疫學調査 · epidemiology
어떤 병의 원인과 전파경로를 파악하는 일이다. 병이 발생한 장소, 시간, 환경 등을 조사하여 원인과 경로를 밝혀서 병을 차단하고 예방하는 것이 목적이다.

No.6218 · 산림청 원문

역화 逆火 · back fire
산불이 확대되어 소화하기 어려울 정도로 불길이 셀 때에 산불연소방향 정면에 맞불을 놓는 것으로서 불을 끄기위한 최후의 수단이며 간접진화 방법.

No.6219 · 산림청 원문

역효과 逆效果 · adverse effect
기대하였던 바와는 정반대가 되는 효과.

No.6220 · 산림청 원문

연간등가소득 年間等價所得 · equivalent annual income, EAI
순현재가치(net present value, NPV)와 비슷한 특성을 갖는 또 다른 비교의 기준으로 순현재가치를 먼저 구하고 자본복구승수를 곱함으로써 구한다.

No.6221 · 산림청 원문

연결녹지 連結綠地 · connection green
도시 안의 공원 · 하천 · 산지 등을 유기적으로 연결하고 도시민에게 산책공간의 역할을 하는 등 여가 · 휴식을 제공하는 선형(線型)의 녹지로서 도시공원및녹지등에관한벌률에 의해 관리됨

No.6222 · 산림청 원문

연결사 連結絲 · connection filber
세포가 유사분열을 할 때 세포의 양극과 염색체 또는 염색체와 염색체를 잇는 실 모양의 미세 소관으로 이루어진 화합물.

No.6223 · 산림청 원문

연계군 連繫群 · circle of races
약간씩 형태를 다르게 하는 종보다 낮은 군이 다른 분포권을 점유하면서 점차적으로 연쇄하여 전체적으로는 종합된 단위를 나타내는 것.

No.6224 · 산림청 원문

연계종 連繫種 · circle of species
전체로서는 분포권이 넓으나 그것을 조성하는 개개의 종은 지방적으로 약간 다른 때.

No.6225 · 산림청 원문

연관 連關 · linkage
둘 이상의 유전자가 동일한 염색체에 있는 현상. 연쇄.

No.6226 · 산림청 원문

연관군 連關群 · linkage group
동일 염색체 위에 있는 유전자들의 집합. 특정 유전자와 관련된 연관군이 아닌 염색체 전체로 간주할 때는 반 염색체수와 같은 연관군으로 표현할 수 있다.

No.6227 · 산림청 원문

연관지도 連關地圖 · linkage map
염색체 위에 유전자의 상대적 위치를 표시한 염색체지도.

No.6228 · 산림청 원문

연구개발 硏究開發 · research and development, R&D
엄밀히 말하면 research는 기초연구와 그 응용화 연구, development는 이러한 연구성과를 기초로 제품화까지 진행하는 개발업무를 가리키나, 양자는 밀접한 관계에 있어 영역을 확실히 구별하기는 어렵다.

No.6229 · 산림청 원문

연구개발지표 硏究開發指標 · R&D indexes
연구개발은 기업에서 주로 신제품을 연구하는 것이며 이를 통해 경쟁의 우월성을 확보하거나 유지하고 장기에 걸쳐 보다 큰 이윤을 가져오게 하는 것이다. 한 나라의 연구개발 능력을 나타내는 지표로는 흔히 총국민총생산에서 차지하는 연구개발 투자비의 비중이 이용되고 있다.

No.6230 · 산림청 원문

연년목재생산가능량 連年木材生産可能量 · annual allowable cut
산림에서 총재적을 감소시키지 않는 범위 내에서 매년 생장량만큼을 연년목재생산 가능량으로 한다.

No.6231 · 산림청 원문

연년보속작업 連年保續作業 · sustained annual yield working
산림에서 생장량만큼을 매년 수확할 수 있는 작업상태.

No.6232 · 산림청 원문

연년생장량 連年生長量 · current annual increment
나무는 임령이 증가하면서 직경, 수고, 단면적, 재적이 양적으로 증가하는데, 이를 생장량이라고 한다. 연년생장량은 이와 같이 직경, 수고, 단면적, 그리고 재적 등에 대하여 1년 동안에 생장한 양을 말한다.

No.6233 · 산림청 원문

연년수리율(지율) 連年收利率(指率) · current annual rate of interest
어느 특정 일년간의 임목 실제 가치성장률과 그 성장을 위해 사용된 실제 생산비의 환원가에 대한 백분율.

No.6234 · 산림청 원문

연년작업 連年作業 · annual working
지속적인 매년의 산림작업.

No.6235 · 산림청 원문

연년작업의평균수리율 連年作業의平均收利率 · mean annual rate of interest for annual working
매년 산림작업에 사용되는 비용에 대한 평균 이자율.

No.6236 · 산림청 원문

연년토지순수확 連年土地純收穫 · annual land net yield
특정 일년간의 토지순수확.

No.6237 · 산림청 원문

연단 鉛丹 · minium
사산화삼납.

No.6238 · 산림청 원문

연락기관 - · National Focal Point
ABS를 이행하는데 있어서 국가별로 CBD 사무국과의 연락을 담당하는 기관. 주요 임무는 유전자원이나 관련 전통 지식에 접근을 원하는 신청자에게 사전통보승인(PIC)을 획득하는 절차와 상호합의조건(MAT)을 확정하는 절차에 대한 정보를 제공

No.6239 · 산림청 원문

연락사무소 連絡事務所 · focal point
국가책임기관(competent authority)에 의해서 지정된 기구로서 유전자 변형생물체(LMO)의 국가간 이동과 관련된 정보를 보내거나 받는 등, 국가 간의 생명공학의정서의 시행에 관한 정보를 수집공급하는 기관.

No.6240 · 산림청 원문

연력 燃力 · burning power
신탄재의 불에 타는 힘.

No.6241 · 산림청 원문

연령 年齡 · age
사람이나 동식물 따위가 세상에 나서 살아온 햇수.

No.6242 · 산림청 원문

연령그룹 年齡그룹 · age group
생물집단 중에서 같은 나이의 개체로만 구성되어 있는 부분.

No.6243 · 산림청 원문

연령분포 年齡分布 · age distribution
개체군에서 각 연령층(age class, 년, 월, 일 등 적당한 시간간격 또는 발육 단계)에 속하는 개체수의 분포를 말하는데, 총개체수에 대한 각 연령층의 비율로 나타나는 것.

No.6244 · 산림청 원문

연료 燃料 · fuel
연소할 수 있는 물질. 즉, 산불에 공급되는 낙엽, 초본, 관목과 나무 등을 말한다.

No.6245 · 산림청 원문

연료감소 燃料減少 · fuel reduction
잠재적인 산불위험성을 감소시키기거나 연소를 포함한 발화의 가능성을 제거하기 위한 연료의 제거.

No.6246 · 산림청 원문

연료림 燃料林 · fuel production forest
연료를 생산하기 위한 숲.

No.6247 · 산림청 원문

연료상 燃料箱 · fuel bed
연료의 량, 깊이, 크기로 구성된 연료의 배열.

No.6248 · 산림청 원문

연료수분율 燃料水分率 · fire moisture rate
건중량을 기초로 측정된 연료에서 물의 백분율

No.6249 · 산림청 원문

연료수분함량 燃料水分含量 · fuel moisture content
연료의 건조무게에 대한 수분함량의 비율.

No.6250 · 산림청 원문

연료습도측정봉 燃料濕度測定棒 · fuel-moisture-indicator stick
연료물질 내 수분변화 지표로서 수분함량 변화를 정하기 위해 건중량을 측정하는 특수 막대.

No.6251 · 산림청 원문

연료유형 燃料類型 · fuel type
산불확산 예측에 영향을 주는 특유한 식물 종, 형태, 크기, 배열 또는 다른 특수한 물질로 구성된 연료요소의 조합.

No.6252 · 산림청 원문

연료재 燃料材 · fuel wood, fire wood
땔감용 나무.

No.6253 · 산림청 원문

연륜 年輪 · tree ring, annual ring
온대지방에서 자라는 나무줄기의 횡단면에 형성되는 둥근테. 봄에 형성된 목부(춘재) 세포의 크기는 크고 세포벽은 얇고 여름과 가을에 형성된 목부(하재 또는 추재)세포의 크기는 작고 세포벽은 두껍다. 춘재와 추재 사이의 경계선이 뚜렷하여 둥근테를 만든다.

No.6254 · 산림청 원문

연막 煙幕 · smoke screen
움직임을 감추기 위해 연기로 만든 막.

No.6255 · 산림청 원문

연무제 煙霧劑 · aerosol
액체를 에어로졸이 되게 하거나 유효성분을 함유한 유기용제액을 액체가스로 분산시켜 기체교질이 되게 한 것.

No.6256 · 산림청 원문

연무질 煙霧質 · aerosol
분산매체가 기체이고 분산물질은 고체 또는 액체인 물질.

No.6257 · 산림청 원문

연반 煙斑 · smokespot
활엽수가 연기의 피해를 받아 엽맥 사이에 생기는 황갈색의 반점.

No.6258 · 산림청 원문

연벌량 年伐量 · annual cutting volume
매년 벌채하는 임목 재적.

No.6259 · 산림청 원문

연벌면적 年伐面積 · annual cutting area
매년 벌채하는 산림 면적.

No.6260 · 산림청 원문

연석 緣石 · capping stone, coping stone, curb stone
갓돌. 빗물에 의한 벽면의 오염방지 및 석축의 보호와 외관 장식을 위해 올려 놓는 석재 또는 콘크리트 블록.

No.6261 · 산림청 원문

연소 燃燒 · combustion
연소물이 산소와 화합하여 열과 빛을 발하는 현상.

No.6262 · 산림청 원문

연소지수 燃燒指數 · burning index
연료형별 불길을 잡는데 필요한 노력에 대하여 산불동태가 미치는 영향을 가리키는 수치로서 산불 위험성을 나타낸다.

No.6263 · 산림청 원문

연속반응 連續反應 · consecutive reaction
어떤 반응에 의해 생성된 물질이 계속 반응을 일으켜 다른 생성계로 변화하는 현상.

No.6264 · 산림청 원문

연속변이 連續變異 · continuous variation
생물에서의 체중이나 높이처럼 많은 개체의 측정값을 모았을 때 개체의 구분이 모호하고 연속적인 스펙트럼을 보이는 변이. 대부분의 양적형질은 연속변이를 보인다.

No.6265 · 산림청 원문

연속적 連續的 · continuous
현상이나 변화가 지속적인 경우.

No.6266 · 산림청 원문

연속적 경관 連續的 景觀 · sequential view
관찰자가 시각회랑을 따라 이동할 경우에 시점의 변화에 따라 경관이 변화하는 모습

No.6267 · 산림청 원문

연속적 분포 連續的 分布 · continuous distribution, continuum
군집은 여러 가지 종 개체군의 분포가 서로 겹쳐져서 성립하고 있을 뿐인 연속체라는 것을 강조하는 이론.

No.6268 · 산림청 원문

연속층림 連續層林 · continuous layered forest
수관층이 연속적으로 계속되는 산림.

No.6269 · 산림청 원문

연쇄 連鎖 · linkage
연관.

No.6270 · 산림청 원문

연쇄반응 連鎖反應 · chain reaction
생성물질의 하나가 다시 반응물로 작용하여 생성, 소멸을 계속하는 반응.

No.6271 · 산림청 원문

연습림 演習林 · research forest
산림과학분야의 교육실습 및 시험연구를 위한 숲으로 학술림이라고 한다.

No.6272 · 산림청 원문

연악용 軟顎? · pupa adectica
곤충 번데기의 1형으로 큰턱이 경화(硬化)해 있지 않아서 움직일 수 있는 것.

No.6273 · 산림청 원문

연엑스선 軟 X 線 · soft X-rays
물질에 쉽게 흡수되어 투과력이 약하고 파장인 긴 엑스선.

No.6274 · 산림청 원문

연역적접근법 演繹的接近方法 · deductive approach method
일반적인 명제나 진리를 전제로 하여 보다 특수하고 개별적인 명제나 진리를 이끌어 내는 추리접근법으로 경험을 필요로 하지 아니하는 순수한 사유(思惟)에 의해 이루어지며, 그 대표적인 전형으로 삼단논법이 있다.

No.6275 · 산림청 원문

연작 連作 · continuous cropping
한곳에 계속해서 동일 작물을 재배하는 것.

No.6276 · 산림청 원문

연장공 筵張工 · mulching
거적덮기, 절토 및 성토에 의해 조성된 대면적의 나지와 비탈면에 기계로 신속하게 잔디를 파종하고 난 후에, 균형있게 짜여진 볏짚을 피복하여 보온,보습으로 발아를 촉진 토양보전 및 잔디원을 조성하여 경관을 자연식생으로 복원시키는 공법이다.

No.6277 · 산림청 원문

연재 軟材 · softwood
침엽수재.

No.6278 · 산림청 원문

연적공 練積工 · mortar walling, mortar masonry
모르타르를 사용한 벽쌓기

No.6279 · 산림청 원문

연절상유세포 連節狀柔細胞 · parenchma strand
가장 보편적인 목부유세포로 한 개의 방추상시원세포로부터 생긴 두 개이상의 단유세포가 종방향으로 배열되어 전체적으로 방추형을 이룬다.

No.6280 · 산림청 원문

연조 緣條 · -
소벌구의 일종으로 대(帶)보다 좁다.

No.6281 · 산림청 원문

연직선 鉛直線 · vertical line
중력방향을 나타내는 선.

No.6282 · 산림청 원문

연철 鍊鐵 · wrought iron
탄소 함량이 0.01% 이하인 무른 철.

No.6283 · 산림청 원문

연축 練築 · mortar masonry
찰쌓기. 줄눈 및 뒤채움의 일부에 시멘트 모타르 및 콘크리트를 사용한 돌쌓기를 말한다. 돌의 찰쌓기는 골쌓기를 원칙으로 하고, 밑돌은 큰돌을 사용하여 위의 두 모서리를 깨어5각형으로 다듬고, 인접한 돌에 밀착되게 한다.

No.6284 · 산림청 원문

연탄 煉炭 · briquette
무연탄과 코크스, 목탄 등의 가루에 피치, 해조, 석회 등의 점결제를 섞어서 굳혀 만든 연료.

No.6285 · 산림청 원문

연필향나무 鉛筆香木 · 學 Juniperus virginiana
북미 원산의 상록침엽교목. 재목은 연필재로 사용되고 열매는 비누와 향료의 원료가 된다.

No.6286 · 산림청 원문

연합선발 聯合選拔 · combined selection
육종을 위한 개체 선발에서 그 개체의 가계와 해당개체의 표현형 값을 함께 고려한 지수를 기준으로 하는 방법.

No.6287 · 산림청 원문

연해 煙害 · damages by smoke
연기의 독으로 인하여 생기는 피해. 제련소나 공장의 굴뚝에서 나오는 유독가스, 유황을 품은 석탄 연기 또는 화산에서 나오는 연기로 사람, 가축, 식물에 유해하다.

No.6288 · 산림청 원문

연화병 軟化病 · flacherie
누에의 몸이 물렁물렁해지고 산 채로 까맣게 썩는 병.

No.6289 · 산림청 원문

열 列 · column
세로방향으로 나 있는 칸.

No.6290 · 산림청 원문

열 - · heat
산불에서 연소열이 전달되는 방법으로는 전도 대류, 및 복사에 의한 3가지 형태가 있다.특히,산불이 발생할 때에는 대류현상에 의한 상승기류의 발생으로 비화가 발생하여 확대되는 특징이 있다.

No.6291 · 산림청 원문

열 개 裂開 · parting
피자식물의 과실이 성숙된 다음 과피가 쪼개지는 현상.

No.6292 · 산림청 원문

열 개과 裂開果 · dehiscent fruit
열매가 성숙하면 껍질이 벌어져 씨앗이 드러나는 열매를 총칭한다. 삭과, 골돌, 협과(꼬투리), 분리과, 단각과, 장각과 등이 이에 포함된다. 폐과(閉果)의 상대어이며 열매의 껍질이 육질이 아니며 말라 있고, 봉합선을 따라 갈라진다.

No.6293 · 산림청 원문

열 충격 단백질 - · HSP(heat shock protein)
식물체가 건조와 고온에 견디기 위하여 만드는 물질

No.6294 · 산림청 원문

열가소성 熱可塑性 · thermoplastic
가열하면 연화하여 쉽게 변형되고 식히면 다시 굳어지는 성질.

No.6295 · 산림청 원문

열굽성 屈熱性 · thermotropism
온도구배에 대하여 식물의 뿌리, 화병, 덩굴손(포자낭병) 등이 굽어 자라는 성질.

No.6296 · 산림청 원문

열단장 裂斷長 · breaking length, fracture length
종이의 인장강도를 표시하는 하나의 방법. 일정폭의 시험편의 일단을 고정하여 펼쳐내릴 때, 그 자중으로 절단되는 때의 시폄편의 길이를 km로 나타낸다.

No.6297 · 산림청 원문

열대 熱帶 · tropical zone
적도를 포함하는 가장 고온의 기후대로서 온대와 접하는 지역. Koppen은 월평균 기온이 20℃ 이상을 열대, Holdridge는 생물기온(평균기온이 영하가 되지 않는 지역에서는 연평균 기온과 같다) 24℃ 이상을 열대, 17~24℃를 아열대로 하였다.

No.6298 · 산림청 원문

열대다우림 熱帶多雨林 · tropical rain forest
연중 온도가 높고 강우량이 많은 열대지방에 나타나며 상록수로 형성된 식물군계. 동남아시아, 아마존유역, 중부아프리카, 뉴기니아 등 적도에서 남북으로 약 20° 부근에 미치며, 연강수량 2,000mm 이상, 또한 각 계절에 평균적으로 비가 내리는 지방에 분포한다. 표고 1,000m 이하의 것을 가리키며, 그 이상의 표고에서는 열대산지다우림이 형성된다.

No.6299 · 산림청 원문

열대림 熱帶林 · tropical forest
열대지방에 있는 산림식물대.

No.6300 · 산림청 원문

열대상품 熱帶商品 · tropical products
천연 및 가공상태에 있는 열대음료, 특정유지종자, 담배, 쌀, 과일, 목재, 고무, 황마 등의 산물.

No.6301 · 산림청 원문

열대우림 熱帶雨林 · tropical rain forest
열대다우림.

No.6302 · 산림청 원문

열량계 熱量計 · calorimeter
양분이 산화분해할 때 발생하는 열량을 측정하는 장치.

No.6303 · 산림청 원문

열사 熱死 · sun-scald
한 여름 태양열을 흡수한 지표면의 고온으로 인해 소목이나 치수의 근부형성층 조직이 피해를 받아 고사하는 현상.

No.6304 · 산림청 원문

열생의 劣生的 · dysgenic
우생(eugenic)의 반대로 어떤 군집의 유전적 형질에 유해한 존재.

No.6305 · 산림청 원문

열선 熱線 · heat rays
적외선.

No.6306 · 산림청 원문

열섬현상 熱섬現像 · heat-island effect
지역적 온난화로 인프라의 밀도, 예를 들어 열을 보유하는 포장도로, 건물, 길 때문에 일어난다. 이는 근처 기상관측소가 수집한 기온 기록에 영향을 끼칠 수 있다. IPCC는 제4차 보고서(2007)에서 열섬현상은 지구 평균 온도에 무시해도 좋은 미미한 영향력만 있다고 결론 내렸다.

No.6307 · 산림청 원문

열성 劣性 · recessive
대립 형질 중에서 잡종 제1세대에서는 나타나지 않는 형질. 우성의 반대.

No.6308 · 산림청 원문

열성상위 劣性上位 · recessive epistatis
한 형질에 2쌍의 대립유전자가 있을 때 한쪽의 열성유전자가 다른 쪽 유전자의 작용을 누르는 관계.

No.6309 · 산림청 원문

열성호모 劣性호모 · recessive homozygote
문제로 삼는 형질 전체에 대해서 열성유전자를 호모로 가지는 개체.

No.6310 · 산림청 원문

열세목 劣勢木 · recessive tree, dominated tree
하층임관을 구성하고 열세목의 압박을 받는 나무.

No.6311 · 산림청 원문

열수지 熱收支 · heat budget
생물체나 물체와 주위 환경과의 에너지의 출입을 말하나 보통 생태계를 대상으로 한다.

No.6312 · 산림청 원문

열식 列植 · row planting, drill planting
규칙적식재(regular planting)와 같으나 주로 장방형식재를 가르킴.

No.6313 · 산림청 원문

열식간벌 列式間伐 · row thinning, line thinning
간벌 방법의 하나로 임분에서 띠 모양으로 벌채목을 선정하는 하는 간벌법, 기계적 간벌의 한 방법.

No.6314 · 산림청 원문

열용량 熱容量 · heat capacity
어떤 물체의 온도를 1도 높이는데 필요한 열량.

No.6315 · 산림청 원문

열전대 熱電對 · thermocouple, themo-junction
두 가지 금속을 고리 모양으로 접합하여 접점 사이의 온도 차이로 열기전력을 일으키게 하는 장치.

No.6316 · 산림청 원문

열전도 熱傳導 · conduction of heat
물질의 이동없이 열이 고온부로부터 저온부로 옮겨가는 현상.

No.6317 · 산림청 원문

열전자방출 熱電子放出 · thermionic emission
금속이나 반도체를 높은 온도로 가열하면 내부에 있는 전자가 열운동이 활발하게 되어 큰 에너지를 얻고 표면으로부터 공간으로 튀어나오는 현상.

No.6318 · 산림청 원문

열전퇴 熱電堆 · thermoelectric pile, thermo-pile
여러 개의 열전기쌍을 직렬로 접속한 장치.

No.6319 · 산림청 원문

열중성자 熱中性子 · thermal neutron
중성자가 물질 안에서 원자핵과 계속 충돌함으로써 감속되어 주위의 물질과 열적 평형 상태에 있는 것.

No.6320 · 산림청 원문

열충격 단백질 熱衝擊 蛋白質 · heat shock protein
온도나 여러 형태의 스트레스가 갑자기 증가하였을 때 세포에서 일시적으로 합성되는 단백질.

No.6321 · 산림청 원문

열풍 - · strong gale
연소물이 연소할 때 열의 강한 대류현상에 의하여 생기는 바람.

No.6322 · 산림청 원문

열해 熱害 · heat injury
산불이 연소할 때 생기는 열에 의한 피해.

No.6323 · 산림청 원문

열해리 熱解離 · thermal dissociation
복잡한 원소나 화합물이 가열되어 간단한 원소나 화합물로 분해되는 현상.

No.6324 · 산림청 원문

염 鹽 · salt
산과 염기의 중화작용으로 산의 수소 이온이 염기의 양이온으로 치환된 화합물을 통틀어 이르는 말.

No.6325 · 산림청 원문

염기 鹽基 · base
화학에서는 물에 녹았을 때 OH-를 생산해 내며 전자공여체로 행동하는 모든 물질을 가리킨다. 그러나 토양학에서는 이외에 Na+, K+, Ca2+, Mg2+ 등의 4종을 염기라고 한다. 이것은 이들 원소의 산화물 또는 수산화물이 물에 용해되면 염기성을 나타내기 때문이다.

No.6326 · 산림청 원문

염기교환 鹽基交換 · base exchange
양이온교환.

No.6327 · 산림청 원문

염기교환용량 鹽基交換容量 · base exchange capacity
양이온교환용량.

No.6328 · 산림청 원문

염기도 鹽基度 · basicity
금속원자로 치환될 수 있는 수소원자의 수.

No.6329 · 산림청 원문

염기성 鹽基性 · basic
염기가 지니는 기본적 성질. 원래는 산의 작용을 중화하고 산과 작용하여 염과 물만을 만드는 성질을 뜻한다.

No.6330 · 산림청 원문

염기성색소 鹽基性色素 · basic dye
염기성염료. 색소 분자 가운데 산성기를 함유하지 아니하고 아미노기 등의 염기성기를 가지고 색소가 양이온으로 되어 있는 수용성 물감의 통칭.

No.6331 · 산림청 원문

염기성암 鹽基性岩 · basic rock
SiO_2의 함량이 45-52%인 화성암.

No.6332 · 산림청 원문

염기치환용량 鹽基置換容量 · base exchange capacity
양이온교환용량.

No.6333 · 산림청 원문

염기포화도 鹽基飽和度 · degree of base saturation
토양에 흡착된 양이온 가운데 수소와 알루미늄을 제외한 염기성 양이온이 전체 양이온치환용량에서 차지하는 비율.

No.6334 · 산림청 원문

염료 染料 · dye
물감. 옷감 등에 빛깔을 들이는 물질.

No.6335 · 산림청 원문

염류농도 鹽類濃度 · salinity
토양에 포함된 수용성 염류의 양을 가리키는 것으로 토양포화 침출액의 전기전도도로 표시한다.

No.6336 · 산림청 원문

염류토양 鹽類土壤 · saline soil
대부분의 작물 생육에 영향을 미칠 정도로 높은 염류농도를 가진 토양.

No.6337 · 산림청 원문

염분 鹽分 · salinity
물 속에 녹아있는 소금의 농도로 보통 1000분비를 쓴다. 해수 1㎏에 염류 35g이 녹아있다.

No.6338 · 산림청 원문

염분인자 鹽分因子 · salt factor
생물의 환경으로써 물 속에 포함되는 염분을 가리킨다.

No.6339 · 산림청 원문

염산 鹽酸 · hydrochloric acid
염화수소의 수용액.

No.6340 · 산림청 원문

염색 染色 · dying, staining
물감을 사용하여 실이나 천 등에 물을 들임.

No.6341 · 산림청 원문

염색립 染色粒 · chromomere
감수 제일 분열 전기 때 염색체에 진하게 염색되어 염주 알처럼 보이는 입자.

No.6342 · 산림청 원문

염색분체 染色分體 · chromatid
염색체가 복제된 2개의 분체. 동원체에 의해 결합되어 있으며 분열에 의해 2개의 새로운 염색체가 된다.

No.6343 · 산림청 원문

염색분체간섭 染色分體干涉 · chromatid interference
염색분체간의 자유로운 조합이 저해되는 현상.

No.6344 · 산림청 원문

염색분체교 染色分體橋 · chromatid bridge
염색체교. 2개의 동원체를 가진 염색분체는 핵분열 후기에 동원체가 양극으로 향하게 되어 양동원체간의 부분이 양극을 연결한 모양이 되는데 이것을 염색분체교라 한다.

No.6345 · 산림청 원문

염색사 染色絲 · chromonema
분열 중기의 염색체나 염색분체 또는 간기핵에서 광학현미경으로 식별할 수 있는 가장 가는 실 모양의 구조.

No.6346 · 산림청 원문

염색중심 染色中心 · chromocenter
소형의 염색체를 가지는 식물세포에서 세포분열 전기에 나타나는 작은 이질염색질 덩어리.

No.6347 · 산림청 원문

염색질 染色質 · chromatin
핵 속에 있는 염기성 색소에 잘 염색되는 물질.

No.6348 · 산림청 원문

염색체 染色體 · chromosome
동식물세포가 유사분열을 할 때 관찰되는 염색이 잘되는 막대모양의 구조체로 세포분열시 방추사가 결합되는 부분인 동원체를 중심으로 그 양쪽을 염색체의 팔(arm)이라고 한다.

No.6349 · 산림청 원문

염색체교 染色體橋 · chromosome bridge
염색분체교.

No.6350 · 산림청 원문

염색체기본수 染色體基本數 · basic number of chromosome
반수의 염색체 구성이 형태나 생리적으로 그 이상의 군으로 나누어질 수 없을 경우 이 수를 염색체 기본수라 한다.

No.6351 · 산림청 원문

염색체기질 染色體基質 · chromosome matrix
염색체 둘레에 있어 염색체를 구성하고 있는 물질.

No.6352 · 산림청 원문

염색체돌연변이 染色體突然變異 · chromosome mutation
염색체 수준에서 일어나는 돌연변이로 결실(deficiency), 중복(duplication), 전좌(translocation) 등은 일반적으로 배우자 고유의 염색체수 변화없이 일어날 수 있는 대표적인 예다. 그러나 특정 염색체가 더 있거나 부족한 경우는 물론 배우자 염색체수 전체가 변하는 큰 단위의 염색체 돌연변이도 생길 수 있다.

No.6353 · 산림청 원문

염색체부분이질배수성 染色體部分異質倍數 · segmental allopoly ploidy
부분적이질배수성. 게놈 구성은 같아도 염색체 구조의 작은 변화로 인하여 일부의 유전자 배열이 이질적으로 된 경우.

No.6354 · 산림청 원문

염색체사 染色體絲 · chromosomal fiber
견인사.

No.6355 · 산림청 원문

염색체쇄 染色體鎖 · chromosome chain
전좌이형접합체의 환원분열에서 볼 수 있는 사슬모양으로 연결된 염색체.

No.6356 · 산림청 원문

염색체수변화 染色體數變化 · variations of chromosome number
염색체 수가 일반적인 것과 다른 경우.

No.6357 · 산림청 원문

염색체외유전 染色體外遺傳 · extrachromosomal inheritance
세포질 유전.

No.6358 · 산림청 원문

염색체이상 染色體異常 · chromosome aberration
염색체의 수와 구조의 변화.

No.6359 · 산림청 원문

염색체조 染色體組 · chromosome set
게놈.

No.6360 · 산림청 원문

염색체주연키메라 染色體周緣 · chromosomal periclinal chimera
식물의 한 조직 중에 염색체수가 배수적 혹은 비배수적으로 다른 세포와 섞여 있을 때 염색키메라 또는 혼수성이라 한다. 이 때 염색체수가 다른 세포로 된 조직이 다른 조직의 둘레에 있으면 이것을 염색체주연키메라라고 부른다.

No.6361 · 산림청 원문

염색체지도 染色體地圖 · chromosome map
하나의 염색체 안에서 유전자 및 표지의 위치와 상대적 거리를 표시한 그림. 유전자 지도(gene map) 혹은 유전연관 지도(genetic linkage map)라고도 한다.

No.6362 · 산림청 원문

염색체초 染色體? · chromosomal sheath
염색체 기질 표면의 얇은 막.

No.6363 · 산림청 원문

염색체포기 染色體抛棄 · chromosome elimination
몇 개의 염색체가 세포분열 중에 중앙에 남게 되어 세포질 내에 위치하고 그 뒤 퇴화소실하는 현상.

No.6364 · 산림청 원문

염색체환 染色體環 · chromosome ring
전좌이형접합체에서는 환원제일분열의 이동기부터 중기에 걸쳐서 표준염색체와 전좌염색체가 서로 어긋나게 배열한 원형모향 결합.

No.6365 · 산림청 원문

염생식물 鹽生植物 · halophyte, halophilous plant
토양의 염분농도가 높아 일반 육상식물이 생육할 수 없는 지역에서 자라는 식물을 총칭한다.

No.6366 · 산림청 원문

염생초원 鹽生草原 · salt steppe
대륙성 기후의 여름철에 건조한 지방에서는 과도한 증발작용으로 인해 토양 속에 염기가 농축되어 있어서 염기성에 강한 식물이 자라는 초원을 말한다.

No.6367 · 산림청 원문

염성 捻性 · fertility
열매를 맺는 성질.

No.6368 · 산림청 원문

염성습지식생 鹽性濕地植生 · salt marsh
육지 깊숙이 바닷물이 들어오거나 강의 하구 부근에서 짠물에 의해 염기성이 강한 습지에 발달하는 식물군락을 말한다. 우리나라에는 갈대나 나문재, 퉁퉁마디 등이 많이 출현하는데, 열대나 아열대지역에서는 초본 말고도 망그로브 나무가 침입하여 망그로브림(mangrove forest, 홍수림(紅樹林))이 발달하는 경우가 많다. 생물다양성 보전에 중요한 지역이다.

No.6369 · 산림청 원문

염소 鹽素 · chlorine
Cl. 원자기호 17. 원자량 35.4527.

No.6370 · 산림청 원문

염소산 鹽素酸 · chloric acid
$HClO_3$.

No.6371 · 산림청 원문

염소산나트륨 鹽素酸 · sodium
chl $NaClO_3$. 무색의 결정.

No.6372 · 산림청 원문

염소산염 鹽素酸鹽 · chlorate
M^1ClO_3(M^1은 1가의 금속).

No.6373 · 산림청 원문

염소산칼륨 鹽素酸 · potassium
ch 광택있는 무색의 결정. $KClO_3$.

No.6374 · 산림청 원문

염소수 鹽素水 · chlorine water
염소를 물 속에서 포화시킨 황록색의 수용액.

No.6375 · 산림청 원문

염습지식물군계 鹽濕地植物群系 · salt marsh formation
해안, 하구 부근에 발달하는 광택식물의 군락.

No.6376 · 산림청 원문

염풍 鹽風 · salt wind
해안지방에서 부는 바람. 내륙 10km까지 영향을 끼친다. 염분은 수목의 잎에서 원형질분리를 일으키고, 심하면 잎을 고사시키며 동시에 유기물의 분해를 방해하고 토양미생물의 번식을 억제한다. 이와 같은 염풍의 피해를 억제하기 위하여 해풍에 직각방향으로 내염성 수종(곰솔향나무사철나무자귀나무팽나무후박나무등)으로 해안 방조림을 조성하기도 한다.

No.6377 · 산림청 원문

염해 鹽害 · salt damage, salt injury
염에 의하여 식물이 피해를 받는 것으로, 해안가의 저지대에 지하수가 침투하거나 해수 물보라가 비산하여 해를 나타낼 수 있으며, 다량의 화학 또는 유기질 비료를 사용한 다음 염류가 집적되어 피해를 나타내기도 한다. 토양용액의 높은 염류농도는 삼투압을 높여 뿌리를 통한 양분과 수분 흡수를 저해하여 피해가 나타나는 것이다.

No.6378 · 산림청 원문

염화나트륨 鹽化 · sodium chloride
NaCl.

No.6379 · 산림청 원문

염화동 鹽化銅 · copper shloride
CuCl, 염화 제1동(英 cuprous chloride 獨 Kupferchlorid, Cuprichlorid), $CuCl_2$,염화 제2동(英 cupric chloride 獨 Kupferchlorid, Cuprichlorid).

No.6380 · 산림청 원문

염화마그네슘 鹽化 · manganesium
$MgCl_2 \cdot 6H_2O$.해수중에 있다.

No.6381 · 산림청 원문

염화망간 鹽化 · manganese chlor
MnCl2, 염화 제1망간(英 manganous chloride 獨 Manganchlorid) $MnCl_3$, 염화 제2망간(英 manganic chloride 獨 Manganchlorid).

No.6382 · 산림청 원문

염화물 鹽化物 · chloride
염소와 염소보다 양성인 원소와의 화합물의 총칭이며 稀 gas류 이외의 원소는 거의 모두가 염화물을 만든다.

No.6383 · 산림청 원문

염화바륨 鹽化 · barium chloride sol
$BaCl_2$. 유독.

No.6384 · 산림청 원문

염화바륨시액 鹽化 · barium chloride
염화바륨 12g을 물에 녹여서 100cc로 한다. 이것을 바리타수(baryta water)라고 한 다.유산칼슘의 검출에 쓴다. 유산칼슘은 염화바륨의 백탁을 가져오고 수산화칼슘은 변화를 주지 않는다.

No.6385 · 산림청 원문

염화불화탄소 - · CFC(chlorofluorocarbon)
오존층을 파괴하는 화합물, 탄소,염소,불소를 함유한 할로 탄소 화합물로서 냉매, 발포제, 분사제등에 쓰이는 기체. 프레온가스

No.6386 · 산림청 원문

염화수소 鹽化水素 · hydrogen chloride
HCl. 무색. 자극적인 냄새를 가지는 기체.

No.6387 · 산림청 원문

염화수은 鹽化水銀 · mercury chloride
HgCl2(염화 제2수은)

No.6388 · 산림청 원문

염화아연 鹽化亞鉛 · zine chloride
$ZnCl_2$. 무색의 결정성분말, 수용성, 목재의 방부제.

No.6389 · 산림청 원문

염화암모늄 鹽化 · ammonium chloride
NH_4Cl. 암모니아太 질소 25% 를 포함한다. 토양을 산성화시키는 정도는 황산암모니움보다 더 심하다. 동량의 석회를 병용할 필요가 있다고 한다.

No.6390 · 산림청 원문

염화에틸 鹽化 · ethyl chloride
C_2H Cl. 냉동기용순환제.국소마취제로 쓰인다.

No.6391 · 산림청 원문

염화철 鹽化鐵 · iron chloride
$FeCl_2$.염화 제1철(英 ferrous chloride, 獨 Eisenchlorur, Ferrchlorid), $FeCl_3$, 염화 제2철(英 ferric chloride, 獨 Eisenchlrid, Ferrichlorid).

No.6392 · 산림청 원문

염화칼슘 鹽化 · calcium chloride
$CaCl_2$.

No.6393 · 산림청 원문

엽 葉 · leaf
잎

No.6394 · 산림청 원문

엽각 葉脚 · leaf base
엽저, 엽신의 기초가 되는 부분. 유저(attrnuate): 엽조가 合치지 않고 날개처럼 된 것. 설저(cuneate): 쐐기 모양으로 역삼각형인 것, 왜저(pbloque): 좌우의 모양이 다른 것. 둔저(oatuse):

양쪽 잎의 가장자리가 90°이상으로 솜쳐져서 뭉뚝한 것, 심장저(cordate): W자처럼 된 것. 원저(rounded): 엽저가 넓은 활모양으로 생긴 것, 평저(절저, truncate): 엽저가 일직선(약 180℃)으로 된 것, 예저(acute): 뾰족하지만 길지 않은 것. 순저(peltate): 방패처럼 생긴 건, 관아(perfoliate): 잎의 밑이 줄기를 둘러 싼 것. 극형(hastate): 칼처럼 생긴 것. 이저(auriculate): 귀(耳)모양으로 처진 것.

No.6395 · 산림청 원문

엽극 葉隙 · leaf gap
고등식물에 있어서 줄기에서 잎이 갈라질 때 엽유관속이 줄기의 유관속으로부터 떨어져 나간 뒤 줄기의 유관속의 위쪽에 남기는 유관속의 결소.

No.6396 · 산림청 원문

엽기 葉基 · leaf base
엽저

No.6397 · 산림청 원문

엽단 葉端 · leaf apex
엽선.

No.6398 · 산림청 원문

엽두 葉頭 · leaf head
엽선

No.6399 · 산림청 원문

엽록소 葉綠素 · chlorophyll
광합성에 가장 중요한 색소로서 녹색의 빛을 제외한 모든 다른 파장의 빛을 흡수하기 때문에 녹색으로 보인다. 식물, 조류(藻類), 광합성 박테리아 등에서 엽록소의 보조수단으로써 다른 색소들이 존재한다. 엽록소자체도 여러 종류가 있는데 가장 중요한 것이 엽록소 a이다. 엽록소 a는 식물, 조류뿐만 아니라 광합성 박테리아에도 존재한다. 이와 비슷한 색소인 엽록소 b는 고등식물, 조류 그리고 1종류의 원핵생물에 존재한다. 엽록소는 다른 색소들과 복합체를 이루어 빛을 받아들이는 안테나를 형성하는데 그 중심에 엽록소 a가 자리잡고 있다.

No.6400 · 산림청 원문

엽록체 葉綠體 · chloroplast
엽록소를 가지고 있으며 광합성을 할 수 있는 식물의 기관. 엽록체는 내부기생 시아노박테리아(cyan bacteria)에서 유래된 것으로 여겨지고 있다. 광합성 세포에서는 명반응과 암 반응이 엽록체 안에서 일어나는데 엽록체는 종에 따라서 그 형태도 달라지며 크기는 두께가 2.5㎛이고, 길이가 5㎛으로 미토콘드리아보다 부피가 훨씬 크다. 엽록체는 2중막으로 싸여 있는데 그 안에는 스타로마라는 기질과 틸라코이드의 디스크로 구성된 라멜라로 되어있다. 이 디스크 막인 틸라코이드막에서 ATP가 형성된다. 즉, 엽록체 안의 모든 광합성 색소와 빛에 의존하는 첫 번째 반응에 필요한 모든 효소는 엽록체 내부막인 틸라코이드에 존재한다. 틸라코이드 액포를 둘러싸고 있는 구획 안의 액체, 즉 스트로마는 CO2가 글루코오스로 환원되는 암반응에 필요한 효소의 대부분을 함유하고 있다. 여러 종류의 광합성 세포에서 암반응은 세포질 안에서도 일어난다 엽록체는 DNA를 가지고 있으며 이 DNA

는 세포주기에 맞추어 복제된다. 엽록체 DNA는 미토콘드리아 DNA와 마찬가지로 고리형이나 동물의 미토콘드리아 DNA보다는 훨씬 크나 식물의 미토콘드리아 DNA 보다는 작다.

No.6401 · 산림청 원문

엽맥 葉脈 · vein
잎맥이라고도 함, 일반적으로는 식물잎에 있는 관다발과 이것을 둘러싼 부분으로된 맥상부분을 말한다.

No.6402 · 산림청 원문

엽면살포 葉面撒布 · top dressing
비료나 농약을 잎에 뿌리는 작업, 뿌리가 양분을 흡수하기 힘든 경우나 부족한 양분의 빠른 보충을 위하여 잎에 양료용액을 뿌리는 것을 엽면시비라 한다.

No.6403 · 산림청 원문

엽면적 - · leaf area
수목 개체의 엽면적은 증산량에 크게 영향한다.증산되는 잎의 표면적이 적으면 수분손실을 감소시킬 수 있다.총 엽면적이 클수록 증산량이 많아진다. 소나무류는 단위 엽면적당 증산량이 활엽수보다 적지만 총 엽면적이 같은 크기의 활엽수보다 더 많기 때문에 총 증산량은 많다.

No.6404 · 산림청 원문

엽면적지수 葉面積指數 · Leaf Area Index
지면 단위면적당 지상부 식물 잎의 총면적의 비. 광합성량 연구, 수분소모량 추정 등에 유용하다.

No.6405 · 산림청 원문

엽병 葉柄 · petiole
잎자루. 속씨식물의 잎은 광선을 많이 받을 수 있도록 넓게 발달하는 엽신(葉身, leaf blade)과 엽신을 지지하는 엽병(잎자루)으로 되어있다. 잎자루내의 통도 조직은 엽신 내의 엽맥이 전체와 연결된다. ⇒ 잎자루.

No.6406 · 산림청 원문

엽병내아 葉柄內芽 · intrapetiolar bud
측아의 일종으로서 엽병의 기부 속에 감싸여 있는 눈이다. 튤립나무나 플라타너스의 측아는 잎의 낙엽 진 후에 엽흔이 측아 주위에 환상으로 나타나 있다.

No.6407 · 산림청 원문

엽분석 葉分析 · foliage analysis
식물의 잎에 포함된 양분을 분석하여 양분의 적정 여부를 확인하는 작업이다. 잎에 포함된 양분의 농도는 동일한 종일지라도 잎의 채취시기, 위치, 잎의 연령 등에 따라서 차이가 있다. 정상적인 생장에 필요한 양분에 대한 표준 수치가 있으면 손쉽고 경제적으로 식물의 양분상태를 진단할 수 있는 정확성이 높은 방법이다. 특히 시비 후 그 효과를 예측하는데 긴요하게 사용된다.

No.6408 · 산림청 원문

엽산 葉酸 · folic acid
비타민 B 복합체의 하나.

No.6409 · 산림청 원문

엽삽 葉揷 · leafcutting
엽병을 포함하든지 도는 엽신만으로 삽목을 할 때 맥아를 붙이면 이것을 엽아삽 Leaf-bud cutting 이라고 한다.

No.6410 · 산림청 원문

엽상식물 葉狀植物 · thallophyte
엽상체가 있는 식물군으로서 경엽체가 있는 식물과 대응된다. 균류, 조류 및 선태류 모두를 엽상식물이라고 부른다.

No.6411 · 산림청 원문

엽상체 葉狀體 · thallus
균상에서와 같이 줄기, 뿌리, 잎으로 특징적으로 보여지지 않는 생장력 있는 몸통

No.6412 · 산림청 원문

엽색 葉色 · leaf color
수종고유의 색을 지니고 윤기가 있으면 시비할 필요가 없다. 그러나 엽맥 사이의 엽신이 노랗게 변한 것은 특정 영양분의 결핍 증세를 나타내는 것이므로 시비할 필요가 없다.

No.6413 · 산림청 원문

엽서 葉序 · leaf arrangement
잎이 줄기와 가지에 달리는 모양을 말한다. 가지 한마디에 두 개씩 달릴 때 대생(對生, opppsite; 마주나기), 잎이 한 개씩 달릴 때 호생(互生, alternate; 어긋나기), 3개 달릴 때 윤생(輪生, whorled; 돌려나기)이라고 한다. 한 개의 가지에서 가지의 둘레를 몇 바퀴 회전하는 회전수 (분자)에 몇 개의 잎이 달려 있는 잎수(분모)로서 나선상의 엽서를 나타내는데 수종마다 특성이 있다.

No.6414 · 산림청 원문

엽선 葉先 · leaf apex
잎의 끝 부분을 말한다. 식물의 종류에 따라 잎끝의 모양이 달라지는데 일반적으로 둥근 것은 원두, 완만하게 둥근 것은 둔두, 예각으로 뾰족한 것은 예두, 뾰족한 것은 첨두, 급하게 뾰족한 것은 급첨두, 편평한 것은 평두, 안으로 오목하게 들어간 것은 요두 등으로 구분한다.

No.6415 · 산림청 원문

엽설 葉舌 · ligule
엽초와 잎몸이 연결되는 부분 안쪽에 있는 혓바닥 모양의 작은 돌기. 특히 벼과 식물을 식별하는 중요한 형질이 되며 종에 따라 엽설이 없는 것도 있고, 일부분이 털처럼 변한 것도 있는 등 다양하다.

No.6416 · 산림청 원문

엽속 葉束 · fascicle
소나무의 2차엽은 두 개의 침엽이 다발로 모여 엽속의 형태로 자란다. 소나무의 2차엽이 신장할 때 분열조직은 기부에 위치하는데 기부는 엽초(葉稍, fascicle sheath)로 둘러 싸여 있다. 잣나무는 5개, 백송은 3개의 잎이 1개의 엽속을 이룬다.

No.6417 · 산림청 원문

엽속삽 染束插 · leafbundle cuttings
잎다발꽂이. 소나무류에 적용한다.

No.6418 · 산림청 원문

엽신 葉身 · leaf blade
속씨식물의 잎은 광선을 많이 받을 수 있도록 얇고 넓게 발달된 엽신과, 엽신을 지지하는 엽병으로 되어있다. ⇒ 잎몸.

No.6419 · 산림청 원문

엽아 葉芽 · foliar bud leaf bud
꽃눈에 대한 말.

No.6420 · 산림청 원문

엽액 葉腋 · axil of leaf
줄기 쪽의 잎의 기초가 되는 부분.

No.6421 · 산림청 원문

엽연 葉緣 · leaf mragin
잎가장자리로 모양이 톱니모양, 파상무늬, 깊게 파인 모양 둥글게 톱니모양 등 다양한다.

No.6422 · 산림청 원문

엽욕 葉褥 · pulvinus
(동의어)엽침. 예. 전나무류.

No.6423 · 산림청 원문

엽육 葉肉 · mesophyll
동화조직의 일종.

No.6424 · 산림청 원문

엽저 葉底, 葉基, 葉脚 · leaf base
잎몸의 가장 아랫부분을 말한다. 즉 잎몸이 잎자루에 붙은 부분. 식물의 종류에 따라서 다양한 형태가 나오므로 식물의 잎을 기재할 때 반드시 서술하는 부분임. 그 모양에 따라 둥근 모양의 원저(圓底), 이그러진 것처럼 모이는 의저 (歪底), 양쪽에 귓불처럼 늘어진 이저(耳底), 뾰족하지 않고 뭉툭한 모양의 둔저(鈍底), 심장 모양의 심장저(心臟底), 혀모양으로 뾰족한 설저(舌底) 등으로 표현한다.

No.6425 · 산림청 원문

엽적 葉跡 · leaf trace
줄기의 마디에 잎이 붙을 때 줄기부터 갈라져서 잎으로 들어가는 유관속을 말한다. 이 때 엽극을 만드는 것도 있고 만들지 않는 것도 있다.

No.6426 · 산림청 원문

엽정 葉頂 · leaf apex
엽선(葉先).

No.6427 · 산림청 원문

엽진병 葉振病 · needle cast
Lophodermium속의 균의 기생에 의해서 적송, 해송에 나타나는 병. 봄에 잎에 황갈 색의 반점이 생기고 잎이 떨어진다. 성숙한 잎에 이 병이 나타나면 곧 떨어지나 어 린 잎은 고사한 침엽이 오랫동안 가지에 붙어 있다. 묘포 또는 식재된 어린 묘목에 피해가 심하다. 여름에 보르도액을 뿌린다. 잎떨림병.

No.6428 · 산림청 원문

엽초 葉梢 · leaf sheath
수목의 초단부와 신초를 가해하는 해충으로는 나비목과 딱정벌레목에 속하는 해충들로부서 주로 나방류와 바구미류이다. 나방류로는 잎말이나방류, 애기 잎말이나방류가 있다. 이들은 야행성으로 침엽사이, 엽초나 새눈근처에 산란한다.

No.6429 · 산림청 원문

엽축 葉軸 · rachis
복엽에서 소엽이 붙는 가운데 잎의 줄기를 말한다. 단엽에서의 주맥에 해당된다. 식물의 종류에 따라서는 붉나무처럼 엽축에 날개가 달려있는 경우도 있다. 꽃대, 조류에서는 깃털의 축을 의미.

No.6430 · 산림청 원문

엽침 葉枕 · pulvinus, spine
1) 잎자루의 아랫부분이 변하거나 잎이 달리는 부분의 줄기가 비후하여 튀어나온 구조이다. 2) 아까시나무나 매자나무처럼 턱잎(탁엽)이 변해서 된 가시이다.

No.6431 · 산림청 원문

엽편 葉片 · lamina
납작한 잎몸의 전체.

No.6432 · 산림청 원문

엽화 葉化 · phyllody
어린 가지와 꽃 대신에 잎이 과도하게 형성되는것.

No.6433 · 산림청 원문

엽흔 葉痕 · leaf scar
잎이 떨어진 뒤에 줄기에 남는 흔적.원형, 타원형, 삼각형, 반원형, 환형 등이 있다.

No.6434 · 산림청 원문

영 齡 · (larvel) instar
곤충류에 있어서 유충의 발육단계를 구분할 때 쓰는 말. 탈피에 관계시킨다. 1st- instar larva, 2nd-instar larva ..... last instar larva(最終齡)등으로 말한다.

No.6435 · 산림청 원문

영과 穎果 · caryopsis cariopside grain
곡과라고도 한다. 과피가 성숙한 뒤, 건조해서 종자에 밀착하는 과실. 벼, 대나무등의 과실은 그 예이다.

No.6436 · 산림청 원문

영구동결층 永久凍結層 · permafrost
극지방에 분포하는 영구결빙된 토양층. 여름에 표층의 일부가 녹지만 심층은 연중 계속 얼은 상태로 있다.

No.6437 · 산림청 원문

영구위조 永久萎凋 · permanent wilting
토양의 함수량이 감소하여 식물의 수분 흡수가 불가능해져 회복할 수 없는 상태에 이르게 되는 것이다. 영구조위라고도 한다.

No.6438 · 산림청 원문

영구위조율 永久萎凋率 · permanent wilting percent, P.W.P
영구위조점에 이르렀을 때 토양의 수분 함수율. 모래땅의 경우는 3%, 양토는 10%, 점토는 19%가 된다.

No.6439 · 산림청 원문

영구위조점 永久萎凋點 · permanent wilting point
시든 식물에 다시 물을 주어도 회복하지 못하는 위조점. 이때 중생식물의 수분 포텐셜은 –15기압정도 된다. 참조: 위조점.

No.6440 · 산림청 원문

영구조위 永久凋委 · permanent wilting
물을 주어도 가역적 회복이 안되고 죽게 되는 것. 영구위조.

No.6441 · 산림청 원문

영구조위율 永久凋萎率 · permanent wilting percentage, P.W.P
영구위조점. 식물이 영원히 시들게 되는 토양수분포텐셜로 농작물인 경우 1.5MPa이다.

No.6442 · 산림청 원문

영구조직 永久組職 · permanent tissue
성장기를 거쳐서 충분히 분화하였으며 원형질은 상실되고 죽기까지 별로 변하지 않는 세포로 구성되어 있는 조직이다.

No.6443 · 산림청 원문

영구표본점 永久標本點 · permanent plot, permanent sample plot, fixed plot
영구표본점은 표본조사에서 표본점을 추출하여 일정 기간마다 주기적으로 생장량을 조사하고 그 자료에 근거로 한 임분생장량표(수확표)를 작성하기 위하여 설치되는 표본점을 말한다. 영구표본점은 고정표본점과 같은 용어로 사용된다. 결과적으로 영구표본점에서는 동일한 임분을 대상으로 주기적인 임분조사가 이루어지기 때문에 임시표본점과는 달리 임분의 생장과 수확 등과 같이 시간이 경과됨에 따라 변화하는 임분특성을 파악할 수 있는 장점을 가지고 있다. 영구표본점을 선정할 때는 푯

말을 세우고 경계선을 확실히 구획하여 후일 측정할 때 쉽게 구별할 수 있도록 해야 한다. 참조: 일시적표본점, 고정표본점.

No.6444 · 산림청 원문

영급 齡級 · ageclass
산림시업의 필요에 따라 임분중의 영계의 합반해서 일급을 만든 것인데 보통교목은 20년, 왜림은 5년으로서 일령수를 일령급으로 한다. 어린것부터 1급으로 시작한다.

No.6445 · 산림청 원문

영급면적 齡級面積 · area of ageclasses
영급이 가지는 면적으로서 총면적을 영급수로 나눈 값이다.

No.6446 · 산림청 원문

영급배치 齡級配置 · distribution of age
임분중에 있는 각급영급의 위치로서 산림조사부에 명시되고 임분도와 기본도에 나타내는 것임.

No.6447 · 산림청 원문

영급법 齡級法 · method of age-class
임분경제법 = 임분시업법. 순수한 영급법과 자크센식 임분경제법으로 나눈다. 전자는 수확의 기초를 연령으로 한 벌채구의 선정에 두고 수확사정과 수확통제에 두 과정을 동시에 고려해서 장래법정한 상태로 이끌고저 하는 방법이다. 후자는 작업급을 편성해서 2~3임반씩 설정하고 벌채순서를 정한다. 다음 토지기망가최고의 벌기령을 산출해서 작업급의 윤벌기를 정한다. 그 뒤 10년 또는 20년의 벌채장소의 현재재적을 사정하고 예산에 의해서 표준연대량을 한다. 본법은 수확의 기초를 성숙기에 달한 임분에 두고 수확량의 사정과 통제에 구별이 있고, 수익원칙에 중점을 두어 법정상태의 현실을 차위 에 두고 있다. 그래서 근대임업의 기업성에는 적합하나 작업종으로서는 벌구식 개벌작업에 주로 적용된다. 개벌작업에 주로 적용된다.

No.6448 · 산림청 원문

영급표 齡級表 · age class table
현재의 영급상태를 실재면적 또는 개위면적별로 나타낸 표.

No.6449 · 산림청 원문

영기 齡期 · stadium
곤충의 탈피기간을 의미하며, 부화유충이 탈피 할 때까지의 기간, 탈피한 후 다음 탈피할 때까지의 기간, 마지막으로 탈피하여 번데기가 될 때까지의 기간.

No.6450 · 산림청 원문

영림감독 營林監督 · forest management governing
산림경영은 소유자의 창의에 의해서 하는 것이 원칙이나, 부적당한 경영으로 황폐될 우려가 있을 때에는 경찰권으로써 소유자의 특정의 행위를 제한하고 경우에 따라서는 필요한 행위를 명한다.이와 같은 시업감독은 철저한 국가관리, 정부에 의한 시업지정, 시업행위의 허가주의, 그리고 시업안감독주의의 네 가지로 나누어 그 성격을 다룰 수 있다.

No.6451 · 산림청 원문

영림감독제도 營林監督制度 · direction of management forest
국가가 민유림에 대하여 산림의 황폐를 방지하고 산림의 건전한 육성과 생산을 위하여 적당한 시업방법을 지정하거나 산림에 대한 어느 정도의 이용과 수익을 제한하는 제도로 산림감독제도라고도 한다.

No.6452 · 산림청 원문

영림계획 營林計劃 · forest management plan
주어진 산림에 대하여 임업의 장기적인 생산기간을 고려하여 산림자원의 보속적 배양으로 생산력의 증진을 도모하고 국토를 보존할 수 있도록 합리적으로 산림을 경영코자 산림청장이 작성하는 산림기본계획 및 시 · 도지사가 작성하는 지역산림계획을 토대로 조림 · 벌채 · 기타 산림소득증대를 위해 영림기술자가 영림계획구별로 10년 단위로 수립하는 계획이다(산림법 시행령 제8조). 산림시업계획, 경영안 또는 산림경영계획이라고도 한다. 작성대상은 공유림과 사유림으로 작성자는 영림기술자, 독림가 또는 임업후계자로 되어 있다. 영림계획에는, ① 조림면적 · 수종별 조림수량 등에 관한 사항, ② 풀베기 · 어린나무가꾸기 등 육림에 관한 사항, ③ 벌채방법 · 벌채량 및 수종별 벌채시기(기준벌기령)에 관한 사항, ④ 임도 · 작업로 · 운재로 등 시설에 관한 사항, ⑤ 기타 산림소득의 증대를 위한 사업 등 영림상 필요한 사항 등이다. 정부는 규제완화차원에서 영림계획제도를 개선하여 종전 의무작성에서 자율작성으로 전환하였다. 즉, 모든 생산임지는 의무적으로 작성하도록 하였으나 1999년 8월부터 모든 임지에 자율적으로 작성토록 규정을 변경하였다. 대신 임업진흥을 촉진시키기 위하여 영림계획을 수립하여 경영하는 산림에 대하여는 세제혜택 등을 주고 있다.

No.6453 · 산림청 원문

영림계획구 營林計劃區 · forest management plan area
영림계획구는 공유림영림계획구와 사유림영림계획구로 구분한다(산림법 시행령 제8조 제2항 및 제3항). 공유림영림계획구는 당해 지역산림계획구안에 소재하는 공유림으로서 그 소유자가 영림계획을 작성할 산림의 단위이다. 사유림영림계획구는 당해 지역산림계획구안에 소재하는 사유림으로서 그 소유자가 영림계획을 작성할 산림의 단위를 말한다. 사유림영림계획구는 다시 ① 일반영림계획구 (사유림의 소유자가 자기 소유산림을 단독으로 경영하기 위한 영림계획구), ② 협업영림계획구(서로 인접한 사유림을 2인 이상의 산림소유자가 협업으로 경영하기 위한 영림계획구. ③ 산업비림영림계획구(산업비림을 소유하도록 권장받은 자가 자기소유산림을 산업비림으로 경영하기 위한 영림계획구)로 구분한다(산림법 시행령 제8조 제2항 및 제3항).

No.6454 · 산림청 원문

영림기술자 營林技術者 · forest management technician
산림법에 규정된 영림기술자의 정의는, 영림계획을 작성하고 그 시행에 관한 업무를 수행하는 자로서 대통령령이 정하는 자를 말한다. 자격은 ① 국가기술자격법에 의한 산림경영기사 이상의 자격을 가진 자, ② 국가기술자격법에 의한 임업종묘기사 · 임산가공기사 · 산림경영산업기사 또는 산림산업기사의 자격을 가진 자로서 임업기술분야에서 2년 이상 종사한 자, ③ 국가기술자격법에 의한 임업종묘산업기사 또는 임산가공산업기사의 자격을 가진 자로서 임업기술분야에서 4년 이상 종사한 자, ④ 국가기술자격법에 의한 임업종묘기능사 · 산림기능사 또는 목재가공기능사의 자격을 가진 자로서 임업기술분야에서 6년 이상 종사한 자. 또한 영림기술자를 배치할 수 있는 기관은 산림청, 특별시 · 광역시 · 도, 시 · 군 · 자치구, 지방산림관리청 · 지방산림관리청국유림관리소, 산림조합중앙회와 산림조합으로 하며, 영림기술자 자격증의 발급은 농림부령으로 정하도록 되어 있다.

No.6455 · 산림청 원문

영림단 營林團 · units of forest craft workers
산림조합이 입목의 벌채 · 반출, 조림 등 각종 시업을 실행하기 위하여 직접고용한 노동자의 작업조직이다. 1999년 현재 민유림의 경우 291개 작업단에 3,339명이 고용되어 있다.

No.6456 · 산림청 원문

영림서 營林署 · regional forest office
산림청의 국유림 관리기관으로 현재는 동, 서, 남, 북, 중부 산림관리청으로 개편되어있다.

No.6457 · 산림청 원문

영림장려 營林奬勵 · encouragement of silviculture
민유림의 경영개선을 경찰명령으로서만 실시한다는 것은 어렵다. 그래서 경찰명령과 표낭일체의 관계로서 조성수단을 강구하고 또는 전연 경찰명령에 의하지 않는 조성 수단만으로써 행하기도 한다. 이와 같은 보육행정이 채용되는 근거는 국민경제상 그 진흥이 희망되고 또 이것을 경영자의 독립에만 맡기면 그 목적을 달성할 수 없을 때 지도적 조성을 한다. 이에는 조성에 의한 경영자의 지식의 향상과 물적조성에 의해서 경영자를 유도하는 방향이 있다.

No.6458 · 산림청 원문

영림창 營林廠 · forest office
영림창은 일제가 국유림 수탈을 목적으로 신설한 산림행정기구이다. 산림수탈을 위해 일제는 한반도 강점 이전부터 중시했던 압록강 · 두만강유역의 국경지대 대밀림의 수탈기구인 통감부 영림창을 총독부 영림창으로 개편하고 일반 임정기구와 구분시켜 총독직속기구로 취급하였다. 그에 따라 영림창 관할지역 이외의 산림을 관장하는 기구와 함께 임정기구가 이원화된 셈이다. 1910년 10월 일반임정의 기구는 이전의 체제를 이어 중앙에는 농상공부의 식산국 아래 임업과를 설치하고, 각 지방청에 6개의 임업사무소를 두어 이들로 하여금 일반산림 산야에 관한 업무를 관장하게 하였다. 그런데 1911년 조선총독부관제 정비에 의해 산림산야에 관한 업무를 관장케 하였다. 이러한 기구조직은 통감부시기의 체제를 대체로 계승한 것으로 농상공부-식산국-산림과란 체계로 산림정책을 주관하게 되었다. 단지 지방업무를 담당하던 임업사무소는 폐지되고 지방청으로 그 업무가 이관되었다. 1907년에 신설되어 1926년까지 20여 년간 존립했던 영림창은 일제 산림정책의 변화 및 총독부 기구개편에 따라 다소 기구변천이 있었지만 큰 변화는 없었다. 영림창 소속의 총인원은 1919년 이후 급증하여 본창에 114명과 지창과 출장소의 242명을 포함하여 356명에 달하였다.

No.6459 · 산림청 원문

영상정합 映像整合 · Image registration
공통된 지역의 위성 영상자료 두 개를 하나의 좌표계에 나타내도록 하는 원격탐사자료처리기법.

No.6460 · 산림청 원문

영선 零線 · zero line
산지의 경사면과 임도시공기면과의 교차선으로 임도시공시 흙깎기 (절토)와 흙쌓기(성토)작업을 구분하는 경계선(기준선)이다.

No.6461 · 산림청 원문

영속변이 永續變異 · permanent modificat
계속변이라고도 한다.이 변화는 나중에는 소실한다.

No.6462 · 산림청 원문

영액금양산 嶺?禁養山 · forest protection policy
조선시대 국방상의 요지로 군대의 주둔이나 수원함양과 토사유출방지 등을 위한 산림으로 산 중복 이상에서는 벌채 등을 금지하고 식재를 장려하였다.

No.6463 · 산림청 원문

영양계 營養系 · clone
1) 클론. 진핵생물의 체세포분열에 의해 조상세포와 똑 같은 유전적 구성을 가진 자손이나 하나의 원핵생물의 분열로 비롯된 같은 유전적 조성을 가지는 개체들을 말함. 따라서 삽목 접목으로 증식된 식물도 클론으로 부를 수 있다. 그러나 이러한 용어는 생물체에만 그치지 않고 DNA 분자를 벡터 등에 삽입시켜 복제된 경우에도 해당된다. 2) 클론. 무성번식으로 단일 세포나 생물체에서 유도된 유전적으로 동일한 세포나 생물체의 집단. 클로닝은 모든 생명체에게 가장 근본적인 문제이다. 그 이유는 동,식물 몸체의 세포들은 결국은 수정된 알에서 유도된 클론이기 때문이다. 협의로 해석할 경우 한 클론은 단일 세포에서 유도되어 유전적으로 동일한 개체로 정의된다. 무성적으로 번식되는 식물들은 클론이라고 불릴 수 있는 유전적으로 동일한 식물들을 만들어 낸다. 클로닝은 옛날부터 원예에서는 일상적인 일이어서 다양한 식물이 잎, 줄기, 뿌리 등을 삽목함으로써 클론으로 증식되었다. 1996년 성숙한 포유동물의 클로닝이 성공하였고 어미 양의 세포로부터 새로운 개체를 만들어내었다. 경제성으로 본다면 동물의 클로닝은 유망하지만 윤리적인 문제는 아직 정립되지 않았다. 유전공학에서 클로닝이란 특정한 기능을 가진 유전자나 특정 DNA 염기서열을 플라스미드 등의 자가복제 시스템인 리플리콘(replicon)에 삽입시킨 후 대장균 등의 기주에서 증식시키는 과정을 의미한다.

No.6464 · 산림청 원문

영양계분리 營養系分離 · clonal separati
분기계 분리라고도 한다. 식물의 1개체부터 영양생식에 의해서 생긴 개체를 분리한다.

No.6465 · 산림청 원문

영양계선발 營養系選拔 · clonal selection
분지계 도태라고도 한다. 클론(영양계)에 있어서의 돌연변이(芽條突然變異등)을 선발하는 것.

No.6466 · 산림청 원문

영양교잡 營養交雜 · vegetative hybridiz
접목등에 의해서 무성적으로 이종의 생물간에 잡종을 만드는 것.

No.6467 · 산림청 원문

영양기관 營養器官 · vegetative organ
식물의 중요한 기관 중에서 뿌리, 줄기, 잎과 같이 식물의 생식과는 관계없이 생장하고 지지하고 유지되는데 관여하는 기관. 영양기관 중에서 뿌리는 땅속에서 식물체를 지지하며 양분 및 수분을 흡수하고, 줄기는 식물의 뿌리와 다른 기관을 연결하며 식물체를 지지하고 양부 및 수분을 이동시키는 역할을 하며, 잎은 광합성을 통하여 양분을 만들고 호흡 및 증산작용을 하게 되는데 이러한 기관을 통칭하여 부르는 용어이다.

No.6468 · 산림청 원문

영양단계 營養段階 · trophic level
생물 군집에서 먹이그물의 같은 부분으로부터 에너지를 얻는 생물 집단. 예를 들어 대부분이 식물인 생산자, 그리고 식물을 소비하는 초식동물이 있다.

No.6469 · 산림청 원문

영양묘채종원 營養苗採種園 · vegetative orchard, clonal seed orchard
접수, 삽수 등의 영양증식재료에 의하여 조성된 채종원이다.

No.6470 · 산림청 원문

영양번식 營養繁殖 · vegetative propagation
식물에서 생식세포가 관여하지 않고 뿌리나 줄기, 잎 등 영양기관에 의해 일어나는 무성생식을 말하며, 대개의 경우 포자생식이나 무배생식은 제외된다. 영양증식에 의해서 만들어진 동일한 유전자형을 갖는 개체를 ramet, ramet 전체의 집합을 genet이라 한다. ⇒ 무성번식.

No.6471 · 산림청 원문

영양변이 營養變異 · vegetative variation
주로 환경의 변화에 의하여 영양생장이 변화함으로써 생겨나는 변이이다. 유전변이와 대비된다. 같은 수종에 있어서 햇빛이 많고 건조한 조건에서 발달되는 양엽은 그늘지고 습윤한 조건에서 발달되는 음엽에 비하여 크기가 작고, 잎과 큐티클 층의 두께가 두껍고, 엽록소 함량이 낮고, 책상조직이 치밀하다. 잎, 영양기관, 과일 등의 크기에 관련된 변이는 영양변이가 많고, 잎의 거치나 모양, 꽃 특성 등 특정한 형태에 관련된 변이는 유전변이가 많다. 식물의 종을 식별하는데 영양변이는 기준이 될 수 없다.

No.6472 · 산림청 원문

영양본체 營養本體 · ortet
영양증식이 이루어진 본체를 의미한다.

No.6473 · 산림청 원문

영양분체 營養分體 · ramet
무성번식 방법에 의하여 번식되어 동일 클론에 속하는 개개의 분체 또는 분주체이다. 자연에서는 구근, 구경, 휘묻이 분체, 근주맹아 치수가 그 예이다. 인공적으로는 분주, 삽목, 근삽, 취목, 접목으로 번식된 개체들이다.

No.6474 · 산림청 원문

영양생식 營養生殖 · vegetative propagation, vegetative reproduction
영양기관이 무성번식으로 번식하여 후대를 이어가는 생식과정이다. 자연상태에서 삽목, 휘묻이, 근맹아 번식이 이루어지고 있으며 인위적으로 이러한 원리를 이용하여 식물을 무성번식한다. 버드나무속의 일종은 자연상태에서 바람으로 가는 가지를 탈락시켜 새로운 개체를 삽목으로 번식한다. 흰말채나무, 개나리, 딸기, 칡 등은 휘묻이로, 사시나무, 아까시나무, 대나무, 두릅나무 등은 근맹아로 새로운 개체를 번식한다.

No.6475 · 산림청 원문

영양생장 營養生長 · vegetative growth
생식생장의 반대어이다.

No.6476 · 산림청 원문

영양소 營養素 · nutrients
식물의 경우 생장에 필요한 무기염류로서 광합성이나 호흡으로는 얻어질 수 없는 요소. 용도별로 구분한다면 비교적 대량으로 요구되는 질소는 단백질, 핵산 혹은 coenzyme에서 주요성분이고 황은 단백질, coenzyme 등에서 필수성분이다. 인은 핵산, 인지질 및 coenzyme에 이용된다. 효소의 성분으로 이용되는 금속이온은 Cu, Zn, Ni, Mo 등이 있으며 cytochrome의 성분으로 Fe가 필요하며 K, Mg, Mn, Ca, Fe, Co는 여러 가지 효소들의 cofactor로 이용된다.

No.6477 · 산림청 원문

영양아 營養芽 · vegetative bud
눈(동아)속에 다음해 발생할 잎의 엽원기를 갖고 있어서 영양생장을 하는 눈을 말한다. 다음해 발생할 꽃의 화아원기를 갖고 있는 꽃눈(화아 또는 생식아)과 대조된다.

No.6478 · 산림청 원문

영양아포믹시스 - · vegetative apomixis
꽃이 피어야 할 곳에 영양아(vegetative bud) 즉 육아(bulbil)가 생겨나서 번식의 수단이 될 때. 예. 백합.

No.6479 · 산림청 원문

영양염류 營養鹽類 · nutritive salts
Mn. K. Ca. Mg. Na. Cl등.

No.6480 · 산림청 원문

영양엽 營養葉 · trophophyll
나엽이라고도 한다. 포자엽에 대한 말.

No.6481 · 산림청 원문

영양잡종 營養雜種 · vegetative hybrid
영양잡종에 의해서 생긴 잡종.

No.6482 · 산림청 원문

영양적불념 營養的不捻 · somatoplastic sterility
배유가 배에 양료공급을 못할 경우 배가 생육을 중지하게 되는 현상.

No.6483 · 산림청 원문

영양조직 營養組織 · vegetative tissue, vegetative structures
생물의 생식조직을 제외한 나머지 부분. 식물의 경우 괴경, 구근, 줄기, 뿌리, 잎 등이 있다. 따라서 영양생장이란 이러한 줄기, 뿌리 등이 자라는 현상을 말한다. 이러한 영양 조직도 증식이 가능한데 무성번식으로 새로운 개체가 만들어 질 경우는 생식생장(reproductive growth)을 하는 셈이 된다. 그러나 생식생장은 꽃이 피어 종자가 맺히는 데까지를 말한다.

No.6484 · 산림청 원문

영양핵 榮養核 · vegetative nucleus

1) 원생동물의 섬모충류에서 개체의 영양생산에만 관련하는 핵으로 생식할 때는 소실된다. 2) 화분관핵: 화분관이 자람에 관여하는 핵이다.

No.6485 · 산림청 원문

영염색체성 零染色體性 · nullisomic

종 염색체 기본수보다 한 쌍의 염색체가 결여된 경우를 말한다.

No.6486 · 산림청 원문

영유 - · gall cecidium

타생물의 기생으로써 식물체에 이상발육을 일으킨 부분.

No.6487 · 산림청 원문

영화 迎火 · counter fire

맞불. 산화용어.

No.6488 · 산림청 원문

옆도랑 側溝 · side ditch, gutter

노면이나 흙깎기(절토)비탈면의 물을 모아서 배수하기 위하여 임도의 길어깨를 따라 종단방향으로 설치하는 배수로이다. 임도에서 옆도랑의 위치는 대부분 흙깎기비탈면과 길어깨 사이에 설치되는데, 대부분 라이닝(lining)없이 사다리꼴로 파고 다듬은 흙수로로 만들어진다. 그러나 흙수로는 강우시 토사로 매몰되기 쉽기 때문에 종단물매가 급한 구간이나 침식에 약한 토질에는 U자형 또는 L자형 콘크리트관 수로를 이용한다.

No.6489 · 산림청 원문

옆치기 切 · hew

큰 자구로써 원목의 옆을 쳐서 각재 비슷하게 만드는 일.

No.6490 · 산림청 원문

옆친나무 ?角 · hewn lumber

통나무(圓木)를 운재 관계상 사방향의 옆을 도끼 같은 것으로 친 것인데 네모에 아직 둥근 맛이 남아 있는 사각재이다.

No.6491 · 산림청 원문

예거치 鋭鋸歯 · acute serrate

잎가장자리의 모양을 나타내는 용어로써 톱니같은 거치가 날카롭고 예리한 형태를 가진다. 벚나무 등의 잎에서 볼 수 있는 것과 같은 모양이다.

No.6492 · 산림청 원문

예덕나무 野桐 · Mallotus japonicus

남쪽 해안산지에 야생하는 낙엽소고목이며, 잎은 전연이다. 또는 2~3천열. 10월에 성숙하는 삭과의 외면에 연자.

No.6493 · 산림청 원문

예두 銳頭 · acute
식물기관의 끝 부분이(주로 잎의 끝을 나타낼 때 쓰임) 단순한 예각을 띠는 끝이다. 이보다 더욱 뾰족한 상태를 예첨두(銳尖頭, acuminate), 침 끝 같이 뾰쪽한 경우를 예철두(銳凸頭, cuspidate)라고 한다.

No.6494 · 산림청 원문

예방 豫防 · prevention
대중 교육, 법집행, 개인적 접촉 그리고 연료 위험감소를 포함하고, 산불 발생율 감소를 지시하는 활동을 말한다.

No.6495 · 산림청 원문

예방사방공사 豫防砂防工事 · preventive erosion control works
토층이 불안정하거나 기복이 심한 경우, 피해가 발생하기 전에 시행하는 사방공사.

No.6496 · 산림청 원문

예방적 원칙 豫防的 原則 · precautionary principles
기후변화협약은 기후 시스템에 대한 돌이킬 수 없는 위협을 막는 수준에서 대기 중 온실가스 농도를 안정시키기 위해 기후변화에 대한 과학적 증거가 불충분하다고 하더라도 사전에 이에 대한 적절한 대책을 시행해야 한다는 이 원칙을 채택하고 있다.

No.6497 · 산림청 원문

예불기 刈草機 · bush cutter
소형 원동기에 의하여 구동되는 둥근톱, 특수날 등에 의하여 잡초, 산죽, 관목들을 자르기 위하여 1인용 운반식 기계를 말한다.

No.6498 · 산림청 원문

예비간벌 豫備間伐 · pre-commercial thinning
미리솎아베기.

No.6499 · 산림청 원문

예비기금 豫備基金 · reserve fund
임업 예비기금의 종류는 ① 보상기금 ② 작업 예비기금 ③산림개량기금이 있다. 보상기금은 불경기 때의 결손을 보충하기 위한 것이고, 작업 예비기금은 산림구입 임도 부설 등을 할 때 가격 등귀로 인한 부족예산을 지출하는데 쓰인다. 산림 개량기금은 임상개량, 황폐지 복구 등을 적절한 시기에 할 수 있도록 하는데 사용된다.

No.6500 · 산림청 원문

예비림 豫備林 · reserve forest
임업기금의 역할을 할 수 있는 임목 축적을 보유하고 있는 산림이다. 예비림에는 처음부터 예비림으로 지정하여 경리하는 고정예비림과, 표준벌채량을 정할 때 정상적인 표준량보다 적게하여 연간 생장량을 저축해 두었다가 필요할 때 더 많이 벌채 이용하는 계산상의 예비림, 즉 보통 이동예비림이 있다.

No.6501 · 산림청 원문

예비벌 豫備伐 · preparatory cutting
산벌작업에 있어서 임목의 결실을 촉진하고, 내풍력을 증강시키기 위한 벌채.

No.6502 · 산림청 원문

예비조사 豫備調査 · presurvey pretest
사전조사.

No.6503 · 산림청 원문

예삭 曳索 · traction rope
예인줄

No.6504 · 산림청 원문

예산내역서 豫算內譯書 · detailed budget
임도에 들어가는 비용을 각 수량에 맞춰 작성하는 것으로 공정별 수량계산서에 의해 공종별 수량을 구하고 단가산출서 및 일위대가표를 통해 공종별 단가를 곱하여 작성한다.

No.6505 · 산림청 원문

예산통제 豫算統制 · budgetary control
예산통제를 이용해서 경영활동 전반을 관리하고자 하는 방법.

No.6506 · 산림청 원문

예업 豫業 · preliminary work
경영계획편성의 기초적 준비작업.

No.6507 · 산림청 원문

예외원리 例外原理 · law of exceptions to routine
경영자 또는 상급직원의 일상의 상무(routine)의 처리를 하급직원에 위재하고 단지 례 외적인, 또는 우발적인 사항을 취급하는 것.

No.6508 · 산림청 원문

예인줄 曳索 · traction rope, traction cable
운재용 삭도시스템에서만 사용하는 용어로 짐이 실린 반송기와 빈 반송기를 연결하여 빈 반송기를 적재장소로 되돌려 주는 역할을 하는 작업줄이다.

No.6509 · 산림청 원문

예초기 刈草機 · brush cutter
예불기

No.6510 · 산림청 원문

예취기 刈取機 · brush cutter
예불기

No.6511 · 산림청 원문

예측구간 豫測區間 · prediction interval
한 확률치에서 미래 관측치가 떨어질 구간의 추정치.

No.6512 · 산림청 원문

오갈피나무 五加木五可皮木 · 學 Acanthopanax sessiliflorum
잎은 장상. 대개는 3출잎 뒤 주맥 위에 잔털 전국에 분포. 수피약용. 핵과가 9월에 검게 됨.

No.6513 · 산림청 원문

오니비료 汚泥肥料 · sludge fertilizer
하수처리 후 발생한 반고형물 형태의 침전물을 미생물로 처리하고 석회와 혼합한 다음 탈수건조 과정을 거쳐 만든 비료.

No.6514 · 산림청 원문

오동나무 梧桐 · 學 Paulownia coreana
잎 뒤에 갈색모가 밀생. 중부 이남에 분포. 이 뒤에 백모가 나는 것을 참오동나무. 백동이라 하는데 생태와 용도는 비슷하다.

No.6515 · 산림청 원문

오동나무탄저병 炭疽病 · antharacnose
오동나무의 잎이 검게 썩는 곰팡이에 의한 병

No.6516 · 산림청 원문

오르토인산 燐酸 · orthophosephor
H_3PO_4. 인산의 일종. 그저 인산이라고도 한다. 무색에 기둥모양의 결정. 조해성이 강하다. 융점 41.5℃.물에 잘 녹고 산성을 정한다.

No.6517 · 산림청 원문

오리나무 五里木赤楊 · East Asian alder
잎이 타원형이고 습지에 난다.

No.6518 · 산림청 원문

오리나무반점병 班點病 · leaf spot disease
오리나무 잎에서 곰팡이에 의해서 생기는 점무늬병.

No.6519 · 산림청 원문

오리나무잎벌레 楊毛腎?葉甲東? · East Asian alder leaf beetle, 學 Agelastica coerulea
성충은 거의 난형이고 자남색 또는 연한 남색이고 광택이 있다.유충은 회갈색 또는 농갈색이고, 흑색의 자모점을 산재하고 자모는 황색이다. 오리나무류, 자작나무류, 사과나무, 개금나무 등의 잎을 식해한다. 성충으로 월동한다.

No.6520 · 산림청 원문

오미자 五味子 · 學 Schisandra chinensis
낙엽 활엽의 만목으로서 홍백색의 꽃이 6~7월에 핀다. 과실을 약용으로 쓴다.

No.6521 · 산림청 원문

오배자 五倍子 · chinese galls knopper
옻나무과의 식물인 붉나무의 유아 또는 엽병이 Schlechtendalia 속의 잔딧물에 자상을 받아 그 자극으로써 생긴 후 혹 모양의 충영을 말한다. 탄닌의 함량이 많다.

No.6522 · 산림청 원문

오배체 五倍體 · pentaploid
기본수의 5배의 염색체를 가진 배수체.

No.6523 · 산림청 원문

오스뮴산 酸 · osmic acid
고가의 시약, 0.5~2% 수용액을 세포의 고정을 쓴다.1% 수용액은 지방, 지방유의 검출에 쓴다. 단, 수지, 탄닌, 정유, 목화세포막도 비슷하게 정색한다.냄새가 심 하고 코의 점막을 자극하므로 주의해야 한다. 시약조제에 있어서는 손실을 피하기 위해서 보통 0.5~1g이 든 암풀의 외측을 비누로 잘 씻고 병안에 그대로 넣어 흔들어서 깨뜨리고 그 뒤 물을 부어 2% 또는 1%의 수용액으로서 보존한다. = 오스민산.

No.6524 · 산림청 원문

오스민산 酸 · osmic acid
이산화오스뮴의 수화물 $OsO_2 \cdot H_2O$(흑색)은 있으나 진정한 오스민산 H_2OsO_4는 얻을 수 없다. 염(오스민酸鹽)은 존재한다. 또 고정제에 있는 오스민산은 사산화오스뮴 OsO_4의 오칭이다. = 오스뮴산.

No.6525 · 산림청 원문

오스민산염 酸鹽 · osmate
M'_2OsO_4(M'은 1가의 금속). 유리의 오스민산은 존재하지 않으나 오스민산염을 존재 한다. 예. 오스민산칼륨. $K_2OsO_4 \cdot 2H_2O$.

No.6526 · 산림청 원문

오염자 부담원칙 汚染者 負擔原則 · polluters pay principle
OECD 국가들이 엄격한 환경규정을 도입하고, 높은 비용과 경쟁력에 미치는 부정적인 영향이 도출되기 시작한 1970년대 초부터 환경정책의 기본원칙으로 대두된 원칙이다. · · 오염자부담원칙 · · 이란 오염방지 조치를 이행하거나 오염으로 야기된 피해를 보상하는데 드는 비용을 오염자가 부담해야 한다는 것을 의미한다. OECD가 1972년에 채택한 환경정책의 국제경제적 측면에 관한 지침(Guiding Principles on the International Economic Aspects of Environmental Policies)에서는 희소한 환경자원의 합리적인 사용을 촉진하고 국제무역과 환경투자를 왜곡시키지 않기 위해 오염방지 및 관리조치의 비용분담에 사용되는 원칙으로 정의하고 있다. 즉 동 원칙은 환경이 수용 가능한 상태가 될 수 있도록 하기 위해 공공기관이 결정한 상기의 조치들을 이행하는데 드는 비용을 오염자가 부담해야 한다는 것이다.

No.6527 · 산림청 원문

오일베드 油溶 · oil bath
실험실용 가열장치의 하나. water bath로서는 목적을 달성하기 어려운 때 즉 100℃이상의 가열을 주로 쓰인다. 유용의 목료로서는 선실유, 아마인유, 피마자 기름, 올리브유 등이 있다. 가열성인 것이 결점이다. 기름, 올리브유 등이 있다. 가열성인 것이 결점이다.

No.6528 · 산림청 원문

오존 - · Ozone
정상 농도보다 높은 상태에서 식물체에 피해를 입히는 불안정한(계속적으로 반응하려는) 상태의 산소.

No.6529 · 산림청 원문

오존구멍 - · ozone hole
지구상의 상층에 있는 오존층의 어떤 부분에서 주위보도 오존 농도가 극단적으로 낮은 구역을 말한다. 오존층은 자외선을 차단해주기 때문에 이 오존 구멍이 있는 곳의 지상에는 자외선이 많이 도달하여 피부암 등 여러 가지 문제를 일으킬 수 있다. 위도가 높은 곳에서 많이 발생하며 특히 남극 대륙의 상공에서 심각한 문제를 일으키고 있다. 지금까지 알려진 바로는 냉장고의 냉매로 쓰이는 프레온가스가 오존층을 파괴한다고 하여 몬트리올의정서에서 프레온가스 사용을 금지하였다.

No.6530 · 산림청 원문

오존층 파괴물질에 관한 몬트리올의정서 - · Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
오존층 파괴물질인 CFCs, Halon 등에 대한 생산 및 사용규제에 관한 협약으로 총 95종의 규제대상 물질을 지정하고 있다. 우리나라는 1992. 5월에 가입하였다.

No.6531 · 산림청 원문

오존홀 - · ozone hole
오존층에서 오존농도가 상대적으로 주위보다도 극단으로 낮은 영역.

No.6532 · 산림청 원문

오지 奧地 · wildland
해안이나 도시에서 멀리 떨어진 대륙 내부의 깊숙한 땅이다.

No.6533 · 산림청 원문

오지림 奧地林 · inaccessible forest
(설명 없음)

No.6534 · 산림청 원문

오차율 誤差率 · ratio of error
오차율은 표본조사법에서 표본점의 수를 결정할 때 사용되는 용어이다. 유한모집단에서 표본 추출 오차의 한계를 d라고 할 때 의 신뢰구간을 d보다 적게 할 수 있는 표본점의 수 n을 결정하면 된다.

No.6535 · 산림청 원문

오키소화합물 化合物 · oxocompo
Carbonyl(獨 Karbonyl)기 > C=O 를 가지는 유기화합물의 총칭. 케토화합물 또는칼보닐화합물이라고도 한다. 예로서 아세톤, 장뇌 등.

No.6536 · 산림청 원문

오키시다제 - · oxidase
산화효소

No.6537 · 산림청 원문

오키시알데히드 - · hydroxyaldehyde
한 분자 중에 콜성 수산기와 알데히드기의 두 가지는 유기화합물을 말한다.

No.6538 · 산림청 원문

오탄당 五炭糖 · pentose
탄소원자의 5개를 가지는 단당류.

No.6539 · 산림청 원문

오토가미 - · autogamy
(1) automixis와 동의. 원생동물의 생식법의 하나로서 동일핵에서 유래한 이핵(동. 일개체이거나 또는 다른 개체)이 다시 모여서 합핵을 형성하는 현상. (2) 자가수분에 의한 수정.

No.6540 · 산림청 원문

오토믹시스 自混 · automixis
오토가미(autogamy)와 같다.

No.6541 · 산림청 원문

오토클레이브 加壓솥 · autoclave
내압솥. 가압하에서 가열하는 장치.

No.6542 · 산림청 원문

오페론 - · operon
원핵생물 및 극히 일부의 진행생물 유전자 구조 및 발현에 관련된 단위로써 상호관련이 있는 소수 유전자들의 집합체. 이 집합체는 하나의 긴 mRNA로 전사되며 이 mRNA에서 서로 다른 단백질이 번역되어 나오는데 이 단백질들은 보통 한 대사작용의 연결된 단계를 촉매한다. 보통은 하나의 operator와 한 두 개의 프로모터를 상류쪽에 지니고 있으며 하루 쪽에 연속으로 위치한 유전자들이 하나의 mRNA로 전사된다. 예를 들면 Streptococcus라는 미생물의 수은대사 회로는 mer operon이라는 operon에 의하여 조절된다. 이 operon에는 세포막의 바깥쪽에 붙어서 외부의 수은을 부착하는 단백질을 만드는 유전자 merP와 부착된 유전자를 세포내로 끌어들이는 수송담당 단백질을 만드는 유전자 merT, 그리고 세포안으로 들어온 수은을 무독한 형태로 전환시키는 유전자 merA, merB가 존재한다. 따라서 이 operon의 프로모터가 외부에 존재하는 수은에 의하여 발동되면 위의 4종의 유전자가 하나의 mRNA로 전자된 다음 4개의 독립된 효소단백질로 번역된다. 이처럼 operon은 한번의 외부자극에 대응하여 관련된 여러 유전자가 동시에 발현되기 때문에 상당히 효율적이라고 할 수 있다. 이러한 operon은 유전체의 크기가 작은 미생물에서 작은 유전체에 많은 정보를 담기 위한 전략

이라고도 할 수 있다. 그러나 대부분의 진핵생물의 유전자는 이와는 달리 하나의 프로모터에 하나의 유전자만으로 되어 있다.

No.6543 · 산림청 원문

오프셋트 支距 · offset
측량용어로서는 기준선으로부터 측점에 이르는 수선의 길이를 말한다. 체인측량(測鎖測量)에 많이 쓰인다.

No.6544 · 산림청 원문

옥도검정 沃度檢定 · iodine test
전분의 검출을 위한 검정법. 옥도가리(potassium iodine)를 쓴다.

No.6545 · 산림청 원문

옥도정기 沃度丁機 · iodine tincture
시약으로 쓸 때에는 옥소 1g을 알콜 10cc에 녹이고 사용할 때 알콜로 다시 희석한다.

No.6546 · 산림청 원문

옥상녹화 屋上綠化 · roof planting
건축물에 의해 토지피복, 물순환 차단, 생물서식공간 훼손 등의 문제점을 극복하기 위해 건축물의 옥상부분에 흙을 올리고 식물을 식재하여, 생태적, 경관적 효용을 얻기 위해 시행하는 녹화사업. 옥상녹화중 조경목적으로 휴게공간을 조성하는 등의 작업은 별로도 옥상조경이라고 구분하기도 하지만, 넓은의미에서 옥상에 시행하는 일련의 조경사업도 모두 옥상녹화에 포함될 수 있음

No.6547 · 산림청 원문

옥상정원 屋上庭園 · roof top garden
옥상에 식물을 식재하고, 휴게시설을 설치하여 정원의 기능을 가질 수 있도록 가꾼 정원

No.6548 · 산림청 원문

옥석 玉石 · gem
호박돌

No.6549 · 산림청 원문

옥소가 沃素價 · iodine value
지방등의 100g이 흡수하는 옥소의 g수.

No.6550 · 산림청 원문

옥시솔 - · Oxisols
주로 열대우림하에서 나타나며, 고도로 풍화된 토양목으로 철과 알루미늄의 산화물과 수산화물의 농도가 높아 적색 혹은 노란색을 띤다.

No.6551 · 산림청 원문

옥신 - · auxin
인돌 아세트산(indolacetic acid, IAA)과 비슷한 생리작용을 하는 생장조절물질의 총칭이다. 4-chloro-indole acetic acid(4-chloro-IAA), phenyl acetic acid(PAA), 3-indolebutyric acid(IBA)

등이 있다. 합성 옥신에는 naphthalene acetic acid(NAA), 2,4-dichlorophenoxy acetic acid(2,4-DIBA) 등이 있다. 옥신은 어린 눈과 잎에서 생성되어 뿌리 쪽으로 운반되는데 생장하는 세포의 세포벽 신장에 관여하여 세포의 생장을 촉진한다. 정아우세 및 측아성장 억제, 부정근형성 촉진, 화아형성 촉진, 선택적 제초효과 등이 있어 실용적으로 활용하기도 한다. 옥신은 저농도에서 촉진효과를 나타내지만 고농도에서는 억제효과를 나타낸다. 옥신은 에틸렌 합성을 유도하는 기능이 있는데 고농도 옥신의 저해작용은 에틸렌 생성에 의한 효과로서 설명하는 경우도 있다.

No.6552 · 산림청 원문

옥신 - · auxin
식물생장 조절물질의 하나로 성장 발근을 촉진하고, 낙과를 방지하며, 착과를 조절한다. 정단부 분열조직에서 생성된다.

No.6553 · 산림청 원문

옥화물 沃化物 · iodide
옥소와 그보다 더 양성인 원소와의 화합물. 옥화수소산의 염으로 취급할 수 있는것도 있다.

No.6554 · 산림청 원문

옥화은 沃化銀 · silver iodine
Ag I .

No.6555 · 산림청 원문

옥화칼륨 沃化 · potassium iodine
KI, 보통 옥도카리라 하나 옳지 않다. 무색의 입방체의 결정.

No.6556 · 산림청 원문

온난지수 溫暖指數 · warmth index
어떤 식물이 충분히 생육하기에는 일정 이상의 온도가 일정 기간 동안 지속할 필요가 있기 때문에 이를 나타내기 위하여 일정 온도 이상의 기간이 얼마 동안 지속되었는가를 나타내는 지수이다. 일반적으로 적산온도를 이용한다. 일정 온도 즉 기준이 되는 온도를 빙점으로 하는 경우와 5℃로 하는 경우 등 학자에 따라서 또는 식물 종류에 따라서 적용하는 기준이 달라진다.

No.6557 · 산림청 원문

온대 溫帶 · temperate zone
기후대의 하나로 열대와 한 대의 중간지역을 말한다. 한 대와의 경계는 산림한계선이기 때문에 상관적으로도 명확하고 기후조건도 연평균기온 0℃, 최난월평균기온 10℃ 등의 지표로 명확하게 구별된다. 그러나 열대와의 이행부는 연속되는 산림이거나 건조기후에 접하고 있기 때문에 경계를 어디에 설정할지에 대한 문제가 많다. 특히 습윤한 동아시아에서는 산림대의 구분과 관련되기 때문에 여러 가지 설이 있다. 또한 기후조건에 관해서도 연교차가 작은 열대로부터 큰 온대로의 구분을 어디에 설정할 것인가에 대한 의론이 갈라진다. 연평균기온을 사용한 구분으로 보면 20℃, 18℃이하 등, 최한월평균기온에서는 20℃, 18℃, 13℃이하 등의 사고방식이 있다. 우리나라의 경우 18~0℃로 보면 무방할 것이다. 쾨펜의 기후구에서는 난온대다우기후와 한냉북방림기후로 대응한다. 온량지수로는 월 180℃~월45℃까지를 온대로 하고 중간의 월 85℃를 난온대와 냉온대로 구분한다. 그 북쪽은 아한대라고 하는데 이것을 세계적으로 보면 한온대(cold temperate zone) 또는 북방대(boreal zone)라고 부르는 것에 해당된다. 온대역은 세 개로 구분되는데 연평균기온 21~13℃(온량지수 월

85~180℃)는 난온대로 상록활엽수림, 13~6℃(온량지수 월 45~85℃)는 냉온대(cool temperate zone, nemoral zone)로 낙엽수림, 6~0℃(온량지수 월 45~15℃)는 한온대(북방대)로 침엽수림이 된다.

No.6558 · 산림청 원문

온대강우관계 溫帶降雨關係 · temperature
기온과 우량으로써 기후의 주요한 형이 정해지고, 이것이 생물의 분포와 관계를 가진다.

No.6559 · 산림청 원문

온대강우림 溫帶降雨林 · temperate rainf
조엽수림.

No.6560 · 산림청 원문

온대림 溫帶林 · temperate forest zone
사철이 뚜렷한 온대지방 산림의 총칭이다. 난온대림과 냉온대림으로 구별되기도 한다. 식생은 조엽수림과 하록광엽수림으로 크게 나누어진다. 오늘날 세계의 대도시는 대부분 온대림역에 있다.

No.6561 · 산림청 원문

온대활엽수림 溫帶闊葉樹林 · temperate broad-leaved forest
온대는 열대, 온대, 한대로 3구분할 때에는 회귀선(23°27′)과 극권(66°33′) 사이의 위도대를 가리키나 기후적으로는 30°~50°의 위도대를 말하는데, 여기에 자라고 있는 산림대는 주로 활엽수림을 이루는데서 나온 말이다. 그러나 일반적으로는 온대림은 냉온대의 낙엽활엽수림대를 말한다. 낙엽활엽수림(落葉闊葉樹林)이나 하록수림(夏綠樹林, summer-green deciduous forest)은 온대낙엽활엽수림에서 겨울에 잎이 떨어지는 활엽수로 이루어지는 식물군계를 말한다. 기온의 연교차 20℃ 이상으로 여름철에는 상당히 고온으로 충분한 습도가 있으며, 겨울철에는 상당히 저온이 되는 북반구 온대에 분포한다. 유럽에서는 북위 40~60°, 북미 및 아시아에서는 30~60°부근. 이 군계가 발달하는 지역이 낙엽활엽수림대(nemoral zone)로 이보다 따뜻한 지역에서는 상록활엽수림대(조엽수림대), 추운지역에서는 침엽수림대를 볼 수 있다. 숲바닥에는 관목, 조릿대류, 초본층 등이, 또한 토양은 갈색산림토가 잘 발달한다. 비교적 낮은 곳에서는 느티나무, 밤나무, 졸참나무, 서어나무류 등이, 높은 곳에서는 신갈나무, 자작나무 등이 주로 분포한다. 너도밤나무는 일본의 낙엽활엽수림을 대표할 수 있으나 우리나라에서는 울릉도 등 일부지방에 국한되어 있고 신갈나무와 졸참나무가 대표한다.

No.6562 · 산림청 원문

온도계 溫度計 · thermometer
물체나 어떠한 공간에서의 온도를 측정하는 기구로 화씨온도계는 파렌하이트가 1714년에, 섭씨온도계는 1742년에 셀시우스가 만들었다.

No.6563 · 산림청 원문

온도굴성 溫度屈性 · -
열굽성.

No.6564 · 산림청 원문

온상 溫床 · hotbeds
식물체가 자라는 흙부분을 따뜻하게 한 밭. 열원으로서는 낙엽과 같은 유기물질, 또는 전열선, 스팀 파이프 등을 이용한다.

No.6565 · 산림청 원문

온생명 全生命 · global life
생명(life)을 '우주 내에 형성되는 지속적 자유에너지의 흐름을 바탕으로, 기존 질서의 일부 국소질서가 이와 흡사한 새로운 국소 질서 형성의 계기를 이루어, 그 복제 생성률이 1을 넘어서면서 일련의 연계적 국소 질서가 형성 지속되어 나가게 되는 하나의 유기적 체계'라고 볼 때 지구상에 나타난 전체 생명 현상을 하나 하나의 개별적 생명체로 구분하지 않고 그 자체를 하나의 전일적 실체로 인정하여 보편적 개념을 도출한 용어로 장회익이 만든 말이다. 그 대표적인 예로 태양까지도 포함한 지구 생태계 전체를 들 수 있다. 즉 물리학자인 장회익은 자유에너지가 생명현상에 필수적인 요건임을 주목하고 주변의 도움 없이 자유 에너지 흐름의 존속성을 유지하고 유기체를 포함하는 실체를 온생명으로 정의한 것이다. 따라서 지구는 자유 에너지를 스스로 공급하는 특성을 가지고 있지 않은 점에서 온생명일 수 없으며 태양과 묶여질 때 온생명이 된다.

No.6566 · 산림청 원문

온실 溫室 · greenhouse
식물의 주요 생육환경인 광선 · 온도 · 습도를 인공적으로 조절할 수 있도록 만든 건축물로, 그 지붕 모양에 따라 양쪽지붕형[兩面式

No.6567 · 산림청 원문

온실가스 溫室가스 · greenhouse gas
이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6) 등 적외선 복사열을 흡수하거나 재방출하여 온실효과를 유발하는 대기 중의 가스 상태의 물질을 말한다.

No.6568 · 산림청 원문

온실가스 배출 溫室가스 排出 · greenhouse gases emission
사람의 활동에 수반하여 발생하는 온실가스를 대기 중에 배출 · 방출 또는 누출시키는 직접배출과 다른 사람으로부터 공급된 전기 또는 열(연료 또는 전기를 열원으로 하는 것만 해당한다)을 사용함으로써 온실가스가 배출되도록 하는 간접배출을 말한다.

No.6569 · 산림청 원문

온실효과 溫室效果 · green house effect
대기는 태양 광선을 통과시켜 빛 에너지가 대기를 통과함으로써 지구 표면의 온도가 올라가게 한다. 그러나 이산화탄소, 메탄 등과 같은 가스와 수증기(구름 형태)는 지구 표면에서 열의 형태로 재 복사되는 에너지를 흡수하여 열이 지구에서 우주로 방출되는 속도를 늦춘다. 이러한 가스를 온실 가스라고 하는데, 이것은 마치 온실의 유리와 같은 기능을 하여 태양광선은 통과시키나 일단 열로 변형된 에너지는 포착하기 때문이다. 가스의 농도가 증가할수록 대기 중에 보다 많은 열 에너지가 저장되어 지표의 온도가 올라가게 된다. 이처럼 온실에 있어서와 같이 대기는 태양에서 온 단파장의 복사는 투과시키나 지표면에서의 장파장의 복사는 많이 투과시키지 못하는데 산업활동으로 이산화탄소 등과 같은 대기 오염물질이 대기 중에 축적되어 이러한 현상이 더 강해져서 지구의 온도가 올라가는 것을 지구는 온실 속에 갇힌 것처럼 기온이 상승한다는 생각을 대기의 온실효과라고 한다. 온실 효

과는 지구에 생명체가 번성할 수 있게 한다는 점에서 중요하다. 만약 온실 효과가 없으면 지표의 온도는 급격히 떨어질 것이다. 그러나 오늘날의 문제는 인위적 활동의 결과 온실가스의 농도가 지나치게 증가하여, 지구 기후에 급격한 영향을 주어 생물이 적응할 수 없다는 데 있다.

No.6570 · 산림청 원문

온천 溫泉 · mineral spring hot spring
지하수 · 수온이 그 지역의 연평균기온이나 얕은 지층의 지하수 수온보다 높은 경우를 말하므로 한계온도는 지역에 따라, 나라마다 정의가 다르다. 한국에서는 25℃ 이상으로 인체에 유해하지 않은 것으로 규정한다.

No.6571 · 산림청 원문

온탕처리법 溫湯處理法 · hot water treat
종자를 수온이 약 50℃되는 물에 30분 가량 침체한다. 발아촉진법의 하나.

No.6572 · 산림청 원문

올리브 橄欖 · olive
쌍떡잎식물 합판화군 용담목 물푸레나무과의 상록교목.

No.6573 · 산림청 원문

올림집재 올림集材 · uphill yarding
상향집재, 상방집재. 집재작업시 나무를 모으는 방향이 산복부에서 산정상 쪽으로 집재하는 방법으로 인력집재로는 불가능하거나 비용이 많이 소요되지만 산복에 개설된 임도를 이용하여 가선집재를 실시하면 내림집재보다 작업이 용이하고 작업능률이 높다.

No.6574 · 산림청 원문

옹벽 擁壁 · retaining wall
토압에 저항해서 흙의 붕괴를 막기 위해 축설된 시설물. 큰 토압에 저항하여 흙의 무너짐을 방지하는 구조물로서 직접 비탈면의 붕괴를 방지하고 급경사지에서 땅깎기 또는 흙쌓기할 토량을 감소시키기 위한 목적 등으로 설치되는 구조물이다. ⇒ 축대벽.

No.6575 · 산림청 원문

옻 漆 · sap of the lacquer tree
옻나무에서 나는 진. 처음 나올 때는 회색이지만 물기를 없애면 검붉은색으로 변한다. 물건에 칠하는 원료나 약재로쓴다.

No.6576 · 산림청 원문

옻나무 漆樹 · varnishtree lacquer tree
전국적으로 분포한다.

No.6577 · 산림청 원문

와그네르대상산벌작업 帶狀傘伐作業 · Wagnersher strip shelter wood harvesting system
와그네르 대상산벌작업이라고도 한다. 본법은 주로 임연하종에 따라 임분의 갱신을 꾀한다. 매우 집약적인 대상산벌로서 Wagner(와그너라고도 발음)가 Gaildorf에서 고 찰한 것. 대면적의 임분소개를 피하고 천연하종으로써 소면적의 동령림을 만들고 사업의 수행을 용역하게 하는 조건에 입각한 것.

No.6578 · 산림청 원문

와셀린 - · vaseline
비결정성의 개체탄화수소를 주성분으로 하는 백색연골물질.

No.6579 · 산림청 원문

와이블분포 와이블分布 · Weibull distribution
와이블분포는 원래 스웨덴의 Waloddi Weibull이 1939년에 수명검정을 위하여 추출한 자료를 설명하기 위하여 고안한 것으로 고장률함수의 분포에 따라 적절하게 고장확률밀도함수를 표현할 수 있도록 만든 확률분포이다. 와이블분포는 임학분야에서 처음으로 Bailey와 Dell이 1973년에 임분의 직경분포를 추정하기 위하여 적용한 이래 다양한 형태의 직경분포의 추정에 있어서 그 우수성이 보편적으로 인정되고 있는 확률분포이다. 와이블분포의 확률밀도함수는 로 표현되며, 만일 x<a인 경우에는 이 확률밀도함수는 0이 된다. 이 식에서 a는 위치의 모수(location parameter)로 분포된 직경의 최소직경을 의미하며, b는 척도의 모수(scale parameter)로 직경분포의 범위를 나타낸다. 또한 c는 형태의 모수(shape parameter)로 이 값의 변화에 따라 다양한 형태의 직경분포를 나타내게 된다. 이상과 같은 와이블분포의 3가지 모수를 추정하는 방법에 대해서는 그동안 다양한 통계적인 방법이 제안되어 사용되고 있다. 참조: 직경분포.

No.6580 · 산림청 원문

와이어 라스 鐵索 · wire lathe
아연도금철선(亞鉛鍍金鐵線) 또는 보통 철선으로 만든 일종의 철망이며, 그 종류는 능형(菱形) 라스, 갑형(甲形) 라스, 환형(丸形) 라스의 3가지 형상이 있다.

No.6581 · 산림청 원문

와이어로프 鋼索 · wire rope, wire cable
가느다란 철선을 꼬아서 1줄의 스트랜드를 만들고, 다시 여러 가닥의 스트랜드를 마(麻), 합성섬유 또는 IWRC(independent wire rope core)로프를 중심으로 꼬아서 만든 쇠밧줄로서 꼬임의 형태에 따라 보통꼬임과 랑꼬임이 있다. 스트랜드의 꼬임 방향에 따라서 S꼬임 로프와 Z꼬임 로프가 있다. 일반적인 용도는 어업용, 토목용, 차량 또는 장비 등에 널리 쓰이며 임업에서는 가공삭도, 가선집재에 활용되며 로프의 굵기, 꼬임의 종류, 도금여부 등으로 구분한다. 임업용에는 스트랜드가 6개인 것이 가장 많이 이용되며, 심줄은 기름이 침투된 마심이나 강도를 요구하는 로프는 IWRC심줄이 들어있는 것을 많이 사용하며 소선이 많을수록 유연성이 있으나 내마모성이 약하다.

No.6582 · 산림청 원문

와이염색체 y 染色體 · ychromosome
성염색체의 하나. 웅 hetero형의 성결정을 하는 생물로서 웅개체가 가지지 않는 성염색체.

No.6583 · 산림청 원문

와이제법 와이제法 · Weise's method
표준목의 흉고직경을 결정하는데 사용할 수 있는 하나의 방법으로, 임목을 직경이 작은 것부터 나열하였을 경우 작은 것에서부터 60%에 해당하는 위치에 있는 임목의 직경을 표준목의 직경으로 선택하는 것을 와이제법이라고 한다. 이 방법은 임상이 균일한 산림에 적용하면 좋은 값을 얻을 수 있고 매목조사를 통하여 모든 임목의 직경을 측정하여야 하는 번거로움이 있으나 비교적 흉고단면적법에 의하여 복잡하게 계산되는 표준목의 직경과 경험적으로 거의 일치하는 것으로 알려져 있다.

No.6584 · 산림청 원문

와이제측고기 와이제測高器 · Weise hypsometer
수고 측정기구의 하나인 와이제측고기는 기하학적 원리를 응용한 측고기로서 구조가 간단하고 가벼워 사용상 편리하다. 금속제 원통에 시준장치가 있고 원통에 붙은 자의 한 면은 톱니모양으로 되어 있다. 원통 안에 보관하는 기구는 수평거리를 고정시키는 눈금과 추가 있으며, 닮은꼴 삼각형의 원리에 의하여 수고를 측정할 수 있도록 고안되어 있다. 그림에서와 같이 아소스측고기를 이용하여 수고를 측정할 때 삼각형 ABC와 A'B'C'가 닮은꼴이고 또한 ABD와 A'B'C'도 닮은꼴 삼각형이기 때문에 이 원리에 의하여 와이제측고기의 눈금을 읽어 실제 수고 h=BC+BD를 구한다.

No.6585 · 산림청 원문

와지붕괴 窪地崩壞 · depression slides
집수(集水)가 원인이 되어 발생되는 산사태로 산복과 계안사이의 토심이 비교적 깊은 와지(窪地)에서 발생한다.

No.6586 · 산림청 원문

와지저류 窪地貯留 · depression storage
움푹 패어 웅덩이가 된 땅에 물이 정체되는 것

No.6587 · 산림청 원문

완경사 緩傾斜 · gentle slope
임지의 경사도가 완만한 것을 말한다. 우리나라 산림조사에서는 15도 미만의 경사를 완경사로 분류한다.

No.6588 · 산림청 원문

완만도 完滿度 · taper rate
수간의 형상은 일반적으로 수간의 직경과 위치에 따라 달라진다. 이와 같은 수간 형상의 변화 상태 또는 변화의 정도를 수량적으로 나타낸 것을 완만도라고 한다. 완만도는 수간의 재적과 밀접한 연관이 있기 때문에 입목재적표를 조제할 때 고려하여야 할 중요한 인자 중의 하나이다.

No.6589 · 산림청 원문

완만도표 完滿度表 · taper table
재적을 산출하기에 앞서서 입목에 대한 형상급을 계산하고 형상급별로 수간의 완만도를 나타낸 표를 완만도표라고 한다. 참조: 완만도.

No.6590 · 산림청 원문

완만한 完滿 · fullboled
나무줄기의 아래나위나 굵기에 있어서 큰 변함이 없는 쓸모있는 상태. 나무줄기의 아래나위나 굵기에 있어서 큰 변함이 없는 쓸모 있는 상태.

No.6591 · 산림청 원문

완벌 緩伐 · 獨 Kitzellhieb
설형산벌법에 있어서 예비벌과 대차없이 간벌 비슷한 벌채를 자주해서 음수를 발생시키는 약도의 벌채.

No.6592 · 산림청 원문

완벌작업 完伐作業 · 獨 Schlagbetrieb
개벌과 산벌을 합쳐서 하는 말. 택벌작업에 대한 말.

No.6593 · 산림청 원문

완신세 完新世 · Holocene
지질시대에서 제4기의 최후의 시대로 1만년 전으로부터 현재까지 해당하는 시대이다. 현세(現世, Recent)라고도 하며 후빙기라고도 불리지만 실제로는 빙하시대 중의 1간빙기로도 볼 수 있다.

No.6594 · 산림청 원문

완전경쟁 完全競爭 · perfect competition
단독으로는 가격 등의 결정에 영향력을 가질 수 없을 정도로 시장 참가자가 많고 시장에 참가하는 것이 자유로우며, 각자가 거래 조건에 대하여 완전한 지식을 가지는 상태를 말한다. 즉, 시장참가자가 많고 자본 · 노동 등의 이동을 방해하는 인위적 제약이 없으며, 수요자측과 공급자측이 각기 최대의 경제적 성과를 얻으려고 행동하는 경우의 경쟁을 말한다. 이 같은 완전경쟁의 성립요건은 다음과 같다. ① 수요자와 공급자가 다수 존재하지만 시장 전체에 비교하면 개개 수요자나 공급자는 매우 작은 존재일 뿐이다. 따라서 개개의 참가자가 그들의 수요량이나 공급량을 증감하여도 시장가격에 영향을 끼칠 수는 없다. ② 시장 참가자는 그 시장과 상품에 관하여 완전한 정보를 가지고 있다. ③ 다수의 상인에 의해 공급되는 동종의 상품은 전부가 동질적이어서 수요자는 어느 공급자로부터 상품을 구입해도 같게 된다. 즉, 시장 참가자는 가격에 의해서만 상품을 선택한다. ④ 이 시장에서는 기업의 참여나 퇴거 및 자원의 이동이 자유롭다. 예를 들면 이 시장에 참가하고 있는 기업의 이윤이나 임금이 다른 산업보다 높으면 새로운 자본이나 노동의 참여가 가능하며, 반대로 낮으면 기존의 자본이나 노동이 퇴거한다는 등의 조건들을 상정할 수 있다. 이같은 조건이 충족되면 동종의 상품은 어디서나 동일한 가격이 된다는 1물 1가(一物一價)의 법칙이 성립하여 상품 가격은 그 생산비에 정상이윤을 보탠 수준에서 스스로 안정을 유지한다고 여겨진다. 그러나 현실적으로는 상표나 광고, 공급자의 입지조건 등에 의해 수요자는 어느 특정상품이나 특정상인을 선별하게 되며, 또 공급자의 수도 한정되어 있는 경우가 많으므로, 완전경쟁의 상태는 현실에 존재하는 것이 아니라 다만 경제분석상 하나의 가설이며, 이론상의 극한상태라 할 수 있다.

No.6595 · 산림청 원문

완전대조교배 完全對照交配 · full-diallel crossing
화분수와 모수로 동시에 이용되는 모든 개체간 조합에서의 교배(상반교배가 포함됨). 양친 모두의 GCA, 전 조합의 SCA, 유전분산의 분할이 가능하고 미래의 육종을 위한 혈연관계가 없는 가계를 최대한 얻을 수 있다. 시간과 경제적인 부담이 너무 큰 단점이 있어 임목육종에서 순수한 형태로 많이 이용 되지 않는다. ⇒ 대조교배.

No.6596 · 산림청 원문

완전변태 完全變態 · holometaboly, complete metamorphosis
곤충에서 번데기 시기가 있는 변태.

No.6597 · 산림청 원문

완전비료 完全肥料 · complete manure
보통 질소, 인산, 칼리의 3성분을 적당하게 포함한 비료.

No.6598 · 산림청 원문

완전세대 完全世代 · teleomorph, perfect stage
자낭균류에서 유성포자인 자낭포자를 만들어 증식하는 세대이다.

No.6599 · 산림청 원문

완전시대 完全時代 · perfect stage
자낭이 형성될 때가 유성시대인데 이때를 자낭시대(ascigerous stage) 또는 완전시대라 한다. 어떤 균에 있어서는 유성시대 이외에 무성시대 즉 불완전시대(impect stage) 를 가지는 것이 있다.

No.6600 · 산림청 원문

완전우성 完全優性 · complete dominance
한 쌍의 대립대립유전자 중 어느 한 쪽이 다른 한 쪽에 완전한 우성을 보이는 경우. 그 유전자좌에서의 표현형은 완전우성 대립유전자가 지배하는 형태를 보인다. 예를 들어 사람의 ABO혈액형과 관련된 유전자형 중 IAIA, IAi에서 대립유전자 IA는 i에 완전우성이므로 표현형적으로 같은 A형을 보인다.

No.6601 · 산림청 원문

완전화 完全花 · complete or perfect flower
꽃은 생식기관으로 생식에 꼭 필요한 긴요기관인 수술과 암술 부분이 있고, 이를 보호하는 역할 등 부수적인 기능을 하는 꽃잎과 꽃받침부분이 있다. 완전화는 이 모든 부분을 모두 갖춘꽃을 말한다.

No.6602 · 산림청 원문

완충녹지 緩衝綠地 · buffer green
각종 공해와 자연재해 등을 방지하기 위하여 설치하는 녹지로서 도시공원및녹지등에 관한법률에 의해 관리됨. 완충녹지는 수질오염 · 대기 오염 · 소음 · 진동 등 공해의 발생원이 되는 곳 또는 가스폭발, 유출 등 재해가 생겨날 우려가 있는 지역과 주거지역이나 상업지역 등을 분리시킬 목적으로 두 지역사이에 설치하는 녹지대를 의미하기도 함. 서로 기능상의 마찰을 일으킬 수 있는 지역사이에 설치됨. 즉 도로나 철도 주변 주거지대 등, 상호 토지 이용의 혼란방지 등의 공공 재해를 줄이고 푸른녹지 보전을 목적으로 하는 녹지를 의미함

No.6603 · 산림청 원문

완충능 緩衝能 · buffer capacity
토양에 외부로부터 물질이 유입되었을 때 이의 영향을 최소화 할 수 있는 능력을 가리킨다. 토양용액의 pH에 대한 완충능은 토양 pH의 완충능이라고 하며, 일반적으로 다른 요인이 같을 경우 양이온 치환용량이 높을수록 완충능이 높다. 또한 토양이 가지고 있는 양분농도를 일정하게 유지하려고 하는 능력을 토양양분의 완충능이라고 한다. 완충용량(緩衝能力)이라고도 한다.

No.6604 · 산림청 원문

완충림 緩衝林 · buffer forest
방재림, 보호림, 보안림등과 같이 외부로 부터의 충격을 완화할 목적으로 조성된 임분.

No.6605 · 산림청 원문

완충용량 緩衝能力 · buffer capacity
완충능

No.6606 · 산림청 원문

완충용액 緩衝溶液 · buffer solution
완충작용을 가지는 용액.

No.6607 · 산림청 원문

완충작용 緩衝作用 · buffer action
어떤 용액에 산 또는 염기를 가했을 때 일어나는 수소이온농도의 변화가 순수에 그것 을 가했을 때 일어나는 수소이온농도의 변화에 비교해서 더 작을 때 이 용액은 완충작용이 있다고 한다.

No.6608 · 산림청 원문

완충지대 緩衝地帶 · buffer zone
양쪽에서 일어나는 변화가 서로 영향을 적게 미치게 하기 위하여 만든 경계 지대를 말하는데, 예를 들어 완충녹지라하면 대기의 오염, 소음, 진동, 악취 등 광범한 공해발생원지역 또는 가스폭발, 유출 등 재해가 생겨날 우려가 있는 지역과 주거지역이나 상업지역 등의 환경을 분단할 것을 목적으로 설치되는 녹지를 말한다.

No.6609 · 산림청 원문

완화곡선 緩和曲線 · transition curve
일정한 반지름의 원곡선이 직선부에 연결되거나 직선부에서 원곡선에 연결될 때 차량의 동요를 경감시키고 차량의 주행을 원활히 하기 위해 단곡선의 시 · 종점과 곡선간 또는 복심곡선의 곡률변화점에 삽입하는 곡선이다.

No.6610 · 산림청 원문

완화구간 緩和區間 · transition distance
도로, 계류의 선형을 변화시킬 때, 직선부와 곡선부의 연결 구간

No.6611 · 산림청 원문

왓트 - · watt
일과 에너지의 실용단위. 기호 Wh. 1wh = 3600줄.

No.6612 · 산림청 원문

왓트슨크릭크의모형 Watson-Crick DNA 模型 · Watson-Crick model of DNA
de(s)oxyribonucleic acid의 분자구조의 가설적 모델. 이에 의하면 이본의 당-인산 의 긴 사슬(소)이 동일축을 중심으로 해서 나선상이 되어 double helix를 형성한다. 한 사슬에 배열된 염기는 다른 사슬의 염기와 쌍을 만들고 수소결합으로써 연결된다. 아데닌과 치민, 구아닌과 시토신이 각각 결합되어 있는 것으로 생각되고 있다. 그래서 한 쪽 사슬의 염기의 배열순서가 알려지면 다른 쪽의 것은 상보적으로 정해진다. 세포분열에서 DNA의 복제가 일어날 때에는 이본의 나선이 서로 분리하고 각각의 사슬 을 주형으로 해서 위에 말한 염기의 상보적인 관계에 따라 새로운 사슬이 형성되어서 DNA분자가 배가된다고 생각된다.

No.6613 · 산림청 원문

왕대(참대) 王竹, 苦竹 · Phyllostachys reticulata
외떡잎식물 벼목 화본과의 대나무.

No.6614 · 산림청 원문

왕버들 河柳 · Salix glandulosa
쌍떡잎식물 이판화군 버드나무목 버드나무과의 낙엽교목.

No.6615 · 산림청 원문

왕벚나무 東京櫻花 · Prunus yedoensis
제주도에 자생한다. 화경에 미모, 4월에 잎이 피기 전에 개화.

No.6616 · 산림청 원문

왕수 王水 · aqua regia
농염기에 적정량의 농초산을 혼합한 용액. 보통 용적비로서는 농염산 3과 농초산 1로 한다.

No.6617 · 산림청 원문

왕실림 王室林 · Buffer zone, Buffer strip, Crown timber land, Crown wood
왕실소유림

No.6618 · 산림청 원문

왜도 歪度 · skewness
통계에서 분포가 평균을 중심으로 대칭이 아니고 한 쪽으로 치우친 것.

No.6619 · 산림청 원문

왜림 矮林 · coppice forest
움돋이로 갱신되는 숲으로 일명 맹아림, 저림, 신탄림이라 불리기도 한다. 움(맹아)으로써 갱신되는 숲으로 벌기가 짧고 입목본수가 많다. 오리나무류, 리기다소나무, 참나무류 등이 왜림을 만드는 주요 수종이다.

No.6620 · 산림청 원문

왜림갱신 矮林更新 · sprout regeneration
움돋이가 쉬운 수종으로 구성된 숲에서 큰 나무를 잘라서 이용하고 움으로 새로운 숲을 만드는 일이다.

No.6621 · 산림청 원문

왜림갱신법 矮林更新法 · natural regeneration by shoots and suckers
저림갱신법.

No.6622 · 산림청 원문

왜림작업 矮林作業 · coppice-forest method, sprout system
큰 나무를 잘라내고 움을 키워서 새로운 숲을 만드는 작업법으로 왜림작업은 대개 모두베기를 한다. 왜림작업은 농용자재 생산이나 연료림작업에 한하여 적용하는 것이 보통이다.

No.6623 · 산림청 원문

왜림택벌작업 矮林擇伐作業 · coppice-selection method
숲의 수종구성이나 나무의 영급배치에 따라서 선택적으로 왜림작업을 시행하는 작업법이다.

No.6624 · 산림청 원문

왜성 矮性 · dwarf
생물의 크기가 그 종(種)의 표준 크기에 비하여 작게 자라는 특성. 또는 그런 특성을 가진 품종.

No.6625 · 산림청 원문

왜소형 矮小型 · dwarf
동물, 식물에 있어서 그 종류의 표준형보다 형이 이상적으로 작은 형.

No.6626 · 산림청 원문

왜웅 矮雄 · dwarf male
자웅이체의 동물에 있어서 숯컷의 몸이 암컷의 몸에 비해서 매우 소형인 것.

No.6627 · 산림청 원문

외 猥 · lath
지붕, 벽속에 엮는 나무, 잡장(雜杖). 얇고 좁게 그리고 길게 켠 나무쪽.

No.6628 · 산림청 원문

외국수종 外國樹種 · exotic species
외국에서 들어온 수종.

No.6629 · 산림청 원문

외국시장개척정책 外國市場開拓政策 · foreign market development program
이 정책은 미국이 농산물수출시장 개척을 위해 해외에서 교육 및 수출촉진활동을 수행하는 협회, 기업 및 기타 단체 등에게 연방정부의 자금을 지원하는 제도로 무역협회의 일부 기금이 총기금에 보태진다. 이 제도는 대체로 장기간에 걸친 제도적인 노력을 통해 농산물 및 가공제품의 판로확대와 수입품의 사용방법을 수입국에 홍보하기 위해 고안되었다. 밀, 옥수수, 콩, 유제품, 면화, 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 과실, 채소 및 견과류 등의 생산자를 대표하는 협회가 이 분야에서 가장 활동적이다.

No.6630 · 산림청 원문

외떡잎식물 單子葉植物 · monocotyledon
배(胚)에서의 떡잎(자엽) 수가 한 장인 종류. 이러한 떡잎의 수가 식물분류에서 계통을 나누는 큰 특징이 되기도 하는데 이러한 분류는 16세기 이미 알려졌으나 1789년 A. L. de Jussieu에 의해 처음 분류군으로 인정되었다. 계통을 나누는데 학설이 있으나 쌍떡잎식물류 중 다심피류에서 유래하였다는 가설이 일반적이다. 잎의 주맥은 평행하고 줄기는 부제중심주여서 형성층이 발달하지 않은 것이 일반적이며 이 종류 식물의 꽃은 3수성이고 배는 발아 후에 즉시 유근을 상실하고 부정근과 교대하는 특징이 있다. 이에 속하는 식물은 벼과 식물, 백합과 식물 등과 같이 초본이 많으며 대나무, 종려와 같은 목본식물은 약 10% 정도로 알려져 있다.

No.6631 · 산림청 원문

외래 外來 · exotic
다른 지방, 나라에서 들어온 생물을 뜻한다.

No.6632 · 산림청 원문

외래수종 外來樹種 · exotic species
외국으로부터 도입된 수종, 자생종(自生種, native species)에 대응된다.

No.6633 · 산림청 원문

외래종 外來種 · exotic species
외국 혹은 국내의 다른 지역에서 들어온 모든 종의 총칭이다.

No.6634 · 산림청 원문

외막 外膜 · exosporium, exine, extine
외피, 외벽이라고도 한다. 포자 또는 화분의 막이 내외이층으로 되어 있을 때 최외부를 덮고 있는 막을 말한다.

No.6635 · 산림청 원문

외목형 外木型 · extoxylar type
내부에 사부 그 외측에 목부를 배열하는 유관속 또는 중심주의 형식. 병목유관속에서 외측에 위치한 목부가 단면에 있어 V자상으로 번져 외측의 사부를 질러 외측까지 감싸게 된 것.

No.6636 · 산림청 원문

외부경제 外部經濟 · external economics
생산자나 소비자의 경제활동이 시장거래에 의하지 않고 직접적 또는 부수적으로 제3자의 경제활동이나 생활에 영향을 미치는 것을 외부경제 효과라고 하며 그 영향이 이익이면 외부경제, 손해면 외부불경제라고 한다. 최근에는 외부불경제로서 대기오염 소음 등 공해가 심각해졌다. 외부경제 효과가 있으면 시장기구가 완전히 작용해도 자원의 최적배분이 실현되지 못한다. 산림경영도 외부경제 효과의 대표적인 사례이나 효과가 시장을 통하여 거래되지 않기 때문에 더욱더 경영난을 겪고 있다.

No.6637 · 산림청 원문

외부교잡 外部交雜 · outcross
이계교배.

No.6638 · 산림청 원문

외부기생 外部寄生 · ectoparasitism
기주의 외부에서 생활하며 양분을 탈취하는 형태의 기생이다.

No.6639 · 산림청 원문

외부기생균 外部寄生菌 · epiphyte
기주외부에 기생하는 균.

No.6640 · 산림청 원문

외부기생선충 外部寄生線蟲 · ectoparasitic nematode
식물병원 선충 중 뿌리조직 내로 침입하지 않고 뿌리 바깥쪽의 세포에서 영양원을 취하는 것이다.

No.6641 · 산림청 원문

외부기생체 外部寄生體 · epiphytic fungi
식물체 또는 식물체 기관의 표면에 존재하는 기생체이다.

No.6642 · 산림청 원문

외부비경제 外部非經濟 · external diseconomy
다른 사람에게 의도하지 않은 손해를 입히고도 이에 대한 비용을 지불하지 않는 것을 말한다. 인간은 사회적 동물로서 상호작용을 하면서 살아간다. 각 경제주체는 경제활동을 하면서 다른 경제주체에게 다양한 영향을 미치는 것이다. 어떤 사람이 휴대폰을 구입하는 경우 그는 휴대폰에 대한 가격을 지불하고 휴대폰의 소유권을 이전 받게 된다. 휴대폰을 사용함에 있어 사용자가 무선통화서비스를 향유하는 것 이외에 통화를 하는 과정에서 주변에 있는 사람에게 불쾌감을 유발할 수 있다. 또한 어떤 사람이 신문을 구매하여 지하철에서 읽고 있는 경우 그 옆에 있는 사람은 신문을 구매하지 않고서도 그 신문이 제공하는 정보를 얻을 수 있다. 즉 사회적 동물인 인간은 경제행위를 함에 있어서도 항상 주변에 있는 사람 또는 환경에 다양한 영향을 미치는 것이다. 그러한 영향 중에서 가격을 통한 경제적 대가를 수반하지 않은 채 다른 경제주체의 소비 또는 생산활동에 미치는 영향을 외부효과(externalities)라고 한다. 기본적으로 각 경제주체는 시장에서 재화 또는 서비스를 교환할 때 그에 대한 가격을 받거나 지불한다. 또한 자신의 경제행위로 인해 타인에게 피해가 야기되면 그에 대한 비용을 지불해야 하며 타인에게 이익이 발생할 경우에는 그에 대한 대가를 받아야 한다. 그러나 경우에 따라서는 그러한 대가나 비용의 지불이 불가능할 수도 있다. 이러한 상황하에서 그 경제주체는 자신의 행위의 결과로 인해 발생하는 비용이나 편익을 완전히 고려하여 의사결정을 할 수 없게 된다. '외부'라는 용어는 외부효과를 야기하는 경제주체가 자신의 행위에 따른 결과를 모두 고려하지 못하고, 즉 내부화하지 못하고 그 결과의 전체 또는 일부가 외부로 유출되는 의미로 사용된 것이다. 이러한 외부효과가 발생하면 경제주체는 자신의 행위에 수반되는 비용이나 자신의 행위에 따른 편익을 올바로 평가하지 못하게 되어 사적인 비용(편익)과 사회적인 비용(편익)간에 괴리가 발생하게 된다. 시장에서의 가격은 사적인 비용과 편익을 바탕으로 형성되므로 사회적 비용이나 편익을 올바로 반영하지 못하게 되는 것이다. 그에 따라 시장가격은 자원의 효율적인 배분을 유도하는 기능을 수행하지 못하게 되어 시장실패가 발생하게 된다. 이러한 외부비경제가 산림 · 임업에도 커다란 문제로 대두되고 있다.

No.6643 · 산림청 원문

외부비용 外部費用 · external cost
외부비용은 사업수행 주체 이외의 주체가 지출하거나 부담하는 희생이나 비용으로 사업수행과정에서 발생하는 환경오염이나 피해의 비용(기술적 외부비용), 사업수행 결과 원자재 가격이나 임금 인상 등 시장여건 변화로 다른 수요자의 비용부담 증대(화폐적 외부 비용) 등이 여기에 포함된다. 임업투자분석에서는 사업수행주체가 직접 지불하거나 부담하는 내부비용만이 고려의 대상이 되며, 외부비용은 투자분석의 비용에 포함되지 않는다.

No.6644 · 산림청 원문

외부생식기 外部生殖器 · external genitalia
곤충에서 암컷의 산란관(ovipositor)과 수컷의 교미기관으로서 곤충의 종류에 따라 그 모양이 다르며, 특히 후자는 변이가 심하여 곤충의 분류에 많이 이용된다.

No.6645 · 산림청 원문

외부참조가격 外部參照價格 · external reference price
국내가격지지 효과나 관세상당액(TE)을 계산할 때 기준이 되는 국제가격으로서 UR 농산물 협정에서는 1986~1988 평균 세계시장가격을 기준으로 하고 있다.

No.6646 · 산림청 원문

외부포식기생자 外部捕食寄生者 · ectoparasitoid
포식기생충이 기주의 체외에서 영양분을 섭취하며 생육하는 것을 말한다

No.6647 · 산림청 원문

외부효과 外部效果 · externalities
외부효과는 경제학적 개념으로서, 어떤 소비자의 만족도나 생산자의 생산비용이 다른 경제주체의 소비활동이나 생산활동에 의하여 시장을 통하지 않고 무상으로 유리하거나 불리한 영향을 받을 때 외부효과가 있다고 말한다. 즉 시장거래를 통하지 않고 타인에게 영향을 미치는 어떤 개인이나 집단의 행동결과를 말한다. 즉 유리한 영향을 받는 것을 외부경제(external economy)의 효과가 있다라고 하고, 불리한 영향을 받는 것을 외부불경제(external diseconomy)의 효과가 있다라고 한다.

No.6648 · 산림청 원문

외사면 外斜面 · -
바깥비탈

No.6649 · 산림청 원문

외생균근 外生菌根 · ectomycorrhiza
주로 목본식물에서 발견되며, 곰팡이의 균사가 기주식물의 세포 안으로 들어가지 않고 기주식물 세포 밖에서만 머문다. 균사는 뿌리 표면을 두껍게 싸서 균투(菌套, fungal mantle)를 형성하고 뿌리 속 피층까지 침투하여 세포와 세포 사이의 간극에 균사에 의한 하티그망(Hartig net)를 만드나 피층 안쪽으로는 들어가지 않는다. 온대지방에서는 소나무과 자작나무과, 참나무과, 버드나무과의 수목에서 흔히 발견된다. 소나무과의 수목은 반드시 외생균근을 형성하며 자연상태에서 균근 없이는 살 수 없다.

No.6650 · 산림청 원문

외생균근 外生菌根 · ectomycorrhiza
균사가 뿌리의 표면을 덮고 표면에 가까운 조직중에서 번식 하고 균투를 형성한다.

No.6651 · 산림청 원문

외생출아 外生出芽 · exospore budding
외부출아라고도 한다. 출아의 보통의 형.

No.6652 · 산림청 원문

외생포자 外生胞子 · exospore
식물체의 외부에 분리된 소세포로 포자의 성질과 기능을 갖고 있는 것. 포자낭 안에 일반포자(내생포자)와 반대되는 개념이다. 예로써 균류에서 볼 수 있는 분생자와 담자포자 등이 있다.

No.6653 · 산림청 원문

외업 外業 · field work
야외에서 실시되는 작업을 말하며 외업, 선점, 예측, 실측, 야장의 기록과 정리 등이 포함된다.

No.6654 · 산림청 원문

외원형 外原型 · exarch
1차목부의 한 형식.

No.6655 · 산림청 원문

외재 外材 · foreign timber
우리나라에 수입된 목재의 통칭으로서, 수입재는 미재, 남양재, 북양재, 기타재로 대별된다. 미재에는 캐나다산의 것도 포함되며 침엽수가 대부분이다. 남양재는 주로 인도네시아 등에서 수입되고 있다. 1999년 우리나라는 6,623천㎥의 외재를 수입하였는데, 이는 총목재 수요량의 80%를 차지한다.

No.6656 · 산림청 원문

외적휴면성 外的休眠性 · external dormancy
일반적인 휴면의 개념으로 종자가 발아에 필요한 외적조건을 주어도 발아하지 않는 현상.

No.6657 · 산림청 원문

외쪽물매 - · superelevation
곡선부의 노면 바깥쪽을 안쪽보다 높게 하여 횡단면 전체에 주는 가로물매(횡단물매)로서 곡선부를 차량이 통과하는 경우 안전하고 쾌적한 주행을 위해서 설치된다.

No.6658 · 산림청 원문

외형질 外形質 · ectoplasm exoplasm
원형질체의 표면의 원형질막의 내측에 접하는 세포질의 부분.

No.6659 · 산림청 원문

요도포름 - · iodoform
CHI_3.황색의 결정.

No.6660 · 산림청 원문

요두 凹頭 · emarginate
식물기관의 끝부분이(주로 잎의 끝을 나타낼 때 쓰임) 전체적으로는 원형이며 중앙 끝이 오목하게 들어 간 형태. 참싸리의 일부 잎에서 나타나는 모양이다.

No.6661 · 산림청 원문

요면경 凹面鏡 · concave mirror
반사경중 반사면이 구면 또는 비슷한 모양을 한 것.

No.6662 · 산림청 원문

요소 尿素 · urea
$CO(NH_2)_2$.중성의 농후비료이다. 요소태질소 46%를 포함한다. 토양콜로이드 에 흡착되지 않는다.

No.6663 · 산림청 원문

요소수지 尿素樹脂 · urea resin
요소와 포름알데히드를 축합해서 얻을 수 있는 합성수지. 무색투명하므로 임의로 흡착시킬 수 있다.

No.6664 · 산림청 원문

요수량 要水量 · water requirement
(동의어) 증산계수.식물체의 1g의 건조식물 형성에 요한 증산량.

No.6665 · 산림청 원문

요인 要因 · factor
어떤 대상이나 특정치에 영향을 끼치게 되는 인자 혹은 원인을 요인이라고 한다. 보통 수학, 물리학, 화학 분야에서 사용되는 용어이지만 생물학적으로는 어떤 생물학적 현상을 일으키는 원인 또는 조건을 말한다. 예를 들면, 종자의 발아를 촉진시키는 요인으로서 온도, 습도, 산소 등을 들 수 있다.

No.6666 · 산림청 원문

요인배치실험법 要因配置實驗法 · factorial design
2개 이상의 인자(요인)에 대하여 2개 이상의 수준을 처리하여 시험하는 것이다. 요인 시험의 장점은 품종, 파종기, 비료 등의 요인을 단독으로 한 시험과 이들 요인을 조합하여 한 복인자 시험의 결과가 거의 일치한다 하더라도, 요인시험에서는 각 요인의 효과를 별도로 추정할 수 있다는 것이다.

No.6667 · 산림청 원문

요인분석 要因分析 · factor analysis
비교적 소수의 인자로 많은 변량(變量) 사이의 관계를 설명하기 위해 고안된 통계적 분석방법을 요인분석이라고 한다. 요인분석은 여러 개의 변량들이 서로 어떤 관련이 있는가를 분석하여 이 변량들의 관계를 파악하는데 활용한다. 이 분석은 독립변량과 종속변량을 구분하지 않고 변량 전체를 대상으로 하여 이루어진다. 요인분석의 종류에는 주성분분석(principal component analysis)과 공통요인분석(common factor analysis) 등으로 나누어 분석할 수 있다.

No.6668 · 산림청 원문

요인설계 要因設計 · factorial design
한쪽 성의 개체들과 다른 성의 개체들과의 모든 조합에서 교배가 이루어짐. 교배조합의 수가 너무 많아지기 때문에 임목육종에서는 몇 개의 개체가 검정목 또는 화분수로 지정되어 다른 개체들과 교배되는 경우가 많은데 이를 검정목설계(tester design)라 부른다. 일반조합능력, 특수조합능력, 유전력의 추정이 가능해 차대검정에 매우 유용한 설계이나 다음 세대의 양친으로 이용될 독립적인 후대의 수가 검정목으로 사용된 개체로 제한되는 단점이 있다.

No.6669 · 산림청 원문

요존국유림 要存國有林 · indispensable national forest
보전국유림. 1) 임업생산임지의 확보, 임업기술개발 및 학술연구를 위하여 보존할 필요가 있는 국유림. 2) 사적(사적) · 성지(성지) · 기념물 · 유형문화재 보호, 생태계보전 및 상수원보호 등 공익상 보존할 필요가 있는 국유림. 3) 그 밖에 국유림으로 보존할 필요가 있는 것으로서 대통령령이 정하는 국유림이 있다.

No.6670 · 산림청 원문

요철 凹凸 · ground roughness, roughness
오목하게 들어가고 뾰족하게 돌출한 형상이다.

No.6671 · 산림청 원문

욕구 欲求 · want
본능적, 충동적으로 뭔가를 구하거나 얻고 싶어하는 생리적, 심리적 상태.

No.6672 · 산림청 원문

욕구위계이론 欲求位階論 · needs hierarchy theory
Maslow가 확립한 이론으로, 인간의 요구는 생리적 요구, 안전요구, 사회적요구, 존경요구, 자아실현 요구의 순서로 진행되며, 인간의 행동은 이중 여러 개의 요구로 결정되는 경향이 있다는 이론이다.

No.6673 · 산림청 원문

용기묘 容器苗 · containerized seedling
뿌리를 노출시킨 묘목(나근묘, 裸根苗)을 이식하는 데서 오는 활착율 저하를 극복하고 묘목식재 시기를 넓히고자 여러 가지 재료로 만들어진 용기에서 양묘된 묘목, 용기묘는 보통 용기에 담긴 채로 조림지로 운반되며 흔히 용기에 담긴 채로 조림한다.

No.6674 · 산림청 원문

용납기 溶蠟器 · grafting wax melter
접목할 때 사용.

No.6675 · 산림청 원문

용도지구계획 用途地區計劃 · district land use plan
공원의 보호 및 이용한계를 지구에 따라 구분하여 관리하는데 필요한 계획으로서 기본지형도를 기준으로 용도지구 및 세부용도지구 계획으로 구분. 자연보전지구, 자연환경지구, 취락지구, 집단시설지구 등이 이에 속한다.

No.6676 · 산림청 원문

용도지구제 用途地區制 · land use zoning system
공원의 효율적인 보호와 이용을 도모하기 위하여 공원을 자연보존지구, 자연환경지구, 취락지구, 집단시설지구를 공원계획으로 결정하는 제도이다.

No.6677 · 산림청 원문

용량 容量 · contents capacity
원래의 뜻은 용기의 용적을 뜻한다. 이것을 확장해서 어떤 물질이 일정의 상태의 변화에 있어서 얻는 열량 또는 물체가 가지는 전기량을 생각할 때 이것을 각각 그 물질의 열용량, 전기용량이라고 한다.

No.6678 · 산림청 원문

용량분석 容量分析 · volumetric analysis
성분의 함량을 산출하는 분석법.이 때 기지농도의 시약을 쓴다.

No.6679 · 산림청 원문

용매 溶媒 · solvent
용체를 구성하는 성분물질중 어떤 한 성분을 특히 용매라 하고 그 밖의 성분을 용질이라고 한다.

No.6680 · 산림청 원문

용수 湧水 · eruptive water
솟아나는 물

No.6681 · 산림청 원문

용수량 容水量 · water capacity
토양이 동력에 항거해서 가질 수 있는 물의 최대량.

No.6682 · 산림청 원문

용수량 用水量 · water holding capacity
보수력.

No.6683 · 산림청 원문

용식작용 溶蝕作用 · corrosion
암석이나 토양에 가해지는 화학적인 침식작용, 또는 어떤 원인에 의해 광물의 결정이 생성당시와 다른 상태의 마그마 속에 놓일 경우 결정의 모서리가 둥글게 변형되는 현상.

No.6684 · 산림청 원문

용액 溶液 · solution
균일한 액상을 만들고 있는 혼합물.

No.6685 · 산림청 원문

용오름 龍乘 · tornado
온대성 저기압인 대륙선풍은 폭풍우를 많이 동반하는데, 이것은 저기압의 지름이 높이의 수분의 일 또는 수십분의 일 정도로 가늘고 긴 소용돌이로서 이것이 강해진 것을 미국 대륙에서는 토네이도라고 부르며 우리나라에서는 용오름이라고 한다.

No.6686 · 산림청 원문

용재 用材 · sawn wood
땔나무감이외의 목재.

No.6687 · 산림청 원문

용재규격 用材規格 · standard for timber
천연재 이외로 쓰이는 목재의 생산, 매매, 이용을 합리화하기 위해서 목재의 형량, 품질구분등에 관한 규정.

No.6688 · 산림청 원문

용재림 用材林 · high forest
용재를 생산하기 위한 숲을 말한다. 용재림은 실생묘로 키우며 보통 벌기가 길고 수고가 높아 고림(高林) 또는 교림(喬林)이라 한다.

No.6689 · 산림청 원문

용적계수 容積系數 · bulk modulus
부여한 압력과 이것에 의해 발생하는 체적의 변화율과의 비에 관계되는 물질의 성질을 말한다.

No.6690 · 산림청 원문

용적밀도 容積密度 · bulk density, volume density, apparent density
용적비중

No.6691 · 산림청 원문

용적비중 容積比重 · bulk density, volume density, apparent density
토양의 고상(固相), 액상 (液相), 기상 (氣相)의 3상을 포함한 토양의 밀도. 즉 토양의 단위용적에 포함된 고상의 중량을 말하며 g/cm^{3}단위로 나타낸다. 가비중(假比重), 용적밀도(容積密度), 전용적밀도(全容積密度), 전용적비중(全容積比重), 용적중(容積重), 가밀도(假密度)라고도 한다.

No.6692 · 산림청 원문

용적중 容積重 · volume weight
용적비중.

No.6693 · 산림청 원문

용존산소 溶存酸素 · dissolved oxygen, DO
물속에 녹아 있는 산소의 양을 가리킨다. 물 속의 공기 중의 산소는 공기 중의 산소에 의하여 공급되며 그 양은 온도나 기압에 따라 달라진다. 대기압의 20℃에서 용존산소는 9.29 mg/ l이며, 온도가 감소하면 증가한다.

No.6694 · 산림청 원문

용체 溶體 · solution
용액이란 개념에 있어서 용매를 기체, 액체 및 개체의 모든 경우에 일반화했을 때 이것을 용체라 한다.

No.6695 · 산림청 원문

용출 溶出 · leaching
목재의 보존성을 높일 수단으로서 목재를 물 속에 침지하든지 또는 끓여서 나온 목재 속의 당류, 전분류(이들은 분해가 잘 되고 균충류의 발생을 돕는다)를 제거하는 일.

No.6696 · 산림청 원문

용탈 溶脫 · leaching
토양이나 식물체 중에 있는 양분이 물에 용해되어 이온상태가 된 다음 이동하는 현상이다.

No.6697 · 산림청 원문

용탈층 溶脫層 · eluvial horizon
토양의 층위 중에서 물질이 유실되는 층으로 일반적으로 무기광물 토양의 표층에 있는 양분이 용탈됨으로써 표백되어 나타나는 층이다.

No.6698 · 산림청 원문

용해 溶解 · dissolution
기체, 액체 또는 개체성질이 다른 기체, 액체 또는 개체물질과 혼합하여서 균일한 상(相), 즉 액체를 만드는 현상.

No.6699 · 산림청 원문

용해도 溶解度 · solubility
포화용액 중의 용질(溶質)의 농도.포화농도라 할 수 있다. 보통 용매(溶媒) 100g중의 양으로 나타내고 용액 100g에 대한 용질의 양으로 나타내기도 한다.

No.6700 · 산림청 원문

용해열 溶解熱 · heat of dissolution
물질이 용매(溶媒)중에 녹을 때 대개 농도가 변화한다. 이 온도변화에 대응하는 열량을 용해열이라고 한다.

No.6701 · 산림청 원문

용해용펄프 溶解用펄프 · dissolving pulp
화학펄프에남아있는 리그닌(ligin), 헤미셀루로스(hemicellous)를 제거하여만든 아주 순도가 높은 펄프

No.6702 · 산림청 원문

용혈 溶血 · hemolysis
적혈구가 파괴되고 혈구의 내용물이 혈장중에 녹는 현상.

No.6703 · 산림청 원문

용혈소 溶血素 · hemolysin
어떤 동물의 적혈구를 타종(他種)의 동물에 주사하면 후자(後者)의 동물 혈청 중에 처음의 적혈구 와 특이적으로 결합하고 이것을 용해하는 작용을 보이는 항체가 생긴다. 이와 같이 혈구용해작용에 이바지하는 항체를 용혈소라 한다.

No.6704 · 산림청 원문

용화 踊化 · pupation
유충(幼蟲)이 번데기로 되는 현상.

No.6705 · 산림청 원문

우가원소 偶價元素 · artiad
우수(偶數)의 원자가를 가지는 원소, 탄소의 원자가는 4,2 이고, 유황의 원자가는 6, 4, 2이므로 모두 이에 속한다.

No.6706 · 산림청 원문

우드보오트 - · woodboat
목재를 운반하기위한 작은 썰매.

No.6707 · 산림청 원문

우드세라믹 - · wood seramics
목재 및 목질폐기물을 이용하여 MDF를 만들고 페놀수지 등을 주입하여 탄화시켜 제조한다. 탈취, 정화, 미생물캐리어, 마찰성능, 전자파차단 등 특수기능을 가진다.

No.6708 · 산림청 원문

우라늄 - · uranium
약호(躍號) U. 원자기호 92. 원자량 238.07.

No.6709 · 산림청 원문

우량 雨量 · rainfall
비의 양, 강수량

No.6710 · 산림청 원문

우량강도 雨量强度 · rainfalll intensity
단위시간에 내리는 우량(雨量).

No.6711 · 산림청 원문

우량계 雨量計 · rain gauge
강수를 받아서 강수량을 측정하는 기구로서, 보통우량계와 자기우량계(self-recording rain gauge)로 대별된다. 우리나라에서 많이 사용하는 보통우량계는 직경 20cm, 높이 60cm의 상단이 개방된 원통형 구리관이나 아연 도금된 철관으로서, 이 관의 상단 내부에 깔데기 모양의 수수기(受水器)를 넣어 빗물을 받은 다음 이를 눈금이 새겨진 우량측정 유리관에 부어 측정하게 된다.

No.6712 · 산림청 원문

우량계수 雨量係數 · rain factor
토양대와 기후간에 밀접한 관계가 있음을 바탕으로 기후의 특징을 수량적으로 간단히 나타내고자 한 것으로, 연평균기온 T(℃)는 1년 중 월평균기온 t℃가 0℃보다 큰 경우를 합하여 12로 나눈 값(단, t >0 ℃)을 사용하며, 우량계수의 크기에 따라 특징적인 경관 및 토양형으로 대별된다.

No.6713 · 산림청 원문

우량목 優良木 · superior plant
우세목

No.6714 · 산림청 원문

우량임분 優良林分 · superior stand
우수한 성질을 가진 수목

No.6715 · 산림청 원문

우량품종 優良品種 · superior race
우수한 성질을 가진 종

No.6716 · 산림청 원문

우록수림 雨綠木本群落 · hiemelignosa, hiemisilvae
우기와 건기가 교대하는 계절풍대에 발생하는 산림. 열대의 몬순림으로 내륙에 있고 우기에만 잎이 피는 낙엽활엽구림이다. 이 지역의 해안에는 우림처럼 상록수림이 분포한다.

No.6717 · 산림청 원문

우루과이라운드 - · Uruguay Round, UR
관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)의 새로운 다각적 무역교섭회의로 1986년 9월 우루과이에서 개최된 GATT 각료회의에서 개시된 가트의 8번째 다자간 무역협상을 말한다. 가트는 국제통화기금(IMF)과 함께 전후 미국 주도의 세계 자본주의를 떠받치는 기둥이 되어왔다. 그러나 그동안 미국의 절대적 우위에 기초한 국제경제질서가 붕괴되고 세계 자본주의의 중심이 미국 일본 유럽공동체(EC) 등으로 다극화되었다. 특히 80년대 들어 미국은 자국의 농업공황, 제조업 쇠퇴, 서비스산업 팽창이라는 산업구조의 변화를 맞아 새로운 무역질서를 구축하려고 시도하게 되었다. 즉 농업, 서비스산업의 비교우위를 무기로 하여 세계경제에 대한 패권을 회복 강화하려고 하는 것이다. 이러한 미국 대자본(大資本)의 이익추구가 가트를 통해 반영된 것이 바로 우루과이 라운드인 것이다. 최고 의사결정기구로서 각료급으로 구성된 무역협상위원회(Trade Negotiation Committee)가 있고 그 산하에 관세 · 비관세 · 농산물 · 긴급수입제한 등 14개 분야의 상품협상그룹 (Group of Negotiations on Goods, GNG)과 이번 우루과이라운드에서 처음 도입된 서비스협상그룹 (Group of Negotiations on Service, GNS) 등 15개 협상그룹을 구성했다. 1991년 12월 교착상태에 빠진 UR협상을 타개하기 위해 전 가트 사무총장 둔켈은 최종협정문(둔켈 초안)을 제시하여 이후 UR협상의 틀을 마련하였으며 1992년 11월20일에는 미국과 EC간에 농산물 분야의 쟁점을 타결하기 위한 블레어하우스협정이 체결되는 등 협상이 진행되어 1993년 12월15일 마침내 협정이 체결되었다. 이어서 1994년 4월 모로코의 마라케시에서 열린 각 국간의 각료급회의에서 최종협정문이 조인됨으로써 우루과이라운드는 완전 타결되었다. UR타결은 우리나라에 수출확대 가능성을 높여준 반면 쌀시장과 서비스시장의 개방이라는 엄청난 변화를 몰고 왔다.

No.6718 · 산림청 원문

우루시올 - · urushiol
C_2HO_2. 비점(沸點) 약 210℃의 액체.

No.6719 · 산림청 원문

우릿히법 - · urich's method
각 직경급에 속하는 본수를 같게 하고 동시에 같은 수의 표준목을 선발한다. 전임재적=(전임단면적합계/표준목단면적합계)×표준목재적합계.

No.6720 · 산림청 원문

우마도 牛馬道 · horse road
목재운반을 위한 도로의 하나.

No.6721 · 산림청 원문

우박 雨雹 · hail
봄 또는 여름에 기상급변으로 내리는 싸라기눈보다 굵고 단단한 덩이

No.6722 · 산림청 원문

우박피해 雨雹被害 · hail injury
크기가 보통 5~6mm 에서 2~3cm가량인 우박에의한 피해.

No.6723 · 산림청 원문

우발돌연변이 偶發突然變異 · spontaneous mutation
외부에서 인위적으로 가하지 않은 자연상태에서 일어나는 돌연변이로 그 빈도는 생물의 종류나 유전자에 따라 다르다.

No.6724 · 산림청 원문

우빙 雨氷 · glaze
지나치게 냉각된 비가 내려 지면에 달하자 곧 얼게 되고 식물을 얼음으로 덮게 되는 현상. 이 현상은 추운 계절에 대기에 기온의 역전이 일어나서 하층은 0℃ 이하, 상층은 0℃ 이상의 기온으로 되고 상층부터 내린 비가 하층을 통과하는 사이에 과냉각(過冷却) 되는 것.

No.6725 · 산림청 원문

우상맥 羽狀脈 · penniveins
주맥에서 측맥이 좌우로 갈라져 나와 전체적으로 깃털모양으로 된 맥이다. 많은 쌍떡잎식물의 잎이 이러한 맥을 가지고 있다.

No.6726 · 산림청 원문

우상문양 羽狀紋樣 · feather crotch figure
새의 날개모양을 닮은 무늬. 나무의 갈라진 부위인 아귀에서 얻어진 목재. 우상문양의 단판은 고급 장식용으로 쓰인다.

No.6727 · 산림청 원문

우상복엽 羽狀復葉 · pinnately compound leaf, innately compound leaf
잎이 여러 개의 소엽으로 이루어지는 그 소엽이 엽축을 중심으로 나란히 달려 전체적으로 깃털모양으로 모이는 잎의 종류, 맨 끝에 붙은 소엽이 한 장이어서 전체적으로 소엽의 수가 홀수 일 때는 기수우상복엽(홀수깃꼴겹잎), 두 장이어서 짝수 일 때는 우수우상복엽(짝수깃꼴겹잎)이라고 하며 우상복엽에 우상으로 갈라져 달리는 소엽이 다시 우상으로 갈라질 경우 2회 우상복엽(bipinate), 한번 더 갈라진 경우를 3회 우상복엽(tripinate)라고 한다.

No.6728 · 산림청 원문

우상층 ?狀層 · warty layer
침엽수 가도관 세포벽의 내표면에 존재하는 사마귀같은 작은 돌기물과 이것을 덮고있는 얇은 층

No.6729 · 산림청 원문

우선순위 優先順位 · priority
다른 것 보다 먼저 행할 수 있도록 순서를 정하는 것이다.

No.6730 · 산림청 원문

우선협상대상국 優先協商對象國 · priority foreign country
1988년 미국의 종합무역법(omnibus trade and competitiveness act) 제1302조와 제1303조에서 사용된 용어로 각각 수퍼 301조(super 301)와 스페셜 301조(special 301)로 알려져 있다. 수퍼

301조는 USTR로 하여금 제거될 경우 미국의 수출증가에 가장 커다란 잠재력을 갖고 있는 관행을 유지하고 있는 국가 즉, 우선협상대상국을 의회에 통보할 것을 의무화한 것이다. 스페셜 301조는 미국 기업에 대한 적절하고도 효과적인 지적재산권(intellectual property rights) 보호를 거부하는 국가 즉, 우선관찰대상국(priority watch list)을 의회에 통보하도록 하고 있다. 이 경우 우선협상대상국은 (1) 적절하고도 효과적인 지적재산권에 대한 보호를 거부하는 가장 악명 높은 법, 정책, 관행을 유지하고 있으며 지적재산권에 의존하는 미국인에 대해 공평하고 균등한 시장접근을 거부하는 국가 및 (2) 문제해결을 위해 양자간 또는 다자간 협정체결을 거절하는 국가들을 말한다. USTR은 일단 우선협상대상국으로 지정된 국가에 대해 301조(Section 301) 조사에 착수해야 한다. 이들 국가는 리스트에서 삭제될 수 있으나 USTR은 그 사유를 소명해야 한다.

No.6731 · 산림청 원문

우성 優性 · dominant
F_1에서 나타나는 형질(形質)을 상대편의 형질에 대해서 우성이라 한다.

No.6732 · 산림청 원문

우성상위 優性上位 · dominant epistasis
한 형질에 두 쌍의 비 대립 유전자가 관계하고 한 쪽의 우성유전자가 다른 쪽의 대립유전자의 작용을 억제할 때 즉 상위일 때 이것을 우성상위라고 한다.

No.6733 · 산림청 원문

우성의법칙 優性法則 · law of dominance
우성의 형질이 우수한 법칙.

No.6734 · 산림청 원문

우세목 優勢木 · dominant tree
1) 수관이 상층임관을 형성하는 잘 자란 나무를 이르는 말로 수관급 분류에서 1급목이 이에 속한다. 2) 인공 조림지에서는 수목의 유전적 요인에 의한 차이, 식재된 임지의 환경적 차이, 그리고 작업방법의 차이 등에 의해서 임목들 간에 경쟁이 있게 되고, 나무 개체간에 생장의 우열이 나타나게 되는데, 이 때 생장상태가 더 뛰어난 수목을 우세목(dominant tree)이라고 하며 그 반대의 수목을 열세목(recessive tree)이라고 한다.

No.6735 · 산림청 원문

우세침식 雨洗浸蝕 · rain wash erosion
표면침식.

No.6736 · 산림청 원문

우송조사 郵送調査 · mail survey
우편을 통한조사

No.6737 · 산림청 원문

우수농산물 관리제도 優秀農産物 管理制度 · good agricultral practices, GAP
유럽, 미국, 칠레 등 주요국가에서 추진 중이며 농림산물 생산부터 수확 후 포장단계까지 농약, 중금속, 미생물 등 농식물 위해 요소를 관리하는 제도이다.

No.6738 · 산림청 원문

우수독림가 優秀篤林家 · excellent forest manager
개인독림가로서 100ha이상의 산림을 영림계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 자 또는 조림실적이 50ha 이상이고 영림계획에 따라 산림을 모범적으로 경영하고 있는 자를 말한다.

No.6739 · 산림청 원문

우식 雨蝕 · rain drop erosion
빗물침식

No.6740 · 산림청 원문

우안 右岸 · right bank of stream
강이나 계곡 따위의 오른쪽 기슭. 하천 흐름의 진행 방향에서 볼 때 오른쪽 제방.

No.6741 · 산림청 원문

우연오차 偶然誤差 · accidental error
주위의 사정으로 측정자가 주의해도 피할 수 없는 불규칙적이고 우발적인 원인에 의해 발생하는 오차이다. 우연오차의 (+)오차와 (-)오차는 같은 정도로 발생하며, 이러한 오차는 평균값을 사용함으로써 작게 할 수는 있으나 보정할 수는 없다.

No.6742 · 산림청 원문

우열의법칙 優劣法則 · law of dominan
우성의 법칙 또는 지배의 법칙이라고도 한다. 즉 잡종 제1대에 있어서 모든우성 의 형질만 나타나는 현상.

No.6743 · 산림청 원문

우열전환 優劣轉換 · change of dominance
F_1개체의 표현형이 발생초기에는 우성형질을, 후기에는 열성형질 나타내는 현상.환경에 따라 이러한 현상이 좌우되기도 한다.

No.6744 · 산림청 원문

우위 優位 · dominance
생활력의 강대성. 우위성.

No.6745 · 산림청 원문

우위성 優位性 · prepotency
대립유전자의 우성관계에 있어서 우성인 것.

No.6746 · 산림청 원문

우적 雨滴 · rain drop
빗방울이 떨어질때는 도토리 비슷한 모양을 하고 있다. 그 크기의 측정은 흡수지로 받아 그 흔적의 면적으로 계산한다.

No.6747 · 산림청 원문

우적침식 雨滴浸蝕 · rain drop erosion
우격침식. 빗방울이 땅에 떨어지면서 지표에 있는 토양을 파헤치며 타격으로 토양입자를 분산시키는 침식을 말한다.

No.6748 · 산림청 원문

우점도 優占度 · dominance
군락안에서 각각의 종이 생태적으로 어느정도 우성 또는 열성인가를 나타내는 정도.

No.6749 · 산림청 원문

우점종 優占種 · dominant species
군집의 성격을 결정하고 대표하는 종류를 지칭하는 말인데, 주로 식물에 사용되지만, 동물에게 사용되는 경우도 있다. 우점종은 일반적으로 군집에서 우점도가 가장 높고 생체량이 가장 많으며, 군집의 최상층을 형성하고 있어 군집의 상관(相觀)을 결정한다. 또한 다른 쪽에서는 군락내의 미기후나 토양조건 등을 변화시켜(환경형성작용), 다른 군락 구성종의 생활에 큰 영향을 미친다. 숲에서는 단일종이 우점하는 경우를 순림, 복수의 우점종을 지닌 경우를 혼합림이라고 한다.

No.6750 · 산림청 원문

우주사진측량 宇宙寫眞測量 · space photogrammetry
인공위성 또는 우주선과 같이 우주공간에서 지구를 향하여 촬영한 사진이나 지구로부터 우주를 촬영한 사진을 이용하는 것을 우주사진측량이라고 한다. 최근에 우주로부터 지구표면을 촬영한 사진에 의하여 지구자원을 탐사하는 기술이 급속히 발달되고 있는데 이것을 원격탐사라고 부른다. 원격탐사에는 사진을 이용하는 경우도 있지만 주로 광파를 이용하며 광파의 특성을 영상으로 전환하여 조사하는 기술이 중심을 이루고 있다.

No.6751 · 산림청 원문

우주선 宇宙線 · cosmic rays
우주부터 지구에 내려온 입자의 방사선.

No.6752 · 산림청 원문

우죽간벌 粗杂間伐 · -
임분내 경제적 가치가 없는 잡관목, 피해목, 고사목, 불량목 등을 제거하는 중간벌의 일종.

No.6753 · 산림청 원문

우차 優差 · accidental error
관측에 있어서 우연히 생기는 오차.

No.6754 · 산림청 원문

우편 羽片 · pinna
잎이 깃털모양으로 갈라져 있을 때 우상복엽을 만들 때 작은 잎 한 조각. 잎이 여러 번 우상으로 갈라졌을 작은 우편을 소우편(pinnule)이라고 한다. 또한 양치식물의 잎처럼 잎이 깃털모양으로 갈라진 상태를 우편상(pinnate)이라고 한다.

No.6755 · 산림청 원문

우회 수출보조 迂回 輸出補助 · circumvention of export subsidy
WTO 농업협정 제10조 1항은 제9조에서 제시한 6가지 형태의 수출보조 이외의 농산물수출에 대한 지원을 금지하고 있다. 이는 계량화가 가능한 수출지원을 감축대상으로 분류하여 감축해 나가는 한편, 사실상 계량화가 어려운 여타 수출지원은 금지토록 하여 감축의무를 회피하는 수단으로 수출지원을 못하도록 하기 위한 것이다. 어떠한 보조가 우회수출보조인지는 명백하게 규정되어 있지 않으나 보조금 및 상계조치에 관한 협정에 규정하고 있는 금지대상 수출보조리스트에 제시된 수출보조가 하나의 해석기준이 될 수 있을 것이며, 그 내용을 요약하면 ① 수출신용, 수출신용보증, 수출보험은 국제적인 합의 규율을 정립하여 준수, ② 국제식량원조는 FAO의 국제식량원조 규율준수, ③ 기타 수출지원은 수출지원의 효과가 발생하는 지원의 금지이다.

No.6756 · 산림청 원문

우회덤핑 迂回덤핑 · circumvention
반덤핑조치의 적용을 받는 물품을 수출하는 기업이 수입국의 반덤핑조치를 회피하고자 완제품대신 부품을 수출하여 수입국내에서 조립하거나 혹은 제3국에서 조립하여 수출하는 관행으로서, 우회덤핑을 방치할 경우에는 반덤핑조치가 사실상 그 효력을 상실하고 국제무역질서의 존립에도 커다란 위협이 될 것이라는 점에서 이에 대한 규제는 불가피하다는 인식이 국제사회에서 점차적으로 정착되어 가고 있다. 다만, 우회덤핑을 과도하게 규제할 경우에는 국제간 무역의 흐름 뿐만 아니라 각 국의 해외직접투자활동을 위축시키는 부정적인 효과도 적지 않을 것이란 점에서 이에 대한 규제가 신중하게 거론되고 있다.

No.6757 · 산림청 원문

우회율(임도) 迂廻率 · elongation coefficients
지형도상에서 측정구간의 실거리에서 측정구간의 직선거리를 뺀 후 측정구간의 직선구간으로 나눈 값을 말한다. 즉 산림에서 일정한 지점간의 직선거리를 연결하기 위해 실제 시공되는 임도 총연장의 증가치를 말한다. η=(l-l0)/l0 η: 임도우회율, l: 측정구간의 노선연장(m), l0: 측정구간의 직선거리 (m)

No.6758 · 산림청 원문

운동공원 運動公園 · sportpark
공원안에 체육관등을 만들어 운동을 할 수 있게 시설한 공원.

No.6759 · 산림청 원문

운량 雲量 · cloud amount
구름의 양

No.6760 · 산림청 원문

운모 雲母 · mica
층상구조를 가지는 규산염광물의 일종으로 규산4면체와 알루미늄8면체 층이 2:1의 비율로 이루어진 결정질 광물이다. 백운모(白雲母, muscovite), 흑운모(黑雲母, biotite), 금운모(金雲母, phlogopite) 등이 대표적인 형태이다.

No.6761 · 산림청 원문

운무림 雲霧林 · cloud forest
끊임없이 구름이나 안개가 끼는 장소에 발달하며 높은 습도 때문에 선태류나 착생 유관속식물이 두텁게 착생한 숲을 말한다. 강수량은 적더라도 안개에 의한 수평강우(horizontal precipitation)가 많은데, 통상 강우의 158%에 달하는 경우도 있다. 습한열대의 고산, 산악해양도의 정상부근, 무역풍지대의 산지 등에 각각 적은 면적이지만 넓게 분포한다.

No.6762 · 산림청 원문

운반 RNA 運搬 RNA · transfer RNA
단백질 합성 시 상보적인 안티코돈을 가지고 있어 mRNA에 해당 아미노산을 운반해 주는 RNA이다.

No.6763 · 산림청 원문

운반비 運搬費 · cost of transportation
물건을 이동할때 드는비용

No.6764 · 산림청 원문

운속계 雲速計 · nephoscope
구름의 움직이는 속도를 측정하는 기계.

No.6765 · 산림청 원문

운영연구 運營硏究 · operation research
운영연구는 주어진 사회적 경제적 조건 하에서 일정목표를 달성하기 위한 최적해(最適解)를 발견하기 위한 분석방법으로서 일반적으로 OR 이라는 약어를 사용한다. 원래 이 방법은 명칭이 함축하고 있는 것과 같이 제2차 대전 중에 효과적인 작전계획을 세우기 위하여 미국에서 개발되었다. 운영연구의 특징은 하나의 문제를 각종의 실무자 및 과학자들이 전문분야별로 검토하고 그 문제에 대한 최적의 해결방법을 발견해내는 집단적인 접근방법이라는 점인데, 여기서 특히 중요시되는 것은 그 문제에 관한 수학적모형의 수립이다. 현재 이런 종류의 방법으로는 선형계획법(linear programming), 재고관리법(inventory control), 대기행렬의 이론(queuing theory), 몬테카를로법(Monte Carlo experiment) 등이 있다.

No.6766 · 산림청 원문

운영전략 運營戰略 · operating strategy
변동하는 기업환경 아래서 기업의 존속과 성장을 도모하기 위해 환경의 변화에 대하여 기업활동을 전체적 · 계획적으로 적응시켜 나가는 전략을 말한다.

No.6767 · 산림청 원문

운재 運材 · log transportation
운재에는 육운(陸運), 수운(水運)이 있다.

No.6768 · 산림청 원문

운재로 運材路 · cart track
목재 운반 길.

No.6769 · 산림청 원문

운적토 運積土 · transported soil
암석의 풍화에 의하여 이루어진 모재가 수력, 중력, 풍력에 의하여 다른 곳에 운반되어 토층을 형성하는 것으로 일종의 퇴적물(deposit)이며 토양이라고 하기는 어렵다.

No.6770 · 산림청 원문

울짱얽기 柵工 · plank board barrier works
말뚝 따위를 죽 잇따라 박아서 만드는 울타리 공법

No.6771 · 산림청 원문

울타리 綠? · hedge, hedge grow, live fence
목초지나 경지의 경계부에 만들어지는 선상 혹은 허리띠상의 평면형태의 수목식재로 유럽, 호주 등에서 볼 수 있다. 비교적 드문드문 심어진 교목사이를 관목이나 초본이 덮여 있어서 비교적 식피(植被)가 친밀한 선상 혹은 허리띠상의 식생으로 되어 있는 경우가 많다. 교목은 일렬로 심어지는 경우도 있고 복수 열로 심어지는 경우도 있다. 동물(특히 조류나 소형포유류)의 이동경로로서, 특히 임녹성(林綠性)의 동물 서식공간으로 중요하게 여겨지고 있다.

No.6772 · 산림청 원문

울티솔 - · Ultisols
석회질이 전혀 없고 풍화 가능한 물질이 10% 미만이며 염기포화도가 35% 미만으로 매우 산성이고 붉은 색을 띄는 토양목으로 주로 남미에 출현한다.

No.6773 · 산림청 원문

울폐 鬱閉 · crown closure
이웃하는 임목의 수관(crown)이 접촉해서 임관(林冠)을 이루고 있는 상태.그 정도 를 폐쇄도(閉鎖度 英 crown density 獨 Schlussgrad) 라고부른 다.

No.6774 · 산림청 원문

울폐도 鬱閉度 · degree of closure
울폐된 정도.

No.6775 · 산림청 원문

울폐림 鬱閉林 · closed forest
여러 층의 임목과 하층식생이 지면을 높은 비율 (40%이상)로 덮고 있고 화본과 식물의 초원이 연속적으로 빽빽한 층을 형성하지 않은 숲을 말한다. 울폐림은 종조성에 따라 (1) 활엽수림, (2) 침엽수림, (3) 죽림, (4) 혼효림 등으로 나눌 수 있다. 특히 인간의 교란 정도에 따라서는 (1) 인간이 교란하지 않은 자연림(natural forest undisturbed by man), (2) 인간이 교란한 자연림(natural forest disturbed by man), (3) 반자연림(semi-natural forest) 등으로 나눌 수 있다.

No.6776 · 산림청 원문

울프의법칙 - · Wolff's law
어떤 양료원소(養料元素)를 최소량으로 써서 충분한 생산량을 올리자면 다른 양료원소를 최소량 이상 줄 필요가 있다는 것. 이것은 양료원소 사이에 대행작용이 있는 까닭이다.

No.6777 · 산림청 원문

움 萌芽 · sprout
나무의 그루터기나 뿌리에서 자라나온 어린 가지이다.

No.6778 · 산림청 원문

움갈이 萌芽更新 · regeneration by sprout
맹아갱신

No.6779 · 산림청 원문

웃거름 追肥 · top dressing
덧거름 또는 추비(追肥)라고도 하며, 식물의 재배기간이 긴 경우 밑거름만으로 양분공급이 부족하기 때문에 생육기간 중간에 추가로 사용하는 비료를 가리킨다.

No.6780 · 산림청 원문

웃자란 가지 徒長枝 · water sprout
여름철 이후에 길게 자라는 가지로 개화결실에 보탬이 되지 않는 관계로 헛가지라 부르기도 한다. 과일나무의 경우 영양분을 허비한다 하여 잘라내는 것이 보통이다.

No.6781 · 산림청 원문

웅성 雄性 · maleness
수컷.

No.6782 · 산림청 원문

웅성불임 雄性不妊 · male sterility
식물에서 염성을 조절하는 기작 중 하나로서 화분이 생기지 않거나 제 기능을 하지 못하는 현상이다. 식물에서의 웅성불임은 유전적 웅성불임으로 핵 내의 유전자들이 약이나 화분의 정상발육을 방해하는 경우와 세포질 웅성불임(cytoplasmic male sterility)으로 세포질상의 유전자가 약이나 화분의 정상발육을 방해하는 경우이다. 수분이 성공하느냐 실패하느냐는 수분(受粉)될 식물의 대립형질 S가 화분을 생산한 식물의 대립형질 S와 잘 맞는가의 여부에 달려있다. S 대립형질은 여러 유전자 좌에 의해서 조절될 수 있으며 한 유전자 좌에 여러 개의 대립형질이 있는 경우도 있다. 웅성불임은 보통 열성형질이다.

No.6783 · 산림청 원문

웅성선숙 雄性先熟 · protandry
웅성기관(雄性器官)이 자성기관(雌性器官)보다 더 빨리 성숙하는 현상.

No.6784 · 산림청 원문

웅성염성 雄性捻性 · male fertile
웅성불염(雄性不捻)의 반대말.

No.6785 · 산림청 원문

웅성외부생식기관 雄性外部生殖器官 · male genitalia
제9 복절의 부속기관과 때로는 제10절의 일부가 결합하여 교미기관을 만든다. 1쌍의 파악기(把握器, clasper)와 그 사이에 있는 삽입기(揷入器, aedeagus)로 되어 있다.

No.6786 · 산림청 원문

웅예 雄? · stamen
꽃밥이 붙어 있는 수술대. 발생학적으로 수술, 암술 모두 잎이 변형된 심피로부터 유래되었다.

No.6787 · 산림청 원문

웅예군 雄?群 · androecium
한 꽃안에 있는 웅예(雄 ·)의 전체를 말한다. 즉 수꽃술군.

No.6788 · 산림청 원문

웅예선숙 雄?先熟 · protandry
1) 웅성(수컷, 수술) 생식기관이 자성(암컷, 암술) 생식기관보다 먼저 성숙하는 현상으로 자예선숙과 대응된다. 2) 한 꽃이나 개체에서 수꽃이 암꽃에 비해 먼저 성숙하는 현상이다. 자식이나 근친교배를 줄이기 위한 기작으로 설명될 수 있다.

No.6789 · 산림청 원문

웅예선숙화 雄?先熟花 · prot(e)androus flower
웅예(雄 ·)가 자예(雌 ·)보다 더 빨리 성숙하는 꽃.

No.6790 · 산림청 원문

웅원핵 雄原核 · generative nucleus
생식핵. 종자식물의 화분안에 형성되는 생식세포.

No.6791 · 산림청 원문

웅핵 雄核 · male nucleus
피자식물은 화분이 발아해서 웅원핵과 영양핵(營養核)으로 되고 웅원핵은 다시 분열해서 두개의 핵을 만 든다.이 핵을 웅핵 또는 정핵이라 한다.

No.6792 · 산림청 원문

웅화아 雄花芽 · staminate flower buds
숫꽃눈. 암꽃눈 또는 잎눈에 대한 말.

No.6793 · 산림청 원문

웅화양성화 이주 雄花兩性花異株 · androdioecy
수꽃만 피는 개체와 양성화가 피는 개체가 함께 자라는 식물개체군, 이가화로의 진화과정에 있는 식물개체군이라 판단된다.

No.6794 · 산림청 원문

워터마크 水紙痕 · watermark
젖어 있는 상태의 지필을 개질하는 작업으로 주로 불투명도 및 지합에 특정한 변화를 주어, 제조된 종이에 빛을 비추어 보았을 때 패턴, 디자인 또는 작업한 부분이 확연히 드러난 것을 말한다. 수문학에서는 강의 수위는 나타내는 표이다.

No.6795 · 산림청 원문

원각형유충 原脚型幼蟲 · protopod larvae
내시류 곤충의 유충의 형태적인 특성에 따라 분류한 것의 중 하나로서 기생봉류의 유충에서 볼 수 있는 것으로 배에는 분절이 완전하지 못하고 머리와 가슴의 부속지는 원시적인 형태이다.

No.6796 · 산림청 원문

원거 圓鋸 · circular saw
둥근톱. 소규모의 제재소에서 쓰이고 있다. 설치하는데 비용이 적게 들고 톱날을 다 시 내어 쓰기가 쉬우므로 특별한 기술자가 아니라도 손쉽게 이용할 수 있다.그러나 동력이 많이 들고 톱밥의 양이 많아서 목재의 손실이 큰 것이 결점이다.

No.6797 · 산림청 원문

원격작용 遠隔作用 · allelopathy
한 생물이 떨어져서 생활하고 있는 다른 생물에 영향을 주는 현상.오동나무가 저해물질을 내어 밑에 자라고 있는 식물의 생육에 해를 주는 일 등.

No.6798 · 산림청 원문

원격잡종 遠隔雜種 · remote hybrid dist
지리적으로 원격(遠隔)의 땅에 생육하고 있는 식물간의 교배로써 생긴 잡종.

No.6799 · 산림청 원문

원격조정방식 遠隔操作方式 · remote control system
기계 등을 직접 사람의 손이나 발로 조작하지 않고 어떤 장치를 사용하여 간접적으로 조작하는 일로서 제어소(制御所)에서 전송기(傳送器) 또는 연락전송선 · 마이크로파 등을 통해서 원격조작을 하는 방식이다. 이 제어방식은 전력 · 철강 · 화학 · 수송의 전체 산업분야에서 사용되고 있다. 이 방식으로는 보통 제어소에서의 제어에 대하여 확실히 기기가 움직였는가, 그 상태는 어떤가하는 반신(半信)을 받을 필요가 있어 무슨 방법으로든지 통신설비를 필요로 하는 경우가 많다. 따라서 이 방식을 원방감시제어라고도 한다. 전송회로는 전송거리 · 제어기기수 · 지리적 조건 등에 의해서 다른데, 가공(架空) 또는 수중제어(水中制御) 케이블에 의한 직접연락, 전력선 통신선에 의한 반송연락(搬送連絡), 마이크로파 등에 의한 연락이 사용되고 있다. 사용하는 케이블의 수, 또는 사용하는 채널의 수가 한정된 전송회로로 많은 기기에 신호를 보내기 위한 경제적인 전송방식에 대해서는 여러 방식이 연구되고 있다.

No.6800 · 산림청 원문

원격조정장치 遠隔調整 裝置 · remote control apparatus
격리된 장소에 있는 기기 등을 멀리떨어져 있는 곳에서 제어, 운전등을 할 수 있는 장치

No.6801 · 산림청 원문

원격탐사 遠隔探査 · remote sensing
원격탐사란 대상물이나 현상에 관한 정보를 얻는데 손을 대지 않고 수집하는 것으로 대상물이나 현상의 식별, 분류, 판독 및 분석을 하는 기술이다. 수집하는 정보는 대상물에서 반사 또는 방사되는 에너지, 즉 전자방사(電磁放射)의 기록이다. 전자파에 관하 정보를 수집하는 데 사용되는 장치는 sensor라고 부르며 이에는 camera와 scanner가 있다. Sensor를 탑재하는 곳을 platform이라고 하는데 항공기 또는 인공위성 등이 이용되고 있다. 따라서 원격탐사란 항공기 또는 인공위성 등의

platform에 탑재된 sensor를 이용하여 지표의 대상물에서 반사 또는 방사되는 전자파를 수집하고 이 자료를 이용하여 대상물의 현상에 관한 정보를 얻는 기술이라고 할 수 있다.

No.6802 · 산림청 원문

원곡선 圓曲線 · circular curve
단곡선

No.6803 · 산림청 원문

원구 元口 · butt end
통나무(圓木)에 있어서 근부(根部)에 가까운 굵은 쪽의 횡단면.

No.6804 · 산림청 원문

원구직경 元口直徑 · butt end diameter
벌채목에서 수간의 가장 아래 부분, 즉 뿌리와 가장 가까운 수간 부위의 직경을 원구직경이라고 한다.

No.6805 · 산림청 원문

원근기 原根基 · root initial
생장하여 뿌리로 발달하는 뿌리의 원기이다. 부정근의 발생 이전에 상처유합조직 내에 발달한다. 버드나무 가지에는 기성원근기가 발달되어 있어 삽목발근이 용이하다.

No.6806 · 산림청 원문

원기 原基 · primordium
화원기, 근원기(根基)등의 말을 쓴다.

No.6807 · 산림청 원문

원두 圓頭 · round
식물기관의 끝부분이(주로 잎의 끝을 나타낼 때 쓰임) 둥근 모양이다. 둔부보다는 보다 더 크게 둥근 형태이다.

No.6808 · 산림청 원문

원면적 圓面積 · circular area
재적측정시 원구및 말구의 면적

No.6809 · 산림청 원문

원면적표 圓面積表 · table of circular area
직경치에 대응하는 원면적을 나타낸 表. 단면적계산에 도움이 된다.

No.6810 · 산림청 원문

원목 原木 · log
현지에서 벌채하여 얻어진 목재를 말함.

No.6811 · 산림청 원문

원목검량 原木檢量 · log scaling
원목의 지름과 길이를 측정하는일.

No.6812 · 산림청 원문

원목수출규제 原木輸出規制 · log expert restriction
수출수량제한, 수출세의 부과 등에 의해 원목수출을 제한 혹은 금지하는 조치이다. 현재 미국, 캐나다, 인도네시아 등 많은 목재수출국에서 실시되고 있다. 일반적으로 수출국이 자국의 목재산업에 대하여 원료를 확보함과 동시에, 보다 부가가치가 높은 제품의 가공을 촉진할 것을 목적으로 실행하고 있다.

No.6813 · 산림청 원문

원목승강대 原木昇降臺 · log deck, platform
운재용 삭도나 가선집재에서 운재계통의 기점 또는 종점에 적재 및 적하를 위해 적당한 높이의 프랫폼을 구축한 것을 원목승강대라고 한다. 반출재를 이용하여 만드는 것이 보통이지만 영구적인 시설, 특수한 지형에서는 철재를 사용하던가 철근콘크리트 구조로 하는 경우도 있다. 삭도에서는 일반적으로 기점의 적재원목승강대를 상부원목승강대, 종점의 적하원목승강대를 하부원목승강대라고 한다. 지형이 평탄하지 않은 곳에서는 집재기 등 기계류를 놓기 위해서도 소형으로 간단한 원목승강대를 구축하는 경우도 있다.

No.6814 · 산림청 원문

원뿌리 主根 · main root, tap root
종자의 유근이 발달한 수직근이다.

No.6815 · 산림청 원문

원산지 규정 原産地 規定 · rules of origin
원산지 규정이란 특정제품의 원산지를 판단하는 기준 및 확인하는 방법이나 절차 등을 규정한 제반 법률이나 규정, 행정절차 등을 총칭하는 개념.

No.6816 · 산림청 원문

원산지 표시제도 原産地 表示制度 · country of origin marking
수입물품에 당해 물품의 생산국을 부착내지 표시할 것을 의무화 함으로써 소비자에게 원산지에 대한 정확한 정보를 알려주어 물품구매시 공정한 선택의 기회를 제공하기 위한 제도이다.

No.6817 · 산림청 원문

원생대 原生代 · Proterozoic era
선캄브리아시대의 전반을 시생대라고 하고 후반을 원생대라고 한다. 시생대와 원생대의 구분은 변성정도로 구별하였는데 시생대층이 심하게 변성과 변형을 받은데 반하여 원생대층은 그 정도가 약하다고 생각하여 구별하였었다.

No.6818 · 산림청 원문

원생동물 原生動物 · protozoans
단세포동물을 말한다.

No.6819 · 산림청 원문

원생림 原生林 · primeval forest
처녀림. 원시림.

No.6820 · 산림청 원문

원생목부 原生木部 · protoxylem
일차분열조직 으로부터 처음으로 분화한 목부(木部).

No.6821 · 산림청 원문

원생지 原生地 · primeval land
인공을 가하지 않은 자연 그대로인 상태로 남아있는 지역이다.

No.6822 · 산림청 원문

원시림 原始林 · primeval forest, virgin forest
천연림에 있어서도 옛적부터 전연 인간의 힘이 작용한 바 없는 것. 처녀림.

No.6823 · 산림청 원문

원시지역 原始地域 · primitive region
훼손되지 않은 자연자원을 가지고 있고, 이용밀도가 낮아서 이용자 상호간에 조우가 거의 일어나지 않는 지역이다.

No.6824 · 산림청 원문

원시협동 原始協同 · protocooperation
두 가지 다른 생물종 간에 상호작용이 작용하면 모두에게 이롭지만, 작용이 중단되면 서로 무관한 관계를 가지게 되는 것.

No.6825 · 산림청 원문

원심건조 遠心乾燥 · centrifugal drying
촉진 천연건조방법중 원심분리기를 이용하는 건조방법

No.6826 · 산림청 원문

원심적도태 遠心的淘汰 · centrifugal selection
집단중에 가장 많은 중앙적 형질은 적응이 나쁘고 점점 변이형이 많아져 갈 때의 도태.

No.6827 · 산림청 원문

원심펌프 遠心펌프 · centrifugal pump
물을 충만시킨 용기중에서 회전하는 팔랑개비로써 물에 압력을 주어 물을 뽑아 내는기계.

No.6828 · 산림청 원문

원야 原野 · wildland
황야, 들판

No.6829 · 산림청 원문

원예 園藝 · horticulture gardening
과수, 채소, 화훼 및 조경용 관상식물 등의 재배와 관련된 농업의 한 분야

No.6830 · 산림청 원문

원원종종자 原原種種子 · breeder's seed
실험장이나 연구소에서 육종담당자의 손에 의해서 만들어지고 유지되고 있는 종자.

No.6831 · 산림청 원문

원자 原子 · atom
물질의 기본적인 구성요소.

No.6832 · 산림청 원문

원자가 原子價 · atom valence
어떤 원소의 원자 한개가 특정의 원자 몇개와 결합하는 가를 보이는 수를 말한다.

No.6833 · 산림청 원문

원자기호 原子記號 · atomic symbol
원자의 종류를 표시하는 기호. 가령 수소를 H, 산소를 O로 나타낸다.

No.6834 · 산림청 원문

원자단 原子團 · atomic group
화합물의 분자내에 포함되는 특정의 원자의 모임.

No.6835 · 산림청 원문

원자량 原子量 · atomic weight
화학에 있어서는 동위원소 조성에 입각해서 평균한한 산소원자의 질량을 16.0000로 하고 이것을 표준으로 한 각 원자의 상대적인 평균질량의 값.

No.6836 · 산림청 원문

원자력 原子力 · atomic energy
원자핵반응을 인위적으로 제어하여, 그 반응에서 얻어지는 에너지.

No.6837 · 산림청 원문

원자로 原子盧 · nuciear reactor
연쇄반응을 일으켜 적절한 수준까지 조작하여 에너지를 얻는 장치

No.6838 · 산림청 원문

원자반응 原子反應 · atomic reaction
반응물질의 하나로서 유리(遊離)된 원자가 관여해서 일어나는 화학반응.

No.6839 · 산림청 원문

원자번호 原子番號 · atomic number
주기율표에 있어서의 원소의 순위를 나타내는 번호.

No.6840 · 산림청 원문

원자의붕괴 原子崩壞 · atomic disintegration
방사성원소의 원자핵이 방사선을 내고 다른 종류의 원자핵으로 변화하는 현상.

No.6841 · 산림청 원문

원자핵 原子核 · atomic nucleus
원자의 중핵을 이루는 것으로 원자 자신의 크기에 비해서는 매우 작으나 원자질량의 대부분이 이곳에 집중하고 양전하(陽電荷)를 가지고 있다.

No.6842 · 산림청 원문

원자핵분열 原子核分裂 · nuclear fission
주로 우란이나 토륨(thorium)등의 무거운 원자핵이 같은 정도 크기의 두개의 원자핵 으로 분열하고 약 150MeV의 막대한 에너지를 방출하는 현상.

No.6843 · 산림청 원문

원저 圓底 · round
식물기관의 아래 부분을(주로 엽저를 표현 할 쓰임) 나타내는 말로써 둥근 모양이다.

No.6844 · 산림청 원문

원적외선 遠赤外線 · infrared ray
파장이 긴 영역의 적외선 . 파장은 50㎛~1㎜

No.6845 · 산림청 원문

원절 圓節 · torus
1차 막공벽의 중앙부에 원형으로 배열된 마이크로 피브릴이 쌓이고 막공벽의 중앙부분이 비후해져 있는 상태

No.6846 · 산림청 원문

원종종자 原種種子 · foundation seed
어떤특정한 유전적형질이 거의 균등하다고 생각되는 종자인데 시험장에서 배포하고있는 종자.

No.6847 · 산림청 원문

원주 圓周 · girth
나무의 둘레 길이

No.6848 · 산림청 원문

원주등분법 圓柱等分法 · disk circumsference equal dividing method
원주등분법은 수간석해에서 직경생장량을 파악하기 위해 원판의 반경 측정방향을 결정하는데 사용되는 방법 중의 하나로 채취된 원판의 원주를 4등분한 후 수심과 연결하여 측정방향을 결정하는 방법이다. 반경의 측정방향이 결정되면 그 방향에 따라 선을 그어 측정하는데, 반경은 해마다 측정하여도 무방하지만 그 값이 대단히 작기 때문에 일반적으로 5년마다 측정한다. 따라서 반경은 5의 배수가 되는 연륜까지를 측정한다. 원주등분법 이외에도 반경의 측정방향을 결정하는 방법으로는 서로 직교하게 하는 심각등분법과 두 방법을 혼합한 절충법이 있으나, 동일한 나무에 대해서는 같은 방법을 취한다. 참조: 심각등분법.

No.6849 · 산림청 원문

원주민 原住民 · Indigenous peoples
다른 문화나 인종이 다른 세계로부터 와서 정복하고 정착하거나 원주민을 감소시키고 식민지화 했던 시기에 이미 그 지역 전부 또는 일부에 거주하면서 살았던 사람들의 현재 후손. 이들은 지금 살고 있는 국가의 제도를 따르기보다 자신들만의 독특한 사회 경제적, 문화적 관습과 전통을 중시한다.

No.6850 · 산림청 원문

원주민 토지 및 영토 原住民 土地 領土 · Indigenous lands and territories
원주민들이 전통적으로 소유했거나 다른 방식으로 점유 또는 사용했던 토지, 대기 물, 바다, 빙하, 동식물상, 기타 자원의 총체적 환경(원주민 권리 선언:4부)

No.6851 · 산림청 원문

원주체 圓柱體 · cylinder
평행인 두 평면 α, β위의 반지름이 같은 두 원의 중심 o, o'를 잇는 직선에 평행하고 두 원의 둘레와 만나는 선분이 그리는 면과 이들 두 원으로 둘러싸인 입체를 말한다. 나무는 4개의 기본적인 기하학적 입체인 원주체, 포물선체, 원추체 및 나일로이드체로 구성되어 있는데, Kunze(1873)가 발표한 간곡선 식인 에서 r=0일 때 가 되며 이는 x축에 평행한 직선이고 이의 회전체는 원주체(Cylinder)가 된다. 위의 식에서 p는 상수이고 r은 형상지수(Form exponent)로서 r의 수치에 따라 간곡선과 회전체의 모양이 달라진다.

No.6852 · 산림청 원문

원주체적 圓柱體積 · cylinder volume
원주체가 점유하는 공간 부분의 크기로 원주체의 체적을 말한다. 즉, 원주체의 밑넓이에 높이를 곱해서 얻은 체적이다. 참조: 원주체.

No.6853 · 산림청 원문

원주표 圓柱表 · cylinders and multiple
단면적의 직경과 그 높이를 알고서 그것에 대응하는 원주의 체적을 알 수 있도록 만든 표.

No.6854 · 산림청 원문

원초피층 原初皮層 · periblem
맨 바같의 수피층

No.6855 · 산림청 원문

원추 圓錐 · circular cone
원뿔. 원뿔.

No.6856 · 산림청 원문

원추곡선 圓錐曲線 · conic sections
직원뿔을 그 꼭지점을 지나지 않는 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 평면곡선의 총칭으로, 원추곡선(圓錐曲線)이라고도 하는데 원뿔의 축에 대한 평면의 기울기가 모선의 기울기에 비하여 큰가, 작은가, 같은가에 따라서 각각 타원, 포물선, 쌍곡선이 된다.

No.6857 · 산림청 원문

원추체 圓錐體 · circular cone
공간에서 원을 정하고 이 원을 포함하는 평면α밖에 한 점 V를 잡는다. 이때 점 V와 원 위의 각 점을 이은 선분 전체와 이 원의 영역으로 이루어지는 입체도형을 원추체라고 한다. 일반적으로 밑변의 반지름이 r, 높이가 h인 원추체의 체적은 에 의하여 구한다.

No.6858 · 산림청 원문

원추화서 圓錐花序 · panicle
전체적인 외형이 원추형을 나타나는 꽃차례. 복합화서의 일종으로 붉나무와 같은 전형적인 원추화서 이외에도 주된 꽃차례의 축이 여러 번 분지하여 최종 상태의 축이 수상화서의 형태인 조릿대, 산형화서가 모여 이루어진 팔손이나 두릅나무, 총상화서의 형태를 만드는 모시대 등도 전체적으로는 이 꽃차례에 포함된다.

No.6859 · 산림청 원문

원칙 原則 · principle
FSC 경우, 산림경영의 본질적인 규칙 또는 요소

No.6860 · 산림청 원문

원판 圓板 · disk
수간석해를 위해 벌채목을 일정한 길이마다 수간과 직교되도록 절단하여 2~3cm의 두께로 채취하는 단판을 원판이라고 한다. 원판을 채취할 위치는 구분의 길이와 적용할 구적식에 따라 달라지는데, 일반적으로 벌채점인 0.2m와 흉고부위인 1.2m 그리고 흉고 이상에서는 2m마다 원판을 채취하며 최후의 것은 1m가 되도록 한다. 채취된 원판은 임령별 직경생장 및 수고생장에 대한 정밀한 정보를 얻는 데 사용된다.

No.6861 · 산림청 원문

원핵생물 原核生物 · prokaryote
1) 박테리아나 시아노박테리아처럼 histone이 부착된 DNA가 존재하지 않고 소포체, 막으로 둘러싸인 핵, 세포 내 소기관 등이 없는 생물체이다. 2) 유전물질이 세포내 염색체나 핵막에 의해서 둘러싸여 있지 않고 세포질 내에 산재되어 있는 생물로서 동식물로 대표되는 진핵생물(eukaryotes)과 구분된다. 세포막은 인지질(phospholipid) 막으로 구성되며 보통 스테롤(sterol)이 없다. 세포내부에 단위막이 존재하지 않아서 미토콘드리아나 엽록체같은 기관도 존재하지 않는다. 간단한 내부구조를 가지며 DNA, RNA 구성자체는 진핵생물과 같으나 유전자 복제, 전사 등에 관여하는 리보솜, 중합효소, 프로모터 배열, 유전자의 오페론(operon)화 등이 다르며 기본적으로 반수체이다. 원핵생물이란 용어는 박테리아란 말과 같은 뜻이다. 편모(flagella)가 있어서 진핵생물과는 움직이는 것이 구별된다.

No.6862 · 산림청 원문

원형 圓形 · orbicular
식물의 기관에서 그 모양을 나타내는 말로써 길이가 너비가 거의 같아 전체적으로 둥근 원처럼 또는 원에 가깝게 보이는 모양이다.

No.6863 · 산림청 원문

원형질 原形質 · protoplasm
생물기능의 기초를 이루는 물질로서 한 세포의 세포질과 핵을 합한 부분.

No.6864 · 산림청 원문

원형질막 原形質膜 · plasma membrane
세포막.

No.6865 · 산림청 원문

원형질분리 原形質分離 · Plasmolysis
식물세포를 그 세포액보다도 삼투압이 높은 용액 속에 담그면 세포액의 수분이 밖으로 빠져나와 그 때까지 세포벽에 밀착되어 원형질이 세포벽에서 떨어져 수축하는 현상

No.6866 · 산림청 원문

원형질연락사 原形質連絡絲 · plasmodesma
두 원형질체를 분리하는 세포벽을 가로질러 두 원형질체를 연결하는 가느다란 원형질의 줄.

No.6867 · 산림청 원문

원형질융합 原形質 融合 · protoplast fusion
세포융합

No.6868 · 산림청 원문

원형질체 原形質體 · protoplast
세포벽에의해 둘러싸여있는 원형질물질

No.6869 · 산림청 원문

원형표본점 圓形標本點 · circular sample plot, circular plot
산림조사에서는 대부분의 경우에 대상 지역 중의 일부를 표본으로 선택하여 조사하는데, 이때 표본으로 선택되어 산림조사가 실시되는 일정한 면적을 표본점(sample plot)이라고 한다. 표본점을 설치하는 방법은 그 형태에 따라 다양한데 표본점의 중심으로부터 반경을 정하여 일정한 표본점의 면적을 갖도록 설치된 표본점을 원형표본점이라고 한다. 원의 면적은 이기 때문에 0.01ha의 원형표본점을 설치하려면 0.01ha의 면적 를 원의 공식에 대입하여 으로 부터 반경 r = 5.64m로 계산한 후 표본점의 중심에서 수평거리로 5.64m의 반경을 갖는 표본점을 설치하면 된다. 이 원형표본점은 정방형표본점이나 구형표본점과는 달리 표본점의 경계를 구분하기 위하여 줄자를 사용할 필요가 없기 때문에 신속한 산림조사가 가능하다는 장점을 가지고 있지만 표본점의 경계를 명확히 구분해야 하는 어려움이 있고 이를 위해서는 상당한 경험과 숙달이 필요하다. 참조: 표본점, 구형표본점, 정방형표본점.

No.6870 · 산림청 원문

월계수 月桂樹 · 學 Laurus nobilis
지중해연안이 원산지. .녹나무과의 상록 교목으로 자웅이주이다. 잎에서 월계유(月桂油)를 짠다.

No.6871 · 산림청 원문

월년과 越年果 · biennial fruit
2년과(二年果)라고도 한다. 수분(受粉)에서 성숙에 이르기까지 2년간을 요하는 과실.

No.6872 · 산림청 원문

월류 越流 · overflow
물이 넘음. 무넘기

No.6873 · 산림청 원문

월류수심 越流水深 · overflow depth
사방댐의 방수로 등에서 넘어 흐르는 물의 깊이

No.6874 · 산림청 원문

월류수제 越流水制 · overflow spur
물이 시설물의 위를 넘도록 설치한 수제

No.6875 · 산림청 원문

웨빙 - · Webbings
물갈퀴의 · 막 ·

No.6876 · 산림청 원문

웨어 堰 · weir
물을 가두어 두기 위하여 하천 또는 골짜기에 가로 방향으로 쌓은 뚝

No.6877 · 산림청 원문

위감수 僞減數 · piseudoreduction
환원제일분열(還元第一分裂)에 있어서 대합을 끝낸 상동염색체가 후사기 초기(厚絲期初期)에는 대단히 밀접해서 보기에는 반수로 된다.

No.6878 · 산림청 원문

위거 緯距 · latitude
측선(測線)의 양단을 지나는 두 개의 위선(緯線)간의 수직거리.

No.6879 · 산림청 원문

위과 僞果 · pseudocarp
심피(心皮)이외의 조직을을 구성단위로 가지는 과실.

No.6880 · 산림청 원문

위기종 威脅種 · endangered species
가까운 미래에 전부 또는 일부가 위기에 처할 가능성이 높은 종

No.6881 · 산림청 원문

위도 緯度 · latitude
적도선으로부터 북쪽 또는 남쪽으로 어떠한 지점까지의 거리는 위도로 표시되며, 적도와 평행한 지구 둘레의 둥근선은 위도선 혹은 위선이라 불린다. 위도선은 동서로 연하는 선이지만 남북 간의 거리는 그들 위도 선간의 거리로서 측정된다.

No.6882 · 산림청 원문

위상구조 位相構造 · topology
점 · 선 · 면들의 공간 형상들의 공간 관계(spatial relationship)를 말하며 위상구조정보는 공간분석을 위하여 필수적으로 존재해야 한다.

No.6883 · 산림청 원문

위색칼라사진 僞色칼라寫眞 · deviated color photographs
특정 피사체의 색체를 특히 강조 또는 과장시켜 기록하여 판독효과를 높이기 위하여 본래의 색이 다른 색으로 나타낸 사진을 위색칼라사진이라고 한다. 이사진에는 보통의 칼라필름에 필터를 사용하여 파장영역을 제한하여 촬영하는 방법과 노출시간 등을 변화시켜 촬영하는 방법 등이 있지만 근래에는 목적에 따라 특수한 필름이 개발 이용되고 있다.

No.6884 · 산림청 원문

위생벌 衛生伐 · sanitation cutting
질병이나 해충에 장애를 겪고 있거나, 치유될 수 없는 물리적 손상을 입어 질병 및 해충에 쉽게 영향을 받을 나무를 제거하는 것이다.

No.6885 · 산림청 원문

위성류 檉柳 · Tamarix chinensis, chinese tamarisk
잎이 실처럼 가늘고 담홍색의 꽃이 핀다.

No.6886 · 산림청 원문

위성화상 衛星畵像 · satellite image
인공위성으로부터 촬영된 사진으로 위성은 원격탐사 자료의 획득은 관측 센서와 센서에 입사하는 전자기파의 세기에 의존한다. 센서는 지표면의 대상물로부터 반사 또는 방사된 에너지를 수집하는 기구로서 전자파를 렌즈와 반사경을 통해 분광하여 그 에너지를 여러 개의 파장대 즉 자외선, 가시광선, 적외선, 열 적외선 등으로 나누어 영상이나 digital number로 기록한다.

No.6887 · 산림청 원문