산림임업용어사전 — ㅋ

← 목차 · 135개 용어 · 카나다발삼 ~ 키틴

카나다발삼 - · canada balsam
카나다에 나는 전나무의 나무진로부터 얻은 담황색의 향기있는 점액체.

No.9376 · 산림청 원문

카네센스포플러 - · 學 Populus canascens
은백양(P. alba)과 유럽사시나무(P. tremula) 사이에 생겨난 잡종포플러. 우리나라의 은사시나무와 닮음.

No.9377 · 산림청 원문

카니발리즘 同種捕食 · cannibalism
같은 종끼리 서로 공격하거나 잡아먹는 행동.

No.9378 · 산림청 원문

카드보드측고기 - · cardboard hypsometer
입목의 수고를 측정하는 기구의 일종. 아브네이레블(Abney hand level)과 같은 원리를 사용하는 특징을 가지고 있다. 카드보드측고기는 수평거리가 변하더라도 직접수고를 측정할 수 있기 때문에 다른 측고기에 비하여 편리한 장점을 가지고 있다. 구조는 판자에 눈금이 시준선과 서로 평행하게 그려져 있으며, 이와 직교하는 종선(鐘線)이 달려 있다. 판자의 눈금은 입목과 수평거리에 따라(5m, 10m, 15m, 20m) 나뉘어 있어 입목의 수평거리에 맞는 눈금을 읽으면 된다.

No.9379 · 산림청 원문

카로티노이드 - · carotinoid
물에는 녹지 않는 지용성 물질의 하나로서 동식물계에 넓게 분포하고 있는 황색, 황적색, 적색 또는 자색 등의 색소.

No.9380 · 산림청 원문

카로틴 - · carotin
식물의 뿌리 또는 과실에 포함되는 카로치노이드의 일종. C40H56.

No.9381 · 산림청 원문

카르 圈谷 · kar
빙하에 의해 생긴 반원상의 오목한 지형으로 권곡이라고도 한다. 그 와지(窪地)에 물이 괴어 빙하호를 형성하기도 한다. 세계의 높은 산맥에는 어디서나 카르를 볼 수 있으며 백두산에서도 있다는 보고가 있다.

No.9382 · 산림청 원문

카르법 - · Karl's method
법정축적에 의해서 수확액을 규정하는 방법. 다음과 같은 변수가 필요하다. e = 연벌채량. Z = 조정기의 처음에 있어서의 연년성장량, m = 현실축적과 법정축적과의 차이, d = 현실성장과 법정성장의 차이, n = 조정기(갱신기)의 처음부터 경과된 연수, a = 정리기의 길이.

No.9383 · 산림청 원문

카르복시메틸 셀룰로오스 - · carboxymethyl cellulose
셀룰로오스에테르의 일종. 알칼리 셀룰로오스에 클로로초산염을 반응시켜 제조한다. 약칭으로 CMC라고 함. 용도: 섬유용 풀, 유화제, 접착제, 아이스크림과 쨈의 안정제 등.

No.9384 · 산림청 원문

카르타헤나 의정서 - · Cartagena Protocol on Biosafety
유전자변형생물체의 국가간 이동을 규제하는 국제협약.

No.9385 · 산림청 원문

카르텔 企業聯合 · Cartel
동일 업종의 기업이 경쟁을 피하여 이익을 확보하기 위해 가격, 생산량, 판로 등에 대하여 협정을 맺는 것으로 형성되는 독점 형태. 각 기업의 독립성이 유지되고 있는 점에서 트러스트와 다르며, 기업연합이라고도 한다. 카르텔은 가맹기업간의 협정, 즉 카르텔 협정에 의하여 성립되며, 가맹기업은 이 협정에 의하여 일부 활동을 제약받지만 법률적 독립성은 잃지 않는다.

No.9386 · 산림청 원문

카메라루시다 - · camera lucida
현미경에 보이는 사물을 보며 그리는 장치. 두개의 프리즘으로 된 기계인데 이것을 접안렌즈에 붙여서 쓴다.

No.9387 · 산림청 원문

카민산 카민酸 · carminic acid
카민이 색소 성분이 되는 글리코사이드. 중앙아메리카 또는 남아메리카의 사막에 있는 선인장(opuntia)류에 기생하는 벌레의 암컷의 몸에 포함되는 홍색의 색소. 식품, 화장품, 생체조직의 염색에 사용. C22H20O13.

No.9388 · 산림청 원문

카보닐 - · carbonyl
산소와 이중결합으로 결합된 탄소가 있는 2가의 작용기(基). -C(=O)-로 표시됨. 이 기 한쪽에 수소원자가 결합한 화합물 R - C(R은 탄화수소기)를 알데히드 또는 —CHO인 기를 알데히드기라고 한다. 두개의 탄화수소기에 카보닐기가 결합한 화합물 R - CO - R'를 케톤, 이때의 =CO기를 케톤기라고 한다.

No.9389 · 산림청 원문

카보키실 炭酸基 · carboxyl
탄소, 산소, 수소로 이루어진 1가의 작용기(基). -COOH 또는 -CO2H로 표시. 이것을 가지는 유기화합물을 보통 카르복시산(酸) 또는 카르복실산(酸)이라고 한다. 치환기로서는 카르복시라고 한다.

No.9390 · 산림청 원문

카스파리점 - · casparian dots
내피세포의 상하좌우의 사직면을 둘러싸는 띠 모양의 두터운 부분으로서 내피세포의 특징의 하나.

No.9391 · 산림청 원문

카이 스퀘어 테스트 - · chi-square test
표본의 분포가 이론적인 분포와 같은지 여부를 검정하는 통계분석 방법.

No.9392 · 산림청 원문

카이자승분포 - · chisquare distribution
서로 독립적인 표준정규 확률변수를 각각 제곱한 다음 합해서 얻어지는 분포.

No.9393 · 산림청 원문

카이자승최소법 - · chisquare minimun method
측정값을 기초로 제곱합을 만들고 이를 최소로 하는 값을 구하는 방법.

No.9394 · 산림청 원문

카이제곱검정 - · chi-square test
실험에서 관찰한 수와 특정 가정 하에서 기대되는 수와의 일치여부를 판정하기 위한 통계적 검정 방법. 흔히 x2 검정이라 한다.

No.9395 · 산림청 원문

카제인 乾酪素 · casein
유단백질로 종이를 만들 때 코팅용 접착제로 사용하는 것.

No.9396 · 산림청 원문

카타라아제 - · catalase
과산화수소를 분해해서 물과 분자상 산소로 하는 효소. 생물체에 넓게 분포하고 호기성세포에는 반드시 포함된다.

No.9397 · 산림청 원문

카타스트로프 - · catastrophe
어떤 시스템에서 어느 종류의 요인이 약간 변해도 폭발적으로 현저한 변화를 나타내는 현상. 예를 들어 약간의 조건 차이에도 불구하고 적조현상이 발생하여 수질이 오염되는 경우나 낙엽이 물길을 막아서 토양유실을 방지하다가 그것이 터지면 더 큰 힘으로 토양유실이 심해지는 경우에 볼 수 있다. 경우에 따라서 낙엽이 놓여 있는 각도의 차이에 의해서도 카타스트로피 현상은 발생할 수 있다.

No.9398 · 산림청 원문

카파가 - · kappa number
펄프의 증해도를 나타내는 방법의 하나로써 수율이 비교적 낮은 간단한 표백 펄프에서 수율 70%의 strong 펄프까지 광범위하게 적용할 수 있도록 과망간산 칼륨가를 개량한 것. 일정 조건에서 전건펄프 1g이 소비하는 N/10 과망간산칼륨용액을 ml수로 표시함. 단 과망간산칼륨의 첨가량의 50%가 펄프에 소비된 경우의 ml 수에 보정한다.

No.9399 · 산림청 원문

카폭 - · kapok white silk cotton tree
동남아세아에 보이는 고목. 처음 줄기에는 가시가 있다. 가지는 수평으로 펴고 잎은 7~8 매의 작은 잎 조각으로 된 손바닥모양의 복엽(複葉)이고 광택이 있다. 잎뒤는 회백색이다. 원주민의 나무배의 재료로 쓰이고 어린잎은 식용이 되고 수지는 약용이 된다.

No.9400 · 산림청 원문

칼날웨어 鋭縁堰 · sharpedged weir
유출량을 측정할 때, 적은 양의 물도 정확하게 측정하기 위하여 방수로의 모양을 삼각으로 하고 물이 접하는 면을 날카롭게 한 장치.

No.9401 · 산림청 원문

칼로리 - · calorie
열량의 단위. 기호 cal. (1) 순수한 물 1g의 온도를 1atm 아래에서 14.5℃로부터 15.5 ℃로 올리는데 요하는 열량. (2) 순수한 물 1g의 온도를 압력 1atm에 있어서 0℃로부터 100℃까지 올리는데 요하는 열량의 100분의 1을 평균 칼로리라 한다. (3) 과거에는 순수한 물을 0℃부터 1℃까지 올리는데 요하는 열량으로 정의되었다. (4)영양학에 있어서는 킬로칼로리를 단순하게 칼로리라고 한다.

No.9402 · 산림청 원문

칼륨 - · potassium
알칼리 금속원소의 일종. 원자식 K. 원자번호 19. 원자량 39.098

No.9403 · 산림청 원문

칼리식물 - · potassium plant
비교적 다량의 칼리를 함유하는 식물. 감자, 사탕무우등.

No.9404 · 산림청 원문

칼린류 - · calines
Went가 1938년에 말한 가설적인 홀몬류. (1) 리조칼린(rhizocaline) : 잎에서 생성된다고 가정되고 근형성에 필요하다고 믿어진다. (2) 카울로칼린(caulocaline) : 뿌리에서 만들어지고 줄기의 신장성장에 필요. (3) 파일로칼린(phyllocaline) : 떡잎 안에서 생성되거나 또는 저장되는 것으로 잎의 성장에 필요한 것이다.

No.9405 · 산림청 원문

칼본산 - · carboxylic acid
일명 카보실산, 카보키실기 —COOH를 가지는 유기화합물의 총칭. 카보키실기의 수에 따라 일염기(성)산, 이염기(성)산 등으로 구별하고 각각 모노칼본산, 디칼본산등으로 말한다.

No.9406 · 산림청 원문

칼슘화합물 ?化合物 · calcium compound
칼슘으로 만들어지는 이가(二價)의 화합물.

No.9407 · 산림청 원문

캄파카유 - · champaca oil
동남아세아에 자생하는 목련과의 캄파카의 꽃을 증류해서 얻은 향료. 참파카유.

No.9408 · 산림청 원문

캐내기 掘取 · lifting
묘포나 임지에서 자라고 있는 묘목이나 나무를 파내는 일.

No.9409 · 산림청 원문

캘러스 조직 癒傷組織 · callus tissue
종종 상처의 가장 자리에 시작하는 상처 표면에서 발전하는 두껍게 벽화된 보호조직.

No.9410 · 산림청 원문

캘러스교 癒傷組織橋 · callus bridge
접수(接穗)와 삽수(揷穗)사이에 캘루스가 형성되어 충만되는 현상.

No.9411 · 산림청 원문

캘러스절 癒傷組織 節 · callus knots
캘루스가 너무 많이 형성되어서 마디 같이 된 것.

No.9412 · 산림청 원문

캘린더 光澤機 · calender
여러 개의 철롤을 수직적으로 겹쳐 배열하고 철롤에 일정한 압력을 유지시키면서 그 사이에 종이를 통과시켜 표면을 평활하게 하고 광택을 부여하는 기계.

No.9413 · 산림청 원문

캠식물 - · CAM plant
기린초, 돌나물, 선인장, 쇠비름과 같이 유기산대사(CAM), 크래슐산대사를 하는 식물. 야간에 기공(氣孔)이 열려서 이산화탄소를 받아들여 유기산(주로 말산)으로 변환시켜 액포에 축적하고, 낮에는 기공이 닫혀지고 유기산을 탈탄산화시켜 광합성탄소고정회로에 이산화탄소를 공급한다.

No.9414 · 산림청 원문

커버 被覆度 · cover
관목층이나 수관층의 피복 정도.

No.9415 · 산림청 원문

커버글라스 - · cover glass cover slip
슬라이드 글라스(slide-glass) 위에 두는 유리. 현미경표본 용어. Zeiss제는 두께가 0.1~0.2㎜.

No.9416 · 산림청 원문

컬 - · curl
종이의 휘어진 모양. 종이는 초지방향을 축으로 하여 둥글게 말아지는 경향이 있다. 컬은 수분의 불균일한 분포, 내부 비틀림, 또는 섬유의 배열 등에 따라 일어난다.

No.9417 · 산림청 원문

컴퍼스 羅盤 · compass
자침과 분도원(分度圓)을 가지고 있는 측량기구. 측선(測線)의 방위각, 고저각 등을 측정할 수 있다. 보통의 경우 분도원의 중심에 자침을 달아놓고 N과 S의 방향선과 동일한 방향으로 시준선이 있어 시준할 수 있도록 되어 있다. 컴퍼스를 이용한 측량을 컴퍼스측량(羅盤測量)이라고 한다.

No.9418 · 산림청 원문

컴퍼스측량 - · compass surveying
컴퍼스를 사용하여 방위 또는 방위각을 측정하고, 테이프로 거리를 재서 각 측점상의 평면상 위치를 결정하는 측량법. 컴퍼스의 경우 국지인력에 의한 영향을 많이 받기 때문에 철제구조물과 전류가 많은 시가지 측량에는 적합하지 않으며, 농지, 임야지 등과 같이 정도가 높이 필요로 하지 않는 지역에 주로 사용한다.

No.9419 · 산림청 원문

케네디라운드 - · Kennedy Round
1963년부터 1967년까지 개최되었던 GATT의 제6차 다자간 무역협상. 케네디 대통령의 제창에 의해 개시되어서 그의 이름을 따서 이렇게 명명되었으며 동 다자간 협상에서는 공산품 평균관세의 35% 인하, 반덤핑 협정문 제정 등의 합의를 도출하였다.

No.9420 · 산림청 원문

케라틴 角質 · keratin
경질 단백질의 하나. 손톱, 모발, 깃털 등에 포함된다.

No.9421 · 산림청 원문

케언즈그룹 - · Cairns Group
농산물 수출시 보조금을 지급하지 않거나 혹은 미미한 보조만을 지급하는 국가그룹. 1986년 호주의 동북구 케언즈(Cairns)라는 도시에서 공식 결성되어 케언즈 그룹이라고 한다. 회원국은 호주를 위시하여 뉴질랜드, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 칠레, 콜롬비아, 필리핀, 말레이지아, 태국, 인도네시아, 피지, 파라과이, 남아공 등의 15개국이나 피지가 UR농산물협상에서 자국의 제안을 내놓지 않은 관계로 14개국으로 보기도 한다.

No.9422 · 산림청 원문

케토산 - · ketoacid
케톤산(Ketonic acid)과 같다.

No.9423 · 산림청 원문

케토스 - · ketose
수산기에 이웃해서 케톤기를 가지는 단당류의 총칭. 케톤알코올에 속한다.

No.9424 · 산림청 원문

케톤 - · ketone
카보닐기가 2개의 탄화수소기와 결합한 화합물. 탄화수소기의 종류가 같은 것을 단일케톤, 다른 것을 혼성케톤이라고 한다.

No.9425 · 산림청 원문

케톤기 - · ketone group
CO의 기(基). →카보닐(carbonyl).

No.9426 · 산림청 원문

케톤산 - · ketonic acid
케토산. 케톤기 = CO와 카보키실기 —COOH를 한분자내에 가지는 유기화합물.

No.9427 · 산림청 원문

켄치아나바이올렛 - · gentian violet
회녹색의 분말. 물 및 알콜에 녹고 생체의 조직과 세균의 염색에 쓰인다.

No.9428 · 산림청 원문

켜쌓기 布積 · coursed masonry
줄쌓기. 바른층쌓기. 돌의 면 높이를 같이하여 가로줄눈이 일직선이 되도록 돌을 쌓는 방법.

No.9429 · 산림청 원문

코돈 - · codon
mRNA에서의 한단위로 작용하는 세 개의 염기(triplet). 합성되는 폴리펩타이드의 특정위치에 번역되어 아미노산으로 첨가되는 특성을 가진다.

No.9430 · 산림청 원문

코드 - · cord
미국에서 사용되는 층적 단위. 길이 4 feet의 통나무를 높이 4 feet, 폭 8 feet로 쌓아 올린 부피로 1 cord = 128 feet3이다.

No.9431 · 산림청 원문

코딩 符號化 · coding
일정한 규칙에 따라 문자 또는 숫자를 기호화는 것.

No.9432 · 산림청 원문

코르크화 木栓化 · suberification
세포벽에 수베린이 집적되는 현상.

No.9433 · 산림청 원문

코르탈 - · coal tar
콜탈. 석탄건유(石炭乾溜)때 얻어지는 부산물.

No.9434 · 산림청 원문

코리올리 효과 - · coriolis effect
지구의 회전에 의해 생기는 효과 바람과 물의 흐름을 북반구에서는 이동방향의 오른쪽으로 남반구에서는 이동방향의 왼쪽을 편향되는 현상.

No.9435 · 산림청 원문

코발트 - · cobalt
원소기호 Co. 원자번호 27. 원자량 58.94.

No.9436 · 산림청 원문

코어링 - · coring
실험실에서 쓰고 있는 콜크천공기(cork borer)나 그와 비슷한 장치를 이용해서 짧은 축의 끝에 있는 중심부의 생장점을 완전히 제거하는 일. 비늘줄기의 번식법의 하나.

No.9437 · 산림청 원문

코요테 전술 - · coyote tactics
대원들이 근무시간 동안 방화선을 설치하고 근무시간 외에는 근처에서 머물다 근무시간에는 다시 그 지점에서 작업을 시작하는 전진 방화선 설치기법.

No.9438 · 산림청 원문

코자크 염기서열 - · kozac sequence
원핵생물의 Shine & Dalgarno 염기서열에 해당되는 진핵생물(eukaryote)의 번역개시 결정 위치. 리보좀(ribosme)이 mRNA의 염기서열 중 methionine 바로 앞에 이 염기서열이 오는 곳에 부착된다. 즉 methionine을 암호화하는 RNA 코돈 AUG 바로 앞에 오는 CC(A/G)CC를 말한다. 그러나 이것은 척추동물의 경우이며 나중에 밝혀진 결과에 의하면 단자엽식물은 CA(A/G)CC가 w주종을 이루며 쌍자엽식물은 AAA(A/C)CC가 더 높은 빈도로 나타난다.

No.9439 · 산림청 원문

코카인 - · cocaine
코카 속의 식물의 잎에 들어 있는 알칼로이드. 기둥 모양의 결정체. 마취제로 사용. 화학식은 C17H21NO4.

No.9440 · 산림청 원문

코터 - · coater
원지에 도료를 칠하는 기계. 코터에는 초지기상에서 도공하는 on machine coating과 초지 후에 도공하는 off machine coating이 있다.

No.9441 · 산림청 원문

코팔 - · copal
나뭇진의 한 무리. manila copal, kauri copal, congo copal등이 있다.

No.9442 · 산림청 원문

콘베이어 - · conveyor
목재와 같이 무겁고 부피가 큰것을 이동시키는 장치. 이것을 재크 래더(jack ladddr), 로그 재크(log jack), 또는 로그 호이스트(log hoist)라고도 한다. 콘베이어로 목재를 제재기 바로 옆에 붙어 있는 유치대(log deck)앞에 올린다. 유치대 앞에는 긴 원목을 짧은 길이의 원목으로 자르기 위하여 횡단용 톱이 장치되어 있고 유치대에는 로그키커(log kicker), 로그 스토퍼(log stopper), 로그 터어너(log turner)등의 장치가 되어 있어서 무거운 원목을 제재할 수 있도록 제재차에 밀어 넣을 수 있게 된다.

No.9443 · 산림청 원문

콘소시에이션 優群集 · consociation
군총(association)을 구성하는 종류 중 우점종이 되는 것의 집합체.

No.9444 · 산림청 원문

콘소시이스 - · consocies
콘소시에이션(consociation)의 어구를 안정군락에만 대해서 사용할 때 그것과 같은 성격이나 천이의 도중에 있는 불안정군락을 말함.

No.9445 · 산림청 원문

콘크리트 - · concrete
모래, 자갈(또는 잡석)을 골재로 하고 시멘트를 교착제로 해서 물로 결합시킨 것.

No.9446 · 산림청 원문

콘크리트공 - · concrete work
콘크리트를 사용해서 공작물을 만드는 것. 모래는 보통, 직경이 5㎜이하, 자갈이나 잡석은 최대지름이 4㎝ 정도로 하고 부득이 할 때는 8㎝ 이하로 하는 것이 좋다.

No.9447 · 산림청 원문

콜라겐 膠原質 · collagen
경단백질의 하나. 결합조직의 성분이고 뼈, 연골, 피부, 비늘 등에 포함된다. 섬유상의 고체로서, 물이나 물로 희석한 산 혹은 알칼리에는 녹지 않는다. 다만 부피가 늘어난다.

No.9448 · 산림청 원문

콜로니 - · colony
같은 종 또는 약천종(若千種)의 생물로 된 집단의 한 종류.

No.9449 · 산림청 원문

콜로이드 膠質 · colloid
직경이 0.1~0.001μm인 입자. 토양 내 있는 점토나 유기물은 그 크기가 이 범위 안에 있기 때문에 종종 토양콜로이드라고 불리운다. 교질(膠質)이라고도 하며, 현미경으로서는 볼 수 없으나 원자와 분자보다는 더 큰 입자로서의 물질이 분산해 있을 때 콜로이드의 성질을 보인다.

No.9450 · 산림청 원문

콜로이드이온 膠質 · colloidal ion
수용액 중에 직경이 1~0.001μ의 전기를 띤 입자. 전기적 성질이 플러스 혹은 마이너스 인지에 따라 colloid anion, colloid cation이라고 한다.

No.9451 · 산림청 원문

콜로지온 - · collodion
초화도(硝化度)가 낮은 Nitrocellulose(N의 함유율 11~12%)를 에텔과 알콜의 혼합액에 녹인 것. 증발하면 투명하고 물에 녹지 않는 얇은 막을 남긴다.

No.9452 · 산림청 원문

콜로포늄 - · colophony
일명 로진(rosin). 소나무과의 나무줄기부터 분비하는 turpentine을 증류해서 휘발성의 텔 펜유를 제거하면 로진이란 수지가 남는다.

No.9453 · 산림청 원문

콜크가시나무 - · 學 Quercus suber
지중해연안 원산의 나무. 참나무류, 나무껍질이 훌륭한 콜크재료로 된다.

No.9454 · 산림청 원문

콜크조직 - · cork tissue
콜크형성층부터 그 바깥쪽에 만들어지는 조직.

No.9455 · 산림청 원문

콜크형성층 - · cork cambium
이차비대성장을 하는 식물의 줄기 및 뿌리의 주로 껍질층 안에 생기는 후생분열조직의 하나.

No.9456 · 산림청 원문

콜키신 - · colchichine
담황색결정 Colchicum autumnale의 비늘줄기에 포함되는 알칼로이드. 유사 핵분열에 있어서 방추사의 형성을 방해하는 작용을 한다. 콜히친이라고도 함.

No.9457 · 산림청 원문

콜키플로이디 倍數體 · colchiploidy
콜히친으로 만들어진 배수체.

No.9458 · 산림청 원문

콩독나방 - · 學 Cifuna locuples
독나방과 나비목. 각종작물과 활엽수의 잎에 붙어서 갉아먹는다. 유충은 흑갈색이며 몸의 제1, 3, 4마디와 꼬리마디에 1쌍의 긴털이 나고 제4, 7마디에는 등뒤면에 각 2개씩 황갈색의 긴털이 뭉쳐난다. 제8, 9, 10마디의 등뒤면에 1개씩의 적갈색의 점이 있다. 1년에 두번 발생하고 콩에 특히 피해가 심하다. DDT나 BHC 가루약제를 뿌린다.

No.9459 · 산림청 원문

콩풍뎅이 - · 學 Popillia atrocoerulea
풍뎅이과 딱정벌레목. 성충이 각종활엽수의 꽃과 잎을 갉아먹는다. 성충은 몸길이가 12㎜가량이며 흑남색 이고 날개의 중앙부는 갈색이다. 1년에 1번 발생하며 유충으로 땅속에서 월동한다. 식물의 뿌리에 해를 입힌다.

No.9460 · 산림청 원문

쾌니히측고기 - · Konig's hypsometer
나무의 높이를 재는 측정기구의 일종.

No.9461 · 산림청 원문

쾨펜의 기후구 - · Koppen's climatic province
쾨펜(1923)은 단순히 온도에 기초를 둔 기후 분류법을 지향하고, 보다 복잡한 방법으로 기후구를 분류. 제1차 분류에서는 온도대를 가장 온난한 지역(A)에서 가장 추운 지역(E)의 5개로 나누었다. 제2차 분류에서는 계절에 따른 건조와 습윤을 기준으로 나누었다. 제3차 분류에서는 여름철의 기온을 가장 고온(a), 적온(b), 가장 저온(c)으로 나누어 각각의 기호로써 나타내었다. 그 후 트레와더가 식생경계가 잘 맞도록 수정하였는데, 세계적으로나 우리나라에서나 가장 널리 이용되는 기후구분 체계이다.

No.9462 · 산림청 원문

쿼터시스템 輸入量割當制度 · quarter system
이것은 수입품 또는 그 양을 수출국에 할당하는 방법. 주로 수입을 제한하고자 도입한다.

No.9463 · 산림청 원문

큐리 - · curie
방사성을 가지는 물질의 양을 나타내는 단위. 매초 370억개의 원자붕괴가 되고 있는 방사성물질의 양(원자수)을 1 curie라하고 그 천분의 일을 1밀리큐리, 백만분의 일을 1마이크로큐리라고 한다. 1mc = 3,700×10 dps(매초붕괴) 1μc = 3,700× 10^4dps. 10^4dps.

No.9464 · 산림청 원문

큐빅푸트 - · cubic foot
실적 및 층적의 단위로 사용되는 미영식 단위. 1cu.ft. = 1foot×1foot×1foot로 계산하며 입방푸트(ft.3)의 용적을 말한다.

No.9465 · 산림청 원문

큐티클 - · cuticle
식물의 표면을 덮고 있는 왁스 또는 왁스 유사물질의 얇은 막층.

No.9466 · 산림청 원문

큐틴 - · cutin
식물의 표면을 보호하는 지방상 또는 왁스상의 물질.

No.9467 · 산림청 원문

크라프트법 - · kraft process
목재 및 기타 섬유원료를 NaOH 및 Na2S로 증해하여 제조된다. 증해온도는 아황법에 비하여 높고 시간은 짧으며 연속증해도 이뤄진다. 황산염법이라고도 불린다. 펄프의 일종으로 목재를 가성(苛性)소다와 황화(黃化) 소다의 혼합액으로 증해(烝解)시켜 그 섬유를 뽑아내서 만든 화학 펄프. 황산염(黃酸鹽) 펄프라고도 한다. 표백이 다소 곤란한 점이 있지만, 강인하며, 강도를 필요로 하는 골판지나 비료 푸대 등에도 사용된다. 수지가 있는 침엽수와 활엽수에도 적용한다. 펄프가 극히 강인하여 주로 포장지나 판지생산에 이용된다. 표백법의 발달로 인견용 펄프를 제조하는데 이용된다.

No.9468 · 산림청 원문

크라프트지 - · kraft paper
kraft pulp를 원료한 질긴 종이의 총칭. 지대용 kraft지, 철사를 넣은 kraft지 등이 있다.

No.9469 · 산림청 원문

크라프트펄프 - · kraft pulp
황화소오다와 가성소오다의 혼합액으로써 목재를 삶아 제조한 것. 나뭇진이 있는 침엽수재에도 적당하고 또 활엽수재에도 쓰인다. 펄프가 극히 강인하고 주로 포장지, 판지에 이용되었으나 최근에는 표백법의 발달로써 인조견 용도의 펄프의 제조도 되어 지고 있다. 펄프의 수량은 아류산염법 만은 못하나 소오다법보다는 더 많다.

No.9470 · 산림청 원문

크러셔 - · crusher
쇄석기.

No.9471 · 산림청 원문

크레솔 - · cresol
페놀의 한 종류인 유기화합물. 무색, 기름 상의 액체. 소독제로 사용. 화학식은 C6H4(CH3)OH.

No.9472 · 산림청 원문

크레오소트 - · creosote
나무타르를 증류하여 기름기를 정제한 것. 목재방부에 쓰인다.

No.9473 · 산림청 원문

크렙스 회로 - · Krebs cycle
TCA cycle, 세포호흡의 근본적인 대사회로. 미토콘드리아에서 일어난다. 해당작용(glycolysis)의 마지막 산물인 pyruvate가 이산화탄소, 수소이온, 및 전자로 산화되어 분해되며 ATP가 형성된다. 이 회로는 폐쇄된 cycle이 아니기 때문에 회로가 진행되는 동안 각 단계별로 계속 물질이 이입되며 일부는 이탈된다.

No.9474 · 산림청 원문

크로마토그래피 - · chromatography
소련의 식물학자 M. Tsvet가 1960년 클로로필 등 식물색소를 연구할 때 사용한 물질의 분별흡착분리법.

No.9475 · 산림청 원문

크로마틴 - · chromatin
염색사와 염색체의 주성분.

No.9476 · 산림청 원문

크로스 데이팅 - · cross-dating
수목연륜연대학의 기본 원리. 수목 연륜의 폭이 넓고 좁은 양상을, 인접 수목들간 또는 다른 지역 수목들간에 비교함으로서 위연륜과 실연륜을 찾아내어 알고 있는 기준연대를 이용하여 정확한 생육연대를 각 나이테에 부여함을 뜻함.

No.9477 · 산림청 원문

크론퀘스트 - · Arthur Cronquist
세계적으로 분류체계를 새롭게 정리한 미국의 계통분류학자(1919~1992). 최근 전 세계의 계통분류체계는 크론퀘스트의 시스템을 따르는 경향이 두드러진다. 그는 목련속 식물을 원시형으로 보고

피자식물을 목련식물문으로 그 하위의 쌍자엽식물강과 단자엽식물강을 목련식물강과 백합식물강으로 하여 유연관계를 고려한 계통분류체계를 새로이 정립하였다. 크론퀘스트의 계통분류체계에서는 지금까지 식물의 분류에 고려된 형질이외에도 화석 및 화분형의 비교를 중요시하였다.

No.9478 · 산림청 원문

크리스털 바이올렛 - · crystal violet
methyl violet라고도 함, 살균제로도 사용, 세포화학에 사용하는 염기성 염료.

No.9479 · 산림청 원문

크리스튼측고기 - · Christen hypsometer
입목(立木)의 수고를 측정하는 기구 중의 하나로 다른 측고기에 비하여 매우 간편하다. 이 측고기는 불규칙적인 수가 적힌 20cm 또는 30cm되는 금속 또는 목재로 된 자와 일정한 길이의 폴과 함께 사용한다. 폴을 측정하고자 하는 나무 밑에 세우고 눈에서 어느정도 떨어진 위치에 크리스튼측고기를 수직 또는 나무와 평행하게 세운 다음 측고기의 길이가 보무를 보는 협각(陜角)에 완전히 끼게 하고, 측고기를 통하여 나무 밑에 세운 폴을 시준할 때 그 시준선이 측고기와 만나는 선의 눈금을 읽어서 수고를 구한다.

No.9480 · 산림청 원문

크리신 - · chrysin
flavone, 2-phenyl benzopyrone의 유도체, 특히 3위에 OH기를 가진 것을 flavonol이라함. 융점 275℃. 황색 판상결정. 포플러속 식물의 동아의 표면을 덮는 점질물중에 포함되는 배당체.

No.9481 · 산림청 원문

크림프 철망 - · crimped wire cloth
얇은 철망으로 옷감처럼 된 것으로 걸러는데 사용함. 농업에서는 망형태로 된 것으로 탈곡기와 콤바인의 탈곡망에 널리 활용되는 것으로 지름 2~3.2mm의 철선으로 엮어 만들고 망눈(눈금)은 대개 8~15mm의 정사각형이 많음.

No.9482 · 산림청 원문

큰기름새 - · 學 Spodiopogon sibiricus
산야에 자생하는 다년생초. 초고 1.2m가량, 목초. 가을에 출수하고 자갈색.

No.9483 · 산림청 원문

큰꽃으아리 轉子蓮 · 學 Clematis patens
낙엽성 활엽 덩굴식물. 전국 분포.

No.9484 · 산림청 원문

큰솔알락명나방 松果梢斑螟 · maritime pine borer, 學 Dioryctria sylvestrella
한국, 일본, 중국, 시베리아, 유럽지역에 분포하며, 소나무, 해송, 잣나무, 섬잣나무, 전나무등에 피해를 입힌다. 잣나무 구과신초, 줄기의 인피부에서 피해가 큰데, 구과의 경우 유충이 과육을 식해하여 결실하지 못한다. 보통 1개의 구과에 5~6마리씩 기생하면서 가해한다.

No.9485 · 산림청 원문

큰키나무 喬木 · tree
교목.

No.9486 · 산림청 원문

큰턱 大顎 · mandible
곤충의 구기(口器)의 부속지중 하나로서 큰턱은 먹이를 자르고 씹기에 알맞게 되어 있는 것이 보통이나 방어용으로 쓰이기도 하며 바늘모양으로 변한 것도 있다. 식식성(食植性)곤충류에서는 이빨이 있으며 일부는 어금니 모양으로 면이 고르지 못하다. 식육성(食肉性) 곤충류는 날카로우며 어금니 모양의 부분이 없는 수도 있다. 날도래목과 파리목 성충의 대부분은 큰턱이 없으며, 나비목 성충의 대부분은 퇴화하거나 흔적만이 있는 수가 있다.

No.9487 · 산림청 원문

큰턱선 大顎腺 · mandibular gland
곤충구기(口器)의 큰턱 기부에 개구(開口)하는 분비조직과 저장낭으로 이루어진 분비선을 말한다.

No.9488 · 산림청 원문

클라이막스 極相 · climax
극상. 극성상이라고도 함.

No.9489 · 산림청 원문

클라인 傾斜(變異) · cline
명백한 불연속적 형질의 차이는 없으나 그 안에 폭넓은 변이가 존재하는 경우에, 그 형질차이가 지리적 분포에 따른 것이면 topocline, 생태조건의 변화에 따른 것이면 ecocline이라 하고, 이것을 합쳐서 cline이라고 한다.

No.9490 · 산림청 원문

클로로포름 - · chloroform
$CHCl_3$, 비점 61.2℃. 무색의 액체. 마취제. 용제.

No.9491 · 산림청 원문

클로로피크린 - · chloropicrine
$CCl_3(NO_2)$. 비점 112℃. 무색의 액체. 휘발성 토양 살충제. 국제적으로 사용이 금지되었음.

No.9492 · 산림청 원문

클로로필 葉綠素 · chlorophyll
엽록소. 식물의 잎의 엽록체 중에 존재하는 녹색의 색소.

No.9493 · 산림청 원문

클로브유 丁字油 · oil of clove
중요한 정유(精油)의 일종으로서 식품가공. 치약, 츄잉검, 향수, 비누, 화장수, 방부제원료로 쓰인다.

No.9494 · 산림청 원문

클로소이드곡선 - · clothoid, euler spiral
곡선의 길이가 증가함에 따라 비례적으로 곡률이 증가하며 반비례로 곡선반지름이 감소하는 곡선으로 완화곡선의 설치에 적용한다. 1/R=C×L (R:곡률반지름, L:곡선장, C는 정수)

No.9495 · 산림청 원문

클론 營養系 · clone
하나의 조상에서 유래되었기 때문에 유전적으로 동일한 세포, 생물체, 혹은 DNA의 집단을 말한다.

No.9496 · 산림청 원문

클론 임업 - · clonal forestry
유전적 우수성이 검증된 소수의 선발 클론을 체세포배 복제기술로 대량증식 시켜 대규모 조림에 활용하는 것을 '클론 임업'이라고 부른다.

No.9497 · 산림청 원문

클론보존원 - · clone bank
육종의 재료가 될 개체를 보존하고 가치를 평가하기 위하여 선발개체들을 영양증식시켜 한 곳에 모아놓은 곳. 종자의 대량공급을 위한 채종원과 다르게 관리된다. breeding orchard라고도 불리운다.

No.9498 · 산림청 원문

클론채종원 클론採種園 · clonal seed orchard
수형목을 재료로 영양번식으로 증식시켜 일정지역에 식재해 놓고 종자를 채취하는 나무의 집단.

No.9499 · 산림청 원문

클리노미터 傾斜計 · Clinometer
지질학에서 사용되는 일종의 경사계. 지층의 주향(走向), 경사각 등을 측정한다. 자석과 수준기 및 추로 되어 있다.

No.9500 · 산림청 원문

키놀린 - · quinoline
C9H7N. 무색, 냄새있는 액체. 비점 238'C, 의약품.

No.9501 · 산림청 원문

키메라 - · chimera
동일개체 중에 유전자형을 다르게 하는 조직이 서로 접촉해 있는 현상. 접목 키메라. 염색체키메라(chromosomal chimera)등이 있다. 황금소나무, 금선개나리 등은 대표적인 키메라인데 이를 variegated 식물이라고도 한다. 동물에서는 이와 같은 현상을 보통 모자이크라고 한다. 배수성(倍數性)의 조직이 정상 조직(2n)에 섞여있는 일이 있는데, 이것을 염색체 키메라라고 한다. 이 경우에 염색체수의 차이에 하나의 식물체 속에 유전자형이 다른 조직이 서로 인접하여 존재하는 현상. 아조변이(芽條變異)에 의하여 식물의 조직이 변해서, 키메라가 되는 키메라. 염색체키메라(chromosomal chimera)등이 있다.

No.9502 · 산림청 원문

키메릭 유전자 - · chimeric gene
두 개 이상의 유전자에서 온 부분이 합쳐져서 만들어진 유전자. 현대 유전공학의 유전자들은 거의가 다 키메릭 유전자라고할 수 있다. 이러한 키메릭 유전자를 만드는 이유는 어떤 유전자를 다른 생물에서 혹은 다른 부위에서, 필요한 시기에 발현시키려는 의도이다. 예를 들면 미생물의 유전자를 식물에서 발현시키려 할 때 유전자의 프로모터와 터미네이터는 식물의 RNA 중합효소가 인식할 수 있는 것으로 치환시켜야 하며 리보솜 부착부위(ribosome binding site)도 진핵생물의 리보솜에 맞는 것으로 전환시켜야 한다. 이 경우 프로모터와 터미네이터는 식물 특이한 것을 이용하게 되는데 그 결과로서 식물프로모터-미생물유전자-식물터미네이터의 합성유전자가 생기게 된다.

No.9503 · 산림청 원문

키산토필 - · xanthophyll
C40H56O2, Carotene의 유도체로서 황색의 알코올용성 염료. 식물의 꽃, 과일, 잎에 함유됨. Lutein이라고도 함.

No.9504 · 산림청 원문

키세니아 - · xenia
배유(胚乳)의 형질에 미치는 화분의 영향. 배유 이외의 모계조직에 나타나는 경우 이것을 메타키세니아라고 한다.

No.9505 · 산림청 원문

키아스마 - · chiasma
교차(crossing over)의 세포학적인 표현으로 감수분열시 4분염색체에서 자매염색분체가 서로 교차하는 접합점을 말한다. 감수분열(neiosis)시 전기(prophase 1)에서 나타나는 상동염색체의 비형매염색분체 사이에 나타나는 십자모형의 교환형태이다.

No.9506 · 산림청 원문

키아즈마관계 - · chiasma relation
연접하는 두개의 키아즈마의 관계는 4본의 염색분체의 행동에 따라 정역형(reciprocal), 보족형(complementary), 및 이종의 대각선형 (diagonal)의 4형이 있고 이 네가지 형이 동일한 빈도로 나타난다.

No.9507 · 산림청 원문

키아즈마빈도 - · chiasma frequency
특정의 염색체에 형성되는 키아즈마 수의 변화를 통계적으로 처리해서 얻은 평균치. 키아즈마 빈도는 염색체의 길이에 거의 비례한다.

No.9508 · 산림청 원문

키아즈마형설 - · chiasma type theory
유전적으로 알려진 교차의 현상을, 화원제일분열의 전기에 이가염색체의 내부에 보이는 염색체교차의 양식 즉 키아즈마 형에 관련시켜 세포학적으로 설명하고자 하는 생각.

No.9509 · 산림청 원문

키틴 - · chitin

절족(節足)동물의 피부, 균류의 세포막등의 중요성분으로서 질소를 함유하는 다당류(多糖類). 무색 결정상의 분말.

No.9510 · 산림청 원문