

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: Nguyễn Văn Hùng
 Số báo danh: 22034213

Mã đề thi 207

- Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

- A. Cr_2O_3 . B. $\text{Cr}(\text{OH})_2$. C. CrO_3 . D. $\text{Cr}(\text{OH})_3$.

Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

- A. Fe. B. Al. C. Mg. D. Cu.

Câu 43: Số nguyên tử hydro trong phân tử axit oleic là

- A. 31. B. 35. C. 34. D. 36.

Câu 44: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

- A. NaHCO_3 . B. HCl. C. NaHSO_4 . D. NaNO_3 .

Câu 45: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

- A. Valin. B. Glyxin. C. Axit glutamic. D. Alanin.

Câu 46: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng vĩnh cửu của nước?

- A. NaNO_3 , KHCO_3 . B. NaNO_3 , KNO_3 . C. CaCl_2 , MgSO_4 . D. NaHCO_3 , KHCO_3 .

Câu 47: Chất nào sau đây là tripeptit?

- A. Ala-Ala-Gly. B. Ala-Gly. C. Gly-Ala. D. Gly-Gly.

Câu 48: Sắt(II) hidroxit là chất rắn màu trắng hơi xanh. Công thức của sắt(II) hidroxit là

- A. $\text{Fe}(\text{OH})_3$. B. Fe_3O_4 . C. $\text{Fe}(\text{OH})_2$. D. FeO.

Câu 49: Công thức phân tử của glixerol là

- A. $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$. B. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. C. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$. D. $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$.

Câu 50: Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H_2 là

- A. Hg. B. Cu. C. Ag. D. Fe.

Câu 51: Cacbohidrat nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

- A. Fructozơ. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 52: Ở nhiệt độ cao, H_2 khử được oxit nào sau đây?

- A. FeO. B. CaO. C. K_2O . D. Na_2O .

Câu 53: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

- A. H_2SO_4 . B. KOH. C. Na_2O . D. Al_2O_3 .

Câu 54: Khi đun nấu bằng than tổ ong thường sinh ra khí X không màu, không mùi, bền với nhiệt, hơi nhẹ hơn không khí và dễ gây ngộ độc đường hô hấp. Khí X là

- A. CO. B. N_2 . C. CO_2 . D. H_2 .

Câu 55: Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

- A. Xenlulozơ. B. Polietilen. C. Poli(vinyl clorua). D. Tơ visco.

Câu 56: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit axetic. Công thức của X là

- A. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. B. HCOOC_2H_5 . C. HCOOCH_3 . D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

Câu 57: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

- A. Mg^{2+} . B. Ag^+ . C. Na^+ . D. Cu^{2+} .

Câu 58: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

- A. NaCl. B. KCl. C. HCl. D. NaNO_3 .

Câu 59: Natri hidroxit (hay xút ăn da) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Công thức của natri hidroxit là

- A. NaOH. B. NaHCO_3 . C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$. D. Na_2CO_3 .

Trang 1/4 - Mã đề thi 207



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết

- Câu 60: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
A. W. B. Al. C. Fe. D. Na.
- Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tơ nylon-6,6 thuộc loại tơ thiên nhiên.
B. Polietilen là polime được dùng làm chất dẻo.
C. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
D. Sau khi lưu hóa, tính đàn hồi của cao su giảm đi.
- Câu 62: Cho $\text{Fe}(\text{OH})_3$ phản ứng với dung dịch H_2SO_4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?
A. FeS . B. FeSO_4 . C. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. D. FeSO_3 .
- Câu 63: Cho 3,0 gam glyxin tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 5,19. B. 4,46. C. 3,73. D. 4,23.
- Câu 64: Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,21 mol khí H_2 . Giá trị của m là
A. 4,86. B. 5,67. C. 3,78. D. 3,24.
- Câu 65: Este X có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm axit propionic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là
A. CH_3COOH . B. CH_3OH . C. HCOOH . D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
- Câu 66: Cho 12,6 gam MgCO_3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO_2 . Giá trị của V là
A. 4,48. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36.
- Câu 67: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 30,24 gam Ag. Giá trị của m là
A. 25,20. B. 50,40. C. 45,36. D. 22,68.
- Câu 68: Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit?
A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Glixerol. D. Saccarozơ.
- Câu 69: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,25 mol Mg vào dung dịch Y chứa $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và AgNO_3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 61,6 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được 0,55 mol SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của H_2SO_4). Giá trị của a là
A. 0,35. B. 0,25. C. 0,30. D. 0,20.
- Câu 70: Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,82 mol hỗn hợp X gồm H_2 và các hidrocacbon mạch hở (CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_6 , C_4H_8 , C_4H_{10}). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br_2 dư thì có tối đa a mol Br_2 phản ứng, khối lượng bình tăng 15,54 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,74 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Giá trị của a là
A. 0,38. B. 0,41. C. 0,45. D. 0,37.
- Câu 71: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:
 $\text{E} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Y} + 2\text{Z}$
 $\text{F} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Z} + \text{T} + \text{H}_2\text{O}$
Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol.
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất T là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.
(b) Chất Y tác dụng với dung dịch HCl sinh ra axit axetic.
(c) Chất F là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(d) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.
(đ) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.



Câu 72: Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H_2O và 2,0 mol CO_2 . Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 53,95 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,4 mol H_2 . Đốt cháy toàn bộ F, thu được H_2O , Na_2CO_3 và 0,4 mol CO_2 . Khối lượng của Y trong m gam T là

- A. 7,30 gam. B. 2,95 gam. C. 3,65 gam. D. 5,90 gam.


Câu 73: Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe_3O_4 . Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,325 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 0,08 mol H_2 và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,12 mol SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của H_2SO_4). Cho Z tác dụng với dung dịch $Ba(OH)_2$ dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 172,81 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm $FeCl_3$ trong Y là

- A. 6,50%. B. 3,25%. C. 5,20%. D. 3,90%.

Câu 74: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2 : 1). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 4,0 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 47,08 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 38,72%. B. 37,99%. C. 39,43%. D. 37,25%.

Câu 75: Cho sơ đồ chuyển hóa:



Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác $CaCO_3$; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

- A. $NaHCO_3$, $CaCl_2$. B. CO_2 , $CaCl_2$.
C. $Ca(HCO_3)_2$, $Ca(OH)_2$. D. $NaHCO_3$, $Ca(OH)_2$.

Câu 76: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 5 giọt dung dịch $CuSO_4$ 0,5% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều; gạn phần dung dịch, giữ lại kết tủa.

Bước 3: Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucosơ 1% vào ống nghiệm, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Thí nghiệm trên chứng minh glucosơ có tính chất của andehit.
B. Nếu thay dung dịch NaOH ở bước 2 bằng dung dịch KOH thì hiện tượng ở bước 3 vẫn tương tự.
C. Ở bước 3, nếu thay glucosơ bằng fructosơ thì hiện tượng xảy ra vẫn tương tự.
D. Sau bước 3, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 77: Cho các phát biểu sau:

- (a) Điện phân nóng chảy NaCl, thu được kim loại Na ở catot.
(b) Thành phần chính của supephotphat kép là $Ca(H_2PO_4)_2$.
(c) Để lâu miếng gang trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa học.
(d) Sục khí CO_2 vào dung dịch $Ca(HCO_3)_2$, thu được kết tủa.

Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 78: Hòa tan hoàn toàn 26,52 gam Al_2O_3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO_3 , thu được 247 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến $20^\circ C$ thì có m gam tinh thể $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ tách ra. Biết ở $20^\circ C$, cứ 100 gam H_2O hòa tan được tối đa 75,44 gam $Al(NO_3)_3$. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 33. B. 14. C. 90. D. 19.



Câu 79: Cho các phát biểu sau:

- (a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật.
- (b) Mỡ lợn có chứa chất béo bão hòa (phân tử có các gốc hidrocacbon no).
- (c) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân.
- (d) Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein.
- (đ) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 80: Hỗn hợp E gồm hai amin X (C_nH_mN), Y ($C_nH_{m+1}N_2$, với $n \geq 2$) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E, thu được 0,03 mol N_2 , 0,22 mol CO_2 và 0,30 mol H_2O . Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 14,46%. B. 43,38%. C. 57,84%. D. 18,14%.

----- HẾT -----

