

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: Trần Ngọc Ý
Số báo danh: 2002.2915

Mã đề thi 222

- Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

- A. K_2O . B. Na_2O . C. CuO . D. BaO .

Câu 42: Công thức phân tử của ancol etylic là

- A. $C_3H_8O_3$. B. C_2H_6O . C. $C_2H_4O_2$. D. CH_4O .

Câu 43: Chất nào sau đây là dipeptit?

- A. Gly-Gly-Gly. B. Ala-Gly. C. Ala-Ala-Ala. D. Ala-Gly-Ala.

Câu 44: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

- A. Tinh bột. B. Poli(vinyl clorua). C. Tơ visco. D. Polietilen.

Câu 45: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

- A. Hg. B. Ag. C. Cu. D. Al.

Câu 46: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

- A. CrO_3 . B. $Cr(OH)_2$. C. $Cr(OH)_3$. D. $K_2Cr_2O_7$.

Câu 47: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

- A. CaO . B. HCl . C. Al_2O_3 . D. $NaOH$.

Câu 48: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

- A. Ba. B. K. C. Al. D. Fe.

Câu 49: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

- A. Glucose. B. Glycerol. C. Saccarozơ. D. Tinh bột.

Câu 50: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng, thu được khí H_2 ?

- A. Au. B. Cu. C. Ag. D. Mg.

Câu 51: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?

- A. $NaCl$, K_2SO_4 . B. KCl , $NaCl$.
C. $Mg(HCO_3)_2$, $Ca(HCO_3)_2$. D. Na_2SO_4 , KCl .

Câu 52: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

- A. Etylamin. B. Alanin. C. Glyxin. D. Valin.

Câu 53: Số nguyên tử hydro trong phân tử axit stearic là

- A. 31. B. 33. C. 36. D. 34.

Câu 54: Este X được tạo bởi ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là

- A. $HCOOC_2H_5$. B. CH_3COOCH_3 . C. $CH_3COOC_2H_5$. D. $HCOOCH_3$.

Câu 55: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

- A. $NaNO_3$. B. KCl . C. $NaCl$. D. $NaOH$.

Câu 56: Chất nào sau đây là muối axit?

- A. $NaCl$. B. $NaNO_3$. C. NaH_2PO_4 . D. $NaOH$.

Câu 57: Chất thải hữu cơ chứa protein khi bị phân hủy thường sinh ra khí X có mùi trứng thối, nặng hơn không khí, rất độc. Khí X là

- A. N_2 . B. CO_2 . C. H_2S . D. O_2 .

Câu 58: Sắt(III) hidroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hidroxit là

- A. Fe_3O_4 . B. $Fe(OH)_2$. C. $Fe(OH)_3$. D. $FeCO_3$.

Trang 1/4 - Mã đề thi 222



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết

- Câu 59: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Al?
A. Mg. B. Fe. C. Cu. D. Ag.
- Câu 60: Natri hidrocacbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit.
Công thức của natri hidrocacbonat là
A. NaHCO_3 . B. Na_2CO_3 . C. NaOH. D. NaHS.
- Câu 61: Cho 10 gam CaCO_3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO_2 . Giá trị của V là
A. 1,12. B. 2,24. C. 3,36. D. 4,48.
- Câu 62: Cho FeO phản ứng với dung dịch H_2SO_4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?
A. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. B. FeSO_4 . C. FeS. D. FeSO_3 .
- Câu 63: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozo. Cho toàn bộ glucozo tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
A. 32,4. B. 18,0. C. 16,2. D. 36,0.
- Câu 64: Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,18 mol khí H_2 . Giá trị của m là
A. 3,24. B. 4,86. C. 2,16. D. 3,78.
- Câu 65: Cho 7,12 gam alanin tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 8,92. B. 12,55. C. 10,59. D. 10,04.
- Câu 66: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.
B. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.
C. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
D. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp.
- Câu 67: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$, thu được dung dịch có màu xanh lam?
A. Fructozo. B. Ancol propylic. C. Anbumin. D. Propan-1,3-điol.
- Câu 68: Este X có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm axit axetic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là
A. HCOOH . B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$. C. CH_3OH . D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
- Câu 69: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:
 $\text{E} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Y} + 2\text{Z}$
 $\text{F} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Y} + \text{T} + \text{H}_2\text{O}$
Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4$, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol.
Cho các phát biểu sau:
(a) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.
(b) Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.
(c) Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO_2 , H_2O và Na_2CO_3 .
(d) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(đ) Chất T được dùng để sản xuất trùng hợp cụ y tế.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
- Câu 70: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 4,07 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 47,08 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là
A. 76,13%. B. 75,57%. C. 76,67%. D. 74,98%.
- Câu 71: Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,47 mol hỗn hợp X gồm H_2 và các hidrocacbon mạch hở (CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_6 , C_4H_8 , C_4H_{10}). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br_2 dư thì có tối đa a mol Br_2 phản ứng, khối lượng bình tăng 9,52 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,28 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Giá trị của a là
A. 0,27. B. 0,21. C. 0,20. D. 0,24.

Trang 2/4 - Mã đề thi 222



Câu 72: Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe₂O₃. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,05 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 0,07 mol H₂ và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H₂SO₄ đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,1 mol SO₂ (sản phẩm khử duy nhất của H₂SO₄). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)₂ dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 136,85 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl₃ trong Y là

- A. 3,25% B. 3,90% C. 5,20% D. 2,60%

Câu 73: Cho các phát biểu sau:

- (a) Tro thực vật chứa K₂CO₃ cũng là một loại phân kali. ✓
(b) Điện phân dung dịch CuSO₄, thu được kim loại Cu ở catot. ✓
(c) Nhỏ dung dịch BaCl₂ vào dung dịch KHSO₄, thu được kết tủa. ✓
(d) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO₄ có xảy ra ăn mòn điện hóa học. ✓

Số phát biểu đúng là

- A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 74: Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol. ✓
(b) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột. ✓
(c) Các mảng "riêu cua" xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein. ✓
(d) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm. ✓
(e) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phần tử có gốc hidrocarbon không no). ✓

Số phát biểu đúng là

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

Câu 75: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO₃)₂ và AgNO₃ (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 87,6 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H₂SO₄ đặc nóng, thu được 1,2 mol SO₂ (sản phẩm khử duy nhất của H₂SO₄). Giá trị của a là

- A. 0,75 B. 0,50 C. 0,60 D. 0,30


Câu 76: Hòa tan hoàn toàn 27,54 gam Al₂O₃ bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO₃, thu được 267,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C thì có m gam tinh thể Al(NO₃)₃·9H₂O tách ra. Biết ở 10°C, cứ 100 gam H₂O hòa tan được tối đa 67,25 gam Al(NO₃)₃. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 26 B. 22 C. 84 D. 45

Câu 77: Hỗn hợp E gồm hai amin X (C_nH_mN), Y (C_nH_{m+1}N₂, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol E, thu được 0,05 mol N₂, 0,30 mol CO₂ và 0,42 mol H₂O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 40,41% B. 38,01% C. 30,31% D. 70,72%

Câu 78: Cho sơ đồ chuyển hóa:



Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác BaCO₃; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

- A. NaHCO₃, Ba(OH)₂ B. CO₂, BaCl₂ C. NaHCO₃, BaCl₂ D. CO₂, Ba(OH)₂

Câu 79: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO₃ 1% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch NH₃, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucozo 1% vào ống nghiệm; đun nóng nhẹ.

Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Ở bước 3, có thể thay việc đun nóng nhẹ bằng cách ngâm ống nghiệm trong nước nóng.
B. Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.
C. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là sobitol.
D. Thí nghiệm trên chứng minh glucozo có tính chất của anđehit.

Trang 3/4 - Mã đề thi 222



Câu 80: Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H_2O và 1,0 mol CO_2 . Xa phồng hòa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 26,92 gam hỗn hợp muối F. Cho F tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,2 mol H_2 . Đốt cháy toàn bộ F, thu được H_2O , Na_2CO_3 và 0,2 mol CO_2 . Khối lượng của Y trong m gam T là

- A. 5,92 gam. B. 4,72 gam. C. 3,65 gam. D. 5,84 gam.

———— HẾT ————

Trang 4/4 - Mã đề thi 222



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết