

ĐỀ VẬT LÝ SỞ BẮC NINH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Ở mặt hồ, áp suất khí quyển là 10^5 Pa . Một bọt khí ở đáy hồ có độ sâu 5 m nổi lên mặt nước thì thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần? Giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ là như nhau, khối lượng riêng của nước là 10^3 kg/m^3 , lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- A. 1,2 lần. B. 2,0 lần.
C. 1,6 lần. D. 1,5 lần.



Câu 2: Năm 1827, khi quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi, Robert Brown đã nhận thấy

- A. chúng có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
B. chúng luôn đứng yên.
C. chúng chuyển động không ngừng.
D. chúng chỉ dao động quanh một vị trí cân bằng.



Câu 3: Trong một động cơ điezen, khối khí (coi là khí lí tưởng) có nhiệt độ ban đầu là 32°C được nén để thể tích giảm bằng $1/16$ thể tích ban đầu và áp suất tăng bằng 48,5 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ khối khí sau khi nén bằng

- A. $97,3^\circ \text{C}$ B. $651,5^\circ \text{C}$ C. $132,9^\circ \text{C}$ D. $924,5^\circ \text{C}$

Câu 4: Một bình kín chứa $N = 3,01 \cdot 10^{23}$ phân tử khí helium. Số mol khí helium có trong bình là

- A. 0,5 mol B. 0,4 mol C. 0,2 mol D. 0,1 mol


Câu 5: Chất nào sau đây có thể tích xác định?

- A. Chất rắn và chất lỏng. B. Chất khí.
C. Chất rắn và chất khí D. Chất lỏng và chất khí.


Câu 6: Tính nhiệt lượng tỏa ra khi 1 miếng sắt có khối lượng 2 kg ở nhiệt độ 500°C hạ xuống còn 40°C . Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K .

- A. 520,5 kJ B. 230,6 kJ C. 423,2 kJ D. 534,6 kJ


Câu 7: Trong hệ tọa độ (p, V) , hình nào sau đây là đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất p vào thể tích V của một khối lượng khí xác định khi nhiệt độ không đổi?




Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.


Câu 8: Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Khối lượng các phân tử khí có thể bỏ qua.
B. Các phân tử luôn tương tác với nhau.
C. Các phân tử được coi là chất điểm.
D. Va chạm của các phân tử khí với nhau là va chạm mềm.

Câu 9: Cho một khối lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái. Phương trình trạng thái về mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái: thể tích (V), áp suất (p), nhiệt độ Kelvin (T) của khối khí là

- A. $\frac{pV}{T} = \text{hằng số}$. B. $\frac{pT}{V} = \text{hằng số}$. C. $\frac{VT}{p} = \text{hằng số}$. D. $\frac{p}{VT} = \text{hằng số}$.

- Câu 10:** Một bình chứa khí lí tưởng neon (Ne) có khối lượng riêng là $1,4 \text{ kg/m}^3$. Biết căn bậc hai giá trị trung bình của các bình phương tốc độ phân tử khí $(\sqrt{v^2})$ là 450 m/s . Áp suất khí trong bình là
A. 967300 Pa. **B.** 94500 Pa. **C.** 65200 Pa. **D.** 632800 Pa.
- Câu 11:** Từ trường không tồn tại xung quanh
A. điện tích đứng yên. **B.** dòng điện.
C. nam châm. **D.** điện tích chuyển động.
- Câu 12:** Một khối lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái sao cho nhiệt độ không đổi. Áp suất của khối khí
A. tỉ lệ nghịch với thể tích. **B.** tỉ lệ thuận với thể tích.
C. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích. **D.** tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.
- Câu 13:** Gọi A và Q lần lượt là công và nhiệt lượng mà hệ nhận được. Độ biến thiên nội năng của hệ được tính bằng công thức nào sau đây?
A. $\Delta U = A + Q$ **B.** $\Delta U = A - Q$ **C.** $\Delta U = -A - Q$ **D.** $\Delta U = Q - A$
- Câu 14:** Một khối lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái sao cho áp suất không đổi. Gọi p_1, V_1, T_1 lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ ở trạng thái 1; p_2, V_2, T_2 lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ ở trạng thái 2. Hệ thức đúng là
A. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ **B.** $p_1 V_2 = p_2 V_1$ **C.** $\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_1}{V_2}$ **D.** $p_1 V_1 = p_2 V_2$
- Câu 15:** Rải đều các hạt sắt lên mặt trên của đáy hộp. Đặt hộp lên một thanh nam châm rồi gõ nhẹ vào thành hộp. Hình ảnh các đường hạt sắt xung quanh nam châm như hình bên được gọi là
A. từ trường. **B.** từ phổ.
C. điện phổ. **D.** điện trường.
- Câu 16:** Thả một đồng xu có nhiệt độ t_1 vào chậu nước có nhiệt độ t_2 . Năng lượng nhiệt được truyền từ chậu nước sang đồng xu khi
A. $t_1 > 2t_2$ **B.** $t_1 = 2t_2$
C. $t_1 < t_2$ **D.** $t_1 = t_2$
- Câu 17:** Gọi k là hằng số Boltzmann. Ở nhiệt độ $T(\text{K})$, động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng được tính bằng công thức nào sau đây?
A. $W_d = \frac{1}{3} kT$ **B.** $W_d = \frac{3}{2} kT^2$ **C.** $W_d = \frac{3}{2} kT$ **D.** $W_d = \frac{1}{3} kT^2$
- Câu 18:** Một khối khí lí tưởng có thể tích 10 lít ở 27°C . Giữ cho áp suất của khối khí không thay đổi, phải tăng nhiệt độ của khối khí lên đến bao nhiêu độ để thể tích của nó là 12 lít?
A. 87°C **B.** 300°C **C.** 60°C **D.** 360°C



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Khi bắt đầu chu kỳ nén của một động cơ đốt trong thì một trong các xi-lanh chứa không khí có $V_1 = 500 \text{ cm}^3$, áp suất $p_1 = 10^5 \text{ Pa}$ và nhiệt độ $t_1 = 27^\circ \text{C}$. Khi kết thúc chu kỳ, không khí đã được nén đến thể tích $V_2 = 45 \text{ cm}^3$, áp suất là p_2 và nhiệt độ $t_2 = 467^\circ \text{C}$. Biết khối lượng mol của không khí là 29 g/mol .
- a) Khối lượng không khí có trong xi-lanh là $58,6 \text{ mg}$.
b) Trong quá trình nén nhiệt độ không khí tăng thêm 440 K .

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

c) Mối liên hệ giữa các thông số trạng thái là

d) Áp suất khí cuối cùng chu kì nén là $27,4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Câu 2: Một học sinh sử dụng bộ thí nghiệm như hình 1 để tiến hành thí nghiệm khảo sát thể tích của một lượng khí xác định theo nhiệt độ của nó ở áp suất không đổi $1,5 \text{ bar}$ ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$). Học sinh này thu được kết quả như bảng sau:



Thể tích V (ml)	2,8	2,6	2,4
Nhiệt độ T (K)	350	325	300

a) Giá trị trung bình của tỉ số V/T là $6 \cdot 10^{-3} \text{ (ml/K)}$

b) Số mol khí sử dụng trong thí nghiệm là $1,20 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

c) Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa V và T có dạng như hình 2.

d) Thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.



Câu 3: Một chiếc xe tải vượt qua sa mạc Sahara. Chuyển đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là $3,0^\circ \text{ C}$ thì áp suất khí trong các lốp xe là $3,41 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến 42° C . Coi khí trong lốp xe là khí lí tưởng và có nhiệt độ như ngoài trời, thể tích của mỗi lốp xe không đổi là $1,50 \text{ m}^3$.

a) Nhiệt độ khi bắt đầu chuyển đi là 315 K .

b) Đến giữa trưa, áp suất của khí trong lốp xe là $3,89 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

c) Số mol khí trong mỗi lốp xe là 273 mol .

d) Các phân tử khí va chạm vào thành lốp gây ra áp suất khí lên lốp.

Câu 4: Người ta đun nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng (Copper) từ nhiệt độ ban đầu 30° C . Biết đồng có nhiệt độ nóng chảy là 1085° C , nhiệt dung riêng là 380 J/kgK , nhiệt nóng chảy riêng là $1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để nung nóng 2 kg đồng từ nhiệt độ ban đầu đến nhiệt độ nóng chảy là $801,8 \text{ kJ}$.

b) Ở nhiệt độ nóng chảy, nhiệt lượng cần cung cấp để 2 kg đồng nóng chảy hoàn toàn là $6,3 \cdot 10^4 \text{ J}$.

c) Khi đang nóng chảy, nhiệt độ của đồng không đổi và bằng 1085° C .

d) Khi nóng chảy các nguyên tử đồng nhận năng lượng để phá vỡ liên kết với các nguyên tử xung quanh.


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một người mỗi nhịp thở hít vào $0,50 \text{ lít}$ không khí ở áp suất 10^5 Pa và nhiệt độ 27° C . Biết khối lượng mol của không khí là 29 g/mol , không khí có $21,0\%$ số phân tử là oxygen.

Câu 1: Mỗi nhịp thở người này hít vào khối lượng không khí là bao nhiêu gam? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 2: Mỗi nhịp thở người này hít vào số phân tử oxygen là $x \cdot 10^{21}$. Giá trị của x là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)

Câu 3: Vành nhật hoa của mặt trời có nhiệt độ là $6 \cdot 10^5 \text{ K}$. Lấy hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/mol.K}$. Động năng tịnh tiến trung bình của



mỗi nguyên tử helium trong vùng này là $x \cdot 10^{-18} \text{ J}$. Giá trị của x là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phân mười)

Sử dụng thông tin sau cho Câu 4 và Câu 5 : Một quả bóng chuyên khí thi đấu có thể tích 4,85 lít và áp suất 1,3 atm. Sử dụng một cái bơm tay để bơm không khí vào bóng, mỗi lần bơm đưa được 0,63 lít không khí ở áp suất 1 atm vào bóng. Bơm chậm để nhiệt độ không đổi. Ban đầu trong bóng không có không khí.

Câu 4: Áp suất 1 atm tương ứng với $x \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Giá trị của x là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 5: Số lần bơm bóng là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 6: Đun 500 g nước đến 100°C thì nước sôi. Biết nước có nhiệt hóa hơi riêng là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Để hóa hơi hoàn toàn khối nước này ở 100°C thì nhiệt lượng cần cung cấp là $x \cdot 10^6 \text{ J}$. Giá trị của x là bao nhiêu?