

លំហាត់ ធម្មជាតិនៃលំនឹងគីមី




(អ្នកគ្រូ ចាន់ វាសនា ០១២ ៧៥ ១១ ៧៩)

សំណួរ

- ដូចម្តេចដែលហៅថា ប្រតិកម្មទៅមក ?
- តើលំនឹងគីមីកើតមាននៅពេលណា ?
- តើកន្សោមថេរលំនឹង K ប្រែប្រួលទៅតាមអ្វី ?

លំហាត់ទី១

ប្រតិកម្មនៃការបង្កើតបានជាអាម៉ូញាក់អាចសរសេរបានតាមច្រើនវិធី ៖



ចូរសរសេរកន្សោមថេរលំនឹងនៃប្រព័ន្ធប្រតិកម្មនីមួយៗ ខាងលើ ។

លំហាត់ទី២


គណនាថេរលំនឹង K នៃប្រព័ន្ធប្រតិកម្ម N_2 , O_2 និង NO នៅសីតុណ្ហភាព $1227^{\circ}C$

គេដឹងថាកំហាប់អង្គធាតុនីមួយៗ នៅពេលលំនឹងគីមីកើតឡើង ៖

$$[N_2] = 6.4 \times 10^{-3}M, [O_2] = 1.7 \times 10^{-3}M, [NO] = 1.1 \times 10^{-3}M$$

លំហាត់ទី៣

គេមានសមីការតុល្យការនៃប្រតិកម្មនៅសីតុណ្ហភាព $1227^{\circ}C$




នៅពេលដែលមានលំនឹងគីមី $[H_2] = 1.83 \times 10^{-3}M$, $[I_2] = 3.13 \times 10^{-3}M$

និង $[HI] = 1.77 \times 10^{-3}M$ ។ ចូរគណនាថេរលំនឹងនៃប្រតិកម្ម K ។

លំហាត់ទី៤

គេមានសមីការតុល្យការនៃប្រតិកម្មនៅសីតុណ្ហភាព $1227^{\circ}C$



នៅពេលដែលមានលំនឹងគីមី $[H_2] = [Cl_2] = 4.5 \times 10^{-3}M$ និង $[HCl] = 62.5 \times 10^{-3}M$ ។

ចូរគណនាថេរលំនឹងនៃប្រតិកម្ម K ។

លំហាត់ទី៥

គណនាកំហាប់ $[HI]$ នៅពេលលំនឹងដែលបានមកពីប្រតិកម្មរវាង I_2 ជាមួយ H_2 នៅសីតុណ្ហភាព

$425^{\circ}C$ ។ កំហាប់អង្គធាតុប្រតិករនៅពេលមានលំនឹងគីមី $[H_2] = [I_2] = 4.79 \times 10^{-4}M$ ។

គេឲ្យថេរលំនឹងនៃប្រតិកម្ម $K = 54.3$ ។




លំហាត់ទី៦

គេយក $0.2 mol$ ឧស្ម័ន H_2 ទៅលាយជាមួយ $0.3 mol$ នៃ CO_2 ដាក់ចូលទៅក្នុងដបមួយដែលមាន

ចំណុះ $1 L$ នៅសីតុណ្ហភាពកំណត់មួយ។ គេទុកល្បាយនេះរហូតដល់លំនឹងគេទទួលបាន $0.04 mol$ នៃទឹក ។

ក. គណនាថេរលំនឹងនៃប្រតិកម្ម ដែលត្រូវនឹងសមីការខាងក្រោមនេះ ៖



ខ. ចំពោះប្រតិកម្មខាងលើ ប្រតិកម្មណាជាប្រតិកម្មនាំមុខ ?

គ. តើលំនឹងគីមីប្រែប្រួលដូចម្តេច បើគេបង្កើនសម្ពាធ ?

ឃ. តើលំនឹងគីមីនឹងប្រែប្រួលតាមកត្តាអ្វីខ្លះ ?