



# 2019 年普通高等学校招生全国统一考试

## 文科数学全国卷三答案与解析

一、选择题: 本题考查基础知识和基本运算. 每小题 5 分, 满分 60 分.


1.  考点: 本题考查集合的交集

✓答案: A


 解析: 因为  $B = \{x | x^2 \leq 1\} = \{x | -1 \leq x \leq 1\}$ , 所以  $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$ .

\*点睛: 本题属于简单的集合运算

(安徽 贾彬)


2.  考点: 本题考查复数的运算性质

✓答案: D


 解析:  $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2(i-i^2)}{2} = 1+i$ .

\*点睛: 利用共轭复数的性质, 分母实数化.

(安徽 贾彬)


3.  考点: 本题考查简单的概率计算

✓答案: D


 解析:  $P = \frac{A_2^2 A_3^3}{A_4^4} = \frac{1}{2}$ .


\*点睛: 捆绑法解决相邻问题

(浙江 陈晓)

4.  考点: 集合的运算

✓答案: C

 解析: 如图所示,





\*点睛: 使用 Venn 图可以更加直观

(河南 时涛)

5.  考点: 本题考查三角函数

✓答案: B

 解析: 设  $y_1 = 2 \sin x$ ,  $y_2 = \sin 2x$ , 画出  $y_1, y_2$  的图像如图所示,



(第 5 题解析图)

函数  $f(x)$  的零点个数即为  $y_1$  与  $y_2$  的交点个数. 由图可知, 有 3 个交点, 故选 B.

**\*点睛:** 本题属于基础题, 将零点转化为交点是解决问题的关键.

(河北 焦子奇)

6. **☞考点:** 本题考查等比数列的基本量

**✓答案:** C

**☞解析:** 设  $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ , 根据题意,

$$\begin{cases} \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = 15, \\ a_1q^4 = 3a_1q^2 + 4a_1, \end{cases}$$

解得  $a_1 = 1, q = 2$ , 因此  $a_3 = 4$ .

**\*点睛:** 方程思想

(宜昌 李云皓)

7. **☞考点:** 本题考查利用导数研究函数的切线

**✓答案:** D

**☞解析:** 记  $f(x) = ae^x + x \ln x$ , 其导函数

$$f'(x) = ae^x + 1 - \ln x,$$

根据题意, 有

$$\begin{cases} f'(1) = ae + 1 = 2, \\ f(1) = ae = 2 + b, \end{cases}$$

解得  $a = e^{-1}, b = -1$ .

**\*点睛:** 基本初等函数的导数及其简单应用

(宜昌 李云皓)


8. **☞考点:** 本题考查空间直线的位置关系

**✓答案:** B

**☞解析:** 在  $\triangle BDE$  中,  $BM, EN$  为该平面直线, 故  $BM, EN$  相交非异面.

取  $BC$  中点  $O$ , 设  $AB = 2$ , 则  $EN = \sqrt{EO^2 + ON^2} = 2$ , 由  $BC \perp CD \Rightarrow BC \perp$  面

$CDE$ ,  $BE = BD = 2\sqrt{2}$ ,  $BM = \sqrt{BE^2 - EM^2} = \sqrt{7}$ . 故  $BM \neq EN$ .



(第 8 题解析图)

**\*点睛:** 也可以使用平行四边形四边对角线定理进行计算

(河南 时涛)

9. **☞考点:** 本题考查算法框图

**✓答案:** C

**🔍解析:** 由题意,

$$s = \sum_{i=0}^7 \left(\frac{1}{2}\right)^i = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^7}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^6}.$$

**\*点睛:** 本题实质是等比数列求和

(浙江 陈晓)

10. **☞考点:** 本题考查双曲线的几何形状

**✓答案:** B

**🔍解析:** 由题意, 不妨设点  $P$  在双曲线的右支上,  $F$  是右焦点,  $F'$  是左焦点. 由题意,  $|OP| = |OF| = |OF'| = 3$ , 所以  $\triangle PFF'$  为直角三角形. 设  $|PF'| = m$ ,  $|PF| = n$ , 则

$$\begin{cases} m - n = 2a = 4, \\ m^2 + n^2 = 36. \end{cases}$$

解得  $mn = 10$ . 所以  $S_{\triangle OPF} = \frac{1}{2} S_{\triangle PFF'} = \frac{1}{4} mn = \frac{5}{2}$ .

**\*点睛:** 合理使用几何性质, 解析几何不解析.

(浙江 陈晓)

11. **☞考点:** 本题考查二元一次不等式组及其平面区域, 简易逻辑

**✓答案:** A

**🔍解析:** 点  $(3, 3) \in D$ , 故命题  $p$  为真命题; 点  $(2, 9) \in D$ , 故命题  $q$  为假命题. 所以真命题为  $p \vee q$  和  $p \wedge \neg q$ .

**\*点睛:** 线性规划结合简易逻辑.

(浙江 陈晓)

12. 考点: 本题考查利用函数的单调性和奇偶性比较大小

✓答案: C

解析: 因为  $f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right) = f(\log_3 4)$ ,  $\log_3 4 > 1$ ,  $1 > 2^{-2/3} > 2^{-3/2} > 0$ , 又因为函数  $f(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减, 所以  $f(2^{-3/2}) > f(2^{-2/3}) > f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right)$ .

\*点睛: 本题要抓住函数的单调性和奇偶性, 并利用指数函数和对数函数的性质判断取值范围和比较大小关系.

(安徽 史飞)

二、填空题: 本题考查基础知识和基本运算, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 考点: 本题考查向量数量积的坐标运算

✓答案:  $-\frac{\sqrt{2}}{10}$

解析: 由题知,  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times (-8) + 2 \times 6 = -4$ ,  $|\mathbf{a}| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ ,  $|\mathbf{b}| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10$ , 所以

$$\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{-4}{2\sqrt{2} \times 10} = -\frac{\sqrt{2}}{10}$$

\*点睛: 熟记数量积的坐标表示

(安徽 贾彬)

14. 考点: 本题考查数列基本量计算, 等差数列前  $n$  项和

✓答案: 100

解析: 因为数列  $\{a_n\}$  是等差数列, 设数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ , 由题知

$$\begin{cases} a_1 + 2d = 5, \\ a_1 + 6d = 13, \end{cases}$$

解得  $a_1 = 1, d = 2$ . 所以

$$s_{10} = 10a_1 + \frac{10(10-1)}{2} \times d = 10 + 90 = 100.$$

\*点睛: 已知数列类型, 首先考虑性质简化, 其次基本量计算; 未知数列类型, 首先是否有明显特征可构造, 否则, 不完全归纳.

(安徽 贾彬)

15. 考点: 考查椭圆方程的几何性质与简单计算

✓答案:  $(3, \sqrt{15})$

解析: 由  $\triangle MF_1F_2$  为等腰三角形可知  $M$  是以  $F_1(-4, 0)$  为圆心, 以  $r = 2c = 8$  为半

径的圆  $(x+4)^2 + y^2 = 64$  上一个点. 又因为  $M$  为  $C$  上一点且在第一象限, 联立

$$\begin{cases} \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1 \\ (x+4)^2 + y^2 = 64 \end{cases}$$

解得  $M(3, \sqrt{15})$ .

**\*点睛:** 判断等腰三角形谁是底边是这道题的关键

(河南 林木)

16. **☞考点:** 本题考常见几何体的体积

**✓答案:** 118.8

**☞解析:** 根据题意, 有

$$\begin{aligned} V_{\text{模型}} &= V_{ABCD-A_1B_1C_1D_1} - V_{O-EFGH} \\ &= 6 \cdot 6 \cdot 4 - \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \right) \cdot 3 \\ &= 132 \text{ (cm}^3\text{)}, \end{aligned}$$

从而所需原料的质量为  $132 \cdot 0.9 = 118.8$  (g).

**\*点睛:** 解决简单的应用问题.

(宜昌 李云皓)

**三、解答题: 共 70 分.**

17. **☞考点:** 本题考查简单的统计

**✓答案:** 见解析

**☞解析:** (1) 由已知得  $0.70 = a + 0.20 + 0.15$ , 故

$$a = 0.35,$$

$$b = 1 - 0.05 - 0.15 - 0.70 = 0.10.$$

(2) 甲离子残留百分比的平均值的估计值为

$$2 \times 0.15 + 3 \times 0.20 + 4 \times 0.30 + 5 \times 0.20 + 6 \times 0.10 + 7 \times 0.05 = 4.05.$$

乙离子残留百分比的平均值的估计值为

$$3 \times 0.05 + 4 \times 0.10 + 5 \times 0.15 + 6 \times 0.35 + 7 \times 0.20 + 8 \times 0.15 = 6.00.$$

**\*点睛:** 读懂题意是关键

(浙江 陈晓)

18. **☞考点:** 本题主要考查正余弦定理, 两角和差公式, 三角形面积公式

**✓答案:** 见解析

解析: (1) 由题设及正弦定理得  $\sin A \sin \frac{A+C}{2} = \sin B \sin A$ . 因为  $\sin A \neq 0$ , 所以

$$\sin \frac{A+C}{2} = \sin B.$$

由  $A+B+C=\pi$ , 可得  $\sin \frac{A+C}{2} = \cos \frac{B}{2}$ . 故

$$\cos \frac{B}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2},$$

因为  $\cos \frac{B}{2} \neq 0$ , 故  $\sin \frac{B}{2} = \frac{1}{2}$ , 因此  $B=60^\circ$ .

(2) 由题设及(1)知  $\triangle ABC$  的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}a.$$

由正弦定理得

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{\sin(120^\circ - C)}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{2 \tan C} + \frac{1}{2}.$$

由于  $\triangle ABC$  为锐角三角形, 故  $0^\circ < A < 90^\circ, 0^\circ < C < 90^\circ$ . 由(1)知  $A+C=120^\circ$ , 所

以  $30^\circ < C < 90^\circ$ , 故  $\frac{1}{2} < a < 2$ , 从而  $\frac{\sqrt{3}}{8} < S_{\triangle ABC} < \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

因此,  $\triangle ABC$  面积的取值范围是  $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ .

※点睛: 正余弦定理及两角和差公式在解三角形中的灵活运用


(河北 宁现丰)

19. 考点: 本题考查空间点、线、面的位置关系, 空间角的求解.

✓答案: 见解析

解析: (1) 由已知得  $AD \parallel BE, CG \parallel BE$ , 所以  $AD \parallel CG$ . 故  $AD, CG$  确定一个平面, 从而  $A, C, G, D$  四点共面.

由已知得  $AB \perp BE, AB \perp BC$ , 故  $AB \perp$  平面  $BCGE$ . 又因为  $AB \subset$  平面  $ABC$ , 所以平面  $ABC \perp$  平面  $BCGE$ .



(第 19 题解析图)

(2) 取  $CG$  的中点  $M$ , 连接  $EM, DM$ . 因为  $AB \parallel DE, AB \perp$  平面  $BCGE$ , 所以  $DE \perp$  平面  $BCGE$ , 故  $DE \perp CG$ .

由已知, 四边形  $BCGE$  是菱形, 且  $\angle EBC = 60^\circ$  得  $EM \perp CG$ , 故  $CG \perp$  平面  $DEM$ . 因此,  $DM \perp CG$ .

在  $\text{Rt}\triangle DEM$  中,  $DE = 1, EM = \sqrt{3}$ , 故  $DM = 2$ . 所以四边形  $ACGD$  的面积为 4.

**\*点睛:** 垂直关系的证明是解决第(2)题的关键

(浙江 陈晓)

**20. 考点:** 本题考查含参函数在定义域内单调性, 闭区间函数极值、最值.

**✓答案:** 见解析

**解析:** (1) 函数  $f(x)$  的导函数为

$$f'(x) = 6x^2 - 2ax = 2x(3x - a)$$

若  $a = 0$ , 则当  $x \in \mathbf{R}$  时恒有  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  的单调递增区间是  $\mathbf{R}$ ;

若  $a < 0$ , 列表如下:

$x$	$(-\infty, \frac{a}{3})$	$\frac{a}{3}$	$(\frac{a}{3}, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

若  $a > 0$ , 列表如下:

$x$	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{a}{3})$	$\frac{a}{3}$	$(\frac{a}{3}, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

综上, 当  $a = 0$  时,  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增; 当  $a < 0$  时,  $f(x)$  在  $(\frac{a}{3}, 0)$  单调递减, 在  $(-\infty, \frac{a}{3}), (0, +\infty)$  单调递增; 当  $a > 0$  时,  $f(x)$  在  $(0, \frac{a}{3})$  单调递减, 在  $(-\infty, 0), (\frac{a}{3}, +\infty)$  单调递增.

(2) 当  $0 < a < 3$  时, 由(1)知,  $f(x)$  在  $(0, \frac{a}{3})$  单调递减, 在  $(\frac{a}{3}, 1)$  上单调递增, 于是

$$m = f\left(\frac{a}{3}\right) = -\frac{a^3}{27} + 2$$

$$M = \max\{f(0), f(1)\} = \begin{cases} 4 - a, & 0 < a < 2, \\ 2, & 2 \leq a < 3. \end{cases}$$

所以

$$M - m = \begin{cases} 2 - a + \frac{a^3}{27}, & 0 < a < 2, \\ \frac{a^3}{27}, & 2 \leq a < 3. \end{cases}$$

当  $0 < a < 2$  时, 可知  $2 - a + \frac{a^3}{27}$  单调递减, 所以  $M - m$  的取值范围是  $\left(\frac{8}{27}, 2\right)$ .

当  $2 \leq a < 3$  时,  $\frac{a^3}{27}$  单调递增, 所以  $M - m$  的取值范围是  $\left[\frac{8}{27}, 1\right)$ .

综上,  $M - m$  的取值范围是  $\left[\frac{8}{27}, 2\right)$ .

**\*点睛:** 合理对参数  $a$  进行讨论, 注意两问的联系.

(浙江 陈晓)

**21. 考点:** 本题考查直线与抛物线的位置关系

**✓答案:** 见解析

**解析:** (1) 设  $D\left(t, -\frac{1}{2}\right)$ ,  $A(x_1, y_1)$ , 则  $x_1^2 = 2y_1$ . 由于  $y' = x$ , 所以切线  $DA$  的斜率为  $x_1$ , 故

$$\frac{y_1 + \frac{1}{2}}{x_1 - t} = x_1,$$

整理得

$$2tx_1 - 2y_1 + 1 = 0.$$

设  $B(x_2, y_2)$ , 同理可得

$$2tx_2 - 2y_2 + 1 = 0.$$

故直线  $AB$  的方程为

$$2tx - 2y + 1 = 0.$$

所以直线  $AB$  过定点  $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ .

(2) 由(1)得直线  $AB$  的方程为  $y = tx + \frac{1}{2}$ . 联立

$$\begin{cases} y = tx + \frac{1}{2}, \\ y = \frac{x^2}{2}, \end{cases}$$



可得  $x^2 - 2tx - 1 = 0$ . 于是

$$x_1 + x_2 = 2t, x_1 x_2 = -1, y_1 + y_2 = t(x_1 + x_2) = 2t^2 + 1.$$

设  $M$  为线段  $AB$  的中点, 则  $M(t, t^2 + \frac{1}{2})$ . 由于  $\overrightarrow{EM} \perp \overrightarrow{AB}$ , 而  $\overrightarrow{EM} = (t, t^2 - 2)$ ,  $\overrightarrow{AB}$  与向量  $(1, t)$  平行, 所以

$$t + (t^2 - 2)t = 0.$$

解得  $t = 0$  或  $t = \pm 1$ .

当  $t = 0$  时,  $|\overrightarrow{EM}| = 2$ , 所求圆的方程为

$$x^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 4.$$

当  $t = \pm 1$  时,  $|\overrightarrow{EM}| = \sqrt{2}$ , 所求圆的方程为

$$x^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 2.$$

**\*点睛:** 同构式的灵活应用是解题的关键

(浙江 陈晓)

**22. 考点:** 考查坐标系与参数方程, 求极坐标方程, 求极坐标

**✓答案:** 见解析

**解析:** (1) 由题意知, 弧  $\widehat{AB}$  所在圆的直角坐标方程为  $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ , 由

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

化简得  $M_1$  的极坐标方程为

$$\rho = 2 \cos \theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{4}].$$

同理, 弧  $\widehat{BC}$  所在圆的直角坐标方程为  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ , 则  $M_2$  的极坐标方程为

$$\rho = 2 \sin \theta, \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}].$$

弧  $\widehat{CD}$  所在圆的直角坐标方程为  $(x + 1)^2 + y^2 = 1$ , 则  $M_3$  的极坐标方程为

$$\rho = -2 \cos \theta, \theta \in [\frac{3\pi}{4}, \pi].$$

(2) 由  $|OP| = \sqrt{3}$ , 设点  $P$  极坐标为  $(\sqrt{3}, \theta)$ , 联立

$$M_1: \begin{cases} \rho = 2 \cos \theta \\ \rho = \sqrt{3} \end{cases}, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right],$$

解得  $\theta = \frac{\pi}{6}$ , 故  $P\left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}\right)$ .

同理联立

$$M_2: \begin{cases} \rho = 2 \sin \theta \\ \rho = \sqrt{3} \end{cases}, \theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right],$$

解得  $\theta = \frac{\pi}{3}$  或  $\theta = \frac{2\pi}{3}$ . 故  $P\left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}\right)$  或  $P\left(\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ .

联立

$$M_3: \begin{cases} \rho = -2 \cos \theta \\ \rho = \sqrt{3} \end{cases}, \theta \in \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$$

解得  $\theta = \frac{5\pi}{6}$ , 故  $P\left(\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6}\right)$ .

综上,  $P$  点的极坐标为

$$P_1\left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}\right), P_2\left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}\right), P_3\left(\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3}\right), P_4\left(\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6}\right).$$

**\*点睛:** 此题着重考查对极坐标系的理解, 能够分类讨论, 具体问题具体分析.

(河南 林木)

**23. 考点:** 不等式求最值; 不等式的证明.

**✓答案:** 见解析

**✎解析:** (1) 因为  $x^2 + y^2 \geq 2xy$ ,  $y^2 + z^2 \geq 2yz$ ,  $z^2 + x^2 \geq 2zx$ , 三式相加得:

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx.$$

不等式两边同时加  $2xy + 2yz + 2zx$  得

$$(x + y + z)^2 \geq 3(xy + yz + zx)$$

所以

$$(x - 1 + y + 1 + z + 1)^2 \geq 3(x - 1)(y + 1) + 3(y + 1)(z + 1) + 3(z + 1)(x - 1).$$

因为  $x + y + z = 1$ , 所以

$$4 \geq 3[(x - 1)(y + 1) + (y + 1)(z + 1) + (z + 1)(x - 1)],$$

即

$$(x - 1)(y + 1) + (y + 1)(z + 1) + (z + 1)(x - 1) \leq \frac{4}{3}.$$

所以

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 \geq \frac{4}{3}.$$

(当且仅当  $x-1 = y+1 = z+1$  时, 等号成立)

(2) 由(1)知,

$$xy + yz + zx \leq \frac{(x+y+z)^2}{3}.$$

因为

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3},$$

所以

$$|x+y+z| \geq 1,$$

即

$$|(x-2) + (y-1) + (z-a)| \geq 1,$$

所以

$$\begin{cases} -2-a \geq 1, \\ -2-a \leq -1, \end{cases}$$

解得  $a \leq -3$  或  $a \geq -1$ .

**\*点睛:** 本题考查了排序不等式的相关内容, 在模拟题中往往以“零点分段讨论法”出现, 也提醒考生在备考时应全方位复习.

(河北 焦子奇)

排版: 浙江 陈晓

严禁用于商业用途, 转载请注明作者与出处!