

《高等微积分 2》第十三周作业

本次作业请在第十四周星期五 (5 月 22 日)24:00 点之前在网络学堂提交.

- 1 设 $C \subset \mathbf{R}^2$ 是光滑的闭曲线, 取逆时针方向 (定向). 假设 $(0,0) \notin C$, 计算第二型曲线积分

$$\int_C \frac{-(x^2y + y^3)dx + (x^3 + xy^2)dy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

- 2 定义曲面 S 为

$$S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, x + y + z = 1\},$$

取指向 z 轴正方向的定向 (或者用课本上的术语, 选定了曲面的上侧).

- (1) 计算第二型曲面积分

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy.$$

- (2) 设 S 的边界为 ∂S , 赋予边界的正定向. 计算第二型曲线积分

$$\int_{\partial S} z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz.$$

- 3 设曲面 S 位于平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 中, 赋予定向 $\mathbf{n} = (\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}})$. 证明:

$$\int_{\partial S^+} (Bz - Cy)dx + (Cx - Az)dy + (Ay - Bx)dz = 2\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \text{area}(S).$$

第 4 题需要用到如下事实: 设 f 在矩形区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 且有连续的偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial x}$. 对每个 $x \in [a, b]$, 定义函数 $g(x) = \int_c^d f(x, y)dy$, 则有 $g'(x) = \int_c^d \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dy$.

- 4 给定 $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$. 对于正数 r , 令 $C(r) = \{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\}$. 设 f 在区域 $D(R) = \{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R^2\}$ 上是光滑函数, 定义函数 $g(r)$ 为如下的第一型曲线积分

$$g(r) = \frac{1}{2\pi r} \int_{C(r)} f(x, y) ds, \quad \forall 0 < r \leq R,$$

其中 ds 表示弧长微元.

- (1) 利用前述事实, 证明: 对任何 $0 < r \leq R$, 有

$$g'(r) = \frac{1}{2\pi r} \int_{C(r)} -f_y(x, y) dx + f_x(x, y) dy,$$

其中 $C(r)$ 取逆时针定向.

- (2) 设 $x_0^2 + y_0^2 > R^2$. 计算 $\frac{1}{2\pi R} \int_{C(R)} \ln(x^2 + y^2) ds$.

- 5 考虑 $\mathbf{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ 上的向量场

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{M(x, y, z)^{3/2}}, \frac{y}{M(x, y, z)^{3/2}}, \frac{z}{M(x, y, z)^{3/2}} \right),$$

其中 $M(x, y, z) = (y + z)^2 + (z + x)^2 + (x + y)^2$.

- (1) 求 \mathbf{F} 的散度 $\nabla \cdot \mathbf{F}$, 其中对于向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 定义其散度为 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$.

- (2) 设 S 是单位球面 $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 取指向外面的定向. 计算第二型曲面积分

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{M(x, y, z)^{3/2}}.$$

- 6 设 S 是 \mathbf{R}^3 中光滑的定向曲面, 其定向由各点处的单位法向量

$$\mathbf{n}(x, y, z) = (\mathbf{n}_1(x, y, z), \mathbf{n}_2(x, y, z), \mathbf{n}_3(x, y, z))$$

描述. 我们假设 $\mathbf{n}(x, y, z)$ 在 S 的某个邻域中处处有定义, 是单位长度的, 且关于 (x, y, z) 是光滑变化的. 证明:

$$\int_{\partial S} (y\mathbf{n}_2 + z\mathbf{n}_3) dx - y\mathbf{n}_1 dy - z\mathbf{n}_1 dz = - \iint_S (y\mathbf{n}_3 - z\mathbf{n}_2)(\operatorname{div} \mathbf{n}) dS,$$

其中我们把 \mathbf{n} 的分量函数简记为 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3$, 用 $\operatorname{div} \mathbf{n}$ 表示 \mathbf{n} 的散度, 用 dS 表示面积微元, 对 S 的边界 ∂S 赋予边界正定向.