《离散数学》第三次作业

- 1 (1) 假设一年共 366 天, 随机的取 k 个人, 则其中存在两个人生日同月同日的概率 (记为 P_k) 是多少?
 - (2) 证明: 当 $2 \le k \le 366$ 时, 有

$$e^{-\frac{(k-1)k}{2(n-k+1)}} < 1 - P_k < e^{-\frac{(k-1)k}{2n}},$$

其中 n = 366.

(3) 已知 $P_k > \frac{1}{2}$, 求 k 的最小值.

(提示: 参考教材 2.5 节; 可搜索网页计算二次方程的根)

- 2 设 m 是正整数, t 是整数且满足 $0 \le t \le m$. 证明: 对于正数 $C \ge 1$, 如下两个命题成立:
 - (1) 如果 $t \ge \sqrt{m \ln C} + \ln C$, 则有 $\frac{C_{2m}^m}{C_{2m}^{m-t}} \ge C$;
 - (2) 如果 $t \leq \sqrt{m \ln C} \ln C$, 则有 $\frac{C_{2m}^m}{C_{2m}^{m-t}} \leq C$.
- 3 (1) 确定 Markov 不等式取等号的条件.
 - (2) 确定 Chebyshev 不等式取等号的条件.
- 4 设 Ω 是有限概率空间, E_1, \ldots, E_n 是一族事件 (即它们都是 Ω 的子集). 设 m 是给定的正整数, 定义

$$F = \{\omega \in \Omega | E_1, \dots, E_n$$
中至少有 $m \uparrow E_i$ 包含 $\omega \}$,

称之为"事件 E_1,\ldots,E_n 中至少 m 个发生"的事件. 证明:

$$P(F) \le \frac{P(E_1) + \dots + P(E_n)}{m}.$$

(提示: 对每个 $\omega \in \Omega$, 设 E_1, \ldots, E_n 中恰有 $d(\omega)$ 个 E_i 包含 ω . 利用交换求和的方法证明

$$\sum_{i=1}^{n} P(E_i) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{\omega \in \Omega, \omega \in E_i} p_{\omega} = \sum_{\omega \in \Omega} d(\omega) p_{\omega},$$

之后再模仿 Markov 不等式的证明方法即可.)

5 设 X 是概率空间 Ω 上的非负随机变量, 记 X 的期望为 $E[X] = \mu$. 定义随机变量 Y 为

$$Y(\omega) = \begin{cases} X(\omega), & \text{mR}X(\omega) > \frac{\mu}{2}, \\ 0, & \text{mR}X(\omega) \leq \frac{\mu}{2}. \end{cases}$$

- (1) 证明: $E[Y] \ge \frac{1}{2}E[X]$.
- (2) 设正数 M 是 X 的一个上界,即满足对每个 $\omega \in \Omega$ 都有 $X(\omega) \leq M$. 证明: $P(X > \frac{1}{2}\mu) \geq \frac{1}{2M}E[X]$.

(提示: 记 $A = \{\omega | X(\omega) > \frac{\mu}{2}\}, B = \Omega \setminus A$, 则有

$$E[X] = \sum_{\omega \in A} X(\omega) p_{\omega} + \sum_{\omega \in B} X(\omega) p_{\omega} \le E[Y] + \frac{\mu}{2} P(B) \le E[Y] + \frac{\mu}{2},$$

其中最后一步用到了 $\mu \geq 0$.)