HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа


ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Признаки вялого пищеварения, и почему они возникают

Причины формирования вялого типа пищеварения

1. Хронический стресс, переутомление, хроническое нарушение режима – недостаток сна, позднее засыпание
2. Сидячий образ жизни, гиподинамия, нарушение осанки
3. В питании: избыток холодной пищи, сладкого, тяжёлого, мучного, еды с обволакивающими свойствами
4. Строгие диеты, формирующие дефициты: витамины группы В, особенно В1, магний, железо, цинк



5. Малое содержание в питании жиров, клетчатки, горечей, кислого вкуса, ферментированных продуктов, экстрактивных веществ
6. Привычки: регулярное переедание, еда на ночь, лежать и мало двигаться после приёмов пищи, купание в холодной воде
7. Длительно протекающие хр. воспалительные процессы органов ЖКТ (гастриты различных типов)
8. Бариатрическая операция
9. Вторичные: гипофункция щитовидной железы, депрессия, вегетативная дисфункция, неврозы, сахарный диабет 2-го типа
10. Приём лекарств: антациды, ИПП, антидепрессанты, бета-блокаторы и пр.
11. Старение
12. Конституционный тип с преобладанием доша Слизь / Капха

Что означают ваши **жалобы**?

Тонкий белый налёт на языке	Замедленное переваривание пищи в ЖКТ. Нарушение микробиома ЖКТ и полости рта
Отпечатки зубов на языке	Отёчность из-за сниженной функции поджелудочной и щитовидной желёз





Тяжесть после еды.


Ощущение медленного переваривания пищи.

Ощущение переполненности желудка после еды

Замедленная эвакуация пищи из желудка из-за нарушения моторики и секреции пищеварительных соков.

Часто – пониженная кислотность желудочного сока.

Возможные диагнозы: функциональная диспепсия, гастриты различного типа, атрофия, гастропарез (замедленное опорожнение желудка)



HOLISTICA DOC


Отрыжка	Несмыкание нижнего пищеводного сфинктера. Возможные причины: повышение внутрибрюшного давления и ГЭРБ, замедленная эвакуация пищи из желудка, сниженная кислотность
Изжога после мучного, сладкого, крахмалистого	Рефлюкс желудочного содержимого в пищевод. Возможные диагнозы: ГЭРБ, пониженная кислотность, гастропарез
Слабые тянущие или ноющие боли в животе	Функциональная диспепсия (с гиперчувствительностью)


Слабые тупые боли
в правом подреберье

Нарушение оттока желчи, особенно при сниженной двигательной активности желчного пузыря.

Возможные диагнозы: дискинезия желчевыводящих путей (гипокинетическая форма), сладж (застой) в желчном пузыре, хронический холецистит без камней.


Риски формирования камней желчного пузыря





HOLISTICA DOC


Вздутие живота вскоре после еды, особенно на смешанную пищу, обильную трапезу, прохладные напитки, жирную и белковую пищу




Не хватает ферментов поджелудочной железы, кишечника.


Возможные причины и диагнозы:

- нарушение желчеоттока
- снижение функции поджелудочной железы из-за хр. панкреатита, структурных изменений
- врождённые или приобретённые дефекты синтеза кишечных ферментов и наличие пищевых непереносимостей




Регулярное вздутие живота во 2-й половине дня	Нарушение моторики кишечника, гиперчувствительность кишечника, нарушение микробиома – проблемы с обработкой клетчатки. Возможные диагнозы: СРК, дисбиоз






Запор: • атонический • спастический	Нарушение моторики кишечника, нарушение микробиома. Нарушения в питании и образе жизни: недостаток клетчатки, жидкости, ферментированных продуктов; стресс, гиподинамия и т. д.
Диарея, несформированный стул	Недостаток ферментов тонкой кишки и поджелудочной железы

Газообразование от клетчатки (яблоки, зелень, капуста)	Избыток грубой клетчатки. Нехватка ферментов для расщепления клетчатки, гиперчувствительность кишечника. Возможные причины: чувствительный тип пищеварения / СРК, нарушение микробиома





Тошнота на жирную / белковую пищу	Медленная эвакуация пищи из желудка, гастропарез. Плохое переваривание жиров при недостатке ферментов или дискинезии желчевыводящих путей. Плохое переваривание белков из-за нарушения работы желудка
Тошнота от голода или стресса	Признак чувствительного типа пищеварения. Нейрогастроэнтерологичес-кие нарушения