HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Вздутие живота, и что с ним делать – часть 1

Причины вздутия



I. Физиологические / анатомические причины



1. Аэрофагия (заглатывание воздуха)

Что происходит? Воздух скапливается в желудке и верхних отделах кишечника, вызывая чувство распирания. В небольших количествах аэрофагия – физиологична.

Иногда возникает при быстром приёме пищи, жевании жвачки, курении, разговоре во время еды.

Что делать? Есть спокойно, неторопливо, отказ от вредных привычек.

2. Замедленное опорожнение желудка (гастропарез), замедленный кишечный транзит (атоничный кишечник)

Что происходит? Задержка пищи в желудке (диспепсия, атрофический гастрит и пр.) → чувство тяжести и распирания.

Замедление транзита пищи по кишечнику → запоры, снижение моторики → задержка газов и пищевого комка → вздутие.

Что делать? Использовать методики программы:

- специи-прокинетики (см. урок по специям)
- баланс питательных веществ в рационе: баланс белков и жиров, достаточно клетчатки
- устранение воспаления
- методы восстановления моторной функции ЖКТ: ГКВ / ТКВ, сочетания продуктов, напитки со специями и травами и т. д.

3. Непроходимость кишечника

Что происходит? при опухолях, спайках, инородных телах в кишечнике замедляется транзит пищи. **Симптомы:** боль, рвота, задержка стула, выраженное вздутие.

Что делать? Госпитализация.

Может быть из-за употребления большого количества продуктов с вяжущими свойствами (например, если употреблять много хурмы).



Причины вздутия



II. Пищевые причины и недостаток ферментов

1. Не хватает ферментов поджелудочной железы
2. Избыток или непереносимость фруктозы
3. Целиакия и нецелиакийная чувствительность к глютену
4. Лактозная непереносимость
5. Плохо усваиваиваются FODMAP-продукты




HOLISTICA DOC

Не хватает ферментов поджелудочной железы

Панкреатическая недостаточность: недостаточное количество амилазы, липазы, протеаз (трипсин, химотрипсин).

Причины: общее снижение переваривающей способности органов ЖКТ с возрастом, хронический панкреатит, инфекции, побочные эффекты от лекарственной терапии, сахарный диабет и т. п.



Характерные симптомы:

1. Вздутие: через 30–60 минут после еды
2. Метеоризм
3. Диарея
4. Изменение стула: жирный, светлый, липкий
5. Тошнота после еды
6. Дефициты питательных веществ
7. Помогает приём ферментов

Общая стратегия коррекции недостатка ферментов:

1. Базовые правила питания для вашего типа пищеварения
2. Правила кулинарной обработки и формирования меню
3. Сочетания продуктов
4. ГКВ / ТКВ
5. Специи
6. Поддержка желчеоттока

Отвар чёрного кардамона

Чёрный кардамон –семена тропического растения *Amomum subulatum.*

Активные вещества: камфен, борнеол, эвкалиптол, танины, лимонен.

Аромат и вкус: копчёный, древесный, смолистый, похож на чернослив.

Основное показание: экзокринная недостаточность поджелудочной железы.

- Выражено усиливает секрецию ферментов!
- Уменьшает вздутие и газообразование
- Противодиарейное и вяжущее действие



Отвар чёрного кардамона

Внимание! Обладает выраженно «согревающим» действием, активно стимулирует выработку ферментов.

Нельзя: воспаление в поджелудочной железе, рецедивирующий панкреатит, воспалительные заболевания кишечника!

Измельчаем чёрный кардамон вместе со шкуркой до фракции «мелколистовой чай».

Берём 1/3 чайной ложки без горки, завариваем в 200 мл горячей кипячёной воды, настаиваем 10 минут, пьём в тёплом виде 1–2 раза в день – перед завтраком и/или перед ужином.

При выраженном дефиците ферментов можно пить отвар кардамона как второй пищеварительный: первый – завтрак, второй – ужин.

HOLISTICA DOC

Избыток или непереносимость **фруктозы**














Фруктоза – это простой сахар, который естественно содержится во фруктах, мёде и некоторых овощах. Самый сладкий натуральный сахар!
В отличие от глюкозы фруктоза всасывается в кишечнике медленно, через транспортный белок GLUT-5.





Вздутие возникает, если мы:

1. Едим слишком много фруктозы
2. Имеем непереносимость фруктозы (снижено количество фруктозы, которую мы можем усвоить)

Здоровый человек может усвоить до 25 г фруктозы за раз (примерно 2 крупных яблока).

Люди с непереносимостью фруктозы могут усвоить не более 5–10 г за 1 раз (100–200 г яблока).

Анализы на непереносимость фруктозы: водородный дыхательный тест (ложноположительные результаты при синдроме избыточного бактериального роста (SIBO).

HOLISTICA DOC

Сорбитол: дополнительные трудности

Сорбитол – сахарный спирт, который содержится во фруктах и овощах.

Входит в состав жевательных резинок, диетических продуктов, леденцов, сиропов. На упаковках сорбит: Sorbitol, E420, сахарные спирты.


Безопасная доза при здоровом ЖКТ – до 10 г сорбита (2 яблока).



Сорбитол: дополнительные трудности

У людей с синдромом раздражённого кишечника и непереносимостью фруктозы сорбитол вызывает вздутие, метеоризм, боли в животе, тошноту и диарею:

- конкурирует с фруктозой за всасывание и ухудшает её переносимость
- задерживает воду в кишечнике, может вызывать диарею



Содержание фруктозы и сорбитола
(в г/100 г продукта)

Фрукт / ягода	Фруктоза (г)	Сорбитол (г)
Финики (сухие)	31,0	0,5
Изюм	30,0	0,6
Инжир (сухой)	23,0	0,8
Курага	12,0	0,4
Чернослив	15,0	2,1
Виноград	7,6	0,2
Груша	6,2	2,6
Яблоко	5,9	1,2
Банан	4,9	0,5
Киви	4,0	0,3
Черешня	4,0	1,5

Содержание фруктозы и сорбитола
(в г/100 г продукта)

Фрукт / ягода	Фруктоза (г)	Сорбитол (г)
Черника	3,0	0,2
Арбуз	3,4	0,2
Клубника	2,0	0,2
Вишня	2,0	0,3
Апельсин	2,2	0,2
Слива	1,5	2,1
Персик	1,5	1,5
Малина	1,5	0,3
Нектарин	1,6	0,7
Грейпфрут	1,6	0,2
Абрикос	0,9	0,3

Безопасные дозы любимых фруктов и ягод ПРИ ЗДОРОВОМ ЖКТ	Доза в граммах
Арбуз	800
Черешня	600
Слива	500
Яблоко	400
Груша	400



Как **уменьшить вздутие** от фруктозы и сорбитола?

- Лучше всего переносятся ягоды (малина, черника, клубника), цитрусовые, абрикосы
- В разумных пределах есть продукты с высоким содержанием фруктозы и сорбита: яблоки, груши, черешня, арбузы, сливы, фруктовые соки
- Не есть больше 30–40 г сухофруктов за 1 раз
- Избегать продуктов с добавленной фруктозой и сорбитом



Сочетание высокого количества глюкозы и фруктозы во фруктах переносится лучше из:

- винограда
- фиников
- инжира
- манго
- банана
- личи



Сочетать фрукты с тёплыми напитками: ГКВ, компот, морс и пр.

Использовать специи – стимуляторы синтеза ферментов: имбирь, чеснок, тмин, куркума.

Термическая обработка фруктов: запекание, компот и т. п. Количество фруктозы не уменьшается, но она легче усваивается.

Целиакия и нецелиакийная **чувствительность к глютену**

Целиакия – это аутоиммунное заболевание, при котором глютен (белок пшеницы, ржи, ячменя и др.) вызывает повреждение слизистой тонкого кишечника, сопровождающееся воспалением кишечника, атрофией ворсинок энтероцитов. Обычно развиваются дефициты питательных веществ (железо, белок и пр.), сильная усталость, сыпь на коже (герпетиформный дерматит), кишечные симптомы: боли, вздутие, метеоризм, диарея / запоры и т. д.




Раньше считалось, что целиакия обнаруживается в младенчестве после введения прикорма.

Точка зрения научного сообщества сейчас: целиакия может быть обнаружена в любом возрасте, так как может протекать почти бессимптомно или маскироваться под другие проблемы.

Триггеры активизации симптомов: инфекции ЖКТ, беременности и роды, операции, сильный стресс, гормональные изменения (в менопаузе), длительная хроническая нагрузка на иммунную систему другим аутоиммунным заболеванием.

Иногда целиакия протекает совсем бессимптомно, единственным признаком может быть остеопороз или необъяснимая анемия.



Диагностика

Антитела к тканевой трансглутаминазе tTG-IgA + антитела к эндомизию Anti-EMA. Достоверность = более 90 %.

Дополнительно: ФГДС с биопсией тонкой кишки.

Очень важно: не исключать глютен перед анализами, иначе тесты могут дать ложноотрицательный результат.



Нецелиакийная чувствительность к глютену (НЦЧГ) – неаутоиммунная и неаллергическая реакция на глютен, при которой нет повреждения кишечника, но есть функциональные симптомы после его употребления. Появляются через 1–24 ч после еды:

- вздутие
- тяжесть в животе
- метеоризм
- иногда – мозговой туман, утомляемость, тревожность

Важно! При НЦЧГ анализы будут в норме, а симптомы непереносимости глютена будут!

Целиакия = 1–2 %. НЦЧГ = +/- 13 %. Суммарно не переносят глютен = +/- 15 % людей.

Простой алгоритм теста на целиакию / НЦЧГ:

1. При подозрении – строгое исключение глютена на 2–3 недели.

   Наблюдать за ЖКТ и общим самочувствием: если симптомы остались, значит, дело не в глютене. Смотрим на другие причины вздутия и др.

2. Если симптомы ушли, вводим глютен обратно и сдаем анализы.

   Если анализы подтверждают целиакию + вернулись симптомы = целиакия. Исключаем глютен навсегда.

   Если анализы не подтверждают целиакию + вернулись симптомы = НЦЧГ. Исключаем глютен на 8–12 недель. Занимаемся пищеварением. Затем можно попробовать потихоньку вернуть глютен.

В любом случае (есть целиакия или НЦЧГ или нет) помогаем ЖКТ вырабатывать достаточно ферментов:

- базовые правила питания для вашего типа пищеварения
- правила кулинарной обработки и формирования меню
- сочетания продуктов
- ГКВ / ТКВ
- специи



Крупы, содержащие глютен	Безглютеновые крупы
Пшеница: твёрдая, мягкая, булгур, кускус, манка **Ячмень:** перловка, ячневая крупа **Рожь:** хлеб и каши изо ржи **Полба** (спельта) **Сейтан** **Овсянка:** содержит авенин – белок, похожий на глютен. В 5–10 % – перекрёстная реакция	**Рис** **Гречка** **Киноа** **Кукуруза** **Амарант** **Лён** **Просо** (пшено)

Могут содержать глютен, читайте состав!

Соусы и заправки: соевый соус, терияки, кетчуп, горчица

Полуфабрикаты: котлеты, наггетсы, зразы

Колбасы и мясные изделия: сардельки, сосиски, паштеты, фарш (могут содержать пшеничный крахмал, панировку)

Сладости и десерты: печенье, шоколад, мороженое, карамель, начинки (могут содержать глютен как загуститель или наполнитель)

Йогурты и творожки: со злаками, печеньем

Консервы: рагу, тушёнка, готовые супы – могут загущаться пшеничной мукой

P.S.: Иногда переносимость глютена зависит от **степени обработки крупы**: чем более обработанная и измельчённая крупа – до муки тонкого помола, тем больше проявлений.

Лактозная непереносимость

Лактозная непереносимость – неспособность организма переваривать лактозу (молочный сахар) в молоке и молочных продуктах из-за дефицита или отсутствия фермента лактазы.

Симптомы (через 30 минут – 2 часа после употребления молочных продуктов):

- вздутие живота, метеоризм
- бурление в кишечнике
- боль и спазмы в животе
- диарея (часто водянистая)
- тошнота



Причины: генетическое снижение лактазы с возрастом, вторичные – инфекции ЖКТ, целиакия, ВЗК, приём лекарств.

Лактозная непереносимость

Интенсивность непереносимости зависит от:

- количества съеденной лактозы
- степени дефицита лактазы

Здоровый взрослый человек способен переварить 25–50 г лактозы за раз. Человек с частичной непереносимостью может переварить +/- 5–7 г лактозы за раз.



Продукт	Количество лактозы на 100 г
Молоко (коровье, цельное)	4,7–5,0
Молоко козье	4,5–4,8
Сливки 10 %	3,0–4,0
Сгущённое молоко с сахаром	10–12
Ряженка, варенец	4,0–4,5
Кефир, йогурт	2,5–4,0
Греческий йогурт	2,0–3,0
Простокваша	2,5–3,5
Сметана 15 %	2,5–3,0
Творог (5–9 %)	2,7–3,2
Твёрдые сыры	0,1–1 – практически не содержат лактозы



Правила хорошего переваривания молочных продуктов при частичной переносимости:

- можно использовать безлактозные молочные продукты
- следим за количеством!
- предпочтительны кисломолочные продукты (меньше лактозы)
- лёгкие сочетания продуктов
- молоко: пить в горячем виде с куркумой + мёдом (по желанию)

HOLISTICA DOC

Плохо усваиваются FODMAP-продукты

FODMAP = Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccharides And Polyols – группа короткоцепочечных углеводов и сахарных спиртов, которые могут плохо перерабатываться и всасываться в тонком кишечнике и при попадании в непереваренном виде в толстую кишку вызывать вздутие живота, боли, спазмы в животе, диарею или запоры.



Monosaccharides / моносахариды	Фруктоза
Яблоки, груши, арбуз, черешня и др.	

Disaccharides / дисахариды	Лактоза
Молоко и кисломолочные продукты	

Polyols / полиолы	Сорбит, маннит, ксилит, мальтит, эритрит
Фрукты и сухофрукты: яблоки, груши, сливы и чернослив, абрикосы и курага, персики, нектарины, вишня, арбуз, манго Овощи: болгарский перец, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, грибы, артишоки, сельдерей, бамия Жевательные резинки без сахара, диабетические сладости, леденцы, пастилки, протеиновые батончики	

Oligosaccharides / олигосахариды	Фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды
Чеснок: сырой, варёный, сушёный Лук: репчатый, красный, зелёный, порей, шалот Капустные: брокколи (ствол), цветная капуста, брюссельская капуста Артишоки Спаржа Репа Бамия Бобовые: нут, чечевица (разные виды), фасоль (разные сорта), горох зелёный и жёлтый, соевое молоко (на тофу – меньше реакция) Пшеница (все виды круп и макаронных изделий), рожь, ячмень Продукты с добавкой инулина: батончики, йогурты и напитки с пребиотиками, протеиновые порошки Цикорий корень (напиток) Топинамбур	

Реакция может быть только на какой-то вид FODMAP, либо на все!

- Проблемы с фруктозой возникают при избыточном потреблении и если её больше, чем глюкозы
- Лактоза вызывает симптомы при дефиците лактазы
- Олигосахариды не перевариваются у всех людей, даже у здоровых, но вызывают симптомы только у чувствительных
- Полиолы в больших дозах могут вызвать брожение и диарею даже у здоровых людей



HOLISTICA DOC



Как FODMAP вызывают симптомы?

1. Плохо всасываются в тонком кишечнике
2. Притягивают воду → разжижение стула
3. Попадают в толстый кишечник → брожение бактериями → газы, вздутие
4. У людей с чувствительным кишечником это вызывает боль, урчание, спазмы

Особенно часто встречается при СРК, висцеральной гиперчувствительности, после инфекций кишечника.

HOLISTICA DOC


Тактика выявления и устранения **FODMAP-непереносимости**

Фаза 0 – наблюдение: 1–2 недели

Ведём пищевой дневник и наблюдаем, после приёмов пищи с какими продуктами появляются вздутие, метеоризм, боли в животе, диарея.

Если среди них есть FODMAP-продукты, переходим к фазе 1.

Помним, что проблемы могут быть не из-за FODMAP, а из-за их переедания, особенно фруктозы и полиолов.



HOLISTICA DOC

Фаза 1 – исключение: 2–4 недели

Исключаем FODMAP-продукты. Диета должна быть строгой и полной в этот период, иначе фаза неинформативна.

Если выявили чёткую реакцию только на 1 группу продуктов, можно исключить только её.



Фаза 2 – тестирование: 6–8 недель

Определяем, какие именно группы FODMAP вызывают реакцию. Вводится одна группа FODMAP за раз, например:

1. **Олигосахариды:** чеснок, лук, спаржа, чечевица, нут
2. **Лактоза:** молоко, йогурт
3. **Фруктоза:** яблоки, груши
4. **Полиолы:** грибы, болгарский перец, сельдерей

Каждая группа тестируется **поэтапно**:

- день 1: маленькая порция продукта
- день 2: средняя порция
- день 3: большая порция
- дни 4–5: перерыв, наблюдение за реакцией

Если появляется вздутие, боль, диарея – тест прекращается. Результаты фиксируются в пищевом дневнике.

Фаза 3 – адаптация: долгосрочная

В рацион возвращаются только переносимые группы / продукты. Минимизируются или исключаются проблемные. Формируется полноценное питание с белками, жирами, клетчаткой в достаточном количестве, витаминами и др.

Даже разрешённые продукты могут давать реакцию при переедании!

Что облегчает переваривание FODMAP в любом случае:

- умеренное количество продукта
- лёгкие сочетания
- в горячем виде, с супами и другими лёгкими блюдами
- специи