HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Еда: какая делает мне хуже, а какая – лучше?

Что мешает работе ЖКТ при чувствительном пищеварении?

- Много холодной воды и напитков
- Много сырых продуктов в рационе
- Избыток грубой клетчатки без термической обработки: сырые листовые овощи, зелень, проростки круп и бобовых, капуста, редис, редька, стебель сельдерея. Различные овощи, фрукты и ягоды с грубой шкуркой: болгарский перец, яблоки, виноград, груши, айва, крыжовник и пр.





Что мешает работе ЖКТ при чувствительном пищеварении?

- Много смузи, соков
- Недостаток белка и жиров в рационе
- «Глушить» голод вместо еды, кусочничать
- Неравномерное питание
- Избыток горечей (кофе, крепкий чай)
- Избыток орехов, семечек (жесткая структура, трудно перевариваются из-за высокого содержания жиров, высокое содержание нерастворимой клетчатки)





А также то, что **тормозит** моторику и секрецию пищеварительных соков в ЖКТ (формирует вялый тип)



- Переедание
- Смешение большого количества разных продуктов в 1 приём пищи (как во время застолий)
- Жиры в холодном виде (жирные закуски, салаты с майонезом, остывшее жирное мясо, смузи с кокосовым молоком и пр.)
- Холодная, пригоревшая пища, пища с жареной корочкой
- Питьё холодных напитков до, во время и после еды



А также то, что **тормозит** моторику и секрецию пищеварительных соков в ЖКТ (формирует вялый тип)

- Мясные продукты – переработанные, длительного хранения, высокой жирности (колбасы, копчёности, свинина, сало)
- Продукты высокой степени переработки и очистки (низкая питательная плотность, мало клетчатки, много простых сахаров): бургеры, чипсы, картофель фри, сладкие газировки и пр.





А также то, что **тормозит** моторику и секрецию пищеварительных соков в ЖКТ (формирует вялый тип)



- Старые мягкие корнеплоды: картофель, свёкла, морковь и пр.
- Бобовые, которые трудно перевариваются: горох, зелёная (коричневая) чечевица, урад-дал
- Молочные продукты: сырые, холодные, высокой жирности – молоко холодное, жирный творог и сметана, мороженое, зрелые сыры, йогурт с сахаром и фруктами
- Сладости в избытке: белый и коричневый сахар, кукурузный и рисовый сироп, фруктоза, шоколад молочный



Что **помогает** восстановить слизистую ЖКТ?

Глутамин (в форме L-глутамина и глутаминовой кислоты): способствует росту клеток кишечника, объёму и весу слизистой оболочки ЖКТ, защищает её от атрофии, улучшает барьерную функцию. Глутамином богаты:

- постные части говядины (бедро, вырезка, лопатка)
- грудка и бедро курицы, индейки (без кожи)



Что **помогает** восстановить слизистую ЖКТ?

- Бульоны из мяса и птицы из сухожилий и соединительной ткани (например, позвоночник, бычий хвост, голень говядины и птицы)
- Белок яйца
- Тунец, лосось, треска, сардины, сельдь и др. виды рыбы
- Соевые бобы, тофу, приготовленные чечевица, нут, фасоль, пшеница (булгур и др.)



Что **помогает** восстановить слизистую ЖКТ?



Жиры:

- ненасыщенные жирные кислоты: омега-3 из жирной океанической рыбы, льняное масло
- фосфолипиды (тофу, яичный желток)
- мононенасыщенные жиры (оливковое масло, авокадо)
- насыщенные жиры в умеренном количестве (топлёное масло, кокосовые продукты)
- источники витамина А (ретинол и бета-каротин): печень, морковь, тыква, сладкий перец, зелень
- источники витамина Е: нерафинированные растительные масла (включая облепиховое), орехи, семечки

Что **помогает** восстановить слизистую ЖКТ?

Синтез короткоцепочечных жирных кислот:

1. Больше растворимой клетчатки:
   - овсянка, ячмень, лён, чечевица
   - овощи – морковь, батат, тыква, баклажан, брокколи, свёкла
   - фрукты и ягоды (можно в приготовленном виде): яблоки, груши, инжир
   - псиллиум, чиа
   - охлаждённый картофель, рис (резистентный крахмал)







Что **помогает** восстановить слизистую ЖКТ?

2. Разнообразить растительный рацион: разные волокна = разнообразие микробиоты
3. Продукты с пробиотиками: кисломолочные продукты, квашеные овощи, мисо



Полезные продукты и блюда

Сбалансированный по нутриентам рацион



	Белок	Жиры	Углеводы
Общая пропорция в рационе	25 %	30–35 %	40–45 %

Основа рациона – супы и костно-мясные бульоны

(горячая, жидкая, легкоусвояемая пища, содержащая глутамин и другие аминокислоты, жиры; благодаря овощам – синтез КЦЖК)

Бульоны из говядины, птицы, баранины, рыбы (смесь жирной и нежирной) (кроме глутамина, содержат ещё и экстрактивные вещества, помогающие переварить другую еду).

Для вегетарианцев – мисо-супы, супы с бобовыми.



Животный белок

Субпродукты: печень, сердечки, желудочки, язык и пр.

Говядина

Птица: перепёлка, курица, индейка, утка, гусь.

Кролик

Рыба – любая, и жирная, и нет (опирайтесь на то, как вы перевариваете жиры): лосось, форель, скумбрия, треска, нерка, кижуч, кета, дорадо, сибас и пр.

Морепродукты

Яйца



Бобовые

Кичари рис + зелёный маш, зелёный маш + киноа, рис + чечевица и пр.

Тофу, темпе, мисо.

Зелёный маш.

Лёгкие виды чечевицы (оранжевая, жёлтая, чёрная).

Пюре из нута, фасоли и других бобовых.



Жиры

Растительные масла:
льняное, оливковое, нерафинированные масла семечек и косточек.

Авокадо

Масло MCT

Кокосовое масло и молоко
(противовоспалительные кислоты)

Гхи

Сливочное масло

Топлёный животный жир
(утки, баранины)



Злаки

Овсянка долгой варки и толокно

Пшеница твердых сортов (булгур, макаронные изделия, кускус)

Рис басмати, жасмин

Лён

Гречка

Киноа

Амарант



Молоко и кисломолочные продукты

Горячее кипячёное молоко со специями: куркума, зелёный кардамон.

Тёплые кисломолочные продукты (йогурт, ряженка, творог).

Приготовленные кисломолочные продукты: запеканка, панир.



Овощи

Можно использовать любые:
70 % приготовленных, 30 % сырых.

Во время обострений чувствительности ЖКТ –
90% приготовленных, 10% сырых.

Ограничивать в сыром виде: все виды капусты, редьку, дайкон, много моркови, зелёную фасоль.

При особенно чувствительной слизистой (изжога и боли в животе на жгучий и кислый вкусы):
не использовать томаты, лук, чеснок, редис, лук перо, хрен, рукколу, щавель.




Фрукты

Любые приготовленные фрукты – печёные, в компоте.

Фрукты сладкого вкуса: абрикос, банан, гранат сладких сортов, груша с мягкой шкуркой, инжир, манго, персик, слива.

Любые сладкие ягоды в небольших количествах: малина, голубика, черника и т. д.



Орехи, семечки, урбечи

В умеренном количестве, не более 30–40 г в день.

Сладости

Мармелад, пастила (по переносимости кислого вкуса). Тростниковый или кокосовый сахар. Сиропы из ягод, шиповника, кленовый, топинамбура и пр. Халва, кэроб. Сухофрукты со сладким вкусом: финики, курага, чернослив.

