HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Заживляем слизистую: дополнительные меры

Меры для восстановления слизистой ЖКТ, которые мы уже используем на программе:

- устранение из питания факторов, раздражающих слизистую
- сон в достаточном количестве, режим питания, снижение уровня стресса
- достаточно белка в питании, в частности – источников глутамина
- обволакивающие меры: кисели изо льна и овса, крахмалистые овощи в меню
- масло облепихи
- фитосоставы



HOLISTICA DOC

Дополнительно мы можем использовать меры:

- защиты слизистой
- питания клеток
- заживления слизистой



ДИСКЛЕЙМЕР

ВСЁ, РАССКАЗАННОЕ В ЭТОМ УРОКЕ, – ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, НЕ ЗАМЕНЯЮЩИЕ И НЕ ОТМЕНЯЮЩИЕ ТОГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НА ПРОГРАММЕ:

- **здоровое питание**
- **ЗОЖ**
- **сон**
- **простые травы и специи**

Дополнительная защита слизистой

Растения с обволакивающими свойствами

При контакте с водой слизи, камеди, пектины в их составе образуют вязкий гель, который покрывает слизистую оболочку тонкой плёнкой, защищая её от раздражения, кислот, ферментов и механического повреждения:

- солодка голая корень (licorice root)
- алтей лекарственный корень (marshmallow root)
- подорожник большой лист (plantain leaf)
- мастиковая смола (mastic gum)
- кора скользкого вяза (slippery elm bark)
- сушеница болотная трава (cudweed herb)

Все эти растения **снижают раздражение слизистой, оказывают обволакивающее действие**. Плюс солодка и мастиковая смола по данным исследований эффективны против *H. pylori!*

Но! Использовать обволакивающие надо только по показаниям: гиперчувствительность пищевода, повреждение пищевода, эрозии слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный процесс.



Если использовать не по показаниям, а просто «на всякий случай», можно **остановить себе пищеварение** (затормозить механическую и секреторную деятельность желудка и двенадцатиперстной кишки)!

HOLISTICA DOC

Фитосбор «заживляющий»
для желудка и кишечника из русской фитотерапии

Общее действие: гастропротективное, спазмолитическое и противовоспалительное.

Показания:

- стойкие / рецидивирующие эрозивные процессы в желудке и кишечнике
- избыточная секреция желудочного сока
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки
- гиперчувствительная слизистая пищевода, желудка, реагирующая на пищевые раздражители
- обострение воспалительных процессов в желудке и двенадцатиперстной кишке

Фитосбор «заживляющий»

для желудка и кишечника из русской фитотерапии

- лист подорожника – 15 г
- трава сушеницы болотной – 15 г
- корень солодки – 10 г
- цветки ромашки – 20 г
- трава тысячелистника – 10 г
- плоды шиповника – 20 г



Свойства растений в сборе:

- **солодка корень** – увеличивает секрецию слизи в желудке, ускоряет заживление эрозий; противовоспалительное, умеренное противомикробное действие (включая *H. pylori*)
- **лист подорожника** – регенератор слизистой ЖКТ, обволакивающее действие на слизистую, помогает заживлять эрозии, умеренно антибактериальный и противовоспалительный эффект
- **сушеница болотная трава** – обволакивает и защищает слизистую желудка и кишечника, уменьшает воспаление, показана при эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ и гастритах







Свойства растений в сборе:

- **ромашка цветки** – противовоспалительное, антисептическое действие, успокаивает слизистую, снижает спазмы, облегчает метеоризм и вздутие
- **трава тысячелистника** – спазмолитическое, умеренное желчегонное, противовоспалительное
- **плоды шиповника** – антиоксидантная защита слизистой, стимулирует выработку желчи







Как принимать состав

Смешать травы и измельчить.

Дозировка при фракции крупнолистовой чай:
1 столовая ложка без горки сбора на 200–250 мл горячей воды, настоять, пить по 1/2 стакана после еды или в промежутках между приёмами пищи.

Курс приёма – 2–3 недели.



Как принимать состав

Дозировка при фракции порошок: половина чайной ложки без горки сбора на 200–250 мл горячей воды, настоять, пить по 1/3 стакана после еды или в промежутках между приёмами пищи.

Курс приема – 2–3 недели.



Используем состав в половинной дозировке! (половина столовой ложки крупного помола или четверть чайной ложки порошка на 200–250 мл воды):

- **низкий ИМТ, выраженный недостаток веса**
- **высокая чувствительность к лекарственным средствам и травам**
- **гиперчувствительность слизистой на любые пищевые раздражители**

Ограничения

Беременность: приём по согласованию с лечащим врачом.

Солодка голая: вывести из состава при наличии **гипертонии**.

Индивидуальные аллергические реакции.

Если нет возможности сделать сбор, пьём что-то одно на выбор:

- мастиковая смола
- отвар корня солодки / деглицирризированная солодка DGL
- настой коры скользкого вяза
- алтей лекарственный / marshmallow













HOLISTICA DOC

Делаем отвары самостоятельно



Отвар корня солодки

Залейте 200 мл воды
1 столовую ложку без горки (4–5 г) измельчённого сухого корня солодки. Нагрейте на водяной бане до кипения. Держите на слабом огне под крышкой 10 минут. Снимите с огня, дайте настояться 30–40 минут. Процедите и доведите объём до 200 мл, добавив кипячёную воду при необходимости.

Пейте по 50—70 мл 2–3 раза в день.

HOLISTICA DOC


Делаем отвары самостоятельно

Отвар коры скользкого вяза

Залейте 200 мл воды 1 чайную ложку без горки (2–3 г) порошка коры скользкого вяза. Нагрейте на водяной бане до кипения. Держите на слабом огне под крышкой 10 минут. Остудите, процедите (может получиться густой отвар, похожий на гель — это нормально).

Пейте по 50–70 мл 2–3 раза в день.

Курс приёма – 3–4 недели.



Либо используем
комбинированные формы

Мастиковая смола + DGL солодка



Supplement Facts

Serving Size 2 Chewable Tablets
Servings Per Container 30

Amount Per 2 Tablets		% Daily Value
Calories	10	
Total Carbohydrate	3 g	1%**
Dietary Fiber	1 g	4%**
Sodium	5 mg	<1%**
Deglycyrrhizinated Licorice (DGL) Extract (*Glycyrrhiza glabra*) (root)	300 mg	*
Mastic Gum (*Pistacia lentiscus*) (mastic tree bark resin)	150 mg	*

**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
*Daily Value not established.

HOLISTICA DOC

DGL солодка, алтей, скользкий вяз, алоэ



HOLISTICA DOC

Дополнительные меры для заживления слизистой

L-глутамин


Глутамин – заменимая аминокислота. Источник энергии для клеток кишечника, способствует их росту, увеличивает объём и вес слизистой оболочки ЖКТ, защищает её от атрофии, улучшает барьерную функцию, предотвращает синдром повышенной кишечной проницаемости (leaky gut).


Содержится в белковой пище: постная говядина, филе и грудка птицы, бульоны, белок яйца, рыба, тофу, бобовы и т. д.

Дозировка от 1000 мг. **Приём** – 30–60 дней.

Противопоказания:

- цирроз печени с гипераммониемией
- онкологические заболевания (потенциальная стимуляции роста быстро делящихся клеток)
- нарушение работы почек





HOLISTICA DOC

Цинк-L-карнозин

Соединение цинка и дипептида карнозина. Обволакивает слизистую, ускоряет заживление язв и эрозий (стимулирует пролиферацию эпителиальных клеток, увеличивает секрецию муцина), противовоспалительное действие. Изучено действие при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите, повреждениях слизистой от НПВС, поддержке слизистой при химиотерапии.

Пищевые источники карнозина – продукты животного происхождения (мясо, птица, рыба). **Пищевые источники цинка:** устрицы, говядина, тыквенные семечки, кешью, яйца и др.

Дозировка: 75 мг. **Приём** – 30–60 дней.

Противопоказания: избыток цинка в организме (при длительном приёме нужно контролировать)





N-ацетил-D-глюкозамин (NAD)

Структурный компонент гликозаминогликанов межклеточного матрикса, прекурсор для синтеза гиалуроновой кислоты.

Участвует в синтезе мукополисахаридов, которые защищают и восстанавливают слизистые оболочки ЖКТ. Улучшает среду кишечника для роста комменсальных бактерий.


За счёт улучшения барьерной функции кишечника снижает сенсибилизацию к белкам пищи, может снижать симптомы пищевой непереносимости (глютен, молочные продукты и др.).

Полезен при воспалительных заболеваниях кишечника, после антибиотикотерапии и т. д.

Синтезируется в организме из глюкозы и глутамина (едим достаточно белка и углеводов!).

Дозировка:
500–1000 мг
1–2 раза в день.

Приём – 30–60 дней.





HOLISTICA DOC

Либо используем

комбинированные формы

L-глутамин + цинк-L-карнозин





HOLISTICA DOC

L-глутамин + цинк-L-карнозин + N-ацетил-D-глюкозамин + кора скользкого вяза + корень алтея + корень солодки + витамин U + кверцитин + алое вера + стевия





HOLISTICA DOC

Питание слизистой и клеток органов ЖКТ

Лецитин (фосфатидилхолин):

- защита мембран клеток слизистой, поддержка их проницаемости и устойчивости к повреждению
- помогает формировать гидрофобный слой, который препятствует проникновению кислоты и пепсина к эпителию желудка
- метилирование ДНК и восстановление клеток



Клинические исследования:

- приём соединений фосфатидилхолина снижает риск повреждений слизистой от НПВС на 80 %
- улучшение симптомов ВЗК при длительном применении



Пищевые источники: желток яйца, печень, семечки и орехи, соевые продукты.

Приём в виде лецитина или эссенциальных фосфолипидов.


Витамин А:

- регуляция экспрессии генов, ответственных за созревание и обновление эпителиальных клеток в слизистой ЖКТ
- стимуляция продукции муцина клетками кишечника
- иммуномодулирующее действие
- дефицит витамина А приводит к атрофии слизистой кишечника, снижению количества бокаловидных клеток и нарушению барьерной функции
- в клинической практике витамин А используется для поддержки слизистой у пациентов с:
  - целиакией
  - воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК)
  - язвенным гастритом

Пищевые источники:

- ретинол: печень, сливочное масло, желток яйца
- каротиноиды (предшественники ретинола): морковь, тыква, шпинат, батат





Дозировка:
от 5000 до 10 000 МЕ. Длительно бесконтрольно принимать нельзя! Курс – 30 дней.

Во время беременности – нельзя в высоких дозах! *(можно только в небольших в составе мультивитаминов)*

Бутират (масляная кислота)

Одна из важнейших короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) для здоровья ЖКТ, особенно для толстой кишки. Продукт ферментации пищевых волокон (клетчатки) бактериями кишечника.





HOLISTICA DOC

Бутират (масляная кислота):

- питание для клеток кишечника
- восстановление слизистой и барьерной функции кишечника
- противовоспалительное действие
- антиканцерогенный эффект: способствует апоптозу (гибели) мутировавших клеток. Может защищать от колоректального рака, особенно у людей с предрасположенностью (полипы, воспаление)
- поддерживает рост полезных бактерий. Является индикатором «здорового» микробиома — чем больше бутирата, тем выше микробиотическая устойчивость





Бутират (масляная кислота):

- при язвенном колите и синдроме раздражённого кишечника (СРК) у пациентов часто наблюдается сниженный уровень бутирата в кишечнике
- применение масляной кислоты даёт снижение симптомов СРК, ускорение заживления слизистой при воспалении, нормализацию стула при диарее и запорах, вызванных дисбиозом

Стимуляция синтеза масляной кислоты через питание: спаржа, бобовые, перловка, овсянка, яблоки, охлаждённый рис / картофель.


Как всё это использовать?



База:

- устранение из питания факторов, раздражающих слизистую
- сон в достаточном количестве, режим питания, снижение уровня стресса
- полноценное и разнообразное питание, включающее источники глутамина, лецитина, витамина А, «подкормку» для микробиоты, кисели изо льна и овса, крахмалистые овощи
- масло облепихи
- фитосоставы





HOLISTICA DOC

Как всё это использовать?

При необходимости выбрать что-то одно из дополнительных обволакивающих: либо моноформу, либо фитосостав. Если нет показаний, обволакивать не надо!

Выбрать 1–2 из дополнительных восстанавливающих (L-глутамин, цинк-L-карнозин, N-ацетил-D-глюкозамин).

Выбрать одно из дополнительных напитывающих. Если нужен больше эффект на желудок – лецитин, если на кишечник – бутират / витамин А.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ДЕЛАЙТЕ СЕБЕ СХЕМЫ ИЗ 10 ДОБАВОК!