HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Изжога, рефлюкс, ГЭРБ - часть 2

Лечение ГЭРБ можно условно разделить на две стратегии:

- быстрое уменьшение симптомов;
- устранение причин, поддерживающих рефлюкс.



Идеально, когда они используются **одновременно.**


Медикаментозное лечение ГЭРБ:
плюсы и минусы
HOLISTICA DOC

Ингибиторы протонной помпы (ИПП)

Омепразол, Пантопразол, Эзомепразол и др.

Как работают?

Уменьшают образование соляной кислоты в желудке. Не снимают уже возникший приступ изжоги. Их эффект развивается постепенно и наиболее выражен через несколько дней регулярного приема.








HOLISTICA DOC

Когда они действительно нужны?

ИПП являются препаратами первой линии при: эрозивном эзофагите, язвах пищевода, тяжелой ГЭРБ, пищеводе Барретта.



ИПП не устраняют причину рефлюкса.



Если **сохраняются ожирение, переедание, слабость нижнего пищеводного сфинктера, нарушение моторики,повышение внутрибрюшного давления,** - то после прекращения приема **ИПП симптомы ГЭРБ вернутся.**

HOLISTICA DOC

Возможные риски длительного приема ИПП

- повышение риска инфекций желудка и кишечника (H. pylori, Clostridioides difficile);
- снижение всасывания витамина B_{12}, магния, кальция и железа;
- синдром «кислотного рикошета» после резкой отмены.




Длительный прием ИПП должен проходить под наблюдением врача и только при наличии показаний!

HOLISTICA DOC

Почему нельзя резко отменять ИПП?

После длительного приема может развиваться **синдром кислотного рикошета**. Желудок начинает временно вырабатывать больше кислоты, чем до лечения, поэтому симптомы ГЭРБ могут усилиться.

Поэтому от ИПП отказываются **постепенно.**



Антациды

Маалокс, Алмагель, Фосфалюгель

Нейтрализуют уже выделившуюся соляную кислоту и уменьшают жжение.

Вариант симптоматической помощи:
действуют быстро, но недолго, не предотвращают новые эпизоды рефлюкса,не устраняют причину заболевания.







HOLISTICA DOC


Альгинаты

Гевискон и препараты на основе альгината натрия.

После попадания в желудок **образуют защитный гель («плавающий плот»)**, который располагается поверх желудочного содержимого и уменьшает попадание кислоты в пищевод.



Преимущества: *действуют быстро, практически не влияют на кислотность желудка, подходят для симптоматического облегчения.*



Прокинетики

Итоприд, Домперидон.



Их задача — ускорить эвакуацию пищи из желудка и уменьшить вероятность рефлюкса.

Эти препараты полезны, когда человеку нужно мягко и без *"кислотного рикошета"* отказаться от ИПП.

Дополнительно используются гастропротекторы - растительные средства со слизистыми полисахаридами: корень алтея, скользкий вяз, деглицирризированная солодка (DGL).
Слизистые вещества временно покрывают слизистую защитным слоем и уменьшают раздражение.



HOLISTICA DOC

Смотрите дополнительные
меры в уроки

"Заживляем слизистую"!

ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И
СХЕМЫ ИХ ОТМЕНЫ НАЗНАЧАЕТ ВРАЧ.





Сода при изжоге

Сода может на несколько минут уменьшить изжогу. **Но эффект очень кратковременный.**

После приема соды в желудке образуется большое количество углекислого газа, желудок растягивается, внутрижелудочное давление повышается, вероятность нового рефлюкса увеличивается.

Поэтому сода не рекомендуется как способ лечения ГЭРБ.



База коррекции ГЭРБ - образ жизни



HOLISTICA DOC

Основные рекомендации:

- поддерживать нормальную массу тела (особенно уменьшать висцеральный жир);
- отказаться от курения;
- ограничить употребление алкоголя;
- не носить тесную одежду, тугие ремни и корсеты (повышают ВБД);
- пересмотреть препараты, которые могут усиливать рефлюкс (совместно с врачом).



Сон

Ночной рефлюкс считается одним из самых повреждающих факторов для слизистой пищевода.

Поэтому рекомендуется

- соблюдать режим сна (лучший друг смыкания нижнего пищеводного сфинктера - гормон сна мелатонин);
- не ложиться после еды;
- ужинать за 3–4 часа до сна (поздние плотные ужины — один из самых частых провокаторов ночной изжоги);
- по возможности спать на левом боку;
- спать с приподнятым головным концом кровати на 10–15 см;
- обеспечить прохладную, темную и хорошо проветриваемую спальню.



Положение подушки при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни



HOLISTICA DOC

Физическая активность

Ограничить:

- вакуум живота;
- поднятие тяжестей;
- упражнения с сильным напряжением мышц пресса;
- глубокие наклоны сразу после еды;
- интенсивные силовые тренировки.



Полезны:

- ходьба;
- плавание;
- пилатес, спокойная йога, лечебная физкультура - с упражнениями на скручивание живота (помогают желчеоттоку и моторике ЖКТ).



Очень полезно диафрагмальное дыхание.

Диафрагма — важная часть антирефлюксного барьера.

Регулярные упражнения на диафрагмальное дыхание помогают **улучшить координацию дыхания, уменьшить тревогу и стресс, поддерживать работу нижнего пищеводного сфинктера и снижать частоту эпизодов рефлюкса.**



HOLISTICA DOC

Питание при ГЭРБ

Главный принцип - индивидуальный подбор рациона.

Придерживайтесь вашего протокола питания на программе: в нем исключены тригеры изжоги и рефлюксов сообразно вашему типу пищеварения.



HOLISTICA DOC

1. Не переедать

Рекомендуется:


- объем одного приема пищи **до 300 мл;**
- **есть спокойно,** не торопясь, отводя на крупные приемы пищи не менее 20 минут (для достижения чувства насыщения без переедания);
- заканчивать прием пищи **до появления чувства переполнения.**



2. Есть медленно и тщательно пережевывать пищу

Быстрая еда = заглатывание воздуха = усиление рефлюкса.

Слюна ощелачивает и нейтрализует кислоту в пищеводе.
Не есть на бегу, в машине и др. Есть за столом, уделяя каждому приему пищи достаточно времени



HOLISTICA DOC

3. Режим питания

- 3–5 полноценных приемов пищи;
- без постоянных перекусов;
- последний прием пищи — за 3–4 часа до сна.

После еды желательно не ложиться и не наклоняться вперед минимум 2 часа.



4. Теплая еда

(около 40-55 гр. С)




HOLISTICA DOC

5. Достаточно жидкости

Воду лучше пить **небольшими порциями** в течение дня, предпочтительна теплая вода **40-50 гр. С.**

При склонности к ночной изжоге желательно не пить много перед сном.



HOLISTICA DOC

6. Продукты с пищевыми волокнами (клетчаткой):

овощи, фрукты, зелень, ягоды, крупы, бобовые.

Пищевые волокна: ускоряют эвакуацию пищи из желудка, улучшают моторику кишечника, уменьшают вероятность запоров, помогают контролировать массу тела, способствуют снижению внутрибрюшного давления. Достаточное количество клетчатки считается одним из наиболее полезных компонентов питания при ГЭРБ.



HOLISTICA DOC

Современные исследования показывают, что **триггеры рефлюкса индивидуальны**.

Необходим дневник питания!

Чаще всего это:

- мята и ментол;
- алкоголь;
- крепкий кофе;
- шоколад;
- какао;
- крепкий чай;
- очень жирная пища;
- острые блюда;
- газированные напитки;
- квас;
- пиво.

*Если отказаться от кофе сложно, допустимо **1 небольшая чашка после еды,** ориентируясь на индивидуальную переносимость.*

HOLISTICA DOC



При воспалении пищевода временно ограничить:



- острые специи: красный жгучий перец, черный перец, чеснок, хрен, горчица, имбирь, асафетида;
- сырой чеснок и лук;
- продукты с выраженно кислым вкусом: томаты, щавель, кислые ягоды, цитрусовые и др.;
- кетчупы и острые соусы;
- маринады и соленья;
- чипсы и снеки;
- фастфуд и другая пища, которая может содержать усилители вкуса и добавки.

HOLISTICA DOC

ГЭРБ КАК ПРАВИЛО ВТОРИЧЕН ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ПРОБЛЕМАМ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.


ГЭРБ - ИХ СЛЕДСТВИЕ.

УБИРАЕМ ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ - ИЗЖОГА И ГЭРБ ПРОХОДЯТ САМИ.

Убираем высокое внутрибрюшное давление

Самые частые причины

- частое вздутие из-за дефицита ферментов, СИБР, СРК и др.;
- запоры;
- переедание;
- лишний вес в области живота.




Рекомендации по устранению этих проблем - смотрите в соответствующих уроках курса.

Восстанавливаем пищеварение

- Нормальная моторика и своевременное опорожнение желудка
- Ферменты поджелудочной железы
- Желчеотделение
- Моторика желудка и кишечника

Все необходимые рекомендации есть в ваших протоколах: в меню, кулинарных рецептах, уроках ваших протоколов.




Восстанавливаем сфинктеры

1. Сон и циркадные ритмы

Влияние на смыкание нижнего сфинктера пищевода и регенерацию слизистой:

- Важно захватывать п**ик мелатонина** 22.00-2.00.
- **Стабильный отход ко сну** +/- в одно время.
- **Достаточная** продолжительность сна.



Восстанавливаем сфинктеры

2. Полноценное питание соединительной ткани и коррекция ДСТ

- достаточное количество белка и его хорошее усвоение;
- витамин С;
- медь;
- марганец;
- кремний;
- магний.



Восстанавливаем сфинктеры

3. Снижаем хронический стресс

Техники управления стрессом из ваших протоколов: гимнастика, дыхательные практики, магний, ванночки для ног и тд.







Восстанавливаем слизистую пищевода и убираем воспаление

(для тех, кому это надо)

Используются растения и нутрицевтики с заживляющим и противовоспалительным действием: алтей, скользкий вяз, цинк-L- карнозин, глутамин, алоэ, витамины А и Е, облепиха, солодка DGL и др.



Смотрите подробности в уроки "Заживляем слизистую"! Есть важные нюансы их использования.



HOLISTICA DOC

Дополнительно: используем "противоязвенный фактор" - витамин U (S-метилметионин)

Витамин U способен:

- участвовать в процессах восстановления слизистой желудка и пищевода;
- защищать клетки слизистой от повреждения;
- уменьшать выраженность воспаления;
- способствовать более быстрому заживлению эрозий и язв;
- участвовать в синтезе фосфолипидов клеточных мембран.



ИСТОЧНИКИ:

- белокочанная капуста;
- брокколи;
- брюссельская капуста;
- спаржа;
- сельдерей.




Рецепт: для ускорения заживления слизистой пить сок белокочанной капусты - по 1 ст. ложке 2-3 раза в день между приемами пищи (по переносимости!)

Улучшаем моторику желудка

Что ухудшает моторику желудка

- постоянные перекусы, отсутствие периода "голодного окна";
- переедание;
- большие объемы пищи;
- избыток жиров за один прием пищи;
- длительный стресс;
- нарушение сна, недосып;
- гиподинамия;
- снижение тонуса блуждающего нерва;
- дефицит ацетилхолина;
- высокий дофамин;
- воспаление слизистой желудка.



Интервалы между приемами пищи:
3,5–5 часов.

Движение

10–20 минут спокойной ходьбы после еды значительно ускоряют эвакуацию содержимого желудка.



Повышение активности блуждающего нерва:

- диафрагмальное дыхание, медленный длинный выдох;
- пение;
- смех;
- полоскание горла;
- умываться холодной водой.

Работа со стрессом

Высокий симпатический тонус буквально "выключает" пищеварение.

Во время хронического стресса:

- снижается выделение ацетилхолина,
- повышается уровень дофамина,
- уменьшается сила сокращений желудка,
- нарушается координация антрального отдела и привратника.



HOLISTICA DOC

Пищевые прокинетики

Горечи: руккола, садовая зелень, цикорий, эндивий, радиккьо, листья одуванчика, артишок

Лимон (только при отсутствии активной изжоги и эрозий)

Ферментированные продукты (органические кислоты стимулируют желудочную секрецию)

Белок: яйца, рыба, птица, морепродукты.

Специи-прокинетики + повышение холнергической передачи



HOLISTICA DOC

- Имбирь
- Черный перец
- Кориандр
- Фенхель
- Кардамон
- Кумин (зира)
- Розмарин
- Куркума
- Черный тмин



Растительные прокинетики (по назначению врача): Иберогаст по 30 капель 2-3 раза в день, курсами по 2–3 недели.



HOLISTICA DOC

Итоговый алгоритм: если есть изжога

1. **Альгинатный тест** (по желанию)
2. **Диагностика с гастроэнтерологом:** опрос, ФГДС, по необходимости - 24-часовая pH-импедансометрия
3. **Применяем базовые меры** в питании и образе жизни.
4. **Оцениваем свой тип пищеварения** и жалобы и расставляем приоритеты коррекции



HOLISTICA DOC

Вялый тип пищеварения	• **Устраняем вздутие** из-за недостатка ферментов поджелудочной и плохого желчеоттока. • Улучшаем **моторику желудка.** • Устраняем то, **что тяжело переваривается** (тяжелые сочетания,избыток жиров и тд.)
Чувствительный тип пищеварения	• Устраняем **вздутие из-за СРК.** • Работаем **со смыканием сфинктеров желудка.** • **Снижаем чувствительность пищевода** (стресс, сон, белок, жиры и другие защитные факторы слизистой)

Воспаленный тип пищеварения	• **Устраняем вздутие из-за СИБР** и воспаления в кишечнике. • **Заживляем слизистую пищевода** и снижаем воспаление. • Восстанавливаем **смыкание сфинктеров желудка.**
Смешанный тип пищеварения	• Меры при **вялом типе пищеварения.** • Меры при **воспаленном типе пищеварения.**