HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ




Воспалённое пищеварение: что делать дальше?

Режим и движение

Сон вовремя: с 22:00–23:00 до 06:00–07:00.

Важно досыпать свою норму!

1. Достаточное количество движения в течение дня: **минимум 30 минут** физ. нагрузки низкой или средней интенсивности
2. **Стабильный ритм работы, отдыха, сна, движения.** Предсказуемость и ритмичность снижает уровень стресса = восстановление защитных факторов слизистой ЖКТ, снижение рисков обострений



Сорбенты / источники клетчатки: псиллиум, чиа, лён, рисовый суп

Когда используем:


- отравление
- **если был длительный перерыв** в использовании ЗОЖ-питания и вы возвращаетесь к рекомендациям
- **подготовка к детоксу** / голоданию 24+ часа
- **дефицит клетчатки:** на фоне исключения FODMAP-продуктов
- комплексная работа с запорами

Напитки

- ТКВ
- Чай противовоспалительный с сафлором, кориандром, душицей
- Чай успокаивающий с ромашкой, бадьяном, мятой, душицей
- Чай мягкий желчегонный с ромашкой, тысячелистником, календулой
- Овсяный / льняной кисель

Бонусы

- Чай против вздутия (кориандр, зира, фенхель)



ГКВ – постоянно, круглогодично (зимой – теплее, летом – прохладнее).

Овсяный / льняной кисель – использовать в комплексе для восстановления слизистой до исчезновения жалоб (изжога, чрезмерная реакция пищевода и желудка на холодное / горячее, кислый, жгучий вкусы).



Пропить курсом **в 4 недели,** далее – применять **2–3 раза в неделю** либо чаще, если есть необходимость.

Чередовать в течение недели (1 день – 1 напиток) либо пить каждый напиток небольшими курсами по 1 неделе:

- чай против вздутия
- чай противовоспалительный с сафлором, кориандром, душицей
- чай успокаивающий с ромашкой, бадьяном, мятой, душицей
- чай мягкий желчегонный с ромашкий, тысячелистником, календулой

Можно составлять свои чайные миксы из предложенных трав (не более 3–4 в одном чае).

Меню

1. **Устранение из питания факторов, раздражающих слизистую, поддерживающих воспаление, затрудняющих пищеварение:**

   - **овощи** с ярким кислым и жгучим вкусом
   - избыток животного белка с насыщенными жирами
   - **фрукты и ягоды** с выраженно сладким или кислым вкусом
   - избыток грубой клетчатки без термической обработки
   - пища с жареной корочкой
   - «тяжёлые» бобовые
   - крепкие бульоны
   - **молочные продукты** высокой жирности
   - смешение большого количества разных продуктов и т. д. (см. урок «Еда: какая делает мне хуже, а какая – лучше?»)

По возможности строгое ограничение этих мер **на протяжении 2–2,5 месяцев** – на этапе активного заживления слизистой и вывода воспаления.

Далее – **пробуем понемногу любимые продукты,** наблюдаем за реакцией ЖКТ.



Некоторые ограничения – оставить на постоянной основе: переедание, тяжёлые сочетания, крепкий алкоголь, энергетики, избыток жиров, копчёное, пригоревшее, маринады с уксусом и т. д.

2. Использование противовоспалительных и восстанавливающих слизистую продуктов:

- **нежирные источники** белка в щадящей термической обработке
- **чередование** животного и растительного белка (по возможности, при условии хорошей переносимости бобовых)
- **супы каждый день**
- **овощи** – 70 % приготовленных, 30 % сырых
- кисломолочные
- **акцент** на теплую приготовленную пищу
- **лёгкие и средние сочетания продуктов**
- **ритмичное питание** без пропусков и т. д.

Все эти и другие меры из уроков оставляем как базу рациона, **то есть используем всегда.**

Вы можете заменять рецепты, добавлять ваши – главное, оставить принципы рациона

Чтобы снять напряжение по поводу ограничений в еде, через 2–2,5 месяца переходим на ЗОЖ 80/20 (см. урок «Гибкий ЗОЖ»).



Специи

Более согревающие	Менее согревающие
Душистый перец Орегано	Куркума Зира (кумин) Тмин обыкновенный Кориандр Фенхель Бадьян Розмарин Тимьян Лист пажитника Лавровый лист

- Менее согревающие специи можно использовать круглогодично
- Более согревающие специи добавляем преимущественно в блюда, где есть много белка и жиров
- В холодные сезоны – более активно, в тёплые – менее активно

Соблюдайте кулинарные дозировки специй, не ешьте их «ложками»!



Фитосредства и добавки

- Пищеварительный: отвар Иролтуева
- Противовоспалительный и желчегонный: Трифала
- Масло облепихи

Бонусы

- Кашица / сок картофеля
- Мумие + отвар трифалы
- Фитосбор «противовоспалительный» (ромашка, мята, тысячелистник, зверобой, сушеница, подорожник, полынь)
- Средства **для защиты слизистой:** солодка / алтей / мастиковая смола / сбор «заживляющий»
- Средства **для восстановления** слизистой и муцинового слоя: L-глутамин, цинк-L-карнозин, N-ацетил-D-глюкозамин
- Средства **для «напитывания» клеток ЖКТ:** витамин А, лецитин, масляная кислота

Базовая схема для вывода воспаления, заживления слизистой и фоновой поддержки функций желудка, поджелудочной железы, желчеоттока, кишечника:

завтрак – отвар Иролтуева;

обед – отвар Трифалы;

в течение дня: кисель + масло;

после ужина / перед сном – кашица / сок картофеля.

Курс – 1–2 месяца.

Если начинается обострение / активизируется воспаление:

мумиё + отвар Трифалы, **приём – 4–6 дней.**

Апгрейд схемы, при необходимости дополнительно защищать, восстанавливать и «напитывать» слизистую:

завтрак: отвар Иролтуева + одно из средств для восстановления слизистой и муцинового слоя (L-глутамин, цинк-L-карнозин, N-ацетил-D-глюкозамин);

в течение дня: фитосбор «противовоспалительный» между приёмами пищи;

в течение дня: кисель + масло;

в течение дня: одно из средств для защиты слизистой (солодка / алтей / мастиковая смола и т. д.);

после ужина / перед сном – кашица / сок картофеля;

Курс – 1–1,5 месяца.

После этого перейти к упрощенной схеме + добавить одно из средств для «напитывания» клеток ЖКТ:

завтрак – отвар Иролтуева + витамин А / лецитин / масляная кислота;

в течение дня – одно из средств для защиты слизистой (солодка / алтей / мастиковая смола и т. д.);

2–3 раза в неделю можно оставить как поддерживающее L-глутамин / цинк-L-карнозин / N-ацетил-D-глюкозамин.

Курс – 1 месяц.

После этого – контроль анализов!

Учитывайте ограничения и противопоказания для всех методов!

Гимнастика
для воспалённого пищеварения

Использовать курсом 4 недели подряд.

В идеале включить эту меру далее в ежедневную практику либо делать гимнастику не менее **3–4 раз в неделю.**



Воспалённый тип пищеварения проявляется жалобами:

- изжога, жжение в пищеводе и желудке от кислого, острого
- **боли или жжение в животе:** на голодный желудок, на алкоголь, кислое, острое, жгучее, горькое **через 1–1,5 часа после еды**; ночные, боли в правом боку, опоясывающие и отдающие в спину, на ферментированную пищу
- тошнота
- диарея или несформированный стул / запоры
- слизь в стуле

Дополнительные жалобы на фоне длительно протекающего воспаления:

- тяжесть после еды
- вздутие живота после еды, вечером
- ощущение, что еда медленно переваривается и долго стоит в желудке
- отрыжка
- чувствительность пищевода и желудка к температуре пищи и напитков
- газообразование от клетчатки (яблоки, зелень, капуста)



Жалобы можно взять под контроль за 2–2,5 месяца активной программы, с учётом соблюдения:

- питания
- контроля стресса, соблюдения образа жизни
- использования чаёв, фитосоставов
- дополнительных мер по устранению воспаления и заживления слизистой

Через 2–2,5 месяца необходим повторный контроль анализов (можно запросить у гастроэнтеролога индивидуальные рекомендации):

- ФГДС
- кал на кальпротектин и скрытую кровь
- **анализы крови на маркеры воспаления:** СРБ ультрачувствительный, СОЭ, ферритин
- (?) «Гастропанель»

После оценки результатов можно переходить в режим поддержки, соблюдая рекомендации по питанию менее строго (см. урок «Гибкий ЗОЖ»).

При наличии диагнозов есть риски обострений:

- эрозивный гастрит
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- дуоденит
- холецистит
- хр. панкреатит
- **воспалительные заболевания кишечника:** колит, язвенный колит, энтерит и т. д.



Рекомендуется разумное соблюдение принципов ЗОЖ 80/20.

Ежегодный контроль состояния у гастроэнтеролога с мониторингом анализов.

Возможно профилактическое использование противовоспалительных отваров (Трифала, Иролтуева) 2 раза в год – осенью и весной, курсом по 3–4 недели.