HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Напитки на программе

что, сколько и когда пить при смешанном пищеварении

О чём этот урок

Разбираем, какие напитки полезны, а какие стоит ограничить при **смешанном типе пищеварения**.

Логика выбора: при смешанном типе ЖКТ ослаблен, но слизистая может быть раздражена и склонна к воспалению. Значит, напитки **не должны охлаждать и замедлять моторику** (как при вялости), но и **не должны раздражать слизистую** и усиливать возможное воспаление (гастриты, чувствительный кишечник, колиты).

Базовый подход: тёплые, мягкие, нейтральные напитки без резкой стимуляции.

1. Что стоит ограничить

Ограничить ≠ исключить. Это значит пить меньше, особенно если пьёте на постоянной основе. Полностью убирать — только если видите прямой вред: выпили и плохо себя чувствуете. Любому напитку есть место в рационе — вопрос количества и уместности.

Что ограничить	Почему
Холодные напитки — комнатной температуры и ниже, особенно со льдом; до, во время и после еды	ЖКТ, его ферменты и нервная система любят тепло. Холодное замедляет и затрудняет работу ЖКТ, которая при смешанном типе и так не оптимальна. В жару можно что-то прохладное, но не вокруг приёмов пищи
Кисели и другие обволакивающие напитки	Обволакивание слизистой замедляет моторику, которая и так не идеальна
Холодное молоко (животное или растительное), молочные коктейли	Трудно переваривается, обволакивает, плюс холод; коктейли — холодные жиры. Молоко лучше согреть до температуры тела и выше, животное — прокипятить и остудить
Газировка — с сахаром и без	Углекислый газ избыточно стимулирует пищеварительный тракт
Крепкий кофе, крепкий чёрный чай	Избыточная стимуляция (некрепкие варианты — можно)
Энергетики	Двойной эффект: углекислый газ + стимулирующие вещества

Что ограничить	Почему
Кислые соки и морсы: гранатовый, томатный, из кислых цитрусовых	Регулярно много кислого при хроническом воспалении — риск обострения. Если любите — смешивайте со сладкими соками
Вода с уксусом и лимоном в большом количестве	Можно эпизодически, но не регулярно
Овощные соки из капусты и свёклы в чистом виде	Выраженное стимулирующее действие на ЖКТ
Смузи из зелени и фруктов регулярно и много	Большой объём сырой грубой клетчатки → повышается чувствительность кишечника, риск обострения
Квас, комбуча	—
Крепкий алкоголь в большом количестве	Риск обострения хронического воспаления. Если от алкоголя сильная изжога или болит поджелудочная — тело недвусмысленно говорит «не надо»
Пиво, сладкие вина, ликёры	Алкоголь усиливает чувствительность к гистамину — риск аллергических реакций (проблема части людей со смешанным типом). Плюс недобросовестные производители: некачественные ингредиенты, усилители вкуса

2. Горячая кипячёная вода — базовый напиток

ГКВ — кипячёная вода выше температуры тела, **40–55 °C**. Летом можно чуть прохладнее, в холодные сезоны — горячее. Приоритет — всегда тёплым и горячим напиткам: это базовая мера поддержки функций ЖКТ.

Когда	Сколько
Утром после пробуждения, до завтрака	1–2 стакана
За 15–20 минут до обеда, ужина, перекуса	По 1 стакану (в видео — за 20–30 минут или в промежутках между едой)
Итого ГКВ	4–5 стаканов в день (около 1 л), больше — по жажде
Всех напитков вместе	В среднем 1,5–2 л в день; можно больше

Для вкуса добавьте кусочек огурца, ложку любых ягод, пару листиков мяты или кусочек лимона — **только если комфортно переносите кислый вкус**.

3. Чай с кардамоном и кориандром

Ингредиенты

✔️ термокружка или небольшой термос на 0,35–0,5 л

✔️ 3 шт. цельного зелёного кардамона

✔️ щепотка цельных семян кориандра

✔️ ¼ кружочка лимона с цедрой — если хорошо переносите кислое регулярно

Приготовление

Всё положить в термос, залить ГКВ, настоять 10–15 минут. Специи можно не вынимать.

Пить в тёплом виде в течение дня.

Противопоказания: острые воспалительные процессы органов ЖКТ, поджелудочной, печени и жёлчного; индивидуальная непереносимость.

4. Травяные чаи

Рецепты — в уроках 1-й недели. Пейте 1–2 кружки в тёплом виде в течение дня, **чередуйте по дням недели**.

Чай	Действие
С шиповником и фенхелем	Мягкое стимулирующее действие, улучшение желчеоттока, продвижение пищи по ЖКТ
С ромашкой, липой и мятой	Лёгкое противовоспалительное и спазмолитическое действие, меньше вздутия и чувствительности кишечника. При изжоге мяту из рецепта уберите

В видео также упомянуты травяные чаи с ромашкой, липой, листом смородины и слабый настой шиповника.

5. Что ещё можно пить

Напиток	Как пить
Горячая вода со специями (кардамон, кориандр и др.)	Рецепт — выше и в предыдущих уроках

Напиток	Как пить
Тёплая вода с небольшим количеством лимона или яблочного уксуса	Эпизодически
Морсы из сладких ягод (малина, черника, голубика), компоты из сладких или кисло-сладких фруктов и сухофруктов	Обязательно со сладким вкусом: слива, груша, сладкое яблоко
Некрепкие чёрный чай, пуэр, кофе, зелёный чай, ферментированный иван-чай, цикорий или корень одуванчика	Если нет гиперреакции и изжоги. Не натощак — через 40 минут – 2 часа после еды
Тёплая минеральная вода	Малыми порциями, по переносимости (углекислый газ стимулирует). Если её рекомендовал гастроэнтеролог — по 100–150 мл в течение дня. Подогрейте в плошке с горячей водой до температуры тела: уйдёт лишний газ, польза останется
Сладкие овощные и фруктовые соки: морковный, тыквенный, сладкие фруктовые	Органические кислоты, минералы, микроэлементы без избытка кислоты
Молоко	Тёплым: довести до кипения и остудить. Добавить куркуму и зелёный кардамон — облегчают переваривание и гасят слизеобразующее действие. Плюсы: нервная система, сон, кальций
Некрепкое какао с молоком	Если любите

Горькие напитки и изжога: если горький вкус чая, кофе, какао или цикория вызывает у вас рефлюкс — лучше исключить их, чтобы слизистая пищевода восстановилась.

Если нужно выпить алкоголь

Когда этого требует социальная ситуация, выберите небольшую порцию:

- **полбокала сухого или полусухого вина** хорошего качества с минимумом усилителей вкуса;

- или **некрепкую настойку горько-вяжущего вкуса** на травах и кореньях — оптимально крепостью до 20°.

Главное — не злоупотреблять: можно обострить воспалительный процесс.

6. Итог: сколько и когда пить

Когда	Что и сколько
Утром до завтрака	1–2 кружки ГКВ
Через 40–60 минут после завтрака	Любой из рекомендованных чаёв с травами или специями
За 15–20 минут до обеда, ужина, перекуса	По 1 кружке ГКВ
В течение дня	Чай и другие напитки — по желанию

Тёплые, мягкие, нейтральные напитки без резкой стимуляции — основа питья при смешанном типе.

Вопросы для самопроверки

1. Каким требованиям должны отвечать напитки при смешанном типе пищеварения и почему?
2. Что значит «ограничить» напиток и когда его стоит исключить полностью?
3. Почему при смешанном типе вредны холодные напитки и когда особенно важно их избегать?
4. Почему при смешанном типе стоит ограничить кисели, хотя при воспалённом типе они полезны?
5. Как правильно пить молоко и зачем добавлять в него специи?
6. Почему ограничиваем газировку, энергетики, крепкий кофе и чай?
7. Как быть с кислыми соками, морсами и водой с лимоном?
8. Чем опасны смузи и овощные соки из капусты и свёклы при регулярном употреблении?
9. Какие риски несут пиво, сладкие вина и ликёры при смешанном типе?
10. Какая температура у ГКВ, когда и сколько её пить?
11. Как приготовить чай с кардамоном и кориандром и кому он противопоказан?
12. Какие травяные чаи используем и как они действуют?
13. Когда пить некрепкий чай и кофе? Что делать, если горькие напитки вызывают изжогу?
14. Как правильно пить минеральную воду?
15. Что выбрать, если нужно выпить алкоголь в социальной ситуации?