HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа


ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Признаки чувствительного пищеварения, и почему они возникают

Причины формирования чувствительного типа пищеварения

1. «Слабый» тип нервной системы: повышенная стресс-реактивность, тревожность. Симпатоадреналовая система включается чаще парасимпатической
2. Дезадаптация к острому и хроническому стрессу: хроническая усталость, нарушение сна и т. д.
3. Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ



4. В питании: нерегулярное питание, еда на бегу, отсутствие полноценных приёмов пищи, длительные перерывы между приёмами пищи, частые перекусы
5. Питание с избытком грубой клетчатки: сыроедение, вегетарианство, веганство
6. Строгие диеты, формирующие дефициты: витамины группы В, особенно В1, магний, железо, цинк
7. Неправильное голодание
8. Врождённые / приобретённые ферментопатии: целиакия, чувствительность к глютену, непереносимость молочных продуктов, фруктозы и пр.
9. Нарушения микробиоты вследствие ферментопатий, диет, инфекций, после приёма лекарств
10. Конституционный тип с преобладанием доша Ветер / Вата

Что означают ваши **жалобы**?

Трещины на языке.
Чувствительный язык.
«Географический» язык

Дефициты витаминов B9, B12.
Нарушение микробиома ЖКТ и полости рта






Изжога, жжение в пищеводе

Гиперчувствительный пищевод. Функциональная изжога.

ГЭРБ: снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера и заброс содержимого желудка в пищевод

Чувствительность к температуре пищи (неприятно глотать холодное или горячее)

Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ




HOLISTICA

Отрыжка

Несмыкание нижнего пищеводного сфинктера, ГЭРБ, замедленная эвакуация пищи из желудка

Слабые тянущие или ноющие боли в животе

Функциональная диспепсия (с гиперчувствительностью)




HOLISTICA


Дискомфорт или слабые боли в правом подреберье

Нарушение оттока желчи.


Возможные диагнозы: дискинезия желчевыводящих путей, сладж (застой) в желчном пузыре, хронический холецистит без камней.

Риски формирования камней желчного пузыря






Вздутие живота вскоре после еды, особенно на смешанную пищу, обильную трапезу, прохладные напитки




Не хватает ферментов поджелудочной железы, кишечника.


Возможные причины и диагнозы:

- нарушение желчеоттока
- снижение функции поджелудочной железы
- кишечные ферментопатии



Регулярное вздутие живота во 2-й половине дня	Нарушение моторики кишечника, гиперчувствительность кишечника, нарушение микробиома – проблемы с обработкой клетчатки. Возможные диагнозы: СРК, дисбиоз





Диарея, несформированный стул, слизь в стуле, ощущение неполного опорожнения кишечника	СРК. Недостаток ферментов тонкой кишки и поджелудочной железы, нарушение желчеоттока
Запор: • атонический • спастический	Нарушение моторики кишечника, нарушение микробиома
Газообразование от клетчатки (яблоки, зелень, капуста)	Избыток грубой клетчатки. Нехватка ферментов для расщепления клетчатки, гиперчувствительность кишечника