HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа


ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Причины формирования смешанного типа пищеварения

2 причины смешанного типа

1. **Есть хр. воспаление:**
   - Либо в самом ЖКТ, и выставлены такие диагнозы, как хр. гастрит, дуоденит, воспалительные заболевания кишечника, панкреатит;
   - Либо в печени и желчном пузыре, и выставлены такие диагнозы, как хр. гепатит, стеатогепатит, холецистит, синдром Жильбера;
   - Либо удален желчный пузырь
   - Либо есть системное хроническое воспаление, сопровождающееся аллергическими реакциями, артериальной гипертензией, аутоиммунными заболеваниями и тд.



2 причины смешанного типа

2. **Активность пищеварительной системы снижена**
   - Длительно протекающий хронический воспалительный процесс в органах ЖКТ
   - Хронический стресс, переутомление, хроническое нарушение режима: недостаток сна, позднее засыпание
   - Сидячий образ жизни, гиподинамия, нарушение осанки
   - В питании: избыток холодной пищи, сладкого, тяжелого, мучного, еды с обволакивающими свойствами
   - Строгие диеты, формирующие дефициты: витамины группы В, особенно В1, магний, железо, цинк

2 причины смешанного типа

2. **Активность пищеварительной системы снижена**
   - Привычки: регулярное переедание, еда на ночь, лежать и мало двигаться после приемов пищи, купание в холодной воде
   - Бариатрическая операция
   - Вторичные: гипофункция щитовидной железы, депрессия, вегетативная дисфункция (ВСД), неврозы, сахарный диабет 2 типа
   - Прием лекарств: антациды, ИПП, антидепрессанты, бета-блокаторы...
   - Старение
   - Конституционный тип с преобладанием доша Слизь / Капха

Почему могло сформироваться **воспаление в ЖКТ**



1. Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ
2. Острый стресс
3. Отравления и инфекции: H. pilori, сальмонелла и другие бактериальные штаммы, вирусные инфекции, простейшие и тд.
4. Длительный прием лекарственных препаратов (НПВС, глюкокортикостероиды, , препараты железа, калия, антибиотики, цитостатики)
5. Нарушение микробиома кишечника
6. Удаление желчного пузыря

Почему могло сформироваться **воспаление в ЖКТ**

7. Вторичные: как следствие других заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и др. систем, аутоиммунных болезней, сахарного диабета
8. Курение
9. Триггеры в питании: переедание, переизбыток жареной и жирной пищи, кислых продуктов, алкоголя, кофе, газированных напитков

Как правило, работает какая-то совокупность факторов. Подумайте, что из перечисленного актуально для вас.

Что означают ваши жалобы?

Тонкий белый налет на языке	Замедленное переваривание пищи в ЖКТ Нарушение микробиома ЖКТ и полости рта
Отпечатки зубов на языке	Отечность из-за сниженной функции поджелудочной и щитовидной желез






Тяжесть после еды

Ощущение медленного переваривания пищи

Ощущение переполненности желудка после еды

Замедленная эвакуация пищи из желудка из-за нарушения моторики и секреции пищеварительных соков.

Возможные диагнозы: функциональная диспепсия, гастриты различного типа, атрофия, гастропарез (замедленное опорожнение желудка)



HOLISTICA DOC

Отрыжка


Несмыкание нижнего пищеводного сфинктера

Возможные причины: повышение внутрибрюшного давления и ГЭРБ, замедленная эвакуация пищи из желудка.

Изжога

Рефлюкс желудочного содержимого в пищевод


Возможные диагнозы: ГЭРБ, гастропарез.



HOLISTICA


Боли на голодный желудок, жжение и боли в желудке через 1–1.5 ч после еды, боли на алкоголь, кислую пищу, горькую пищу и напитки

Повреждение слизистой желудка: поверхностный гастрит, эрозивный гастрит, язва желудка



HOLISTICA


Слабые тупые боли в правом подреберье




Нарушение оттока желчи, особенно при сниженной двигательной активности пузыря


Возможные диагнозы: дискинезия желчевыводящих путей (гипокинетическая форма), сладж (застой) в желчном пузыре, хронический холецистит без камней.

Риски формирования камней желчного пузыря.




Колющие боли в правом боку, особенно после жирной, жареной пищи	Воспаление или спазм желчного пузыря/протоков. Хр. холецистит, дискинезия желчных путей, желчные камни.






Вздутие живота вскоре после еды, особенно на смешанную пищу, обильную трапезу, прохладные напитки, жирную и белковую пищу




Не хватает ферментов поджелудочной железы, кишечника.

Возможные причины и диагнозы:

- Нарушение желчеоттока
- Снижение функции поджелудочной железы из-за хр. панкреатита, структурных изменений
- Врожденные или приобретенные дефекты синтеза кишечных ферментов и наличие пищевых непереносимостей



Боли в животе, в левом подреберье, отдающие в спину (опоясывающие)	Панкреатит





HOLISTICA DOC

Боли или жжение в животе через 1–2 часа после еды

Воспаление в тонкой кишке.

Дуоденит, язва 12-перстной кишки, энтерит, колит, болезнь Крона.





HOLISTICA DOC

Регулярное вздутие живота во 2й половине дня	Нарушение моторики кишечника, гиперчувствительность кишечника, нарушение микробиома - проблемы с обработкой клетчатки Возможные диагнозы: СРК, дисбиоз
Вздутие и боли на ферментированную пищу, пробиотики	Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке
Боли в животе и газообразование от клетчатки (сырые фрукты и овощи в большом количестве, салаты, капустные, грубая шкурка фруктов и овощей)	Синдром раздраженного кишечника

Диарея, несформированный стул, слизь в стуле	Маркер нарушения пищеварения в тонкой и толстой кишке: • Воспалительные заболевания кишечника • Недостаток ферментов тонкой кишки • Гипермоторный желчный • СИБР • СРК
Запор • Атонической • Спастический	Нарушение моторики кишечника, нарушение микробиома Нарушения в питании и образе жизни: недостаток клетчатки, жидкости, ферментированных продуктов, стресс, гиподинамия...